

TOMATE BHN




# TITAN

Planta indeterminada de porte alto con excelentes características tanto para invierno como para verano. Fruto tipo bola con hombros medios y cierre perfecto. Alta adaptabilidad a diferentes condiciones de cultivo.

## CARACTERÍSTICAS

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Altura aprox.:  | 1.8 metros  |
| Racimos/planta: | 8 – 10      |
| Frutos/racimo:  | 3 – 5       |
| Peso promedio:  | 250 – 350 g |
| Forma:          | Tipo bola   |



## RESISTENCIAS

|     |                           |     |                       |
|-----|---------------------------|-----|-----------------------|
| TMV | Tomato Mosaic Virus       | V   | Verticillium dahliae  |
| F1  | Fusarium oxysporum raza 1 | N   | Meloidogyne spp. (Mi) |
| F2  | Fusarium oxysporum raza 2 | LSL | Long Shelf Life       |
| F3  | Fusarium oxysporum raza 3 |     |                       |





# Glosario de Resistencias

Los códigos de resistencia se clasifican en dos niveles: HR (High Resistance / Resistencia Alta) e IR (Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia). Se organizan por grupo de patógeno: Virus → Bacterias → Hongos → Nemátodos.

## HR High Resistance / Resistencia Alta

La planta controla eficazmente el patógeno bajo presión normal de la enfermedad.

## IR Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia

La planta reduce el impacto pero puede mostrar síntomas leves bajo alta presión.

### VIRUS

#### TMV Tomato Mosaic Virus

Virus del mosaico del tomate. Causa moteado y deformación foliar.

#### TSWV Tomato Spotted Wilt Virus

Virus de la marchitez manchada. Transmitido por trips.

#### TYLCV Tomato Yellow Leaf Curl Virus

Virus del enrollamiento amarillo. Transmitido por mosca blanca.

### BACTERIAS

#### Bacteria Clavibacter michiganensis

Bacteria del cancro bacterial. Manchas en hojas y frutos.

### NEMÁTODOS

#### N Meloidogyne spp. (Mi)

Nemátodos del nudo de raíz. Reducen absorción de nutrientes.

### HONGOS

#### F1 Fusarium oxysporum raza 1

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 1.

#### F2 Fusarium oxysporum raza 2

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 2.

#### F3 Fusarium oxysporum raza 3

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 3.

#### FORL Fusarium radicis-lycopersici

Pudrición de raíz y corona por Fusarium.

#### V Verticillium dahliae

Marchitamiento vascular por Verticillium.

### CARACTERÍSTICA

#### LSL Long Shelf Life

Larga vida de anaquel. Mayor firmeza y durabilidad postcosecha.