

TOMATE BHN

TITAN


Planta indeterminada de porte alto con excelentes características tanto para invierno como para verano. Fruto tipo bola con hombros medios y cierre perfecto. Alta adaptabilidad a diferentes condiciones de cultivo.

CARACTERÍSTICAS

Altura aprox.:	1.8 metros
Racimos/planta:	8 – 10
Frutos/racimo:	3 – 5
Peso promedio:	250 – 350 g
Forma:	Tipo bola



RESISTENCIAS

TMV Tomato Mosaic Virus**F1** Fusarium oxysporum raza 1**F2** Fusarium oxysporum raza 2**F3** Fusarium oxysporum raza 3**V** Verticillium dahliae**N** Meloidogyne spp. (Mi)**Distribuido por: SEMILLAS DGR S.A.**

Edificio Ribleh, San Antonio de Belén, Heredia — Local 5
Milton Castillo H. | semillasdgrsa@gmail.com
+506 8820-4170 | +506 2102-0910 | +506 7053-6966

semillasdgrsa@gmail.com

semillasdgr-cr.com

@semillasdgr

Glosario de Resistencias

Los códigos de resistencia se clasifican en dos niveles: HR (High Resistance / Resistencia Alta) e IR (Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia). Se organizan por grupo de patógeno: Virus → Bacterias → Hongos → Nemátodos.

HR High Resistance / Resistencia Alta

La planta controla eficazmente el patógeno bajo presión normal de la enfermedad.

IR Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia

La planta reduce el impacto pero puede mostrar síntomas leves bajo alta presión.

VIRUS

TMV

Tomato Mosaic Virus

Virus del mosaico del tomate. Causa moteado y deformación foliar.

TSWV

Tomato Spotted Wilt Virus

Virus de la marchitez manchada. Transmitido por trips.

TYLCV

Tomato Yellow Leaf Curl Virus

Virus del enrollamiento amarillo. Transmitido por mosca blanca.

BACTERIAS

Bacteria

Clavibacter michiganensis

Bacteria del cancro bacterial. Manchas en hojas y frutos.

CARACTERÍSTICA

LSL

Long Shelf Life

Larga vida de anaquel. Mayor firmeza y durabilidad postcosecha.

HONGOS

F1

Fusarium oxysporum raza 1

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 1.

F2

Fusarium oxysporum raza 2

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 2.

F3

Fusarium oxysporum raza 3

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 3.

FORL

Fusarium radicis-lycopersici

Pudrición de raíz y corona por Fusarium.

V

Verticillium dahliae

Marchitamiento vascular por Verticillium.

Phytophthora

Phytophthora capsici

Pudrición de raíz y corona por Phytophthora.

NEMÁTODOS

N

Meloidogyne spp. (Mi)

Nemátodos del nudo de raíz. Reducen absorción de nutrientes.