

TOMATE BHN



# IL-1908

Planta indeterminada de porte alto con frutos de excelente calibre y larga vida poscosecha. Alta productividad con 3–5 frutos por racimo. Ideal para producción de invierno y verano.

## CARACTERÍSTICAS

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Altura aprox.:  | 1.8 metros  |
| Racimos/planta: | 8 – 10      |
| Frutos/racimo:  | 3 – 5       |
| Peso promedio:  | 240 – 280 g |



## RESISTENCIAS

|       |                               |     |                           |
|-------|-------------------------------|-----|---------------------------|
| TMV   | Tomato Mosaic Virus           | F3  | Fusarium oxysporum raza 3 |
| TSWV  | Tomato Spotted Wilt Virus     | V   | Verticillium dahliae      |
| TYLCV | Tomato Yellow Leaf Curl Virus | N   | Meloidogyne spp. (Mi)     |
| F1    | Fusarium oxysporum raza 1     | LSL | Long Shelf Life           |
| F2    | Fusarium oxysporum raza 2     |     |                           |



# Glosario de Resistencias

Los códigos de resistencia se clasifican en dos niveles: HR (High Resistance / Resistencia Alta) e IR (Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia). Se organizan por grupo de patógeno: Virus → Bacterias → Hongos → Nemátodos.

**HR**  
High Resistance / Resistencia Alta

La planta controla eficazmente el patógeno bajo presión normal de la enfermedad.

**IR**  
Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia

La planta reduce el impacto pero puede mostrar síntomas leves bajo alta presión.

VIRUS

**TMV**  
Tomato Mosaic Virus

Virus del mosaico del tomate. Causa moteado y deformación foliar.

**TSWV**  
Tomato Spotted Wilt Virus

Virus de la marchitez manchada. Transmitido por trips.

**TYLCV**  
Tomato Yellow Leaf Curl Virus

Virus del enrollamiento amarillo. Transmitido por mosca blanca.

BACTERIAS

**Bacteria**  
Clavibacter michiganensis

Bacteria del cancro bacterial. Manchas en hojas y frutos.

NEMÁTODOS

**N**  
Meloidogyne spp. (Mi)

Nemátodos del nudo de raíz. Reducen absorción de nutrientes.

HONGOS

**F1**  
Fusarium oxysporum raza 1

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 1.

**F2**  
Fusarium oxysporum raza 2

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 2.

**F3**  
Fusarium oxysporum raza 3

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 3.

**FORL**  
Fusarium radicis-lycopersici

Pudrición de raíz y corona por Fusarium.

**V**  
Verticillium dahliae

Marchitamiento vascular por Verticillium.

CARACTERÍSTICA

**LSL**  
Long Shelf Life

Larga vida de anaquel. Mayor firmeza y durabilidad postcosecha.