

TOMATE BHN

CACIQUE

Variedad indeterminada con alta carga de frutos por planta. Excelente adaptación a condiciones tropicales con producción uniforme y consistente. Fruto firme con buena vida poscosecha.

CARACTERÍSTICAS

Porte:	Indeterminado
Vida poscosecha:	Larga
Racimos/planta:	8 – 10
Peso promedio:	250 – 320 g



RESISTENCIAS

TMV	Tomato Mosaic Virus	F2	Fusarium oxysporum raza 2
TSWV	Tomato Spotted Wilt Virus	F3	Fusarium oxysporum raza 3
TYLCV	Tomato Yellow Leaf Curl Virus	V	Verticillium dahliae
F1	Fusarium oxysporum raza 1	N	Meloidogyne spp. (Mi)



Glosario de Resistencias

Los códigos de resistencia se clasifican en dos niveles: HR (High Resistance / Resistencia Alta) e IR (Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia). Se organizan por grupo de patógeno: Virus → Bacterias → Hongos → Nemátodos.

HR High Resistance / Resistencia Alta

La planta controla eficazmente el patógeno bajo presión normal de la enfermedad.

IR Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia

La planta reduce el impacto pero puede mostrar síntomas leves bajo alta presión.

VIRUS

TMV

Tomato Mosaic Virus

Virus del mosaico del tomate. Causa moteado y deformación foliar.

TSWV

Tomato Spotted Wilt Virus

Virus de la marchitez manchada. Transmitido por trips.

TYLCV

Tomato Yellow Leaf Curl Virus

Virus del enrollamiento amarillo. Transmitido por mosca blanca.

BACTERIAS

Bacteria

Clavibacter michiganensis

Bacteria del cancro bacterial. Manchas en hojas y frutos.

CARACTERÍSTICA

LSL

Long Shelf Life

Larga vida de anaquel. Mayor firmeza y durabilidad postcosecha.

HONGOS

F1

Fusarium oxysporum raza 1

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 1.

F2

Fusarium oxysporum raza 2

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 2.

F3

Fusarium oxysporum raza 3

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 3.

FORL

Fusarium radicis-lycopersici

Pudrición de raíz y corona por Fusarium.

V

Verticillium dahliae

Marchitamiento vascular por Verticillium.

Phytophthora

Phytophthora capsici

Pudrición de raíz y corona por Phytophthora.