

TOMATE BHN

# IL-1909

Planta indeterminada con frutos de calibre extragrande y excelente poscosecha. Alta productividad con 3–5 frutos por racimo. Frutos con calibres superiores a 310 g, destacados por su firmeza y larga vida comercial.

## CARACTERÍSTICAS

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Altura aprox.:  | 1.8 metros  |
| Racimos/planta: | 8 – 10      |
| Frutos/racimo:  | 3 – 5       |
| Peso promedio:  | 230 – 310 g |



## RESISTENCIAS

|              |                               |             |                              |
|--------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>TMV</b>   | Tomato Mosaic Virus           | <b>F3</b>   | Fusarium oxysporum raza 3    |
| <b>TSWV</b>  | Tomato Spotted Wilt Virus     | <b>FORL</b> | Fusarium radicle-lycopersici |
| <b>TYLCV</b> | Tomato Yellow Leaf Curl Virus | <b>V</b>    | Verticillium dahliae         |
| <b>F1</b>    | Fusarium oxysporum raza 1     | <b>N</b>    | Meloidogyne spp. (Mi)        |
| <b>F2</b>    | Fusarium oxysporum raza 2     |             |                              |



# Glosario de Resistencias

Los códigos de resistencia se clasifican en dos niveles: HR (High Resistance / Resistencia Alta) e IR (Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia). Se organizan por grupo de patógeno: Virus → Bacterias → Hongos → Nemátodos.

## HR High Resistance / Resistencia Alta

La planta controla eficazmente el patógeno bajo presión normal de la enfermedad.

## IR Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia

La planta reduce el impacto pero puede mostrar síntomas leves bajo alta presión.

### VIRUS

#### TMV

##### Tomato Mosaic Virus

Virus del mosaico del tomate. Causa moteado y deformación foliar.

#### TSWV

##### Tomato Spotted Wilt Virus

Virus de la marchitez manchada. Transmitido por trips.

#### TYLCV

##### Tomato Yellow Leaf Curl Virus

Virus del enrollamiento amarillo. Transmitido por mosca blanca.

### BACTERIAS

#### Bacteria

##### Clavibacter michiganensis

Bacteria del cancro bacterial. Manchas en hojas y frutos.

### CARACTERÍSTICA

#### LSL

##### Long Shelf Life

Larga vida de anaquel. Mayor firmeza y durabilidad postcosecha.

### HONGOS

#### F1

##### Fusarium oxysporum raza 1

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 1.

#### F2

##### Fusarium oxysporum raza 2

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 2.

#### F3

##### Fusarium oxysporum raza 3

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 3.

#### FORL

##### Fusarium radicis-lycopersici

Pudrición de raíz y corona por Fusarium.

#### V

##### Verticillium dahliae

Marchitamiento vascular por Verticillium.

#### Phytophthora

##### Phytophthora capsici

Pudrición de raíz y corona por Phytophthora.