

PORTAINJERTO

R1912

Portainjerto intraespecífico de innovación genética. Excelente compatibilidad entre portainjerto y copa, brindando un sinergismo óptimo entre ambos materiales. Maximiza la resistencia a enfermedades y el potencial de alta producción.


CARACTERÍSTICAS

Tipo:	Intraespecífico
Compatibilidad:	Alta con variedades BHN
Beneficio:	Máxima resistencia + producción



RESISTENCIAS

TMV	Tomato Mosaic Virus	FORL	Fusarium radicis-lycopersici
Bacteria	Clavibacter michiganensis	Phytophthora	Phytophthora capsici (pudrición raíz)
F1	Fusarium oxysporum raza 1	V	Verticillium dahliae
F2	Fusarium oxysporum raza 2	N	Meloidogyne spp. (Mi)
F3	Fusarium oxysporum raza 3		



Distribuido por: SEMILLAS DGR S.A.

Edificio Ribleh, San Antonio de Belén, Heredia — Local 5
Milton Castillo H. | semillasdgrsa@gmail.com
CR: +506 7053-6966 | PTY: +507 6391-1504

semillasdgrsa@gmail.com
semillas-dgr.com
@semillasdgr

Glosario de Resistencias

Los códigos de resistencia se clasifican en dos niveles: HR (High Resistance / Resistencia Alta) e IR (Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia). Se organizan por grupo de patógeno: Virus → Bacterias → Hongos → Nemátodos.

HR High Resistance / Resistencia Alta

La planta controla eficazmente el patógeno bajo presión normal de la enfermedad.

IR Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia

La planta reduce el impacto pero puede mostrar síntomas leves bajo alta presión.

VIRUS

TMV

Tomato Mosaic Virus

Virus del mosaico del tomate. Causa moteado y deformación foliar.

TSWV

Tomato Spotted Wilt Virus

Virus de la marchitez manchada. Transmitido por trips.

TYLCV

Tomato Yellow Leaf Curl Virus

Virus del enrollamiento amarillo. Transmitido por mosca blanca.

BACTERIAS

Bacteria

Clavibacter michiganensis

Bacteria del cancro bacterial. Manchas en hojas y frutos.

CARACTERÍSTICA

LSL

Long Shelf Life

Larga vida de anaquel. Mayor firmeza y durabilidad postcosecha.

HONGOS

F1

Fusarium oxysporum raza 1

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 1.

F2

Fusarium oxysporum raza 2

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 2.

F3

Fusarium oxysporum raza 3

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 3.

FORL

Fusarium radicis-lycopersici

Pudrición de raíz y corona por Fusarium.

V

Verticillium dahliae

Marchitamiento vascular por Verticillium.

Phytophthora

Phytophthora capsici

Pudrición de raíz y corona por Phytophthora.