

PORTAINJERTO

# R1912

Portainjerto intraespecífico de innovación genética. Excelente compatibilidad entre portainjerto y copa, brindando un sinergismo óptimo entre ambos materiales. Maximiza la resistencia a enfermedades y el potencial de alta producción.

CARACTERÍSTICAS

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Tipo:           | Intraespecífico                 |
| Compatibilidad: | Alta con variedades BHN         |
| Beneficio:      | Máxima resistencia + producción |



RESISTENCIAS

|          |                           |              |                                       |
|----------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|
| TMV      | Tomato Mosaic Virus       | FORL         | Fusarium radicis-lycopersici          |
| Bacteria | Clavibacter michiganensis | Phytophthora | Phytophthora capsici (pudrición raíz) |
| F1       | Fusarium oxysporum raza 1 | V            | Verticillium dahliae                  |
| F2       | Fusarium oxysporum raza 2 | N            | Meloidogyne spp. (Mi)                 |
| F3       | Fusarium oxysporum raza 3 |              |                                       |



Distribuido por: SEMILLAS DGR S.A.

Edificio Ribleh, San Antonio de Belén, Heredia — Local 5  
Milton Castillo H. | semillasdgrsa@gmail.com  
+506 8820-4170 | +506 2102-0910 | +506 7053-6966

semillasdgrsa@gmail.com  
semillasdgr-cr.com  
@semillasdgr

# Glosario de Resistencias

Los códigos de resistencia se clasifican en dos niveles: HR (High Resistance / Resistencia Alta) e IR (Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia). Se organizan por grupo de patógeno: Virus → Bacterias → Hongos → Nemátodos.

## HR High Resistance / Resistencia Alta

La planta controla eficazmente el patógeno bajo presión normal de la enfermedad.

## IR Intermediate Resistance / Resistencia Intermedia

La planta reduce el impacto pero puede mostrar síntomas leves bajo alta presión.

### VIRUS

#### TMV

Tomato Mosaic Virus

Virus del mosaico del tomate. Causa moteado y deformación foliar.

#### TSWV

Tomato Spotted Wilt Virus

Virus de la marchitez manchada. Transmitido por trips.

#### TYLCV

Tomato Yellow Leaf Curl Virus

Virus del enrollamiento amarillo. Transmitido por mosca blanca.

### HONGOS

#### F1

Fusarium oxysporum raza 1

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 1.

#### F2

Fusarium oxysporum raza 2

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 2.

#### F3

Fusarium oxysporum raza 3

Marchitamiento vascular por Fusarium, raza 3.

#### FORL

Fusarium radicis-lycopersici

Pudrición de raíz y corona por Fusarium.

#### V

Verticillium dahliae

Marchitamiento vascular por Verticillium.

#### Phytophthora

Phytophthora capsici

Pudrición de raíz y corona por Phytophthora.

### BACTERIAS

#### Bacteria

Clavibacter michiganensis

Bacteria del cancro bacterial. Manchas en hojas y frutos.

### CARACTERÍSTICA

#### LSL

Long Shelf Life

Larga vida de anaquel. Mayor firmeza y durabilidad postcosecha.

### NEMÁTODOS

#### N

Meloidogyne spp. (Mi)

Nemátodos del nudo de raíz. Reducen absorción de nutrientes.