

AZUMO 80 FLOW

FUNGICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

Meccanismo d'azione: FRAC M2

Registrazione del Ministero della Salute n. 17637 del 27/05/2022

Composizione

ZOLFO puro g. 56,1 (= 800 g/l)
Coformulanti q. b. a g. 100

AFEFASA Azufre y Fertilizantes Pallarés, S.A.

Pol. Ind. de Constantí, Av. De Europa, 1-7

43120 Constantí - Tarragona (Spagna)

T. +34 977 524 650

Stabilimento di produzione:

AFEFASA Azufre y Fertilizantes Pallarés, S.A.
Constantí, Tarragona (Spagna)

Contenuto netto: 0,100-0,250-0,500-1-5-10-20 L

Partita n.

INDICAZIONI DI PERICOLO: ---

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio:

- Nell'impiego su cereali rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m da zona non coltivata o in alternativa utilizzare ugelli che riducano la deriva dell'80%

- Negli impieghi su vite, ribes nero e lampone rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 m da zona non coltivata o in alternativa utilizzare ugelli che riducano la deriva dell'85%

- Negli impieghi su pomacee, drupacee, avocado, mango, papaya, nocciolo e ornamentali rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 15m da zona non coltivata o in alternativa utilizzare ugelli che riducano la deriva dell'88,5%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

AZUMO 80 FLOW è un fungicida a base di zolfo in sospensione concentrata specifico per il controllo dell'oidio sulle colture di vite, pomacee, drupacee, frutti tropicali, carciofo, peperone, salsefrica, ribes nero e lampone, nocciolo, sedano, pomodoro, melanzana, cereali, floreali, ornamentali, alberi e arbusti ornamentali.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

AZUMO 80 FLOW può essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi:

Coltura	Malattia	Epoca d'impiego	Dose (L/ha)	N° max applicazioni	Intervallo minimo tra le applicazioni	Intervallo di sicurezza
VITE	Oidio (<i>Erysiphe necator</i>)	Trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi a partire dalla fase di 5-8 foglie distese (BBCH 15-18)	12,5	8	7 giorni	5 giorni
POMACEE (melo, pero, cotogne, nespole, nespole del Giappone)	Oidio (<i>Podospaera leucotricha</i>)	Trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi fino ad inizio fioritura (BBCH 01-60) e dopo la caduta petali (BBCH >69)	7,5	6	10 giorni	3 giorni
DRUPACEE (pesche, nettarine, albicocche)	Oidio (<i>Sphaerotheca pannosa</i> <i>Podospaera leucotricha</i>)	Trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi dopo la caduta petali (BBCH >69)	7,5	6	10 giorni	3 giorni
AVOCADO, MANGO, PAPAYA	Oidio	Trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi dopo la caduta petali (BBCH >69)	7,5	6	10 giorni	3 giorni
CARCIOFO	Oidio	Trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi	6,0	6	10 giorni	3 giorni
PEPERONE	Oidio (<i>Leveillula sp.</i>)	Trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi	2,0	6	10 giorni	3 giorni
SALSEFRICA	Oidio (<i>Erysiphe sp.</i>)	Trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi	6,0	6	10 giorni	3 giorni
RIBES NERO e LAMPONE	Oidio (<i>Sphaerotheca mors-uvae</i>)	Trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi	3,0	6	10 giorni	3 giorni
NOCCIOLO	Oidio (<i>Erysiphe suffulta</i> / <i>Phyllactinia suffulta</i>)	Trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi	1,0	11	10 giorni	3 giorni
SEDANO	Oidio	Trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi	6,0	6	10 giorni	3 giorni
POMODORO E MELANZANA	Oidio (<i>Leveillula taurica</i>)	Trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi	2	6	10 giorni	3 giorni
FRUMENTO	Oidio (<i>Blumeria graminis</i>)	Trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi	10	2	14 giorni	35 giorni
FLOREALI, ORNAMENTALI, ALBERI E ARBUSTI ORNAMENTALI	Oidio (<i>Sphaeroteca pannosa</i>)	Trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi	3	5	10 giorni	---

COMPATIBILITÀ: AZUMO 80 FLOW non è compatibile con antiparassitari alcalini, con oli minerali e captano. Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego di oli minerali e captano.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Nei periodi di temperature più elevate evitare di applicare il prodotto nelle ore più calde e soleggiate della giornata.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

AZUMO 80 FLOW FUNGICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC) Meccanismo d'azione: FRAC M2 Registrazione del Ministero della Salute n. 17637 del 27/05/2022	
Composizione ZOLFO puro g. 56,1 (= 800 g/l) Coformulanti q.b. a g. 100	<u>AFEPPASA Azufretera y Fertilizantes Pallarés, S.A.</u> Pol. Ind. de Constantí, Av. De Europa, 1-7 43120 Constantí - Tarragona (Spagna) T. +34 977 524 650
INDICAZIONI DI PERICOLO: --- CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.	Stabilimento di produzione: AFEPPASA Azufretera y Fertilizantes Pallarés, S.A. Constantí, Tarragona (Spagna) Contenuto netto: 100 mL Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE