



Bilimsel Kaynaklı Beslenme Rehberi

30 Günlük Tüp Bebek Beslenme Planı

Akdeniz tipi beslenmeye dayalı, tedavi dönemlerine göre düzenlenmiş örnek beslenme ve yaşam tarzı rehberi



Akdeniz tipi sağlıklı yiyecek tabağı — renkli sebzeler, mevsim balığı, zeytinyağı, ceviz



Doç. Dr. Senai Aksoy

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Üreme Tıbbı ve Yardımcı Üreme Teknikleri

İÇİNDEKİLER

Rehber İçeriği

01 Beslenmenin Üreme Sağlığı Üzerindeki Rolü

02 Akdeniz Diyeti: Bilimsel Kanıtlar

03 Makro Besin Değerlerinin İyileştirilmesi

04 Önemli Vitamin ve Mineraller ve Kaynakları

05 Faz 1: Hazırlık Dönemi (1-7. Gün)

06 Faz 2: Yumurtalıkların Uyarılması (8-14. Gün)

07 Faz 3: Transfer Öncesi Dönem (15-21. Gün)

08 Faz 4: Transfer Sonrası Bekleyiş (22-30. Gün)

09 Kaçınılması Gereken Gıdalar

10 Erkek Faktörü: Babaya Ait Beslenme

11 Hidrasyon, Uyku ve Stres Yönetimi

BÖLÜM 01

Beslenmenin Üreme Sağlığı Üzerindeki Temel Rolü

Beslenme tedavinin yerine geçmez; ama sürece hazırlığın bir parçasıdır

Kısırlık (infertilite), 12 ay boyunca düzenli ve korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik oluşmamasıdır. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2023 tahminine göre yetişkinlerin yaklaşık **%17,5'i, yani 6 kişiden 1'i** yaşamının bir döneminde bu sorunu yaşar.^[14]

**Bu Rehber Ne Yapar, Ne Yapmaz?**

Beslenme ile tüp bebek sonucu arasındaki bağı inceleyen çalışmaların çoğu **gözlemseldir**: düzenli ve dengeli beslenen kişilerde sonuçların biraz daha iyi olduğunu gösterir, ama bunun nedeninin yalnızca beslenme olduğunu kanıtlamaz.^{[6][7][8]} Bu rehber, kanıtla uyumlu dengeli bir beslenme düzenini günlük menülere çevirir. Hiçbir besin veya menü tek başına gebelik sağlamaz.

Gebelik öncesi dönemde dengeli beslenme, hem tedavi sürecinde kendinizi iyi hissetmenize hem de gebelik oluştuğunda sağlıklı bir başlangıca yardımcı olur. Gebelik planlayan kadınlar için iyi kanıtlanmış bir öneri de besinlere ek olarak **günde 400 mikrogram folik asit** kullanmaktır (ayrıntısı Bölüm 04'te).^[13]

**Takvim Hakkında**

Bu rehberdeki 1-30. günler **örnek bir takvimdir**. Yumurtalıkların uyarılması, yumurta toplama ve embriyo transferinin zamanı kişiden kişiye ve tedavi türüne (taze ya da dondurulmuş embriyo transferi) göre değişir. Menüleri kendi tedavi takviminize göre kaydırın; ilaç, sıvı ve beslenmeyle ilgili özel bir talimat aldıysanız tedavi ekibinizin önerisini uygulayın.



Şematik illüstrasyon: hücre ve mitokondri

BÖLÜM 02

Akdeniz Diyeti: Bilimsel Kanıtlar

Tüp bebek sonuçlarıyla ilişkisi en çok çalışılmış beslenme düzeni: ne gösteriyor, ne göstermiyor?



Akdeniz diyetinin ana bileşenleri: zeytinyağı, balık, sebze, meyve, tam tahıl, baklagil

Akdeniz tipi beslenme; sebze, meyve, tam tahıl, baklagil, balık ve zeytinyağına dayanır, işlenmiş gıdayı ve şekeri azaltır. Tüp bebek sonuçlarıyla ilişkisi en çok çalışılmış beslenme düzeni budur. Çalışmaların çoğunda bu düzene uyumu yüksek olan kişilerde gebelik ve canlı doğum oranları biraz daha yüksek bulundu. Ancak bu çalışmalar **gözlemseldir**: Akdeniz tipi beslenenler başka açılardan da farklı olabilir. Sistematik derlemeler ilişkinin tutarsız olduğunu ve kanıt kesinliğinin düşük olduğunu belirtiyor.^{[6][7][8]}

Klinik Araştırma Sonuçları

Araştırma	Ne buldu?
Vujkovic ve ark. (2010) ^[1] Gözlemsel, 161 çift	Akdeniz tipi beslenmeye yüksek uyum gösteren çiftlerde gebelik olasılığı daha yüksek bulundu (OR 1,4; %95 GA 1,0-1,9)
Twigt ve ark. (2012) ^[2] Gözlemsel, 199 çift	Kadının ulusal beslenme önerilerine uyum puanındaki her 1 puanlık artış, devam eden gebelik olasılığında artışla ilişkiliydi (OR 1,65)
Karayiannis ve ark. (2018) ^[3] Gözlemsel, 244 kadın	35 yaş altındaki kadınlarda Akdeniz diyeti puanındaki 5 puanlık artış, klinik gebelik ve canlı doğum olasılığında yaklaşık 2,7 kat artışla ilişkiliydi. 35 yaş ve üzerinde ilişki bulunmadı.
Noli ve ark. (2023) ^[4] Kesitsel, 296 kadın	Akdeniz diyetine orta düzeyde uyan kadınlarda, uyumu düşük olanlara göre beklenmedik zayıf over yanıtı riski daha düşüktü (aOR 0,29)
Kermack ve ark. (2020) ^[5] Randomize kontrollü, 111 çift	6 hafta omega-3, D vitamini ve zeytinyağı desteği embriyo gelişim hızının bazı ölçümlerini değiştirdi. Gebelik veya canlı doğuma etkisi ölçülmedi.



Bu Bulgular Nasıl Okunmalı?

Gözlemsel çalışmalarda görülen ilişki, beslenmeyi değiştirince sonucun da değişeceği anlamına gelmez. Akdeniz tipi beslenmeyi önermek için en sağlam gerekçe, genel sağlık ve gebelik için zaten önerilen dengeli bir beslenme düzeni olmasıdır. Tüp bebek sonucunu artırdığı ise henüz randomize çalışmalarla gösterilmedi.^{[5][6]}

BÖLÜM 03

Protein, Karbonhidrat ve Yağ Seçimi

Tabağınızı oluştururken nelere dikkat edebilirsiniz?

🍳 Protein: Her Öğünde Bir Kaynak

Protein, vücudun hücre ve doku yapımı için gereken temel besin öğelerinden biridir. Her öğünde bir protein kaynağı bulundurmak pratik bir hedeftir. Balık, yumurta, tavuk ve yoğurt gibi hayvansal kaynakları; mercimek, nohut ve fasulye gibi baklagillerle dönüşümlü kullanabilirsiniz. Tüp bebek sonucunu değiştiren belirli bir günlük protein miktarı gösterilmemiştir.



Mercimek

Bitkisel protein + folat



Nohut

Lif + demir + protein



Mevsim balığı

Omega-3 + D vitamini



Yumurta

Kolin + B12 + protein



Bulgur

Lif + B vitaminleri



Tofu / Edamame

Fitoöstrojen + protein

🍞 Karbonhidrat: Tam Tahıllı Öne Çıkarın

Beyaz ekmek, şekerli içecekler ve tatlılar gibi rafine karbonhidratlar kan şekerini hızla yükseltir. Tam tahıllar ve baklagiller ise lif içerdiği için daha yavaş sindirilir. Kan şekeri ve insülin düzenini korumak, özellikle polikistik over sendromu (PCOS) veya insülin direnci olan kişilerde genel sağlık için önemlidir.



Pilavda Küçük Bir Değişiklik

Beyaz pirinç pilavının yerine zaman zaman **bulgur veya karabuğday pilavı** tercih edebilirsiniz. Bulgur lif ve B vitaminleri açısından zengindir; kan şekerini beyaz pirince göre daha yavaş yükseltir.



Tarif: Karabuğday (Greçka) Pilavı

Hazırlanışı: 1 su bardağı karabuğdayı (veya bulguru) yıkayıp zeytinyağında 1 dk kavurun. 2 su bardağı sıcak su ve az tuz ekleyin. Suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirip 10 dk demlenmeye bırakın.



Sağlıklı Yağlar: Zeytinyağı, Ceviz ve Balık

Zeytinyağı, ceviz, keten tohumu ve yağlı balık, Akdeniz tipi beslenmenin temel yağ kaynaklarıdır. Omega-3 konusunda en çok alıntılanan çalışma, doğal yoldan gebe kalmaya çalışan ve infertilite öyküsü olmayan 30-44 yaş arası kadınlarda yapıldı: omega-3 takviyesi kullananlarda her adet döngüsünde gebe kalma olasılığı yaklaşık 1,5 kat daha yüksek bulundu.^[9] Bu bir gözlemsel çalışmadır; takviye kullananlar başka açılardan da daha sağlıklı yaşıyor olabilir. Tüp bebek tedavisinde omega-3 takviyesinin gebelik veya canlı doğum oranını artırdığı randomize çalışmalarla gösterilmemiştir.^[5] Takviye kullanmayı düşünüyorsanız hekiminizle konuşun.



Sızma Zeytinyağı

MUFA + antioksidan



Ceviz

Omega-3 + E vitamini



Keten Tohumu

ALA omega-3 + lif



Avokado

MUFA + folat + K vit.



Omega-3 ve tekli doymamış yağ asitleri açısından zengin besinler: zeytinyağı, ceviz, keten tohumu, avokado

BÖLÜM 04

Önemli Vitamin ve Mineraller ve Kaynakları

Besinlerden alabileceğiniz ve takviye gerektirebilecek olanlar



Folik Asit: Besinlere Ek Olarak Takviye

Gebelik planlayan kadınlara, gebe kalmaya çalışmaya başladıkları andan itibaren besinlere ek olarak **günde 400 mikrogram (0,4 mg) folik asit** önerilir. Gebelik öncesi dönemde folik asit kullanımı bebekte nöral tüp defekti (omurilik ve beyin gelişim kusuru) riskini belirgin şekilde azaltır.^[13] Daha önce nöral tüp defektli bir gebelik yaşadığınız doz farklı olabilir; hekiminize danışın.



Folat (B9 Vitamini)

DNA yapımı ve hücre bölünmesi için gereklidir. Yeşil yapraklı sebzeler ve baklagiller iyi kaynaklardır; yukarıdaki folik asit takviyesinin yerini tutmaz.

Ispanak

Brokoli

Bamya

Mercimek

Kuşkonmaz

Karalahana



E ve A Vitaminleri

Antioksidan özellikli vitaminlerdir ve dengeli bir beslenmeyle besinlerden alınabilir. Takviye kullanmayı düşünüyorsanız önce hekiminize danışın.

Fındık

Ceviz

Havuç

Domates

Ayçiçeği



D Vitamini

Kemik sağlığı ve bağışıklık sistemi için gereklidir. Kan düzeyinin ölçülmesini ve takviye gerekip gerekmediğini tedavi öncesi değerlendirmede hekiminizle konuşabilirsiniz.

Güneş ışığı

Mevsim balığı

Yumurta sarısı

Takviye



Fitokimyasallar & Polifenoller

Renkli sebze ve meyveler, bitkisel bileşenler (polifenoller) açısından zengindir ve dengeli beslenmenin parçasıdır. Pancar, nar veya başka tek bir besinin rahme giden kan akışını artırdığı ya da tutunmayı kolaylaştırdığı insanda gösterilmemiştir; çeşitlilik tek bir besinden daha önemlidir.

Pancar

Nar

Böğürtlen

Ahududu

1

Hazırlık Dönemi

İşlenmiş gıdayı azaltıp sebze, tam tahıl, baklagil ve balığa ağırlık veren düzene geçiş

1. - 7. GÜNLER



Bu Fazın Hedefi

Yumurta ve sperm hücrelerinin gelişimi aylar süren bir süreçtir; bu yüzden beslenme düzenini tedaviden birkaç hafta önce oturtmak mantıklıdır. Bu dönemde işlenmiş gıdaları, fast food'u, şekerli içecekleri ve tatlıları azaltın; alkolü bırakın ve kafeini günde 200 mg'ın (1-2 fincan filtre kahve) altında tutun.^{[10][15]}



Yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, narenciye, böğürtlen: hazırlık döneminin temel besinleri

GÜN	KAHVALTI	KUŞLUK	ÖĞLE	İKİNDİ	AKŞAM
1	Yulaf ezmesi (ev yapımı ayran (veya taze süt), keten tohumu, yaban mersini, tarçın)	Çiğ badem + şekerless yeşil çay	Zeytinyağlı yeşil mercimek, yeşil mercimek salatası (bol limonlu)	Yarım ceviz + ev yapımı ayran	Izgara levrek, buharda brokoli, zeytinyağlı roka salatası
2	Tam çavdar ekmeği + zeytinyağlı ezme + rafadan yumurta	Taze nar veya mandalina	Izgara tavuklu semizotu salatası (zeytinyağlı, cevizli)	Kefir + öğütölmüş keten tohumu	Zeytinyağlı pırasa, bulgur pilavı
3	Yoğurtlu meyve kasesi (geceden ıslatılmış, çilek ve file badem ile)	Çiğ ceviz + yeşil elma dilimi	Etlı nohut yemeği, tam buğday makarna	Havuç-salatalık çubukları + humus	Izgara levrek, fırınlanmış kuşkonmaz, zeytinyağlı havuç sote
4	Az yağlı menemen, tam tahıllı ekmek, siyah zeytin, nane	Orman meyveleri (böğürtlen / ahududu)	Fırınlanmış hindi göğsü, pancar ve bebek ıspanak salatası	Probiyotik yoğurt + 2 tam ceviz	Zeytinyağlı taze fasulye, ince bulgur pilavı, cacık
5	Sütlü yulaf kepeği, muz, organik bal, kabak çekirdeği	Papatya çayı + çiğ fındık	Sebzeli mercimek çorbası, Akdeniz salatası	Taze ananas dilimi + çiğ kaju	Limonlu tavuk, patates püresi
6	2 haşlanmış yumurta, domates, salatalık, maydanoz, lor peyniri	Taze havuç-zencefil suyu	Fırın çipura, zeytinyağlı mevsim salatası	Çiğ badem + sade yoğurt	Sebzeli bulgur pilavı, zeytinyağlı enginar kalbi
7	Yoğurt kasesi: yulaf, çilek, ceviz, tarçın	Maden suyu (cam şişe) + kabak çekirdeği	Izgara yağsız köfte, piyaz (soğan, fasulye, maydanoz)	Elma dilimleri + şekerless fıstık ezmesi	Fırında sebze turlüsü (patlıcan, kabak, biber, domates soslu)



Pratik Tarif: Keten Tohumlu Kahvaltı Kasesi

Hazırlanışı: 3 yemek kaşığı keten tohumu, 1 su bardağı ev yapımı ayran (veya taze süt) ve yarım çay kaşığı tarçını bir kavanozda karıştırın. Buzdolabında en az 2 saat (tercihen gece boyu) bekletin. Üzerine taze yaban mersini veya ceviz ekleyerek servis yapın.

Yumurtalıkların Uyarılması ve Folikül Büyümesi

Hormon iğneleriyle foliküller büyür. Düzenli öğünler ve her öğünde bir protein kaynağı

8. - 14. GÜNLER



Bu Fazın Hedefi

Yumurtalıklar büyüdükçe karında şişkinlik hissi olabilir. Bu dönemde düzenli öğünler ve her öğünde bir **protein kaynağı** pratik bir hedeftir. Demir açısından zengin yeşil yapraklı sebzeleri, demirin emilimini kolaylaştıran C vitamini kaynaklarıyla (limon, portakal, biber) birlikte tüketebilirsiniz. Ne kadar sıvı içmeniz gerektiği konusunda tedavi ekibinizin önerisine uyun.



Yumurta, balık, tavuk, baklagil, bulgur: dönüşümlü kullanılacak protein kaynakları

GÜN	KAHVALTI	KUŞLUK	ÖĞLE	İKİNDİ	AKŞAM
8	Ispanaklı ve lor peynirli omlet, tam buğday ekmeği	Mandalina + çiğ badem	Ton balıklı yeşil mercimek salatası (bol yeşillikli)	Probiyotik yoğurt + keten tohumu	Etlı taze fasulye, bulgur pilavı, yeşil salata
9	Yulaf lapası, taze incir/kayısı, çiğ ceviz, tarçın	Rezene çayı + çiğ kaju	Izgara tavuk göğsü, haşlanmış brokoli-karnabahar	1 kivi + 1 bardak kefir	Zeytinyağlı barbunya, bol limonlu marul salatası
10	Çırpılmış yumurta, yarım ceviz, zeytin	Portakal dilimleri	Izgara yüzey balığı (sardalya/hamsi), semizotu salatası	Havuç dilimleri + tahin-pekmez (ölçülü)	Kırmızı mercimek çorbası, fırınlanmış karışık kök sebzeler
11	Lor peyniri, ceviz, salatalık, domates, kapy biber tabağı	Yeşil elma + çiğ badem	Izgara hindi parçaları, bulgur salatası (nane, maydanoz)	Ayran + şekeriz yulaf bisküvisi	Ispanak yemeğı (zeytinyağı, kıymalı), sarımsaklı yoğurt
12	Tam tahıllı ekmek arası beyaz peynir, marul, domates	Orman meyveleri + çiğ fındık	Bol sebzeli nohut salatası, zeytinyağı-tahinli sos	Çiğ kaju + kabak çekirdeğı	Izgara mevsim balığı, kuşkonmaz, zeytinyağı domates sosu
13	Mantarlı omlet, taze yeşillik, açık siyah çay	1 ince dilim ananas	Fırınlanmış tatlı patates, ızgara tavuk parçaları, limonlu roka	Çiğ badem + şekeriz yeşil çay	Zeytinyağı kereviz yemeğı, esmer pirinç pilavı
14	Yulaf ezmesi, keten tohumu, yarım muz, hindistan cevizi tozu	Nar taneleri	Izgara köfte, zeytinyağı çoban salata	Sade yoğurt + keten tohumu + yaban mersini	Izgara levrek, fırın brüksel lahanası, havuç sote



Tarif: Renkli bulgur Salatası

Hazırlanışı: 1 su bardağı haşlanmış bulguru; bol maydanoz, dereotu, taze soğan, nane ve nar taneleri ile karıştırın. Sos olarak zeytinyağı, bol limon ve az tuz ekleyip harmanlayın. Üzerine dövülmüş ceviz ekleyerek servis yapın.

3

Transfer Öncesi Dönem

Rahim iç zarı transfere hazırlanırken dengeli düzeni sürdürmek

15. - 21. GÜNLER



Bu Fazın Hedefi

Bu dönemde rahim iç zarı (endometrium) transfere hazırlanır. Endometriumun kalınlaşmasını tedavide kullanılan hormonlar ve vücudunuzun kendi hormonları yönetir. Pancar, nar suyu ya da başka bir besinin rahim zarını kalınlaştırdığı veya rahme giden kan akışını artırdığı insanda gösterilmemiştir. Menüler önceki haftaların dengeli düzenini sürdürür.



Pancar, nar, mevsim balığı, ceviz: renkli ve çeşitli bir tabak

GÜN	KAHVALTI	KUŞLUK	ÖĞLE	İKİNDİ	AKŞAM
15	Haşlanmış yumurta, yarım ceviz, tam tahıllı ekmek, nane	Taze pancar-havuç suyu	Izgara tavuk, pancar ve roka salatası (bol zeytinyağı, limon)	Çiğ fındık + papatya çayı	Zeytinyağlı enginar, bulgur pilavı, cacık
16	Sütlü yulaf, dövülmüş ceviz, bol nar taneleri	Hindistan cevizi suyu	Tavuk sulu sebze çorbası, tam buğday spagetti	Ev yapımı ayran + çiğ badem	Izgara levrek, zeytinyağlı ıspanak sote, domates salatası
17	Cevizli ve çeri domatesli tam tahıllı tost	Taze çilek veya mevsim meyvesi	Yeşil mercimek yemeği, ince bulgurla yapılmış kısır	1 küçük bardak saf nar suyu	Izgara balık, buharda brokoli-karnabahar karışımı
18	Yoğurtlu meyve kasesi (ev yapımı ayran (veya taze süt) + orman meyveleri)	Ceviz içi + elma dilimleri	Izgara hindi göğsü, pancar salatası	Kefir + yaban mersini	Zeytinyağlı pırasa, bulgur pilavı, sade yoğurt
19	Az yağlı menemen, lor peyniri, zeytin, bitki çayı	Pancar-elma-zencefil suyu	Börülce salatası (zeytinyağlı, limonlu), çavdar ekmeği	Çiğ kaju + mandalina	Kemik suyuna tel şehriye çorbası, ızgara köfte
20	Yulaf lapası, yarım muz, öğütülmüş keten tohumu	Taze ceviz içi	Mevsim balıklı roka salatası, zeytinyağı-limon-hardal sosu	Probiyotik yoğurt + tarçın	Zeytinyağlı barbunya yemeği, bulgur pilavı, yeşil salata
21	Haşlanmış yumurta, lor peyniri ve ceviz, çeri domates	1 küçük bardak saf nar suyu	Sebzeli nohut yemeği, bulgur pilavı	Çiğ badem + açık siyah çay	Izgara levrek, fırınlanmış kök sebzeler (tatlı patates, havuç, soğan)

Transfer Sonrası Bekleyiş

Özel bir tutunma diyeti yoktur: dengeli beslenmeyi sürdürün, gebelikte sakıncalı gıdalardan kaçının

22. - 30. GÜNLER



Transfer Sonrası Beslenme

Embriyo transferinden sonra özel bir "tutunma diyeti" yoktur. Önceki haftalardaki dengeli düzeni sürdürmeniz yeterlidir. Çiğ salatanın, soğuk içeceğin veya belirli bir yemeğin tutunmayı bozduğunu gösteren bir kanıt yoktur. Gebelik olasılığını düşünerek çiğ ya da az pişmiş et ve balıktan, pastörize edilmemiş süt ürünlerinden ve yüksek cıvalı balıklardan kaçının (ayrıntısı Bölüm 09'da).^[16]



Sık Duyulan Bir İnaniş: Ananas Tutunmaya Yardımcı Olur mu?

Transferden sonra ananas, özellikle de sert orta kısmını yemenin tutunmayı kolaylaştırdığı sık duyulur. Ananasın ya da içindeki bromelain enziminin tutunmayı artırdığını gösteren bir insan çalışması yoktur; bu konudaki çalışmalar hayvan ve laboratuvar çalışmalarıyla sınırlıdır. Ananası seviyorsanız diğer meyveler gibi dengeli beslenmenizin bir parçası olarak yiyebilirsiniz; tutunma için özel bir anlamı yoktur.



Çorba, pişmiş sebze ve tahıllar: transfer sonrası dönemde de çeşitli bir tabak

GÜN	KAHVALTI	KUŞLUK	ÖĞLE	İKİNDİ	AKŞAM
22	Yulaf lapası, tarçın, fırında elma, ceviz	Mandalina + su	Sebze çorbası, tam buğday ekmeği	Kefir	Buharda mevsim balığı, ıspanak, havuç püresi
23	Omlet, tam tahıllı ekmek, domates, salatalık	Armut + birkaç badem	Mercimek çorbası, fırınlanmış sebze tabağı	Rezene çayı + badem	Fırında hindi göğsü, tatlı patates, yeşil salata
24	Bulgur lapası, ev yapımı ayran (veya süt), yaban mersini	Kivi	Sebze çorbası, yeşil mercimek salatası	Papatya çayı + muz	Fırınlanmış sebzeli güveç, bulgur
25	Lor peynirli omlet, fırınlanmış domates	Mevsim meyvesi	Fırınlanmış kök sebzeler (pancar, havuç), ızgara tavuk	Yoğurt + keten tohumu	Fırında beyaz etli balık, kuşkonmaz, mevsim salatası
26	Sütlü yulaf, tarçın, ezilmiş fındık	Nar taneleri	Havuçlu-patatesli tavuk haşlama (suyuyla)	Şekersiz elma kompostosu	Zeytinyağlı taze fasulye, bulgur pilavı
27	Haşlanmış yumurta, tam tahıllı ekmek	Ceviz içi + rezene çayı	Ezogelin çorbası, sotelenmiş ıspanak	Ayran	Fırın çipura, pazı, çoban salata
28	Bulgur lapası, keten tohumu, fırınlanmış armut	Çiğ badem + su	Sebzeli tavuk suyu çorbası	Kefir	Izgara yağsız köfte, zeytinyağlı kereviz yemeği
29	Menemen, 1 dilim tam tahıllı ekmek	Havuç dilimleri	Sebzeli erişte çorbası	İhlamur çayı	Fırınlanmış tatlı patates püresi, tavuk göğsü
30	Yoğurt + ceviz	Mevsim meyvesi	Nohut yemeği, bulgur pilavı	Şekersiz kayısı kompostosu	Fırında balık, brokoli, zeytinyağlı havuç sote

BÖLÜM 09

Kaçınılması Gereken Gıdalar

Gebelik olasılığı nedeniyle kaçınılması ya da azaltılması önerilenler



İşlenmiş gıdalar, alkol, fazla kafein, kızartmalar: azaltılması veya kaçınılması önerilenler



Trans Yağlar & Kızartmalar

Akdeniz tipi beslenme düzeninde yer almaz; mümkün olduğunca azaltın



Rafine Şeker & Tatlılar

Kan şekerini hızla yükseltir (Bölüm 03); ara sıra ve küçük porsiyonlarla



Alkol

Gebelikte güvenli bir alkol düzeyi gösterilmemiştir. Kadınlarda haftada 84 gramın üzerindeki tüketim, tüp bebekte daha düşük gebelik oranıyla ilişkili bulundu.^[10] Gebelik planı ve tedavi sürecinde alkolden kaçının.



Fazla Kafein (Günde 200 mg'ın üzeri)

Kafein tüketimi ile tüp bebek sonucu arasında ilişki bulunmadı.^[10] Gebelikte günlük kafeinin 200 mg'ın (1-2 fincan filtre kahve) altında tutulması önerilir.^[15]



Yüksek Cıvalı Balıklar

Kılıçbalığı, köpekbalığı, iri ton balığı: cıva, gelişmekte olan bebeğin sinir sistemi için zararlı olabilir



Çiğ Et, Sushi, Midye

Gebelikte listeria gibi gıda kaynaklı enfeksiyonlar daha ağır seyredebilir^[16]



Pastörize Edilmemiş Süt

Listeria enfeksiyonu riski; listeria gebelikte anne karnındaki bebeğe geçebilir^[16]



İşlenmiş Et (Sosis, Salam)

Akdeniz tipi beslenme düzeninde sınırlı yer alır; daha az tüketin



Plastik Kaplar ve BPA

Bazı plastiklerde bulunan bisfenol-A (BPA) gibi maddeler hormon sistemini etkileyebilir; üreme sağlığıyla ilgili veriler gözlemseldir. İsterseniz suyu cam veya paslanmaz çelik şişede saklayabilir, yiyecekleri plastik kapta ısıtmaktan kaçınabilirsiniz.

BÖLÜM 10

Erkek Faktörü: Babaya Ait Beslenme

Sperm üretimi 70-100 gün sürdüğü için beslenme düzenine birkaç ay önceden başlamak mantıklıdır



Kabak çekirdeği, domates, ceviz, mevsim balığı, keçiyoynuzu, orman meyveleri

Tüp bebekte sonucu yalnızca kadının değil, erkeğin sağlığı da etkiler. Erkeklerde Akdeniz tipi beslenmeye uyum; sperm sayısı, hareketliliği ve şekli gibi semen ölçümleriyle olumlu yönde ilişkili bulundu. Ancak bunun tüp bebekte gebelik veya canlı doğum oranına yansıdığı gösterilmedi.^[12] Aynı dengeli düzeni çift olarak birlikte uygulamak pratik bir yoldur.

Menüye Eklenebilecek Besinler



Mevsim balığı & Ceviz

Omega-3



Pişmiş Domates

Likopen



Kabak Çekirdeği

Çinko + selenyum



Orman Meyveleri

Antioksidan + lif



Keçiboynuzu (Harnup)

Geleneksel bir ara öğün



Yumurta

B12 + çinko + protein




Sigara ve Alkol

Sigara (nargile dahil) ve yoğun alkol kullanımı sperm kalitesini olumsuz etkileyebilir. Tedavi sürecinde baba adayının da sigarayı bırakması önerilir; yoğun veya sık alkol kullanımı varsa bırakmayı hekiminizle konuşun. Margarini, yağlı etleri ve kızartmaları azaltmak da Akdeniz tipi düzenin bir parçasıdır.

BÖLÜM 11

Hidrasyon, Uyku ve Stres Yönetimi

Beslenmenin yanında bu dönemi daha rahat geçirmenize yardımcı olabilecek alışkanlıklar



Su içmek, uyku, nefes egzersizi ve doğa yürüyüşü

Sıvı Tüketimi

Yeterli sıvı almak genel sağlık için önemlidir. Pratik bir başlangıç noktası olarak aşağıdaki hesabı kullanabilirsiniz. Yumurtalıkların uyarılması döneminde ya da tedavi ekibiniz farklı bir miktar önerdiyse onların önerisine uyun.

Günlük Sıvı İçin Pratik Hesap

$$\text{Vücut Ağırlığı (kg)} \times 30-35 \text{ ml}$$

Örnek: 60 kg bir kişi için: $60 \times 30 = 1.800 \text{ ml}$ – $60 \times 35 = 2.100 \text{ ml}$

Uyku

Düzenli ve yeterli uyku, tedavi sürecinin yorgunluğuyla baş etmeyi kolaylaştırır. Yetişkinler için genellikle gece **7-9 saat** uyku önerilir.



Uykuyu Kolaylaştıran Küçük Adımlar

Melatonin, karanlıkta salgılanan ve uyku düzenine yardımcı olan bir hormondur. Yatak odasını karanlık tutmak ve yatmadan önce ekran ışığını azaltmak uykuya dalmayı kolaylaştırabilir.



Stres ve Kaygı

Tedavi süreci kaygı verici olabilir ve bu çok anlaşılırdır. Bilinmesi gereken önemli bir bulgu var: 14 prospektif çalışmanın birlikte değerlendirildiği bir meta-analizde, tedaviden önceki kaygı ve üzüntü düzeyinin tüp bebek sonucuyla ilişkili olmadığı görüldü.^[11] Stres hissetmek tedavinizi başarısız kılmaz. Aşağıdaki öneriler sonucu değiştirmek için değil, bu dönemi daha rahat geçirmeniz için.



Doğa Yürüyüşleri: Hafif-orta tempolu yürüyüşler rahatlamanıza yardımcı olabilir.



Yoga ve Nefes Egzersizleri: Hafif yoga ve nefes egzersizleri gevşemeye yardımcı olabilir. Tedavi dönemine uygun hareketleri tedavi ekibinize sorabilirsiniz.



Psikolojik Destek: Kaygı veya üzüntü günlük yaşamınızı zorlaştırıyorsa psikolojik destek almak sürecin doğal bir parçasıdır. Çevrenizle ne kadarını paylaşacağınıza siz karar verebilirsiniz.



Düzenli Uyku Saatleri: Her gün aynı saatte yatıp kalkmak ve yatmadan önce ekran ışığını azaltmak uykuyu kolaylaştırabilir.

KAYNAKÇA

Bilimsel Referanslar

1. Vujkovic M, de Vries JH, Lindemans J, ve ark. The preconception Mediterranean dietary pattern in couples undergoing in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection treatment increases the chance of pregnancy. *Fertil Steril*. 2010;94(6):2096-101. [doi:10.1016/j.fertnstert.2009.12.079](https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2009.12.079)

2. Twigt JM, Bolhuis MEC, Steegers EAP, ve ark. The preconception diet is associated with the chance of ongoing pregnancy in women undergoing IVF/ICSI treatment. *Hum Reprod.* 2012;27(8):2526-31. [doi:10.1093/humrep/des157](https://doi.org/10.1093/humrep/des157)
3. Karayiannis D, Kontogianni MD, Mendorou C, ve ark. Adherence to the Mediterranean diet and IVF success rate among non-obese women attempting fertility. *Hum Reprod.* 2018;33(3):494-502. [doi:10.1093/humrep/dey003](https://doi.org/10.1093/humrep/dey003)
4. Noli SA, Ferrari S, Ricci E, ve ark. Adherence to the Mediterranean diet and the risk of unexpected poor response to ovarian stimulation in IVF cycles. *Reprod Biomed Online.* 2023;47(1):77-83. [doi:10.1016/j.rbmo.2023.03.011](https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2023.03.011)
5. Kermack AJ, Lowen P, Wellstead SJ, ve ark. Effect of a 6-week "Mediterranean" dietary intervention on in vitro human embryo development: the Preconception Dietary Supplements in Assisted Reproduction double-blinded randomized controlled trial. *Fertil Steril.* 2020;113(2):260-269. [doi:10.1016/j.fertnstert.2019.09.041](https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2019.09.041)
6. Kellow NJ, Le Cerf J, Horta F, ve ark. The effect of dietary patterns on clinical pregnancy and live birth outcomes in men and women receiving assisted reproductive technologies: a systematic review and meta-analysis. *Adv Nutr.* 2022;13(3):857-874. [doi:10.1093/advances/nmac023](https://doi.org/10.1093/advances/nmac023)
7. Winter HG, Rolnik DL, Mol BWJ, ve ark. Can dietary patterns impact fertility outcomes? A systematic review and meta-analysis. *Nutrients.* 2023;15(11):2589. [doi:10.3390/nu15112589](https://doi.org/10.3390/nu15112589)
8. Mérida-Yáñez B, García-Oliva S, Antúnez-Calvente I, ve ark. Dietary inflammatory index and Mediterranean Diet in female reproductive health: a systematic review and meta-analysis of dietary inflammatory potential. *Front Nutr.* 2026;13:1904722. [doi:10.3389/fnut.2026.1904722](https://doi.org/10.3389/fnut.2026.1904722)
9. Stanhiser J, Jukic AMZ, McConnaughey DR, Steiner AZ. Omega-3 fatty acid supplementation and fecundability. *Hum Reprod.* 2022;37(5):1037-1046. [doi:10.1093/humrep/deac027](https://doi.org/10.1093/humrep/deac027)
10. Rao W, Li Y, Li N, ve ark. The association between caffeine and alcohol consumption and IVF/ICSI outcomes: a systematic review and dose-response meta-analysis. *Acta Obstet Gynecol Scand.* 2022;101(12):1351-1363. [doi:10.1111/aogs.14464](https://doi.org/10.1111/aogs.14464)
11. Boivin J, Griffiths E, Venetis CA. Emotional distress in infertile women and failure of assisted reproductive technologies: meta-analysis of prospective psychosocial studies. *BMJ.* 2011;342:d223. [doi:10.1136/bmj.d223](https://doi.org/10.1136/bmj.d223)
12. Agarwal R, Salas-Salvadó J, Davila-Cordova E, ve ark. Mediterranean diet, semen quality, and medically assisted reproductive outcomes in the male population: a systematic review and meta-analysis. *Adv Nutr.* 2025;16(8):100454. [doi:10.1016/j.advnut.2025.100454](https://doi.org/10.1016/j.advnut.2025.100454)
13. De-Regil LM, Peña-Rosas JP, Fernández-Gaxiola AC, Rayco-Solon P. Effects and safety of periconceptional oral folate supplementation for preventing birth defects. *Cochrane Database Syst Rev.* 2015;(12):CD007950. [doi:10.1002/14651858.CD007950.pub3](https://doi.org/10.1002/14651858.CD007950.pub3)
14. Dünya Sağlık Örgütü. 1 in 6 people globally affected by infertility. 4 Nisan 2023. www.who.int/news/item/04-04-2023-1-in-6-people-globally-affected-by-infertility
15. American College of Obstetricians and Gynecologists. Moderate caffeine consumption during pregnancy. Committee Opinion No. 462. 2010. www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2010/08/moderate-caffeine-consumption-during-pregnancy
16. Dünya Sağlık Örgütü. Listeriosis (bilgi notu). www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/listeriosis

tüpbebek.com

30 Günlük Tüp Bebek Beslenme Planı — 2026 Basımı

Hazırlayan: Doç. Dr. Senai Aksoy | Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Tıbbi inceleme: tüpbebek.com Editöryal Ekip (Tıbbi Yayın Ekibi)

İlk yayın: 5 Nisan 2026 · Son güncelleme: 4 Ekim 2026

Kanıt taraması: PubMed, 4 Ekim 2026 · Güncellemenin kapsamı: iddialar kaynaklarla yeniden karşılaştırıldı, kaynakça bilimsel yayınlarla yenilendi

Tıbbi Sorumluluk Reddi: Bu e-kitap yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir diyet değişikliği yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Bireysel sağlık durumunuza göre farklı beslenme gereksinimleri olabilir. Bu rehber, tıbbi tedavinin yerini almaz.