

INFORME ANTROPOMÉTRICO



DATOS PERSONALES

Nombre y Apellido: Joel, Serrudo

Edad: 22 años

Fecha de evaluación: 10/07/26



MEDICIONES ANTROPOMETRICAS

Segunda medición (11/05/26)

Peso: 61 kg

Talla: 164 cm

IMC (según OMS): 22.7

Clasificación IMC (OMS): Normopeso

Tercera medición

Peso: 59 kg (2 kg menos)

Talla: 164 cm

IMC (según OMS): 21.93

Clasificación IMC (OMS): Normopeso



PLIEGUES CUTANEOS

Los siguientes pliegues son indicadores de grasa corporal subcutánea (externa):

Segunda medición

-Triceps: 11 mm

-Subescapular: 11 mm

-Supraespinal: 16 mm

-Abdominal: 16 mm

-Muslo medio: 11 mm

-Pierna (pantorrilla): 6 mm

-Sumatoria de 6 pliegues: 71 mm

Tercera medición

-Triceps: 9 mm

-Subescapular: 11 mm

-Supraespinal: 11 mm

-Abdominal: 9 mm

-Muslo medio: 7 mm

-Pierna: 6 mm

-Sumatoria de 6 pliegues: 53 mm

Otros pliegues:

-Biceps: 4 mm

-Cresta iliaca: 19 mm

Otros pliegues:

- Biceps: 4 mm

- Cresta iliaca: 12 mm



PERIMETROS

Los siguientes perímetros son indicadores de masa muscular:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| -Brazo relajado: 30.2 cm | -Brazo relajado: 30 cm |
| -Brazo flexionado y contraído: 32 cm | -Brazo flexionado: 30.5 cm |
| -Muslo medio: 52 cm | -Muslo medio: 51 cm |
| -Pierna: 34.5 cm | - Pierna: 33 cm |

Los siguientes perímetros son indicadores de grasa visceral (abdominal):


- | | |
|-----------------|------------------|
| -Cintura: 73 cm | -Cintura: 73 cm |
| -Cadera: 88 cm | -Cadera: 88.3 cm |



PERIMETROS CORREGIDOS

Los siguientes perímetros determinan masa muscular. Al aumentar estos valores, aumenta la masa muscular.


- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| -Brazo corregido: 26.74cm | -Brazo corregido: 27.17 cm |
| -Muslo corregido: 48.54 cm | -Muslo corregido: 48.80 cm |
| -Pierna corregida: 32.62cm | - Pierna corregida: 31.12 cm |



Se observa estabilidad en los perímetros de brazo y muslo, mientras que el perímetro de pierna disminuyó 2 cm respecto a la evaluación anterior. En conjunto, los cambios son mínimos y sugieren una composición corporal relativamente estable.



DISTRIBUCIÓN ADIPOSO MUSCULAR



Respecto a la distribución de la grasa corporal, se observa predominio en la zona abdominal y superior. En cuanto a la masa muscular, esta se concentra principalmente en la región del muslo.



INDICADORES DE SALUD

- Índice adiposo muscular: 0.48 (muy alto)

Disminuyó de 0.57 a 0.48 (0.09), reflejando una reducción de la proporción de tejido graso en relación con la masa muscular.

- Índice músculo óseo (IMO): 2,76 (medio)

Mantenimiento 2.80 a 2.76 (0.04), evidenciando estabilidad con tendencia favorable.


- Índice cintura/cadera: 0,83 (saludable)

Mantenimiento 0.83. Este resultado indica que la distribución de la grasa corporal no representa, en la actualidad, un factor de riesgo cardiometabólico elevado



COMPOSICIÓN CORPORAL

La composición corporal es la forma en que se distribuye el peso total del cuerpo en sus distintos componentes. Permite conocer qué parte del peso corresponde a tejido graso, muscular, óseo y residual.




Referencia ArgoRef. Francis Holway (2005).

- Masa adiposa (promedio): 27,02 % a 23,17% (16,47 kg a 13,67 kg)
- Masa muscular (promedio): 47,49% a 48,56% (28,96 kg a 28,59 kg)
- Masa ósea (promedio): 16,95 % a 17,53% (10,33 kg a 10,34 kg)
- Masa residual (promedio): 16,95% a 10,85% (10,34 kg a 6,40 kg)



SOMATOTIPO

El somatotipo clasifica el cuerpo de una persona, según sus características físicas predominantes, como la forma, la distribución de masa muscular y grasa, y la contextura general



- Endomorfa (4,03 a 3,29), Mesomorfa (5,69 a 5,20), Ectomorfa (1,92 a 2,26)

El análisis del somatotipo evidencia un perfil endo-mesomórfico, caracterizado por un adecuado desarrollo músculo esquelético y una moderada adiposidad relativa. En comparación con la evaluación previa, se observan variaciones mínimas que no modifican la clasificación del somatotipo, manteniéndose una composición corporal estable durante el período evaluado.



CONCLUSIONES

La evaluación antropométrica evidencia una composición corporal estable respecto al control previo. Los perímetros de brazo y muslo se mantienen sin modificaciones, mientras que el perímetro de pierna presenta una disminución de 2 cm.

El Índice Músculo-Óseo (IMO) mostró una leve variación de 2,80 a 2,76, cambio de escasa magnitud y sin relevancia clínica significativa. Asimismo, el somatotipo se mantiene dentro de la categoría endo mesomórfica, caracterizada por un adecuado desarrollo músculo esquelético y una adiposidad moderada.

En conjunto, los resultados sugieren mantenimiento de la masa muscular y estabilidad de la composición corporal, observándose una ligera reducción de los tejidos periféricos sin cambios significativos corporales. Se recomienda continuar con el plan nutricional y el entrenamiento establecido, realizando controles periódicos para monitorear la evolución.