직장훈련 성과 진단 문제은행(구급)

구분	출제과목	출제문항	비 고
1	119구급대원 현장응급처치 표준지침	46	자격 구급대원
		24	비자격 구급대원

소 방 청

National Fire Agency

소방공무원 직장훈련 성과 진단 문제은행(구급)

구분	과목명	문제	정답	비 고
1	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	빈맥에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 빈맥은 분당 심박수가 100회 이상인 경우로 정의된다. ② 보통 빈맥으로 인한 증상은 분당 심박수가 150회 이상인 경우 나타난다. ③ 빈맥은 넓은 QRS 빈맥(QRS>0.12sec)과 좁은 QRS 빈맥(QRS<0.12sec)으로 나뉜다. ④ 넓은 QRS 빈맥은 주로 심방에서 기원하는 경우가 많다.	④	자격 구급대원
2	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	흉통환자에게 니트로글리세린 투여 금기증으로 옳은 것은? ① 발기부전제를 복용한 경우: 최근 24시간 이내 비아그라, 레비트라 등을 복용하거나, 48시간 이내 시알리스를 복용한 경우 ② 수축기 혈압이 100 mmHg 이하 ③ 분당 60회 미만의 서맥(느린맥) 환자 ④ 심부전이 없는 상태에서의 빈맥(빠른맥)(>90회/분)	①	자격 구급대원
3	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	아프가(Apgar) 점수의 내용으로 옳은 것은? ① 태아 출산 후 즉시 실시한다. ② 태아가 호흡을 하지 않는다면 아프가 점수가 결정될 때까지 소생술은 중단한다. ③ 태아 출산 후 1분과 5분 지나서 실시한다. ④ 병원도착 전까지 최초 1회 측정 후 2회까지만 측정한다.	③	자격 구급대원
4	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	화상 손상 깊이에 대한 내용으로 옳은 것은 ? ① 1도(표재성)화상 : 표피층의 손상으로 통증과 수포가 확인된다. ② 2도(부분층)화상 : 표피전층과 진피일부의 손상으로 통증은 없으며 수포가 확인된다. ③ 3도(전층)화상 : 진피전층과 피하조직 대부분의 손상으로 통증이 없으며 수포가 확인되지 않는다. ④ 피부의 기능 소실에 의한 체내 수분 소실 및 체온조절 기능에는 영향이 없다.	③	자격 구급대원
5	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	급성심근경색 환자의 심전도 리듬에 대한 내용으로 옳은 것은? ① 전중격벽 : ST상승(V2-V3리드) ② 전벽 : ST상승(V5-V6리드) ③ 하벽 : ST상승(Ⅱ, Ⅲ, aVF리드) ④ 외벽 : ST상승(Ⅰ, aVL, V3-V4리드)	③	자격 구급대원
6	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	급성 질환 성인의 특정 산소화 목표 수치로 옳은 것은? ① 만성폐쇄성폐질환: 94 ~ 98% ② 급성심근경색환자: 96 ~ 98% ③ 중증외상환자: 88 ~ 93% ④ 심정지에서 ROSC 된 환자: 94 ~ 98% → 수정	④	자격 구급대원
7	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	다음 중 생리학적 기준으로 판단되는 중증외상 기준으로 옳은 것은? ① AVPU 의식수준 V이하 또는 글라스고우 혼수척도 14점 이하 ② 수축기 혈압<90mmHg ③ 분당 호흡수 <12 혹은 >20 ④ 두 개 이상의 원위부 긴뼈 골절	②	자격 구급대원
8	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	아나필락시스 진단 기준 내용으로 옳은 것은 ? ① 수 분에서 수 시간 이내에 피부증상이 있으면서 호흡기계 증상 또는 심혈관계 허탈 증상이 있는 경우 ② 이미 알고 있던 유발인자에 노출된 후 갑자기 혈압저하가 발생하여 수축기 혈압이 100mmHg 미만인 경우(성인기준) ③ 이미 알고 있는 유발인자에 노출된 후 급작스럽게 피부·점막의 증상, 심혈관계 허탈 증상, 위장관계 증상(복통, 구토) 중 하나의 장기 증상이 있는 경우 ④ 위 내용 전부	①	자격 구급대원
9	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	쇼크환자의 처치 및 이송에 관한 설명 중 맞는 것은? ① 저혈압 및 호흡곤란일 경우 머리를 상승시키는 환자 자세를 유지시킨다. ② 정맥로 확보는 매우 중요하므로 현장에서의 시간이 지체되더라도 두 개의 정맥로 확보를 한 후 이송하도록 한다. ③ 쇼크의 첫 번째 변화는 맥박의 상승이므로 활력징후 측정 시 빈맥 여부를 우선으로 확인한다. ④ 원거리이더라도 지역응급의료센터 이상 의료기관으로 이송해야 한다.	③	자격 구급대원
10	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	빈맥 환자에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르시오? ① 빈맥은 분당 심박수가 100회 이상인 경우로 정의된다. ② 빈맥으로 인해 나타날 수 있는 심각한 증상으로는 의식변화, 저혈압, 흉통, 호흡곤란, 두근거림, 실신, 울혈성 심부전 등이 있다. ③ 빈맥이 일차적인 원인으로 작용하여 증상을 일으키는 경우는 보통 분당 심박수가 120 이상에서 발생하며, 그 이하에서는 드물다. ④ 심각한 증상 및 징후를 가진 빈맥환자에서는 정맥로를 확보한다.	③	자격 구급대원

11	119구급대원 현장응급처치 표준지침	가래를 동반한 기침, 거친 나음, 만성 청색증, 흡기와 호기시 저항을 특징으로 하는 만성 기관지염과 가래를 동반하지 않은 기침, 쌕쌕거림, 나음, 호기의 연장을 특징으로 하는 폐기종으로 분류되는 질환은? ① 천식 ② 만성폐쇄성폐질환 ③ 심부전 ④ 폐렴	②	자격 구급대원
12	119구급대원 현장응급처치 표준지침	혈관확장제 니트로글리세린 설하정에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 녹내장 환자는 금기증이다. ② 울혈성 심부전(심근경색과 연관된 경우)에 사용한다. ③ 중증 빈혈환자에게 사용한다. ④ 약물 사용 시 드물게 발한, 요실금, 변실금이 나타날 수 있다.	③	자격 구급대원
13	119구급대원 현장응급처치 표준지침	쇼크 환자의 응급처치에 대한 설명으로 바른 것은? ① 의식이' V'이하로 저하되고 호흡이 10회 미만이면 비재호흡 마스크로 분당 15L 속도의 고농도 산소를 공급한다. ② 저혈량성 쇼크환자의 경우 5분에서 10분마다 500mL(소아는 5mL/kg)의 생리식염수나 젖산 링거액을 투여한다. ③ 심장성 쇼크가 의심되면 원인이 심장기능부전이므로 폐부종이 없는 경우 생리식염수를 250mL 투여한다. ④ 호흡곤란을 호소할 경우 환자의 머리와 다리를 상승시키는 등 적절한 환자의 자세를 취한다.	③	자격 구급대원
14	119구급대원 현장응급처치 표준지침	다음 중 두부손상 환자의 응급처치로 틀린 것은? ① 두개골골절의 징후(너구리눈, 귀 뒷부분의 반상출혈)로 코나 귀에서 혈액이나 뇌척수액이 흐를 경우 막아준다. ② 뇌탈출의 징후(호흡이상, 동공반사 이상, 제뇌경직 등)가 보일 경우 머리를 30도 정도 높이는 두부거상체위를 적용하고 산소포화도가 94~98%를 유지하도록 산소를 공급한다. ③ 모든 중증 두부손상환자는 경추보호대를 착용한다. ④ 생명을 위협하는 외부출혈이 확인되면 멸균된 소독거즈로 압박하여 지혈한다.	①	자격 구급대원
15	119구급대원 현장응급처치 표준지침	비 외상성 쇼크의 임상적 특징으로 틀린 것은? ① 호흡: 빠르고 얕은 호흡을 하고 더욱 진행할 경우 호흡수는 감소한다. ② 맥박: 빠르고 약한 맥박이 발생한다.(단, 신경성쇼크에서는 서맥이 발생할 수 있음) ③ 피부: 혈관이 팽창하면서 피부가 창백하고 차가워지며, 더욱 진행할 경우 땀이 나게 된다. ④ 의식변화: 쇼크로 인해 가장 먼저 뇌가 영향을 받아 안전부절, 불안감을 유발할 수 있다.	③	자격 구급대원
16	119구급대원 현장응급처치 표준지침	뇌졸중의 일반적인 증상의 특징으로 틀린 것은? ① 주된 증상은 두통, 어지러움, 편마비, 언어장애, 보행 장애, 의식장애 등이다. ② 일과성 허혈 발작은 일시적인 국소 허혈에 의해 발생한다. ③ 가역적이고 일시적이나 반복되는 양상을 보이는 경우에 뇌경색의 선행 증상이 될 수 있다. ④ 일반적으로 편측 대뇌의 병변으로 생긴 뇌졸중은 의식저하와 혼수를 일으킨다.	④	자격 구급대원
17	119구급대원 현장응급처치 표준지침	다음 흉통 환자 중 니트로글리세린을 투여할 수 있는 경우는? ① 수축기 혈압이 100mmHg ② 분당 50회 미만의 서맥 환자 ③ 심부전이 없는 상태에서의 빈맥(>100/분) ④ 최근 24시간 이내 비아그라, 레비트라 등을 복용한 경우	①	자격 구급대원
18	119구급대원 현장응급처치 표준지침	다음 중 경련성 질환의 정의 중 다른 것은? ① 경련: 뇌신경 세포의 비정상적이며 과도한 전기활동에 의해 유발되는 일시적인 신경학적 이상 증상 및 징후가 일어나는 상태 ② 뇌전증(간질): 만성적인 기저 병변으로 인해 반복적인 경련을 보이는 상태 ③ 뇌전증 지속상태(간질 지속상태): 경련이 3분 이상 지속되는 상태 ④ 뇌전증 지속상태(간질 지속상태): 의식의 회복됨이 없이 발작이 반복되는 상태	③	자격 구급대원
19	119구급대원 현장응급처치 표준지침	화상 환자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 화상이 발생한 원인에 따라 열화상, 전기화상, 화학화상, 및 방사선화상 등으로 분류할 수 있다. ② 조직 손상과 피부 반응의 깊이를 기준으로 1도, 2도, 3도 화상으로 구분한다. ③ 2도 화상의 손상정도는 표피전층 및 진피일부이며 통증이 심하며 수포가 발생한다. ④ 3도 화상 시 피부색은 갈색 또는 붉은색(마른가죽느낌)으로 변하며 통증이 매우 심하다.	④	자격 구급대원
20	119구급대원 현장응급처치 표준지침	24개월 된 10kg의 영아 심정지 신고를 받고 출동하여 제세동기 분석을 한 결과 심실세동으로 1회 제세동을 시행하였고 현장에서 2분간 가슴압박을 시행하였다. 그 후 리듬분석을 하니 계속 심실세동 이였을 때 2번째 제세동 용량으로 맞는 것은? ① 10J ② 20J ③ 30J ④ 40J	④	자격 구급대원

21	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	서맥의 임상학적 특징과 응급처치에 대한 지침내용이 아닌 것은? ① 증상에는 의식변화, 저혈압, 흉통, 호흡곤란, 실신, 울혈성 심부전과 발한, 구역 구토 등 쇼크를 시사 하 는 징후들이 있다. ② 서맥을 일으킬 수 있는 원인들은 교감 신경계 항진, 심장 전기 전도계 이상, 약물중독, 방실 접합부 허혈 또는 경색 등이 있다. ③ 산소투여는 산소포화도가 94%미만일 경우 비강캐뉼러로 1~5L/min 또는 안면마스크로 6~10L/min의 산소를 투여하여 산소포화도를 95% 이상 유지한다. ④ 심전도 상 서맥이지만, 환자반응이 없고 맥박이 동반되지 않은 경우는 무맥성 전기활동으로 간주하고 심정지 항목 표준지침에 따라 처치한다.	②	자격 구급대원
22	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	경련에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 경련은 중추신경계 뇌신경 세포의 비정상적이며 과도한 전기활동에 의해 유발되는 일시적인 신경학적 이상 증상이다. ② 뇌전증은 급성적인 기저 병변으로 인해 반복적인 경련을 보이는 상태이다. ③ 뇌전증 지속상태는 경련이 5~10분 이상 지속되는 상태이다. ④ 뇌전증 지속상태는 의식의 회복됨없이 발작이 반복되는 상태를 말한다.	②	자격 구급대원
23	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	호흡곤란 환자평가 중 병력청취 OPQRST 내용이 옳지 않은 것은? ① Onset: 호흡곤란이 시작되었을 때 무엇을 하고 있었는지 호흡곤란이 언제 시작 되었는지, 갑자기 시작되었는지, 서서히 악화되었는지 물어본다. ② Provocation: 어디에 증상이 있는지, 다른 곳으로 퍼지는지 물어본다. ③ Quality: 숨을 들이쉴 때와 내쉴 때 언제 더 숨이 찬지 흉통 등의 동반된 증상은 어떠한지 동반되는 증상이 있는지 물어본다. ④ Severity: 호흡곤란이 어느정도 심한지, 이전에도 이렇게 심했는지의 정도를 물어본다.	②	자격 구급대원
24	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	다음 중 소아 심정지의 임상적 특징으로 옳지 않은 것은? ① 소아 심정지는 성인과 달리 질식성 심정지보다 심인성 심정지 비율이 높다. ② 소아 심정지는 만1세 이상~만8세 미만의 소아에서 발생하는 심정지를 의미한다. ③ 초기리듬에서 제세동이 필요한 심실세동이나 심실빈맥인 경우는 약 5% 정도이다. ④ 심폐소생술 도중 약 25% 정도에서 제세동이 필요한 리듬이 나타날 수 있다.	①	자격 구급대원
25	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	복부관통상 환자에 대한 응급처치로 잘못된 것은? ① 산소포화도가 94% 미만일 경우 비강캐뉼러로 1~5L/min 또는 안면마스크로 6~10L/min의 산소를 투여한다. ② 내부 장기가 복부 밖으로 노출된 경우 생리식염수로 적신 거즈로 노출된 장기를 덮어서 건조를 막고 두터운 드레싱으로 압력을 가한다. ③ 환자의 의식이 P 이하인 경우 입인두기도기를 삽입한다. ④ 이물질이 박혀있는 것이 확인되면 현장에서 제거하지 말고 두터운 패드나 타월 뭉치를 이용하여 신체에 고정하여 이송한다.	②	자격 구급대원
26	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	지속적양압환기(CPAP)의 적응증으로 옳은 것은? ① 호흡정지, 심정지 환자 ② 의식이 없고 기관삽관이 필요한 환자 ③ 기흉(공기가슴증)이 의심되는 환자 ④ 만성폐쇄성폐질환, 폐부종 환자	④	자격 구급대원
27	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	니트로글리세린 설하정 투여에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 심장의 전부하를 낮춤으로써 심장의 산소소비량을 줄여주며 심장의 후부하도 어느정도 감소시킨다. ② 협심증의 치료, 울혈성심부전 환자에게 투여해도 된다. ③ 투여 전과 투여 후 혈압을 측정하여 수축기 혈압이 10mmHg이상 감소한 경우 추가 투여를 금한다. ④ 우심실경색 의심환자 금기한다.	③	자격 구급대원
28	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	소아 경련 응급처치 절차 및 방법으로 틀린 것은? ① 토사물의 기도 흡인 방지를 위해 머리를 한 쪽으로 돌려준다. ② 닫힌 입을 벌리기 위해 억지로 손을 넣거나 입인두기도기를 삽입하지 않는다. ③ 산소투여에도 산소포화도<90%이면서 청색증 등 호흡곤란 징후가 관찰되면 BVM(백밸브마스크)으로 양압환기 호흡보조를 해준다 ④ 경련이 지속되면 산소를 2L/min를 환자의 코에 대 준다.	④	자격 구급대원
29	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	흉부손상시 응급처치 절차 및 방법 중 틀린 것은? ① 개방성 기흉(공기가슴증)이 있는 경우 즉시 삼면 밀봉 드레싱을 한다. ② 환자의 의식이 P 이하인 경우 입인두기도기(oral airway)를 삽입하여 기도를 유지하고 환자가 구역반사를 보일 경우에는 이를 제거하고 비인두 기도유지기를 삽입하여 기도를 유지한다. ③ 기도 유지시 두개골 기저부 골절이 의심되는 상황인 경우 코인두 기도기를 삽입하고 도수조작(두부후굴하악거상법)을 시행한다. ④ 동요가슴(호흡시 모순운동)이 보이면 앙와위(바로누움자세)를 유지하면서 두꺼운 패드 및 붕대 등으로 압박・고정한다.	③	자격 구급대원
30	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	다음 중 소아 기도 이물 환자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 의식이 있는 기도이물 환자에서는 마질 겸자를 이용한 제거술을 해서는 안 된다. ② 쌕쌕거리는 천명음은 하기도 폐쇄를 의미한다. ③ 기침을 못하고 목소리가 나오지 않을 시 완전 폐쇄를 의미한다. ④ 상기도 폐쇄는 흡기 시 천명음이 관찰된다.	①	자격 구급대원

31	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	복부 및 골반 손상의 임상적 특징이 아닌 것은? ① 복부 둔상은 복부에 직접 압력이 전해져서 고형장기나 유강장기가 손상되어 출혈과 복막염을 유발할 수 있다. ② 복부 유강장기의 파열이나 장기손상에 의한 복강내 출혈은 쉽게 알 수 없다. ③ 복강(배안) 내 많은 양의 피가 고여 있어도 외형적인 변화가 없을 수 있으며 복막자극 증상이 나타나지 않을 수 있다. ④ 골반 뼈의 골절은 수직력과 전후 압박력에 의해 발생하며 쇼크를 일으킬 정도에 출혈이 동반되지는 않는다.	④	자격 구급대원
32	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	다발성 또는 중증외상환자 신체검사 소견에 따른 기준으로 틀린 것은? ① 대퇴부 자상 ② 한 개 이상의 근위부 긴뼈 골절 ③ 손목,발목 상부의 절단 ④ 마비	②	자격 구급대원
33	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	다음 급성 뇌졸중의증 환자의 설명 중 틀린 내용은? ① 수축기혈압이 90mmHg 이상인 경우 15~30도 상체를 올려 준다. ② 수축기 혈압이 90mmHg 미만 시 환자는 평평히 눕힌 자세를 취해 준다. ③ 지주막하 출혈에서 치명적인 부정맥이 발생할 수 있으므로 심전도 감시를 한다. ④ 병원 전 뇌졸중 선별검사를 실시하고, 현장에서 10분 이상 지체하지 않는다.	②	자격 구급대원
34	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	일산화탄소(CO) 중독에 관한 사항 중 옳지 않은 것은? ① 두통, 시력감소, 구토, 호흡곤란 및 빈호흡 등이 발생한다. ② 고유량의 산소투여는 위험하므로 피하도록 한다. ③ 부정맥, 흉통, 실신 등이 발생 할 수 있다. ④ 심각한 중독의 경우에는 혼수상태를 나타낼 수 있다.	②	자격 구급대원
35	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	다음 중 정량적 호기말 이산화탄소 감시 방법에 대해 옳지 않은 것은? ① 기관내삽관의 성공을 확인 후, 2번의 환기를 시행한 이후 장착 준비를 한다. ② 환자의 호기에 따라 호기말이산화탄소 측정치나 그래프가 적절하게 나타나는지 확인한다. ③ 측정기 결과에 대한 결론이 확실하지 않고 기관내 삽관 위치의 적절성을 확신할 수 없다면 기관내 삽관을 제거한 후 백밸브 마스크 환기를 재개한다. ④ 기관삽관 전 탄산음료를 섭취하였거나 과도한 환기에 의한 위팽만이 있는 경우 식도에 기관튜브가 자리잡았을때도 이산화탄소가 측정이 될 수 있다.	①	자격 구급대원
36	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	발열 및 패혈증성 쇼크 환자의 임상적 특징으로 틀린 것은? ① 전신성염증반응증후군(SIRS) : 4가지(체온, 맥박수, 호흡수, 백혈구수) 소견중 3가지 이상이 나타나는 경우로서 전신염증, 장기기능저하, 장기부전관 관련된 중증질환 상태를 말한다. ② 패혈증(Sepsis): 전신성 염증반응증후군과 혈액 내 감염이 의심되거나 확진된 상태로서 치명적이 될 수 있음. ③ 중증패혈증(Severe sepsis): 패혈증과 더불어 하나 이상의 주요장기에 순환부전, 기능 부전 등의 증상이 나타나는 경우를 말함 ④ 패혈증성 쇼크: 패혈증과 더불어 수액치료에도 반응하지 않는 저혈압이 지속되는 경우	①	자격 구급대원
37	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	비외상성 쇼크 종류에 따른 특징으로 옳지 않은 것은? ① 저혈량성 쇼크: 구토, 설사, 수분섭취 제한, 출혈 등으로 인해 체액이 소실되면서 혈액량이 줄어든 경우 발생한다. ② 심장성 쇼크: 심장의 펌프 작용이 약화되면서 발생한다. ③ 신경성 쇼크: 뇌 또는 척추의 신경 손상으로 인해 혈관이 확장되어 발생한다. ④ 패혈성 쇼크: 광범위하게 퍼진 감염과 독소로 인해 체액이 혈관 내로 이동되면서 발생한다.	④	자격 구급대원
38	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	다음 중 환자의 일차 평가 및 처치로 옳지 않은 것은? ① 일차평가는 2분 이내에 종결함을 원칙으로 한다. ② 의식상태는 GCS(Glascow Coma Scale) 분류법에 따라 측정한다. ③ 전체적인 초기평가는 15~30초 동안 전체적인 조사로 즉시 필요한 결정적인 처치를 찾아낸다. ④ 호흡소리 중 기포음, 코고는 소리, 천명음 등은 하부기도 폐쇄 문제이다.	②	자격 구급대원
39	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	다음 중 쇼크 발생시 첫 번째 활력징후의 변화는? ① 혈압상승 ② 산소포화도 감소 ③ 혈압저하 ④ 맥박상승	④	자격 구급대원
40	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	다음 중 중독물질의 해독제로 적절하지 않는 것은? ① 마약성 진통제(헤로인,옥시코돈,모르핀) – 날록손(Naloxone) ② 아세트아미노펜 – 2-PAM(pralidoxime) ③ 콜린성 약물(유기인계, 카바메이트계 살충제) - 아트로핀(Atropine) ④ 삼환계 항우울제(TCA) - 중탄산나트륨(sodium bicarbonate))	②	자격 구급대원
41	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	포도당주사액(Dextrose) 적응증 및 투여방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 성인기준 혈당이 70mg/dl이하이면 저혈당 치료의 적응증이 된다. ② 50% 포도당 수액의 경우 경구투여가 가능하다. ③ 10세 미만 경구투여시 25g(50ml) 용량으로 한다. ④ 10세 미만 정맥투여시 50% 포도당 용액을 5mL/Kg 1회 투여한다.	④	자격 구급대원

42	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	고온 환경 질환 중 열사병의 임상적 특징으로 옳지 않은 것은? ① 체온 조절 기능장애로 발생 ② 심부 체온이 40℃이상 상승 ③ 땀을 많이 흘리거나 전해질 공급 부족으로 탈수와 전해질 이상 발생 ④ 불안, 이상행동, 신경질적 반응, 환각, 경련, 운동 실조, 의식소실, 혼수	③	자격 구급대원
43	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	외상환자 중증도 평가기준 중 손상기전에 대해 틀리게 설명한 것은? ① 추락: 성인 6m, 소아 3m 이상 높이에서 추락 ② 고위험 교통사고: 차량전복/차체내부 30cm 이상 안으로 밀림 ③ 고위험 교통사고: 30cm 이상 차체 찌그러짐/자동차에서 튕겨져 나감 ④ 30km/h 이상 속도의 오토바이 사고	③	자격 구급대원
44	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	비 외상성 쇼크 환자에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 이송 중 활력징후 측정 등 지속적 환자상태를 감사히고 필요시 심전도를 측정한다. ② 현장에서 병원 이송전에 한 개 또는 두 개의 정맥로를 확보할 수 있다. ③ 모포를 덮어 환자의 적정한 체온을 유지한다. ④ 쇼크의 첫 번째 활력징후의 변화는 맥박 상승이 아닌 혈압저하이므로 활력징후 측정시 혈압의 변화를 우선적으로 확인한다.	④	자격 구급대원
45	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	호흡곤란 환자에 대한 설명으로 틀린 것은 ? ① 만성폐쇄성폐질환 : 흡기와 호기시 저항을 특징으로 하는 만성 기관지염과 가래를 동반하지 않은 기침, 쌕쌕거림, 나음, 호기의 연장을 특징으로 하는 폐기종으로 분류 ② 만성폐쇄성폐질환 환자 호흡곤란이 심하다면 즉시 고농도 산소를 투여한다. ③ 심혈관계 기왕력이 있는 환자는 앉는 자세(sitting position)을 취한다. ④ 심전도 측정기가 있는 경우 3유도 심전도 검사를 시행한다.	②	자격 구급대원
46	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	기관내 삽관 또는 성문상 기도기(I-gel) 삽입의 적응증으로 틀린 것은 ? ① GCS 점수 9점 이하 ② 중증의 호흡곤란 환자 ③ 입인두기도기를 포함한 백밸브마스크환기가 효과적이지 않는 환자 ④ 지속적인 의식상태 악화	①	자격 구급대원
47	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	다음 중 심폐정지 발생시간(추정)으로 잘못 서술한 것은? ① 심정지가 발생했을 것으로 추정하는 일시를 기록한다. ② 해당 년도는 알지만 월. 일. 시 등을 알 수 없는 경우 발견한 시각을 기록한다. ③ 추정시간은 발견자나 이야기를 전해들은 제3자의 발언을 근거로 기록한다. ④ 근거가 없을 경우 마지막 목격시간(Last Normal Time)을 조사하여 기록한다.	②	비자격 구급대원
48	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	현장에서 소생술을 중단할 수 있는 상황으로 옳은 것은? ① 30분간 심폐소생술이 시행 되었지만 자발순환회복이 되지 않은 경우 ② 구급대원이 지쳐서 더 이상 소생술을 지속할 수 없는 경우 ③ 흉부(심장) 관통상에 의한 심정지 ④ 외상으로 인한 폐쇄성 두개골 골절	②	비자격 구급대원
49	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	구급활동일지 작성요령 중 환자가 호소하는 증상의 내용이 틀린 것은? ① 의식장애: 의식을 잃었으나 곧(수 분 이내에) 정상으로 돌아온 경우 ② 마비: 상지나 하지 혹은 얼굴 근육의 근력 저하가 나타난 상태 ③ 화상: 불이나 뜨거운 물, 화학물질 등에 의해 피부 및 조직이 손상된 것 ④ 객혈: 기침 시 피가 남. 가래에 피가 섞임, 아주 선홍색의 피를 다량 토하면서 호흡곤란이 동반된 경우	①	비자격 구급대원
50	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	척추 손상을 야기할 수 있는 손상기전으로 다친 환자의 경우 등 척추고정을 반드시 고려해야 하는 경우로 옳은 것은? ① 교통사고 환자로 의식이 명료한 상태로(A) 사고당시 기억이 있으며, 우측 발목 통증 호소 ② 넘어진 환자로 운동 또는 감각에 이상은 없으며 우측 손목 통증 호소 ③ 교통사고 환자로 좌측 무릎 찰과상 확인되며, 의식소실, 의식변화 등 기타 증상/징후 확인 되지 않음 ④ 사고기억을 못하며, 혼돈이 있어 대화 내용이 부적절하고 지시에 따르기 어려운 상태	④	비자격 구급대원
51	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	119현장응급처치 표준지침의 응급처치 및 이송거부에서 말하는 환자의 권리가 아닌 것은? ① 환자가 만 18세 이상의 성인이며 적절한 판단력을 행사할 수 있는 건전한 정신상태라면 응급처치 및 이송을 거부할 수 있는 권리가 있다. ② 환자가 미성년자이거나 적절한 판단력을 행사할 수 없는 경우에는 법적인 대리인(부모 또는 가족)이 판단을 대신할 수 있다. ③ 개인의 자율적 권리보다 공공의 이익이 우선하는 자해 또는 자살의 위험이 있는 환자는 제외한다. ④ 개인의 자율적 권리보다 공공의 이익이 우선하는 전염성 질병이 있거나, 타인에게 해를 가할 위험이 있는 환자는 제외한다.	①	비자격 구급대원

52	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	과호흡 환자에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오? ① 과도하게 빨라진 호흡에 의해 환기가 증가하면서 혈중 이산화탄소 분압이 감소하게 되어 나타난다. ② 서서히 악화되는 호흡곤란, 공포감, 일시적 감각마비, 수족 경련 등의 증상을 호소한다. ③ 병원에 도착할 때가지 숨을 천천히 쉬도록 환자를 안정시켜 준다. ④ 비닐봉투나 종이봉투를 이용한 재호흡요법을 적용한다.	④	비자격 구급대원
53	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	갑작스러운 충격이나 운동으로 근막이나 인대가 상하거나 타박상으로 피하 조직이나 장기가 상한 상태를 나타내는 것은? ① 개방성 골절 ② 탈구 ③ 염좌 ④ 폐쇄성 골절	③	비자격 구급대원
54	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	절단된 조직의 처치로 틀린 것은? ① 절단부의 상처는 일반적인 상처의 처치에 따른다. ② 절단조직은 마른 소독거즈로 감싼다. ③ 절단조직을 넣은 밀폐용기는 얼음물에 담그거나, 얼음주머니로 감싼다. ④ 조직이 얼음에 직접 닿지 않도록 주의한다.	②	비자격 구급대원
55	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	저체온증 환자의 임상적 특징으로 옳지 않은 것은? ① 떨림이 감소하고, 기면, 혼미 섬망 등이 나타난 것은 30~34℃의 중등도 체온이다. ② 반사가 저하되고, 신체 기능의 저하로 호흡수, 혈압, 맥박수가 감소한 것은 34℃ 이상의 경증의 저체온증 상태이다. ③ 추위를 느끼고, 떨림이 나타나며 운동 실조 증상이 나타나는 상태는 34℃ 이상의 경증의 저체온증 상태이다. ④ 떨림이 사라지고, 혼수가 나타나며 부정맥의 위험성이 증가하는 상태는 30℃ 이하의 중증의 저체온증 상태이다.	②	비자격 구급대원
56	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	중독환자의 응급처치 시 주의사항으로 옳지 않은 것은? ① 환자의 의복이 독성물질에 오염되어 있을 시 모두 제거 한다. ② 환자가 구역반사를 보일 경우 코인두기도유지기를 삽입하여 기도를 유지한다. ③ 산소포화도가 94% 미만일 경우 비강캐뉼러 또는 안면마스크로 산소를 투여한다. ④ 파라쿼트(제초제) 중독 모든 환자에게 산소를 투여한다.	④	비자격 구급대원
57	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	외상처치 일반적인 부목 고정 방법 중 옳지 않은 것은? ① 중증 환자로 즉시 이송을 해야하는 경우를 제외하고는 손상 부위의 부목 고정 후에 환자를 이동하도록 한다. ② 모든 상처는 부목을 대기 전에 소독된 거즈로 덮어 준다. ③ 부목고정 전, 후에 손상부위 원위부의 순환(pulse), 운동(motor) ,감각(sensory) 상태를 평가한다. ④ 골절이 확실하다 판단되면 골절부위 피복을 제거하여 확인하지 않고 부목고정을 한다.	④	비자격 구급대원
58	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	뱀에 의한 교상 시 응급처치로 옳지 않은 것은? ① 뱀에 물렸을 경우 습식 드레싱 후 부목을 이용해 움직임을 최소화 한다. ② 물린 부위 위로 탄력붕대를 감은 후 말단부위 맥박 및 모세혈관 재충혈을 확인한다. ③ 독사에 물렸을 때에는 상처를 심장보다 낮게 위치하며, 주변 환경을 조용하게 유지하고, 환자의 움직임을 최소화 하도록 한다. ④ 혈압, 맥박, 호흡, 산소포화도를 지속적으로 감시한다.	①	비자격 구급대원
59	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	탈구된 치아의 처치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 치아의 뿌리를 씻고 소독하여 치과진료가 가능한 병원으로 이송한다. ② 이송 중에는 치아를 우유 또는 생리식염수에 넣어 이송한다. ③ 구강 내 출혈을 제거해 호흡에 지장이 없도록 한다. ④ 출혈이 심한 연조직 손상은 거즈를 이용하여 압박 드레싱을 적용한다.	①	비자격 구급대원
60	119구급대원 현장응급 처치 표준지침	두부손상의 임상적 특징으로 볼 수 없는 것은? ① 육안적으로 확인 가능한 두피 출혈이 있어야 두개골 골절이나 뇌출혈 발생을 알 수 있다. ② 두피 손상의 경우 대부분 쉽게 회복되나 외부로의 심한 출혈이 있을 수 있으므로 주의를 요한다. ③ 환자의 의식저하가 없는 경증 두부외상은 일반적으로 가벼운 외상을 말하지만 지연성 출혈 등으로 인해 뒤늦게 증상이 나타나는 경우가 있어 지속적인 모니터링이 필요하다. ④ 두부손상이란 외력에 의해 일어나는 머리 부분의 손상을 말한다.	①	비자격 구급대원

61	119구급대원 현장응급처치 표준지침	환자가 응급처치나 이송을 거부하는 경우 따르는 지침에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은? ① 혈압, 맥박수, 호흡수, 산소포화도 등 생체징후가 불안정한 환자인 경우 의료지도를 요청한다. ② 가능한 단순명료한 말로 환자에게 이송 및 처치 거부로 발생할 수 있는 잠재적위험에 대해 설명하며, 필요한 경우 의료지도를 요청한다. ③ 이송거절, 거부확인서의 서명을 거부하는 경우 구급거부확인서에 표시하는 방법밖에 없다. ④ 환자가 정확히 이해하고 있는지를 확인하기 위해, 구급대원이 설명한 내용을 환자 스스로의 말로 다시 표현해보도록 한다.	③	비자격 구급대원
62	119구급대원 현장응급처치 표준지침	비뇨생식기 손상에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 외력에 의하여 발생하는 신장과 방광, 생식기의 손상을 말한다. ② 남성 외생식기의 완전 절단 시에는 플라스틱 통이나 비닐주머니에 절단물을 넣고 냉장용기에 보관하여 운반한다. ③ 생식기 손상 환자에서 성폭행 등의 가능성이 없는지 주의한다. ④ 동반손상보다 단독손상이 흔하므로 그에 대한 처치를 우선한다.	④	비자격 구급대원
63	119구급대원 현장응급처치 표준지침	안과적 손상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 외력에 의하여 발생하는 안구와 눈꺼풀, 안와골의 손상을 말한다. ② 안통, 이물감, 시야장애 및 복시 등의 증상을 호소할 수 있다. ③ 두부손상을 동반할 수 있다. ④ 한 부위가 손상되어 안대의 적용이 필요하다면 한 측에만 시행한다.	④	비자격 구급대원
64	119구급대원 현장응급처치 표준지침	다음 중 뱀에 물렸을 경우 응급처치로 틀린 것은? ① 물린 부위는 부목을 이용하여 움직임을 최소화한다. ② 멸균증류수 또는 식염수를 이용하여 상처를 세척한다. ③ 얼음팩을 적용한다. ④ 상처를 심장보다 낮게 위치하며, 산소를 공급하며 이송한다.	③	비자격 구급대원
65	119구급대원 현장응급처치 표준지침	다음 중 응급의료법 시행규칙에서 정하는 응급증상에 해당하지 않는 것은? ① 신경학적 응급증상: 의식장애, 현훈 ② 알러지: 얼굴 부종을 동반한 알러지 반응 ③ 출혈: 계속되는 각혈, 지혈이 안되는 출혈, 급성 위장관 출혈 ④ 소아과적 응급증상: 소아경련성 장애	①	비자격 구급대원
66	119구급대원 현장응급처치 표준지침	다음 중 현장에서 소생술을 중단할 수 있는 상황이 아닌 것은? ① 구급대원이 지쳐서 더 이상 소생술을 지속할 수 없는 경우 ② 구급대원이 소생술을 지속하기 어려운 환경에 노출되는 경우 ③ 직접의료지도를 요청하여 '소생술 중단'의 의료지도를 받은 경우 ④ 소생술을 시행했지만, 시행 중 '소생술 유보'의 조건이 확인되지 않는 경우	④	비자격 구급대원
67	119구급대원 현장응급처치 표준지침	행동 이상 환자에 대한 응급처치 절차 및 방법 중 바르지 않은 것은? ① 기본처치는 환자 안정화, 현장안전확보, 환자임상평가 순으로 진행한다. ② 구급대원이 접근하기 위험한 현장 환경에 행동 이상 환자가 있거나 무기 등의 위험한 물건을 소지하고 있거나 난폭한 행동을 하는 경우에는 경찰에 통보하고 협조를 요청한다. ③ 현장 안전이 확보되면 행동 이상 환자를 안정화 시켜야 한다. 초기 안정화 시에는 일차적으로 구두로 환자를 진정시켜서 안정하도록 하고 응급처치에 순응하도록 협력 관계를 구축한다. ④ 환자 임상 평가 후에 동반된 손상이나 중독에 대해서 평가한다.	①	비자격 구급대원
68	119구급대원 현장응급처치 표준지침	응급처치나 이송을 거부하는 경우에 대한 설명으로 바르지 않은 것은? ① 환자가 만19세 이상의 성인이며 적절한 판단력을 행사할 수 있는 건전한 정신상태라면 응급처치 및 이송을 거부할 수 있는 권리가 있다. ② 구급대원은 환자 또는 보호자가 응급처치 및 이송을 거부하더라도 반드시 이송을 하여야 한다. ③ 구급대원은 구급거절, 거부확인서를 작성하며 그 내용을 이송을 거부한 환자 또는 보호자에게 알려주고 서명을 받는다. ④ 구급거절, 거부확인서의 서명을 거부하는 경우 목격자에게 받을 수 있다.	②	비자격 구급대원
69	119구급대원 현장응급처치 표준지침	아동학대 가능성을 의심할 수 있는 이학적 검진 내용 중 틀린 것은 ? ① 멍의 색깔로 수상 시기를 판정한다 ② 다리미, 젓가락, 난로의 옆면, 격자무늬와 같은 기하학적인 모양의 화상 ③ 장갑 혹은 양말을 끼운듯한 모양의 화상 ④ 허벅지 안쪽의 화상	①	비자격 구급대원
70	119구급대원 현장응급처치 표준지침	안구손상이 있는 환자의 응급처치 술기로 올바르지 않은 것은 ? ① 눈을 움직이면 통증이 있으므로 안대의 적용이 가능하면 양측에 시행한다. ② 이물에 의한 처치는 일반적인 상처의 처치에 따른다. ③ 환자의 손상된 눈이 위쪽을 향하도록 자세를 취해준다. ④ 세척방법은 중력을 이용하여 1~2리터의 생리식염수로 세척하며 약품이 모두 씻겨나갈때까지 눈을 충분히 세척한다.	③	비자격 구급대원

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	빈맥에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	① 빈맥은 분당 심박수가 100회 이상인 경우로 정의된다.		
	② 보통 빈맥으로 인한 증상은 분당 심박수가 150회 이상인 경우 나타난다.		
	③ 빈맥은 넓은 QRS 빈맥(QRS>0.12sec)과 좁은 QRS 빈맥(QRS<0.12sec)으로 나뉜다.		
	④ 넓은 QRS 빈맥은 주로 심방에서 기원하는 경우가 많다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 233		
문제해설	❖ (해설) 넓은 QRS 빈맥은 주로 심실에서 기원하는 경우가 많다		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	흉통환자에게 니트로글리세린 투여 금기증으로 옳은 것은?		
	①	발기부전제를 복용한 경우: 최근 24시간 이내 비아그라, 레비트라 등을 복용하거나, 48시간 이내 시알리스를 복용한 경우	
	②	수축기 혈압이 100 mmHg 이하	
	③	분당 60회 미만의 서맥(느린맥) 환자	
	④	심부전이 없는 상태에서의 빈맥(빠른맥)(>90회/분)	
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 227		
문제해설	❖ (해설) 수축기 혈압이 90 mmHg 이하 분당 50회 미만의 서맥(느린맥) 환자 심부전이 없는 상태에서의 빈맥(빠른맥)(>100회/분)		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	아프가(Apgar) 점수의 내용으로 옳은 것은?		
	① 태아 출산 후 즉시 실시한다.		
	② 태아가 호흡을 하지 않는다면 아프가 점수가 결정될 때까지 소생술은 중단한다.		
	③ 태아 출산 후 1분과 5분 지나서 실시한다.		
	④ 병원도착 전까지 최초 1회 측정 후 2회까지만 측정한다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 284		
문제해설	❖ (해설) 태아 출산 후 1분과 5분 지나서 실시 태아가 호흡하지 않는다면 아프가 점수가 결정될 때까지 소생술을 중단하지 않는다. 병원도착 전까지 1,5, 10분 간격으로 반복하여 측정한다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	화상 손상 깊이에 대한 내용으로 옳은 것은 ?		
	① 1도(표재성)화상 : 표피층의 손상으로 통증과 수포가 확인된다.		
	② 2도(부분층)화상 : 표피전층과 진피일부의 손상으로 통증은 없으며 수포가 확인된다.		
	③ 3도(전층)화상 : 진피전층과 피하조직 대부분의 손상으로 통증이 없으며 수포가 확인되지 않는다.		
	④ 피부의 기능 소실에 의한 체내 수분 소실 및 체온조절 기능에는 영향이 없다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 363		
문제해설	화상 환자의 구조와 응급처치는 매우 위험할 수 있기 때문에, 현장의 안전을 확보하는 것이 가장 중요하다. 화상이 발생한 원인에 따라 열화상, 전기화상, 화학화상, 및 방사선화상 등으로 분류할 수 있다. 조직 손상과 피부 반응의 깊이를 기준으로 **1도(표재성) 화상, 2도(부분층) 화상, 3도(전층) 화상**으로 구분한다.		

1. 임상적 특징

- 피부의 기능 소실
- 외부 세계에 대한 기계적 방어 및미생물 침투 차단
- 체내 수분 소실 방지와 감각기관 및 체온조절의 역할
- 화상의 깊이(분류)



	1도 화상	2도 화상	3도 화상
손상정도	표피	표피전층+ 진피일부	진피전층+ 피하조직 대부분
피부색	붉은색	붉은색	갈색 또는 흰색 (마른가죽느낌)
증상	통증○/수포×	통증○/수포○	통증×/수포×
치유기간	1주내 회복	2주내 회복	피부이식 필요

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	급성심근경색 환자의 심전도 리듬에 대한 내용으로 옳은 것은?		
	① 전중격벽 : ST상승(V2-V3리드)		
	② 전벽 : ST상승(V5-V6리드)		
	③ 하벽 : ST상승(Ⅱ, Ⅲ, aVF리드)		
	④ 외벽 : ST상승(Ⅰ, aVL, V3-V4리드)		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 602		
문제해설	급성심근경색 - 전중격벽 : ST상승(V1-V2리드) - 전벽 : ST상승(V3-V4리드) - 하벽 : ST상승(Ⅱ, Ⅲ, aVF리드) - 외벽(Ⅰ, aVL, V5-6) - 후벽 : ST크게 하강 0.04초 이상 넓은 R Wave(V1, V2리드)		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	급성 질환 성인의 특정 산소화 목표 수치로 옳은 것은?		
	① 만성폐쇄성폐질환: 94 ~ 98%		
	② 급성심근경색환자: 96 ~ 98%		
	③ 중증외상환자: 88 ~ 93%		
	④ 심정지에서 ROSC 된 환자: 94 ~ 98% → 수정		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 494		
문제해설	**7. 급성 질환 성인의 특정 산소화 목표** - 과도한 산소로 인한 부작용에 주의하여야 한다. 산소포화도 100%를 유지하기 위해 필요이상의 산소공급은 혈관수축, 염증, 심장, 폐, 뇌에 산화 스트레스를 증가시킬 수 있는 위험이 있어, 다음의 목표산소포화도를 권장한다. - 급성중증성인환자 94~98% - 만성폐쇄성폐질환 88~92% - 급성심근경색환자 94~96% - 급성호흡부전증후군 88~93%(FiO2≥0.7) - 중증외상환자 96~98% - 심정지에서 ROSC 된 환자 92~98% 단, 중증흡부손상, 익수, 유독가스 흡인에 의한 기도 화상, 일산화탄소 중독, 아나필락시스, 중증 감압병, 중증 고산병, 군발두통의 경우 100%산소를 공급한다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	다음 중 생리학적 기준으로 판단되는 중증외상 기준으로 옳은 것은?		
	① AVPU 의식수준 V이하 또는 글라스고우 혼수척도 14점 이하		
	② 수축기 혈압<90mmHg		
	③ 분당 호흡수 <12 혹은 >20		
	④ 두 개 이상의 원위부 긴뼈 골절		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 321		
문제해설	❖ (해설) AVPU 의식수준 V이하 또는 글라스고우 혼수척도 13점 이하 분당 호흡수 <10 혹은 >29 두개 이상의 근위부 긴뼈 골절		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침

문 제	아나필락시스 진단 기준 내용으로 옳은 것은 ?	
	①	수 분에서 수 시간 이내에 피부증상이 있으면서 호흡기계 증상 또는 심혈관계 허탈 증상이 있는 경우
	②	이미 알고 있던 유발인자에 노출된 후 갑자기 혈압저하가 발생하여 수축기 혈압이 100mmHg 미만인 경우(성인기준)
	③	이미 알고 있는 유발인자에 노출된 후 급작스럽게 피부·점막의 증상, 심혈관계 허탈 증상, 위장관계 증상(복통, 구토) 중 하나의 장기 증상이 있는 경우
	④	위 내용 전부
	정답	①

출제근거

❖ (근거)
「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 266

문제해설

* 아나필락시스의 진단 기준

	양상
기준1	수 분에서 수 시간 사이에 피부증상(예: 전신두드러기, 홍조, 입술·구강 혈관부종)이 있으면서 호흡기계 증상(예: 천명음, 분당호흡수>29회, 산소포화도<94%) 또는 심혈관계 허탈 증상(수축기혈압 90mmHg 미만, 의식 수준 V 이하)이 있는 경우
기준2	이미 알고 있는 유발인자에 노출된 후 갑자기 혈압저하가 발생하여 수축기 혈압이 90mH 미만인 경우(성인 기준)
기준3	이미 알고 있는 유발인자에 노출된 후 급작스럽게 피부·점막의 증상, 호흡기계 증상, 심혈관계 허탈 증상, 위장관계 증상(복통, 구토) 중 둘 이상의 장기 증상이 있는 경우

출제위원

소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	쇼크환자의 처치 및 이송에 관한 설명 중 맞는 것은?		
	① 저혈압 및 호흡곤란일 경우 머리를 상승시키는 환자 자세를 유지시킨다.		
	② 정맥로 확보는 매우 중요하므로 현장에서의 시간이 지체되더라도 두 개의 정맥로 확보를 한 후 이송하도록 한다.		
	③ 쇼크의 첫 번째 변화는 맥박의 상승이므로 활력징후 측정 시 빈맥 여부를 우선으로 확인한다.		
	④ 원거리이더라도 지역응급의료센터 이상 의료기관으로 이송해야 한다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 213		
문제해설	❖ (해설) 1. 저혈압일 경우 환자의 다리를 상승시키고, 호흡곤란인 경우는 머리를 상승시키는 등 적절한 환자의 자세를 취한다. 2. 현장에서 병원 이송 전에 한 개 또는 두 개의 정맥로를 확보할 수 있다. 하지만 현장에서 정맥로 확보에 시간을 너무 많이 보내면 안된다. 3. 가까운 지역응급의료센터 이상의 의료 기관으로 이송함을 원칙으로 하되, 지역별 여건에 따라 의료지도 등을 받아 치료 가능한 가까운 지역응급의료기관으로 이송할 수 있다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	빈맥 환자에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르시오?		
	① 빈맥은 분당 심박수가 100회 이상인 경우로 정의된다.		
	② 빈맥으로 인해 나타날 수 있는 심각한 증상으로는 의식변화, 저혈압, 흉통, 호흡곤란, 두근거림, 실신, 울혈성 심부전 등이 있다.		
	③ 빈맥이 일차적인 원인으로 작용하여 증상을 일으키는 경우는 보통 분당 심박수가 120 이상에서 발생하며, 그 이하에서는 드물다.		
	④ 심각한 증상 및 징후를 가진 빈맥환자에서는 정맥로를 확보한다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 233		
문제해설	❖ (해설) - 빈맥(빠른맥)으로 인해 나타날 수 있는 심각한 증상으로는 의식변화, 저혈압, 흉통, 호흡곤란, 두근거림, 실신, 울혈성 심부전과 발한, 구역/구토 등 쇼크를 시사하는 징후들이 있다. - 빈맥(빠른맥)이 일차적인 원인으로 작용하여 증상을 일으키는 경우는 보통 분당 심박수가 150 이상에서 발생하며, 그 이하에서는 드물다		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	가래를 동반한 기침, 거친 나음, 만성 청색증, 흡기와 호기시 저항을 특징으로 하는 만성 기관지염과 가래를 동반하지 않은 기침, 쌕쌕거림, 나음, 호기의 연장을 특징으로 하는 폐기종으로 분류되는 질환은?		
	① 천식		
	② 만성폐쇄성폐질환		
	③ 심부전		
	④ 폐렴		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 219		
문제해설	❖ (해설) 만성폐쇄성폐질환: 가래를 동반한 기침, 거친 나음, 만성 청색증, 흡기와 호기시 저항을 특징으로 하는 만성 기관지염과 가래를 동반하지 않은 기침, 쌕쌕거림, 나음, 호기의 연장을 특징으로 하는 폐기종으로 분류한다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	혈관확장제 니트로글리세린 설하정에 대한 설명으로 틀린 것은?		
	① 녹내장 환자는 금기증이다.		
	② 울혈성 심부전(심근경색과 연관된 경우)에 사용한다.		
	③ 중증 빈혈환자에게 사용한다.		
	④ 약물 사용 시 드물게 발한, 요실금, 변실금이 나타날 수 있다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 531		
문제해설	❖ (해설) 금기증 ◦ nitroglycerin에 대한 과민반응 ◦ 녹내장 환자, 두부외상이나 뇌출혈, 중증 빈혈 ◦ 저혈압(수축기 혈압이 90 mmHg 이하), 분당 50회 미만의 서맥(느린맥), 심부전이 없는 상태에서의 빈맥(빠른맥)(>100회/분)환자에게는 설하정을 투여하지 않는다. ◦ 최근 24시간 이내 비아그라, 레비트라 등을 복용하거나, 48시간 이내 시알리스를 복용한 경우 설하정을 투여하지 않는다. ◦ 설하정 투여 전과 투여 후 혈압을 측정하여 수축기 혈압이 20 mmHg 이상 감소한 경우 추가 투여를 금한다. ◦ 우심실경색 의심환자		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	쇼크 환자의 응급처치에 대한 설명으로 바른 것은?		
	①	의식이' V'이하로 저하되고 호흡이 10회 미만이면 비재호흡 마스크로 분당 15L 속도의 고농도 산소를 공급한다.	
	②	저혈량성 쇼크환자의 경우 5분에서 10분마다 500mL(소아는 5mL/kg)의 생리식염수나 젖산 링거액을 투여한다.	
	③	심장성 쇼크가 의심되면 원인이 심장기능부전이므로 폐부종이 없는 경우 생리식염수를 250mL 투여한다.	
	④	호흡곤란을 호소할 경우 환자의 머리와 다리를 상승시키는 등 적절한 환자의 자세를 취한다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 214		
문제해설	❖ (해설) - 의식이 명료할 경우 비재호흡 마스크(☞ Ⓕ ② ①)를 이용해 분당 15 L 속도의 고농도 산소를 투여한다. - 의식이'V'이하로 저하되고 호흡이 10회 미만이면 백밸브마스크로 환기를 보조한다. - 의식이 'U'인 경우 입인두기도기 등을 삽입하고 백밸브마스크로 환기를 유지한다. - 저혈량성, 신경성, 패혈성 쇼크 혈압, 맥박수, 의식 등이 정상 범위로 회복될 때까지 5분에서 10분마다 300mL(소아는 5mL/kg)의 생리식염수나 젖산 링거액을 투여하고 혈압, 맥박수, 의식 등이 정상 범위로 회복되는지 확인한다 - 저혈압일 경우 환자의 다리를 상승시키고, 호흡곤란인 경우는 머리를 상승시키는 등 적절한 환자의 자세를 취한다.		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	다음 중 두부손상 환자의 응급처치로 틀린 것은?		
	①	두개골골절의 징후(너구리눈, 귀 뒷부분의 반상출혈)로 코나 귀에서 혈액이나 뇌척수액이 흐를 경우 막아준다.	
	②	뇌탈출의 징후(호흡이상, 동공반사 이상, 제뇌경직 등)가 보일 경우 머리를 30도 정도 높이는 두부거상체위를 적용하고 산소포화도가 94~98%를 유지하도록 산소를 공급한다.	
	③	모든 중증 두부손상환자는 경추보호대를 착용한다.	
	④	생명을 위협하는 외부출혈이 확인되면 멸균된 소독거즈로 압박하여 지혈한다.	
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 331		
문제해설	❖ (해설) 두개골 골절의 징후 (너구리눈, 귀 뒷부분의 반상출혈)로 코나 귀에서 혈액이나 뇌척수액이 흐를 경우 막지말고 닦아준다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	비 외상성 쇼크의 임상적 특징으로 틀린 것은?		
	① 호흡: 빠르고 얕은 호흡을 하고 더욱 진행할 경우 호흡수는 감소한다.		
	② 맥박: 빠르고 약한 맥박이 발생한다.(단, 신경성쇼크에서는 서맥이 발생할 수 있음)		
	③ 피부: 혈관이 팽창하면서 피부가 창백하고 차가워지며, 더욱 진행할 경우 땀이 나게 된다.		
	④ 의식변화: 쇼크로 인해 가장 먼저 뇌가 영향을 받아 안전부절, 불안감을 유발할 수 있다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 213		
문제해설	❖ (해설) 피부 : 혈관이 수축하면서 피부가 창백하고 차가워지며, 더욱 진행할 경우 땀이 나게 된다.		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	뇌졸중의 일반적인 증상의 특징으로 틀린 것은?		
	① 주된 증상은 두통, 어지러움, 편마비, 언어장애, 보행 장애, 의식장애 등이다.		
	② 일과성 허혈 발작은 일시적인 국소 허혈에 의해 발생한다.		
	③ 가역적이고 일시적이나 반복되는 양상을 보이는 경우에 뇌경색의 선행 증상이 될 수 있다.		
	④ 일반적으로 편측 대뇌의 병변으로 생긴 뇌졸중은 의식저하와 혼수를 일으킨다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 249		
문제해설	❖ (해설) 일반적으로 편측 대뇌의 병변으로는 의식저하와 혼수를 일으키지 않음.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	다음 흉통 환자 중 니트로글리세린을 투여할 수 있는 경우는?		
	① 수축기 혈압이 100mmHg		
	② 분당 50회 미만의 서맥 환자		
	③ 심부전이 없는 상태에서의 빈맥(>100/분)		
	④ 최근 24시간 이내 비아그라, 레비트라 등을 복용한 경우		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 531		
문제해설	❖ (해설) 금기증1,2 ◦ nitroglycerin에 대한 과민반응을 보이는 환자, 알레르기 증상이 있는 환자 ◦ 녹내장 환자, 머리외상이나 뇌출혈, 중증 빈혈이 있는 환자 ◦ 저혈압(수축기 혈압이 90 mmHg 이하)의 환자 ◦ 분당 50회 미만의 서맥(느린맥) 심부전이 없는 상태에서의 빈맥(빠른맥)(>100회/분) 환자 ◦ 최근 24시간 이내 비아그라, 레비트라 등을 복용하거나, 48시간 이내 시알리스를 복용한 환자 ◦ 설하정 투여 전과 투여 후 혈압을 측정하여 수축기 혈압이 20 mmHg 이상 감소한 경우 추가 투여를 금한다. ◦ 우심실경색 의심환자(따라서 하벽경색 있는 경우 사용에 주의하고 우측 심전도 검사 권장)		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	다음 중 경련성 질환의 정의 중 다른 것은?		
	①	경련: 뇌신경 세포의 비정상적이며 과도한 전기활동에 의해 유발되는 일시적인 신경학적 이상 증상 및 징후가 일어나는 상태	
	②	뇌전증(간질): 만성적인 기저 병변으로 인해 반복적인 경련을 보이는 상태	
	③	뇌전증 지속상태(간질 지속상태): 경련이 3분 이상 지속되는 상태	
	④	뇌전증 지속상태(간질 지속상태): 의식의 회복됨이 없이 발작이 반복되는 상태	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 255		
문제해설	❖ (해설) 뇌전증 지속상태는 경련이 5~10분 이상 지속되는 상태		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	화상 환자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	①	화상이 발생한 원인에 따라 열화상, 전기화상, 화학화상, 및 방사선화상 등으로 분류 할 수 있다.	
	②	조직 손상과 피부 반응의 깊이를 기준으로 1도, 2도, 3도 화상으로 구분한다.	
	③	2도 화상의 손상정도는 표피전층 및 진피일부이며 통증이 심하며 수포가 발생한다.	
	④	3도 화상 시 피부색은 갈색 또는 붉은색(마른가죽느낌)으로 변하며 통증이 매우 심하다.	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 363		
문제해설			

1 화상

화상 환자의 구조와 응급처치는 매우 위험할 수 있기 때문에, 현장의 안전을 확보하는 것이 가장 중요하다. 화상이 발생한 원인에 따라 열화상, 전기화상, 화학화상, 및 방사선화상 등으로 분류할 수 있다. 조직 손상과 피부 반응의 깊이를 기준으로 **1도(표재성) 화상, 2도(부분층) 화상, 3도(전층) 화상**으로 구분한다.

1. 임상적 특징
- 피부의 기능 소실
- 외부 세계에 대한 기계적 방어 및미생물 침투 차단
- 체내 수분 소실 방지와 감각기관 및 체온조절의 역할
- 화상의 깊이(분류)

	1도 화상	2도 화상	3도 화상
손상정도	표피	표피전층+ 진피일부	진피전층+ 피하조직 대부분
피부색	붉은색	붉은색	갈색 또는 흰색 (마른가죽느낌)
증상	통증○/수포×	통증○/수포○	통증×/수포×
치유기간	1주내 회복	2주내 회복	피부이식 필요

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	24개월 된 10kg의 영아 심정지 신고를 받고 출동하여 제세동기 분석을 한 결과 심실세동으로 1회 제세동을 시행하였고 현장에서 2분간 가슴압박을 시행하였다. 그 후 리듬 분석을 하니 계속 심실세동 이였을 때 2번째 제세동 용량으로 맞는 것은?		
	① 10J		
	② 20J		
	③ 30J		
	④ 40J		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 303		
문제해설	❖ (해설) 제세동 - 처음 2J/kg, 이후 4J/kg 이상(최대 10J/kg 또는 성인 최대용량 이하)		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	서맥의 임상학적 특징과 응급처치에 대한 지침내용이 아닌 것은?		
	①	증상에는 의식변화, 저혈압, 흉통, 호흡곤란, 실신, 울혈성 심부전과 발한, 구역 구토 등 쇼크를 시사 하 는 징후들이 있다.	
	②	서맥을 일으킬 수 있는 원인들은 교감 신경계 항진, 심장 전기 전도계 이상, 약물중독, 방실 접합부 허혈 또는 경색 등이 있다.	
	③	산소투여는 산소포화도가 94%미만일 경우 비강캐뉼러로 1~5L/min 또는 안면마스크로 6~10L/min의 산소를 투여하여 산소포화도를 95% 이상 유지한다.	
	④	심전도 상 서맥이지만, 환자반응이 없고 맥박이 동반되지 않은 경우는 무맥성 전기 활동으로 간주하고 심정지 항목 표준지침에 따라 처치한다.	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 230 ~ 231		
문제해설	1. 임상적 특징 • 서맥(느린맥)으로 인해 나타날 수 있는 심각한 증상에는 의식변화, 저혈압, 흉통, 호흡곤란, 실신, 울혈성 심부전과 발한, 구역/구토 등 쇼크를 시사하는 징후들이 있다. • 서맥(느린맥)을 일으킬 수 있는 원인들 - 부교감 신경계 항진 - 심장 전기 전도계 이상 - 약물 중독 - 방실 접합부 허혈 또는 경색		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	경련에 대한 설명으로 틀린 것은?		
	①	경련은 중추신경계 뇌신경 세포의 비정상적이며 과도한 전기활동에 의해 유발되는 일시적인 신경학적 이상 증상이다.	
	②	뇌전증은 급성적인 기저 병변으로 인해 반복적인 경련을 보이는 상태이다.	
	③	뇌전증 지속상태는 경련이 5~10분 이상 지속되는 상태이다.	
	④	뇌전증 지속상태는 의식의 회복됨없이 발작이 반복되는 상태를 말한다.	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 255		
문제해설	❖ (해설) 뇌전증 지속상태는 경련이 5~10분 이상 지속되거나 또는 의식의 회복됨이 없이 발작이 반복되는 상태		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	호흡곤란 환자평가 중 병력청취 OPQRST 내용이 옳지 않은 것은?		
	①	Onset: 호흡곤란이 시작되었을 때 무엇을 하고 있었는지 호흡곤란이 언제 시작 되었는지, 갑자기 시작되었는지, 서서히 악화되었는지 물어본다.	
	②	Provocation: 어디에 증상이 있는지, 다른 곳으로 퍼지는지 물어본다.	
	③	Quality: 숨을 들이쉴 때와 내쉴 때 언제 더 숨이 찬지 흉통 등의 동반된 증상은 어떠한지 동반되는 증상이 있는지 물어본다.	
	④	Severity: 호흡곤란이 어느정도 심한지, 이전에도 이렇게 심했는지의 정도를 물어본다.	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 219~220		
문제해설	❖ (해설) Provocation : 무엇이 호흡곤란을 유발시켰는지, 어떻게 하면 호흡곤란이 완화되는지, 어떤 자세에서 호흡곤란이 심해지는지 물어본다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	다음 중 소아 심정지의 임상적 특징으로 옳지 않은 것은?		
	① 소아 심정지는 성인과 달리 질식성 심정지보다 심인성 심정지 비율이 높다.		
	② 소아 심정지는 만1세 이상~만8세 미만의 소아에서 발생하는 심정지를 의미한다.		
	③ 초기리듬에서 제세동이 필요한 심실세동이나 심실빈맥인 경우는 약 5% 정도이다.		
	④ 심폐소생술 도중 약 25% 정도에서 제세동이 필요한 리듬이 나타날 수 있다.		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 301		
문제해설	❖ (해설) 영아/소아 심정지는 성인과 달리 호흡 부전이나 쇼크에 의한 질식성 심정지 비율이 높다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	복부관통상 환자에 대한 응급처치로 잘못된 것은?		
	①	산소포화도가 94% 미만일 경우 비강캐뉼러로 1~5L/min 또는 안면마스크로 6~10L/min의 산소를 투여한다.	
	②	내부 장기가 복부 밖으로 노출된 경우 생리식염수로 적신 거즈로 노출된 장기를 덮어서 건조를 막고 두터운 드레싱으로 압력을 가한다.	
	③	환자의 의식이 P 이하인 경우 입인두기도기를 삽입한다.	
	④	이물질이 박혀있는 것이 확인되면 현장에서 제거하지 말고 두터운 패드나 타월 뭉치를 이용하여 신체에 고정하여 이송한다.	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 343		
문제해설	❖ (해설) 내부 장기가 복부 밖으로 노출된 경우 정복을 시도하지 말고 생리식염수로 적신 거즈로 노출된 장기를 덮어서 건조를 막고, 두터운 드레싱을 하되 압력을 가하지 않는다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	지속적양압환기(CPAP)의 적응증으로 옳은 것은?		
	① 호흡정지, 심정지 환자		
	② 의식이 없고 기관삽관이 필요한 환자		
	③ 기흉(공기가슴증)이 의심되는 환자		
	④ 만성폐쇄성폐질환, 폐부종 환자		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 482		
문제해설	❖ (해설) 심부전/폐부종, 만성 폐쇄성 폐질환, 급성 호흡부전		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	니트로글리세린 설하정 투여에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	① 심장의 전부하를 낮춤으로써 심장의 산소소비량을 줄여주며 심장의 후부하도 어느정도 감소시킨다.		
	② 협심증의 치료, 울혈성심부전 환자에게 투여해도 된다.		
	③ 투여 전과 투여 후 혈압을 측정하여 수축기 혈압이 10mmHg이상 감소한 경우 추가 투여를 금한다.		
	④ 우심실경색 의심환자 금기한다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 531		
문제해설	❖ (해설) 투여 전과 투여 후 혈압을 측정하여 수축기 혈압이 20mmHg이상 감소한 경우 추가 투여를 금한다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	소아 경련 응급처치 절차 및 방법으로 틀린 것은?		
	① 토사물의 기도 흡인 방지를 위해 머리를 한 쪽으로 돌려준다.		
	② 닫힌 입을 벌리기 위해 억지로 손을 넣거나 입인두기도기를 삽입하지 않는다.		
	③ 산소투여에도 산소포화도<90%이면서 청색증 등 호흡곤란 징후가 관찰되면 BVM(백밸브마스크)으로 양압환기 호흡보조를 해준다		
	④ 경련이 지속되면 산소를 2L/min를 환자의 코에 대 준다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 313		
문제해설	❖ (해설) 경련이 지속되면 산소를 10L/min를 환자의 입 주위에 대 준다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	흉부손상시 응급처치 절차 및 방법 중 틀린 것은?		
	①	개방성 기흉(공기가슴증)이 있는 경우 즉시 삼면 밀봉 드레싱을 한다.	
	②	환자의 의식이 P 이하인 경우 입인두기도기(oral airway)를 삽입하여 기도를 유지하고 환자가 구역반사를 보일 경우에는 이를 제거하고 비인두 기도유지기를 삽입하여 기도를 유지한다.	
	③	기도 유지시 두개골 기저부 골절이 의심되는 상황인 경우 코인두 기도기를 삽입하고 도수조작(두부후굴하악거상법)을 시행한다.	
	④	동요가슴(호흡시 모순운동)이 보이면 앙와위(바로누움자세)를 유지하면서 두꺼운 패드 및 붕대 등으로 압박・고정한다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 339		
문제해설	❖ (해설) 두개골 기저부 골절이 의심되는 상황인 경우 코인두 기도기를 삽입하지 않고 도수조작만 시행한다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	다음 중 소아 기도 이물 환자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	① 의식이 있는 기도이물 환자에서는 마질 겸자를 이용한 제거술을 해서는 안 된다.		
	② 쌕쌕거리는 천명음은 하기도 폐쇄를 의미한다.		
	③ 기침을 못하고 목소리가 나오지 않을 시 완전 폐쇄를 의미한다.		
	④ 상기도 폐쇄는 흡기 시 천명음이 관찰된다.		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 306~307		
문제해설	❖ (해설) 의식이 있는 환자에서 기도 이물 제거술을 2회 시행해도 기도 이물이 제거되지 않는 경우, 마질 겸자를 이용한 제거술을 시도한다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	복부 및 골반 손상의 임상적 특징이 아닌 것은?		
	①	복부 둔상은 복부에 직접 압력이 전해져서 고형장기나 유강장기가 손상되어 출혈과 복막염을 유발할 수 있다.	
	②	복부 유강장기의 파열이나 장기손상에 의한 복강내 출혈은 쉽게 알 수 없다.	
	③	복강(배안) 내 많은 양의 피가 고여 있어도 외형적인 변화가 없을 수 있으며 복막자극 증상이 나타나지 않을 수 있다.	
	④	골반 뼈의 골절은 수직력과 전후 압박력에 의해 발생하며 쇼크를 일으킬 정도에 출혈이 동반되지는 않는다.	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 342		
문제해설	❖ (해설) 골반 뼈의 골절은 수직력과 전후 압박력에 의해 발생할 수 있으며, 골반 뼈 골절에 의해 골반강 내 장기의 손상과 쇼크를 일으킬 정도의 출혈이 동반될 수 있다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	다발성 또는 중증외상환자 신체검사 소견에 따른 기준으로 틀린 것은?		
	① 대퇴부 자상		
	② 한 개 이상의 근위부 긴뼈 골절		
	③ 손목,발목 상부의 절단		
	④ 마비		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 321		
문제해설	❖ (해설) 두개 이상의 근위부 긴뼈 골절		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	다음 급성 뇌졸중의증 환자의 설명 중 틀린 내용은?		
	① 수축기혈압이 90mmHg 이상인 경우 15~30도 상체를 올려 준다.		
	② 수축기 혈압이 90mmHg 미만 시 환자는 평평히 눕힌 자세를 취해 준다.		
	③ 지주막하 출혈에서 치명적인 부정맥이 발생할 수 있으므로 심전도 감시를 한다.		
	④ 병원 전 뇌졸중 선별검사를 실시하고, 현장에서 10분 이상 지체하지 않는다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 251~252		
문제해설	❖ (해설) 수축기혈압이 90mmHg 미만인 경우에는 변형트렌델렌버그 자세를 취해준다.		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	일산화탄소(CO) 중독에 관한 사항 중 옳지 않은 것은?		
	① 두통, 시력감소, 구토, 호흡곤란 및 빈호흡 등이 발생한다.		
	② 고유량의 산소투여는 위험하므로 피하도록 한다.		
	③ 부정맥, 흉통, 실신 등이 발생 할 수 있다.		
	④ 심각한 중독의 경우에는 혼수상태를 나타낼 수 있다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 388		
문제해설	❖ (해설) 고유량의 산소 투여가 필요하며, 필요시 고압산소 치료를 시행할 수 있다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	다음 중 정량적 호기말 이산화탄소 감시 방법에 대해 옳지 않은 것은?		
	① 기관내삽관의 성공을 확인 후, 2번의 환기를 시행한 이후 장착 준비를 한다.		
	② 환자의 호기에 따라 호기말이산화탄소 측정치나 그래프가 적절하게 나타나는지 확인한다.		
	③ 측정기 결과에 대한 결론이 확실하지 않고 기관내 삽관 위치의 적절성을 확신할 수 없다면 기관내 삽관을 제거한 후 백밸브 마스크 환기를 재개한다.		
	④ 기관삽관 전 탄산음료를 섭취하였거나 과도한 환기에 의한 위팽만이 있는 경우 식도에 기관튜브가 자리잡았을때도 이산화탄소가 측정이 될 수 있다.		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 515		
문제해설	**6. 정량적 호기말 이산화탄소 감시 방법** • '기관내 삽관술'에 준하여 기관내 삽관을 적절하게 시행한다. • 기관내 삽관의 성공을 임상적으로 확인하고, 적절한 호흡용량으로 **6번의 환기를 시행한 이후** capnometry 또는 capnography를 장착할 준비를 한다. • 환자 호기에 따라 호기말 이산화탄소 측정치나 그래프가 적절하게 나타나는지 확인한다. • 환자의 혈관류가 적당한 징후를 보이는데 측정치나 그래프의 변화가 적절하지 않을 경우, 적절치 않은 기관내 삽관 또는 삽관튜부의 위치를 고려하고, 기관내 튜브를 제거하고 백밸브마스크 환기를 충분히 재개한 후 재삽관을 시도한다.		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	발열 및 패혈증성 쇼크 환자의 임상적 특징으로 틀린 것은?		
	①	전신성염증반응증후군(SIRS) : 4가지(체온, 맥박수, 호흡수, 백혈구수) 소견중 3가지 이상이 나타나는 경우로서 전신염증, 장기기능저하, 장기부전관 관련된 중증질환 상태를 말한다.	
	②	패혈증(Sepsis): 전신성 염증반응증후군과 혈액 내 감염이 의심되거나 확진된 상태로서 치명적이 될 수 있음.	
	③	중증패혈증(Severe sepsis): 패혈증과 더불어 하나 이상의 주요장기에 순환부전, 기능 부전 등의 증상이 나타나는 경우를 말함	
	④	패혈증성 쇼크: 패혈증과 더불어 수액치료에도 반응하지 않는 저혈압이 지속되는 경우	
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 262		
문제해설	❖ (해설) 전신선염증반응증후군 (SIRS) : 4가지(체온, 맥박수, 호흡수, 백혈구수) 소견중 2가지 이상이 나타나는 경우로서 전신염증, 장기기능저하, 장기부전관 관련된 중증질환 상태를 말한다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	비외상성 쇼크 종류에 따른 특징으로 옳지 않은 것은?		
	①	저혈량성 쇼크: 구토, 설사, 수분섭취 제한, 출혈 등으로 인해 체액이 소실되면서 혈액량이 줄어든 경우 발생한다.	
	②	심장성 쇼크: 심장의 펌프 작용이 약화되면서 발생한다.	
	③	신경성 쇼크: 뇌 또는 척추의 신경 손상으로 인해 혈관이 확장되어 발생한다.	
	④	패혈성 쇼크: 광범위하게 퍼진 감염과 독소로 인해 체액이 혈관 내로 이동되면서 발생한다.	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 213		
문제해설	◦ 쇼크의 종류에 따른 특징 - 저혈량성 쇼크: 구토, 설사, 수분섭취 제한, 출혈 등으로 인해 체액이 소실되면서 혈액량이 줄어든 경우 발생한다. - 심장성 쇼크: 심장의 펌프 작용이 약화되면서 발생한다. - 신경성 쇼크: 뇌 또는 척추의 신경 손상으로 인해 혈관이 확장되어 발생한다. - 패혈성 쇼크: 광범위하게 퍼진 감염과 독소로 인해 체액이 혈관 외로 이동되면서 유발된다. - 아나필락시스 쇼크: 전신적인 알레르기 반응으로 인해 유발된다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	다음 중 환자의 일차 평가 및 처치로 옳지 않은 것은?		
	① 일차평가는 2분 이내에 종결함을 원칙으로 한다.		
	② 의식상태는 GCS(Glascow Coma Scale) 분류법에 따라 측정한다.		
	③ 전체적인 초기평가는 15~30초 동안 전체적인 조사로 즉시 필요한 결정적인 처치를 찾아낸다.		
	④ 호흡소리 중 기포음, 코고는 소리, 천명음 등은 하부기도 폐쇄 문제이다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 441~452		
문제해설	**4. 일차평가 및 처치** 일차평가의 목적은 치명적인 병변이나 손상을 빨리 발견하고 치료하는 것으로서, 동시다발적으로 평가가 이루어져야 하며 발견된 심각한 이상은 발견 즉시 처치한다. 현장에서 별도 처치가 불필요한 경우, 일차평가는 **2분 이내**에 종결함을 원칙으로 한다. - 전체적 초기평가: 15~30초 동안 전체적인 조사로 즉시 필요한 결정적인 처치를 찾아낸다. ☞ Ⓕ ② ① - 대략적 연령, 성별 - 전체적이고 대략적인 의식수준, 호흡기, 순환기의 상황들 - 이를 통해 즉각적인 생명을 위협하는 질병이나 손상을 확인하고 즉시 처치한다. - 의식상태: **AVPU 분류법**에 따라 환자의식 상태를 측정한다. ☞ Ⓕ ② ①		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	다음 중 쇼크 발생시 첫 번째 활력징후의 변화는?		
	① 혈압상승		
	② 산소포화도 감소		
	③ 혈압저하		
	④ 맥박상승		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 213~215		
문제해설	❖ (해설) 쇼크의 첫 번째 활력 징후의 변화는 혈압저하가 아닌 맥박의 상승이다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	다음 중 중독물질의 해독제로 적절하지 않는 것은?		
	① 마약성 진통제(헤로인,옥시코돈,모르핀) – 날록손(Naloxone)		
	② 아세트아미노펜 – 2-PAM(pralidoxime)		
	③ 콜린성 약물(유기인계, 카바메이트계 살충제) - 아트로핀(Atropine)		
	④ 삼환계 항우울제(TCA) - 중탄산나트륨(sodium bicarbonate))		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 387~395		
문제해설	- 아세트아미노펜(타이레놀 등): 초기에는 무증상에서부터 구역, 구토 등을 보이며, 독성 용량(>10 gm/일, 200 mg/kg/일)을 넘은 경우 비가역적인 간 손상을 초래할 수 있다. 해독제로는 N-acetylcysteine을 경구 또는 정맥 투여한다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	포도당주사액(Dextrose) 적응증 및 투여방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	① 성인기준 혈당이 70mg/dl이하이면 저혈당 치료의 적응증이 된다.		
	② 50% 포도당 수액의 경우 경구투여가 가능하다.		
	③ 10세 미만 경구투여시 25g(50ml) 용량으로 한다.		
	④ 10세 미만 정맥투여시 50% 포도당 용액을 5mL/Kg 1회 투여한다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 529~530		
문제해설	❖ (해설) 10세 미만 정맥투여시 10% 포도당 용액을 5mL/Kg 1회 투여한다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	고온 환경 질환 중 열사병의 임상적 특징으로 옳지 않은 것은?		
	① 체온 조절 기능장애로 발생		
	② 심부 체온이 40℃이상 상승		
	③ 땀을 많이 흘리거나 전해질 공급 부족으로 탈수와 전해질 이상 발생		
	④ 불안, 이상행동, 신경질적 반응, 환각, 경련, 운동 실조, 의식소실, 혼수		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 383~386		
문제해설	❖ (해설) 땀을 많이 흘리거나 전해질 공급 부족으로 탈수와 전해질 이상 발생은 열사병이 아닌 열탈진의 증상이다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	외상환자 중증도 평가기준 중 손상기전에 대해 틀리게 설명한 것은?		
	① 추락: 성인 6m, 소아 3m 이상 높이에서 추락		
	② 고위험 교통사고: 차량전복/차체내부 30cm 이상 안으로 밀림		
	③ 고위험 교통사고: 30cm 이상 차체 찌그러짐/자동차에서 튕겨져 나감		
	④ 30km/h 이상 속도의 오토바이 사고		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 111		
문제해설	❖ (해설) 고위험 교통사고: 45cm 이상 차체 찌그러짐/자동차에서 튕겨져 나감		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	비 외상성 쇼크 환자에 대한 설명으로 틀린 것은?		
	①	이송 중 활력징후 측정 등 지속적 환자상태를 감사히고 필요시 심전도를 측정한다.	
	②	현장에서 병원 이송전에 한 개 또는 두 개의 정맥로를 확보할 수 있다.	
	③	모포를 덮어 환자의 적정한 체온을 유지한다.	
	④	쇼크의 첫 번째 활력징후의 변화는 맥박 상승이 아닌 혈압저하이므로 활력징후 측정시 혈압의 변화를 우선적으로 확인한다.	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 211		
문제해설	❖ (해설) 쇼크의 첫 번째 활력징후의 변화는 혈압저하가 아닌 맥박의 상승이므로 활력징후 측정 시 빈백(빠른맥) 여부를 우선으로 확인한다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	호흡곤란 환자에 대한 설명으로 틀린 것은 ?		
	①	만성폐쇄성폐질환 : 흡기와 호기시 저항을 특징으로 하는 만성 기관지염과 가래를 동반하지 않은 기침, 쌕쌕거림, 나음, 호기의 연장을 특징으로 하는 폐기종으로 분류	
	②	만성폐쇄성폐질환 환자 호흡곤란이 심하다면 즉시 고농도 산소를 투여한다.	
	③	심혈관계 기왕력이 있는 환자는 앉는 자세(sitting position)을 취한다.	
	④	심전도 측정기가 있는 경우 3유도 심전도 검사를 시행한다.	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 219~221		
문제해설	❖ (해설) 만성폐쇄성폐질환 환자 호흡곤란이 심하다면 단계적으로 저농도에서 고농도 산소를 투여한다. (비강캐뉼라 → 비재호흡마스크)		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	기관내 삽관 또는 성문상 기도기(I-gel) 삽입의 적응증으로 틀린 것은 ?		
	① GCS 점수 9점 이하		
	② 중증의 호흡곤란 환자		
	③ 입인두기도기를 포함한 백밸브마스크환기가 효과적이지 않는 환자		
	④ 지속적인 의식상태 악화		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 469		
문제해설	❖ (해설) GCS 점수 8점 이하 ※ 그 밖의 경우 : 심정지/호흡정지 환자		
출제위원	소속	직위	성명 / 서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	다음 중 심폐정지 발생시간(추정)으로 잘못 서술한 것은?		
	① 심정지가 발생했을 것으로 추정하는 일시를 기록한다.		
	② 해당 년도는 알지만 월. 일. 시 등을 알 수 없는 경우 발견한 시각을 기록한다.		
	③ 추정시간은 발견자나 이야기를 전해들은 제3자의 발언을 근거로 기록한다.		
	④ 근거가 없을 경우 마지막 목격시간(Last Normal Time)을 조사하여 기록한다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 91		
문제해설	❖ (해설) 해당년도는 알지만 월, 일, 시 등을 알수 없는 경우 미상에 체크		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	현장에서 소생술을 중단할 수 있는 상황으로 옳은 것은?		
	① 30분간 심폐소생술이 시행 되었지만 자발순환회복이 되지 않은 경우		
	② 구급대원이 지쳐서 더 이상 소생술을 지속할 수 없는 경우		
	③ 흉부(심장) 관통상에 의한 심정지		
	④ 외상으로 인한 폐쇄성 두개골 골절		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 52		
문제해설	❖ (해설) 현장에서 소생술을 중단할 수 있는 상황 1. 자발순환이 회복된 경우 2. 구급대원이 지쳐서 더 이상 소생술을 지속할 수 없는 경우 3. 구급대원이 소생술을 지속하기 어려운 환경에 노출되는 경우 4. 소생술을 시작하였지만, 시행 중 '소생술 유보'의 조건이 확인된 경우 5. 직접의료지도를 요청하여 '소생술 중단'의 의료지도를 받은 경우		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	구급활동일지 작성요령 중 환자가 호소하는 증상의 내용이 틀린 것은?		
	① 의식장애: 의식을 잃었으나 곧(수 분 이내에) 정상으로 돌아온 경우		
	② 마비: 상지나 하지 혹은 얼굴 근육의 근력 저하가 나타난 상태		
	③ 화상: 불이나 뜨거운 물, 화학물질 등에 의해 피부 및 조직이 손상된 것		
	④ 객혈: 기침 시 피가 남. 가래에 피가 섞임, 아주 선홍색의 피를 다량 토하면서 호흡곤란이 동반된 경우		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 74~75		
문제해설	❖ (해설) 의식장애 : 호흡, 맥박이 있으나 의식이 비정상으로 변한 상태가 지속되는 것. 단 기존의 의식수준에서 변화가 없는 경우 제외		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	척추 손상을 야기할 수 있는 손상기전으로 다친 환자의 경우 등 척추고정을 반드시 고려해야 하는 경우로 옳은 것은?		
	①	교통사고 환자로 의식이 명료한 상태로(A) 사고당시 기억이 있으며, 우측 발목 통증 호소	
	②	넘어진 환자로 운동 또는 감각에 이상은 없으며 우측 손목 통증 호소	
	③	교통사고 환자로 좌측 무릎 찰과상 확인되며, 의식소실, 의식변화 등 기타 증상/징후 확인 되지 않음	
	④	사고기억을 못하며, 혼돈이 있어 대화 내용이 부적절하고 지시에 따르기 어려운 상태	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 500		
문제해설	❖ (해설) ◦ 다음의 기준에서 하나라도 "예" 라면 척추 고정이 필요하다. □ 의식 소실을 포함한 의식변화 □ 고 위험 손상 기전으로 발생한 경우 □ 고속 충돌 사고 □ 환자 위를 지나가는 사고에 의한 손상 □ 1 m 이상 또는 5계단 이상 높이에서의 낙상 □ 다이빙 등의 척추나 척수에 작용하는 힘을 동반한 손상 □ 자전거 또는 오토바이 사고에 의한 손상 □ 중독 가능성이 있는 경우 □ 척추의 가운데 통증을 호소하거나 압통이 있는 경우 □ 신경학적 결손 증상 동반: 운동 또는 감각이상		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	119현장응급처치 표준지침의 응급처치 및 이송거부에서 말하는 환자의 권리가 아닌 것은?		
	①	환자가 만 18세 이상의 성인이며 적절한 판단력을 행사할 수 있는 건전한 정신상태라면 응급처치 및 이송을 거부할 수 있는 권리가 있다.	
	②	환자가 미성년자이거나 적절한 판단력을 행사할 수 없는 경우에는 법적인 대리인(부모 또는 가족)이 판단을 대신할 수 있다.	
	③	개인의 자율적 권리보다 공공의 이익이 우선하는 자해 또는 자살의 위험이 있는 환자는 제외한다.	
	④	개인의 자율적 권리보다 공공의 이익이 우선하는 전염성 질병이 있거나, 타인에게 해를 가할 위험이 있는 환자는 제외한다.	
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 41		
문제해설	❖ (해설) 환자가 만 19세 이상의 성인이며 적절한 판단력을 행사할 수 있는 건전한 정신 상태라면 응급처치 및 이송을 거부할 수 있는 권리가 있다. (적절한 판단력이란 자신의 결정으로 인해 발생하는 결과를 바르게 이해할 수 있는 능력이다)		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	과호흡 환자에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오?		
	①	과도하게 빨라진 호흡에 의해 환기가 증가하면서 혈중 이산화탄소 분압이 감소하게 되어 나타난다.	
	②	서서히 악화되는 호흡곤란, 공포감, 일시적 감각마비, 수족 경련 등의 증상을 호소한다.	
	③	병원에 도착할 때가지 숨을 천천히 쉬도록 환자를 안정시켜 준다.	
	④	비닐봉투나 종이봉투를 이용한 재호흡요법을 적용한다.	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 224		
문제해설	❖ (해설) 비닐봉투나 종이봉투를 이용한 재호흡요법은 이산화탄소 증가보다는 혈중 산소분압의 감소가 더 심하게 나타나므로 사용하지 않는다		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	갑작스러운 충격이나 운동으로 근막이나 인대가 상하거나 타박상으로 피하 조직이나 장기가 상한 상태를 나타내는 것은?		
	① 개방성 골절		
	② 탈구		
	③ 염좌		
	④ 폐쇄성 골절		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 74		
문제해설	❖ (해설) 염좌(삠): 갑작스러운 충격이나 운동으로 근막이나 인대가 상하거나 타박상으로 피하 조직이나 장기가 상한 상태		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	절단된 조직의 처치로 틀린 것은?		
	① 절단부의 상처는 일반적인 상처의 처치에 따른다.		
	② 절단조직은 마른 소독거즈로 감싼다.		
	③ 절단조직을 넣은 밀폐용기는 얼음물에 담그거나, 얼음주머니로 감싼다.		
	④ 조직이 얼음에 직접 닿지 않도록 주의한다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 505		
문제해설	❖ (해설) 절단조직을 생리식염수를 적신 후 꼭 짠 거즈로 감싼다.(물이 흥건한 거즈를 사용해서는 안된다.)		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	저체온증 환자의 임상적 특징으로 옳지 않은 것은?		
	①	떨림이 감소하고, 기면, 혼미 섬망 등이 나타난 것은 30~34℃의 중등도 체온이다.	
	②	반사가 저하되고, 신체 기능의 저하로 호흡수, 혈압, 맥박수가 감소한 것은 34℃ 이상의 경증의 저체온증 상태이다.	
	③	추위를 느끼고, 떨림이 나타나며 운동 실조 증상이 나타나는 상태는 34℃ 이상의 경증의 저체온증 상태이다.	
	④	떨림이 사라지고, 혼수가 나타나며 부정맥의 위험성이 증가하는 상태는 30℃ 이하의 중증의 저체온증 상태이다.	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 378		
문제해설	❖ (해설) 30~34℃ 는 중증도 저체온증 상태이다. - 떨림이 감소한다. - 기면, 혼미, 섬망 등의 증상이 나타난다. - 반사가 저하된다. - 신체 기능의 저하로 호흡수, 혈압, 맥박수가 감소한다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	중독환자의 응급처치 시 주의사항으로 옳지 않은 것은?		
	① 환자의 의복이 독성물질에 오염되어 있을 시 모두 제거 한다.		
	② 환자가 구역반사를 보일 경우 코인두기도유지기를 삽입하여 기도를 유지한다.		
	③ 산소포화도가 94% 미만일 경우 비강캐뉼러 또는 안면마스크로 산소를 투여한다.		
	④ 파라쿼트(제초제) 중독 모든 환자에게 산소를 투여한다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 391		
문제해설	❖ (해설) 파라쿼트(제초제) 중독에서 중증 호흡부전이 생기지 않는 한, 산소를 부여하지 않는다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	외상처치 일반적인 부목 고정 방법 중 옳지 않은 것은?		
	①	중증 환자로 즉시 이송을 해야하는 경우를 제외하고는 손상 부위의 부목 고정 후에 환자를 이동하도록 한다.	
	②	모든 상처는 부목을 대기 전에 소독된 거즈로 덮어 준다.	
	③	부목고정 전, 후에 손상부위 원위부의 순환(pulse), 운동(motor) ,감각(sensory) 상태를 평가한다.	
	④	골절이 확실하다 판단되면 골절부위 피복을 제거하여 확인하지 않고 부목고정을 한다.	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 507		
문제해설	❖ (해설) 골절 및 외상 부위의 피복 및 신발을 제거하여 상처 부위 및 정도, 변형, 부종 등을 관찰한다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	뱀에 의한 교상 시 응급처치로 옳지 않은 것은?		
	① 뱀에 물렸을 경우 습식 드레싱 후 부목을 이용해 움직임을 최소화 한다.		
	② 물린 부위 위로 탄력붕대를 감은 후 말단부위 맥박 및 모세혈관 재충혈을 확인한다.		
	③ 독사에 물렸을 때에는 상처를 심장보다 낮게 위치하며, 주변 환경을 조용하게 유지하고, 환자의 움직임을 최소화 하도록 한다.		
	④ 혈압, 맥박, 호흡, 산소포화도를 지속적으로 감시한다.		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 398		
문제해설	❖ (해설) 뱀에 물렸을 경우 물린 부위를 건조드레싱 후 부목을 이용해서 움직임을 최소화한다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	탈구된 치아의 처치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	① 치아의 뿌리를 씻고 소독하여 치과진료가 가능한 병원으로 이송한다.		
	② 이송 중에는 치아를 우유 또는 생리식염수에 넣어 이송한다.		
	③ 구강 내 출혈을 제거해 호흡에 지장이 없도록 한다.		
	④ 출혈이 심한 연조직 손상은 거즈를 이용하여 압박 드레싱을 적용한다.		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 358		
문제해설	❖ (해설) 치아의 뿌리를 만지거나 씻어내지 않는다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	두부손상의 임상적 특징으로 볼 수 없는 것은?		
	①	육안적으로 확인 가능한 두피 출혈이 있어야 두개골 골절이나 뇌출혈 발생을 알 수 있다.	
	②	두피 손상의 경우 대부분 쉽게 회복되나 외부로의 심한 출혈이 있을 수 있으므로 주의를 요한다.	
	③	환자의 의식저하가 없는 경증 두부외상은 일반적으로 가벼운 외상을 말하지만 지연성 출혈 등으로 인해 뒤늦게 증상이 나타나는 경우가 있어 지속적인 모니터링이 필요하다.	
	④	두부손상이란 외력에 의해 일어나는 머리 부분의 손상을 말한다.	
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 330		
문제해설	❖ (해설) 육안적으로 확인 가능한 두피 출혈이 없어도, 두개골 골절이나 뇌출혈이 생길 수 있다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	환자가 응급처치나 이송을 거부하는 경우 따르는 지침에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?		
	①	혈압, 맥박수, 호흡수, 산소포화도 등 생체징후가 불안정한 환자인 경우 의료지도를 요청한다.	
	②	가능한 단순명료한 말로 환자에게 이송 및 처치 거부로 발생할 수 있는 잠재적위험에 대해 설명하며, 필요한 경우 의료지도를 요청한다.	
	③	이송거절, 거부확인서의 서명을 거부하는 경우 구급거부확인서에 표시하는 방법밖에 없다.	
	④	환자가 정확히 이해하고 있는지를 확인하기 위해, 구급대원이 설명한 내용을 환자 스스로의 말로 다시 표현해보도록 한다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 42		
문제해설	❖ (해설) 구급거절, 거부확인서의 서명을 거부하는 경우, 목격자에게 받을 수 있으며, 이 또한 불가능 한 경우 구두로 2회에 걸쳐 서명거부를 확인한 후 구급 거부확인서에 표시하고, 필요시 녹음(녹화)하여 기록을 남긴다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	비뇨생식기 손상에 대한 설명으로 틀린 것은?		
	① 외력에 의하여 발생하는 신장과 방광, 생식기의 손상을 말한다.		
	② 남성 외생식기의 완전 절단 시에는 플라스틱 통이나 비닐주머니에 절단물을 넣고 냉장용기에 보관하여 운반한다.		
	③ 생식기 손상 환자에서 성폭행 등의 가능성이 없는지 주의한다.		
	④ 동반손상보다 단독손상이 흔하므로 그에 대한 처치를 우선한다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 347		
문제해설	❖ (해설) 단독손상 보다는 동반손상이 흔하므로 그에 대한 처치를 우선한다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	안과적 손상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	① 외력에 의하여 발생하는 안구와 눈꺼풀, 안와골의 손상을 말한다.		
	② 안통, 이물감, 시야장애 및 복시 등의 증상을 호소할 수 있다.		
	③ 두부손상을 동반할 수 있다.		
	④ 한 부위가 손상되어 안대의 적용이 필요하다면 한 측에만 시행한다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 355~356		
문제해설	❖ (해설) 안대의 적용이 가능하다면 양측에 시행한다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	다음 중 뱀에 물렸을 경우 응급처치로 틀린 것은?		
	① 물린 부위는 부목을 이용하여 움직임을 최소화한다.		
	② 멸균증류수 또는 식염수를 이용하여 상처를 세척한다.		
	③ 얼음팩을 적용한다.		
	④ 상처를 심장보다 낮게 위치하며, 산소를 공급하며 이송한다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 397~398		
문제해설	❖ (해설) 독사에 물렸을 경우에는 얼음 팩을 적용하지 않는다. (독소를 비활성화 시키지 못할 뿐 아니라, 동상의 위험성에 의한 조직 괴사의 위험성이 높아지기 때문이다.)		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	다음 중 응급의료법 시행규칙에서 정하는 응급증상에 해당하지 않는 것은?		
	① 신경학적 응급증상: 의식장애, 현훈		
	② 알러지: 얼굴 부종을 동반한 알러지 반응		
	③ 출혈: 계속되는 각혈, 지혈이 안되는 출혈, 급성 위장관 출혈		
	④ 소아과적 응급증상: 소아경련성 장애		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 45		
문제해설	❖ (해설) 신경학적 응급증상은 응급증상에 준하는 증상이다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	다음 중 현장에서 소생술을 중단할 수 있는 상황이 아닌 것은?		
	① 구급대원이 지쳐서 더 이상 소생술을 지속할 수 없는 경우		
	② 구급대원이 소생술을 지속하기 어려운 환경에 노출되는 경우		
	③ 직접의료지도를 요청하여 '소생술 중단'의 의료지도를 받은 경우		
	④ 소생술을 시행했지만, 시행 중 '소생술 유보'의 조건이 확인되지 않는 경우		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 52		
문제해설	❖ (해설) 소생술을 시행했지만, 시행 중 '소생술 유보'의 조건이 확인된 경우		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	행동 이상 환자에 대한 응급처치 절차 및 방법 중 바르지 않은 것은?		
	① 기본처치는 환자 안정화, 현장안전확보, 환자임상평가 순으로 진행한다.		
	② 구급대원이 접근하기 위험한 현장 환경에 행동 이상 환자가 있거나 무기 등의 위험한 물건을 소지하고 있거나 난폭한 행동을 하는 경우에는 경찰에 통보하고 협조를 요청한다.		
	③ 현장 안전이 확보되면 행동 이상 환자를 안정화 시켜야 한다. 초기 안정화 시에는 일차적으로 구두로 환자를 진정시켜서 안정하도록 하고 응급처치에 순응하도록 협력 관계를 구축한다.		
	④ 환자 임상 평가 후에 동반된 손상이나 중독에 대해서 평가한다.		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 P. 269~279		
문제해설	**- 기본처치: 현장 안전 확보, 환자 안정화, 환자 임상 평가** - 기본처치는 **현장 안전 확보, 환자 안정화, 환자 임상평가** 순으로 진행된다. - 행동 이상 환자에 대한 응급 처치는 일차적으로 현장 안전을 확보한 후에 수행한다. 현장 안전 확보 이전까지 구급대원은 환자와 일정 거리를 유지한다. ☞ Ⓕ ② ① - 구급대원이 접근하기에 위험한 현장 환경에 행동 이상 환자가 있거나 무기 등의 위험한 물건을 소지하고 있거나 난폭한 행동을 하는 경우에는 **경찰에 통보**하고 협조를 요청하여 현장 안전이 확보된 후에 응급처치를 수행한다. ☞ Ⓕ ② ① - 현장 안전이 확보되면, 행동 이상 환자를 안정화시켜야 한다. 초기 안정화 시에는 일차적으로 구두로 환자를 진정시켜서 안정하도록 하고 응급 처치에 순응하도록 협력 관계를 구축한다. ☞ Ⓕ ② ① - 환자가 안정화되면, 생체 징후를 측정하고 말초 혈액의 혈당을 검사 한다. ☞ ② ① - 저혈당이 확인되면 정맥 주사를 확보하고 **50% 포도당 용액 50 mL**를 주사한다. ☞ ① - 환자 임상 평가 후에 동반된 손상이나 중독에 대해서 평가한다. 손상에 대한 응급 처치를 수행하고, 중독 환자의 경우에는 복용한 물질의 종류와 양, 복용 시간을 확인해야 한다. ☞ Ⓕ ② ①		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	응급처치나 이송을 거부하는 경우에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?		
	①	환자가 만19세 이상의 성인이며 적절한 판단력을 행사할 수 있는 건전한 정신상태라면 응급처치 및 이송을 거부할 수 있는 권리가 있다.	
	②	구급대원은 환자 또는 보호자가 응급처치 및 이송을 거부하더라도 반드시 이송을 하여야 한다.	
	③	구급대원은 구급거절, 거부확인서를 작성하며 그 내용을 이송을 거부한 환자 또는 보호자에게 알려주고 서명을 받는다.	
	④	구급거절, 거부확인서의 서명을 거부하는 경우 목격자에게 받을 수 있다.	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 41~43		
문제해설	► 혈압, 맥박수, 호흡수, 산소포화도 등 생체징후가 불안정한 환자인 경우 의료지도를 요청한다. ► 공공의 안전 등을 위해 필요한 경우 경찰 등 관계 공무원에게 도움을 요청한다. ► 가능한 단순 명료한 말로 환자에게 이송 및 처치 거부로 발생할 수 있는 잠재적 위험에 대해 설명하며, 필요한 경우 의료지도를 요청한다. ► 환자가 정확히 이해하고 있는지를 확인하기 위해, 구급대원이 설명한 내용을 환자 스스로의 말로 다시 표현해 보도록 한다. ► 환자에게 증상이 재발하거나 악화되면 다시 신고하도록 권고하며, 가능한 환자를 적절하게 돌볼 수 있는 보호자에게 인계할 수 있도록 한다. ► 구급대원은 **구급거절, 거부확인서**를 작성하며, 그 내용을 이송을 거부한 환자 또는 보호자에게 알려주고 서명을 받는다. ► 구급거절, 거부확인서의 서명을 거부하는 경우, 목격자에게 받을 수 있으며 이 또한 불가능한 경우 구두로 2회에 걸쳐 서명거부를 확인한 후 구급 거부확인서에 표시하고 필요시 녹음(녹화)하여 기록을 남긴다. ► 구급대원은 '구급 거절·거부 확인서' 및 증빙자료 등을 소속 소방관서에 3년간 보관한다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	아동학대 가능성을 의심할 수 있는 이학적 검진 내용 중 틀린 것은 ?		
	① 멍의 색깔로 수상 시기를 판정한다		
	② 다리미, 젓가락, 난로의 옆면, 격자무늬와 같은 기하학적인 모양의 화상		
	③ 장갑 혹은 양말을 끼운듯한 모양의 화상		
	④ 허벅지 안쪽의 화상		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 415~416		
문제해설	❖ (해설) 멍의 색깔로 수상 시기를 판정할 수 있다는 과학적인 근거는 없음. 다만 아주 오래되어 탈색 중인 멍과 최근 손상으로 붉은 빛이 도는 멍이 섞여 있다면 반복적 구타를 의심 그 밖에 사항 1) 도넛 모양 화상 : 항문을 제외한 나머지 둔부의 화상 2) 의심스러운 열상 화상 3) 대칭적인 상처, 물린 상처 등		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	구급	과목명	119구급대원 현장응급처치 표준지침
문 제	안구손상이 있는 환자의 응급처치 술기로 올바르지 않은 것은 ?		
	① 눈을 움직이면 통증이 있으므로 안대의 적용이 가능하면 양측에 시행한다.		
	② 이물에 의한 처치는 일반적인 상처의 처치에 따른다.		
	③ 환자의 손상된 눈이 위쪽을 향하도록 자세를 취해준다.		
	④ 세척방법은 중력을 이용하여 1~2리터의 생리식염수로 세척하며 약품이 모두 씻겨 나갈때까지 눈을 충분히 세척한다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「119구급대원 현장응급처치 표준지침」P. 512		
문제해설	❖ (해설) 환자의 손상된 눈이 아래쪽을 향하도록 자세를 취해준다.		

출제위원	소속	직위	성명	서명