

§5 общие линейные уравнения гиперболического типа и аналогично

$$\int_M^P (H d\eta - K d\xi) = -(uv)_M + (uv)_P + \int_P^M 2\left(\frac{dv}{ds} - \frac{b-a}{\sqrt{2}}v\right) u ds$$

Отсюда из формулы (6) следует:

$$\begin{aligned} (uv)_M &= \frac{(uv)_P + (uv)_Q}{2} + \int_P^M \left(\frac{dv}{ds} - \frac{b-a}{2\sqrt{2}}v\right) u ds + \int_Q^M \left(\frac{dv}{ds} - \frac{b+a}{2\sqrt{2}}v\right) u ds + \\ &+ \frac{1}{2} \int_P^Q (H d\eta - K d\xi) - \frac{1}{2} \int_{MP} \int_Q (v\varphi[u] - uM[v]) d\xi d\eta. \end{aligned} \quad (8)$$

Эта формула является тождеством, верным для любых достаточно гладких функций  $u$  и  $v$ . Пусть  $u$ -решение поставленной выше задачи с начальными условиями, а функция  $v$  зависит от точки  $M$  как от параметра и удовлетворяет следующим требованиям:

$$M[v] = v_{\xi\xi} - v_{\eta\eta} - (av)\xi - (bu)\eta + cu = 0 \quad \text{внутри} \quad MPQ \quad (9)$$

и

$$\left. \begin{aligned} \frac{dv}{ds} &= \frac{b-a}{2\sqrt{2}}v \quad \text{на характеристике} \quad MP, \\ \frac{dv}{ds} &= \frac{b+a}{2\sqrt{2}}v \quad \text{на характеристике} \quad MQ, \end{aligned} \right\} \quad (9a)$$

$$v(M) = 1.$$

Из условий на характеристиках и последнего условия находим:

$$\begin{aligned} v &= e^{\int_{s_o}^s \frac{b-a}{2\sqrt{2}} ds} \quad \text{на} \quad MP, \\ v &= e^{\int_{s_n}^s \frac{b+a}{2\sqrt{2}} ds} \quad \text{на} \quad MQ, \end{aligned}$$

где  $s_o$  - значение  $s$  в точке  $M$ . Как мы видели в § 4, уравнение (9) и значения функции  $v$  на характеристиках  $MP$  и  $MQ$  полностью определяют ее в области  $MPQ$ . Функцию  $v$  часто называют *Функцией Римана*.

## УРАВНЕНИЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА

Таким образом, формула (8) для функции  $v$ , удовлетворяющей уравнению (7), принимает следующий окончательный вид:

$$v(M) = \frac{(uv)_P + (uv)_Q}{2} + \frac{1}{2} \int_P^Q [v(u_\xi d\eta + u_\eta d\xi) - u(v_\xi d\eta + v_\eta d\xi) + uv(ad\eta - db_\xi)] + \frac{1}{2} \int_{MP} \int_Q v(M, M') f(M') do'_M (do'_M = d\xi d\eta). \quad (10)$$

Эта формула решает поставленную задачу, так как выражения, стоящие под знаком интеграла вдоль  $PQ$ , содержит функции, известные на дуге  $C$ . В самом деле, функция  $v$  была определена выше, а функции

$$\begin{aligned} u|_C &= \phi(x), \\ u_x|_C &= u_s \cos(x, s) + u_n \cos(x, n) = \frac{\phi'(x) - \psi(x)f'(x)}{\sqrt{1 + (f'(x))^2}}, \\ u_y|_C &= u_s \cos(y, s) + u_n \cos(y, n) = \frac{\phi'(x)f'(x) + \psi(x)}{\sqrt{1 + (f'(x))^2}} \end{aligned}$$

вычисляются при помощи начальных данных.

Формула (10) показывает, что если начальные данные известны на дуге  $PQ$ , то они полностью определяют функцию в характеристическом  $PMQ$ , если функция  $f(x, y)$  известна в этой области <sup>1)</sup>.

Формула (10), полученная в предположении существования решения, определяет его через начальные данные и правую часть уравнения (7) и тем самым по существу доказывает единственность решения (ср. с формулой Даламбера, гл. 11, § 2, стр. 51).

Можно показать, что функция  $u$ , определяемая формулой (10), удовлетворяет условиям задачи (7) - (7'). Однако мы на этом доказательстве не останавливаемся.

**3. Физическая интерпретация функция Римана.** Выясним физический смысл функции  $\nu(M, M')$ . Для этого найдем решение неоднородного уравнения

$$\varphi[u] = -2f_1 \quad (f = 2f_1)$$

с нулевыми начальными условиями на кривой  $C$ . Обращаясь к формуле (10), видим, что искомое решение имеет вид

$$u(M) = \int_{MP} \int_Q v(M, M') f_1(M') d\sigma_{M''} \quad (11)$$

---

<sup>1)</sup> Если характеристика пересекает кривую  $C$  в двух точках  $P$  и  $M_1$  (см. рис. 26), то значение  $u(M_1)$  не может задаваться произвольно, а определяется по формуле (10) с начальными данными на дуге  $PQ_1$  и значениями  $f(x, y)$  в  $\Delta PM_1Q_1$ .