

2I003 TD 1 Rappels mathématiques

Exercice 1 – Logique d’automne

On considère la proposition suivante : « A l’automne, s’il a plu pendant la nuit, je vais toujours ramasser des champignons ».

Question 1

Donnez cette proposition sous la forme logique $(a \text{ et } b) \Rightarrow c$.

Question 2

Donnez « en français » la contraposée de cette proposition.

Question 3

Donnez « en français » la contradiction de cette proposition.

Exercice 2 – Logique élémentaire

On considère la propriété P suivante : « Tout élève qui finit son assiette aura un dessert ou un bonbon ». Soit également \mathcal{E} l’ensemble des élèves, et les prédicats suivants pour tout $x \in \mathcal{E}$:

- $a(x) = x$ termine son assiette ;
- $b(x) = x$ a un bonbon ;
- $c(x) = x$ a un dessert.

Question 1

Mettez P sous la forme d’une formule logique. Transformez la pour ne plus avoir que les opérateurs {non, et, ou}. Exprimez la négation et la contraposée sous forme logique et en français.

Question 2

Indiquez parmi les formules suivantes celles qui sont équivalentes :

1. $a(x) \Rightarrow (b(x) \text{ ou } \text{non}(c(x)))$;
2. $\text{non}(b(x)) \Rightarrow (a(x) \text{ et } c(x))$;
3. $c(x) \Rightarrow (a(x) \text{ ou } b(x))$;
4. $\text{non}(b(x)) \Rightarrow (a(x) \text{ ou } \text{non}(c(x)))$;
5. $\text{non}(a(x) \text{ et } c(x)) \Rightarrow b(x)$;
6. $((a(x)) \text{ et } c(x)) \Rightarrow b(x)$.

Exercice 3 – Preuve par contraposée, preuve par l’absurde, réciproque

Question 1

Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. Démontrez par contraposée que, si n^2 est pair, alors n est pair.

2. Quelle est la réciproque ? Est-elle vérifiée ?
3. Quelle est la réciproque de la contraposée ? Est-elle vérifiée ?

Question 2

Démontrez par l'absurde que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Question 3

Soit $n > 0$. Démontrez par l'absurde que si n est le carré d'un entier, alors $2n$ n'est pas le carré d'un entier.

Exercice 4 – Preuve par l'absurde

Question 1

On considère n ensembles E_1, \dots, E_n d'entiers tels que ces ensembles soient distincts deux à deux. Montrez la propriété suivante :

\mathcal{P} = "Au moins l'un des ensembles E_1, \dots, E_n ne contient aucun des $n - 1$ autres ensembles".

Exercice 5 – Suites récurrentes homogènes

Question 1

Calculer les suites récurrentes :

1. $u_n = u_{n-1} + 6u_{n-2}$ si $n \geq 2$, $u_0 = 0$, $u_1 = 1$
2. $u_n = 4u_{n-1} - 4u_{n-2}$ si $n \geq 2$, $u_0 = 1$, $u_1 = 4$
3. $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ si $n \geq 2$, $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ (suite de Fibonacci).
4. $u_n = 5u_{n-1} - 8u_{n-2} + 4u_{n-3}$ si $n \geq 3$, $u_0 = 0$, $u_1 = 1$, $u_2 = 2$.

Exercice 6 – Suites récurrentes non homogènes

Question 1

Calculer les suites récurrentes :

1. $u_n = u_{n-1} + n$ si $n \geq 1$, $u_0 = 0$
2. $u_n = 2u_{n-1} + 1$ si $n \geq 1$, $u_0 = 2$
3. $u_n = 2u_{n-1} + 2^n$ si $n \geq 1$, $u_0 = 3$
4. $u_n = u_{n-1} + 6u_{n-2} + 6$ si $n \geq 2$, $u_0 = 0$, $u_1 = 1$
5. $u_n = 2u_{n-1} + n + 1$ si $n \geq 1$, $u_0 = 0$

Exercice 7 – Bases du dénombrement

Question 1

1. Quel est le nombre d'applications d'un ensemble à p éléments dans un ensemble à n éléments ?
2. Quel est le nombre de bijections d'un ensemble à n éléments dans un ensemble à n éléments ?

3. Quel est le nombre d'injections d'un ensemble à p éléments dans un ensemble à n éléments ?

Exercice 8 – Combinaisons et nombres de parties

Soit E un ensemble à n éléments et A et B deux parties de E telles que $A \cap B = \emptyset$, $|A| = n_1$ et $|B| = n_2$.

Question 1

Soit $p \geq 2$, calculer le nombre de parties de E à p éléments ayant exactement un élément dans A et exactement un élément dans B .

Exercice 9 – Triangle de Pascal

Question 1

Montrer l'égalité du triangle de Pascal : $C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$ pour $1 \leq k \leq n-1$

Exercice 10 – Combinaisons

Question 1

Montrer que : $C_n^q C_{n-q}^{p-q} = C_n^p C_p^q$ pour $0 \leq q \leq p \leq n$

Question 2

Calculer : $\sum_{q=0}^p (-1)^q C_n^q C_{n-q}^{p-q}$ pour $0 \leq p \leq n$

Exercice 11 – Récurrence faible

Question 1

Montrer par récurrence sur n que :

$$1. \sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$2. \sum_{i=0}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Exercice 12 – Exponentielle et récurrence faible

Question 1

Démontrez par récurrence faible que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $2^{n-1} \leq n! \leq n^n$.

Question 2

Soit maintenant la propriété $\mathcal{P}(n) : 2^n > n^2$.

1. Montrez que, pour tout $n \geq 3$, $\mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(n+1)$.
2. Pour quelles valeurs de $n \in \mathbb{N}$ la propriété $\mathcal{P}(n)$ est-elle vérifiée ?

Exercice 13 – Géométrie et récurrence

On considère un polygone (convexe) à n cotés. Une diagonale est un segment joignant deux sommets non consécutifs.

Question 1

Montrer que le nombre de diagonale d'un polygone à n côtés, $n \geq 4$, est donné par la formule $d(n) = \frac{n^2-3n}{2}$.

Exercice 14 – Importance de la base

Question 1

On considère la propriété $\mathcal{P}(n)$: toute application f de $\{0, \dots, n\}$ dans \mathbb{N} vérifie $f(0) = 0$.

Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N} \quad [\mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(n+1)]$.

Peut-on en déduire que la propriété $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$?

Question 2

On considère la propriété $\mathcal{Q}(n)$: toute application définie sur un ensemble à n éléments est constante.

Le raisonnement suivant est-il correct ? Pourquoi ?

” $\mathcal{Q}(1)$ est vraie car toute application définie sur un singleton est constante.

Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que $\mathcal{Q}(n)$ soit vraie. Soit $E = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ un ensemble ayant $n+1$ éléments et f une application de E dans un ensemble F . La restriction de f à $E = \{x_0, x_1, \dots, x_{n-1}\}$ est une application définie sur un ensemble à n éléments donc elle est constante : $\exists a \in F$ tel que $f(x_0) = f(x_1) = \dots = f(x_{n-1}) = a$. La restriction de f à $E = \{x_1, \dots, x_n\}$ est une application définie sur un ensemble à n éléments donc elle est constante : $\exists b \in F$ tel que $f(x_1) = \dots = f(x_n) = b$. Comme $f(x_1) = a$ et $f(x_1) = b$, on obtient $a = b$. Par conséquent, $f(x_0) = f(x_1) = \dots = f(x_n) = a$ et f est constante sur E .

On a donc montré que : $\forall n \geq 1 \quad [\mathcal{Q}(n) \Rightarrow \mathcal{Q}(n+1)]$.

On en conclut que $\mathcal{Q}(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$.”

Exercice 15 – Cherchez l’erreur !

Question 1

Nous allons “démontrer” dans le texte suivant que tous les chevaux sont de la même couleur sur Terre !

Base : Supposons que la planète Terre ne contienne qu’un seul cheval : donc l’hypothèse de couleur unique pour tous les chevaux est bien vérifiée pour un cheval.

Induction : Supposons que l’hypothèse de récurrence est vérifiée pour un nombre $n \geq 1$ de chevaux : c’est-à-dire que tout ensemble de n chevaux sont tous de la même couleur.

Considérons un ensemble E de $n+1$ chevaux.

Soient deux chevaux distincts, nommés c_1 et c_2 dans cet ensemble E de $n+1$ chevaux (il en existe bien deux distincts car $n \geq 1$). Posons alors

$$F_1 = E \setminus \{c_1\} \quad \text{et} \quad F_2 = E \setminus \{c_2\}.$$

On peut remarquer que ces deux ensembles F_1 et F_2 contiennent tous deux n chevaux : donc tous les chevaux de F_1 sont d’une même couleur, notons-la o_1 , et tous les chevaux de F_2 sont d’une même couleur, notons-la o_2 .

Or le cheval c_1 est dans F_2 donc $o_1 = o_2$. Donc l’ensemble E contient des chevaux tous de la même couleur.

Conclusion : En utilisant cette propriété de récurrence pour l’ensemble des chevaux de toute la planète, on vient donc de prouver que tous les chevaux sont de la même couleur !

Étant donné qu'il est bien connu que les chevaux ont des couleurs bien différentes sur la planète... Où est l'erreur du raisonnement précédent ?

Exercice 16 – Récurrence et combinaisons

Question 1

Montrer, par récurrence sur n , que : $\sum_{k=p}^n C_k^p = C_{n+1}^{p+1}$ pour $0 \leq p \leq n$

Exercice 17 – Formule du binôme de Newton

Question 1

Montrer, par récurrence sur n , la formule du binôme de Newton :

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}$$

Convention : on pose $0^0 = 1$.

Exercice 18 – Récurrence forte sur Fibonacci

La suite de Fibonacci F_n a été définie en cours et dans l'exercice 6.

On considère la suite G_n définie par $G_n = G_{n-1} + G_{n-2} + 1$ si $n \geq 2$, $G_0 = 0$, $G_1 = 0$.

Question 1

Montrer par récurrence forte la propriété $\Pi(n) : G_n = F_{n+1} - 1$ pour $n \geq 0$. En déduire la valeur de G_n .

Exercice 19 – Récurrence forte

Question 1

On considère ici la suite donnée par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sum_{i=0}^n u_i$. Montrer que, pour tout $n \geq 0$, $u_n \leq 2^n$.

Question 2

Montrez que tout entier peut s'écrire comme une somme finie de puissances de 2 toutes distinctes.

Question 3

Montrer par récurrence forte sur n que, pour tout entier naturel $n \geq 1$, il existe deux entiers naturels p et q tels que $n = 2^p(2q + 1)$.

Question 4

Montrer l'unicité du couple (p, q) tel que $n = 2^p(2q + 1)$, en faisant un raisonnement par l'absurde.

Exercice 20 – Récurrence faible ou récurrence forte ?

Question 1

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_n = \sum_{i=0}^{n-1} u_i$ si $n \geq 1$ et $u_0 = 1$.

1. Montrer par récurrence forte sur n que $u_n = 2^{n-1}$ pour tout $n \geq 1$.
2. Pour $n \geq 2$, exprimer u_n en fonction du seul u_{n-1} et montrer par récurrence faible sur n que $u_n = 2^{n-1}$ pour tout $n \geq 1$.

Question 2

On considère la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $v_n = \prod_{i=0}^{n-1} v_i$ si $n \geq 1$ et $v_0 = 2$.

1. Montrer par récurrence forte sur n que $v_n = 2^{2^{n-1}}$ pour tout $n \geq 1$.
2. Pour $n \geq 2$, exprimer v_n en fonction du seul v_{n-1} et montrer par récurrence faible sur n que $v_n = 2^{2^{n-1}}$ pour tout $n \geq 1$.

Exercice 21 – Un autre exercice sur récurrence faible/forte

Question 1

Montrer par récurrence faible sur n que : $\sum_{k=1}^{n-1} (k+1)(k+1)! = (n+1)! - 2$ si $n \geq 1$.

Question 2

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_n = \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)u_k$ si $n \geq 1$ et $u_0 = 1$.

1. Montrer par récurrence forte sur n que $u_n = \frac{(n+1)!}{2}$ pour tout $n \geq 1$.
2. Pour $n \geq 2$, exprimer u_n en fonction du seul u_{n-1} et montrer par récurrence faible sur n que $u_n = \frac{(n+1)!}{2}$ pour tout $n \geq 1$.

Exercice 22 – Récurrence forte

La suite de Fibonacci F_n a été définie et calculée dans l'exercice 1.

Question 1

Montrer par récurrence sur n que

$$1 + \sum_{i=0}^n F_{2i} = F_{2n+1} \quad \text{pour tout } n \geq 0$$

Question 2

On considère la suite u_n définie par $u_n = \sum_{i=0}^{n-1} (n-i)u_i$ si $n \geq 1$ et $u_0 = 1$.

Montrer que $u_n = F_{2n}$ pour tout $n \geq 1$.