

Estatística

Sérgio Manuel Salazar dos Santos, N^o: 1020881

16 de Dezembro de 2019

Conteúdo

.1	Introdução	1
.2	O conjunto de dados	1
.3	Metodologia Estatística	4
.3.1	<i>TEE IC_{95%}</i>	4
.3.2	<i>NEE</i>	4
.3.3	<i>TESTE REG</i>	5
.4	Resultados e interpretação	5
.5	Conclusões	5

Resumo

Este trabalho consiste no estudo de Estatística das Entregas Expresso em duas regiões **A** e **B**, as variáveis em estudo é o tempo de demora das entregas e a variável de número de encomendas entregues num determinado unidade de tempo [u.t.]. Nestas situações foram retiradas 120 e 90 amostras nas duas regiões respectivamente. A primeira é uma distribuição contínua, o tempo, e a segunda uma distribuição discreta.

As matérias abordadas vão ser **Amostragem**, **Estimação de parâmetros** e **Testes de Hipóteses**

.1 Introdução

As variáveis consideradas são:

- Região (REG): variável nominal com dois níveis
Região A
Região B
- Tempo de entrega (TEE), por encomenda: Variável expressa em u.t.
- Número de encomendas entregues (NEE) por u.t.

Admitindo que a amostra disponível é uma amostra aleatória representativa das populações.

Neste relatório esta-se a trabalhar com duas grandezas precisamente o tempo (TEE) e quantidade por u.t (NEE), temos recolhidos 120 registos **TEE** na qual pela regra de sturges $c = \text{int}(1 + 3.3\log(n))$, determina-se que é necessário sete [7] classes.

Podemos obter a amplitude de cada classe $h = b - a$ e sua marca $x_i = \frac{a+b}{2}$.

.2 O conjunto de dados

X_{iA} - "Variável aleatória que representa o tempo de demora na Região **A** da entrega de uma encomenda Expresso em u.t." $i=1,2,3, \dots, 120$

X_{iB} - "Variável aleatória que representa o tempo de demora na Região **B** da entrega de uma encomenda Expresso em u.t." $i=1,2,3, \dots, 120$

Abaixo o resultado da tabela TEE:

h_i	CLASSE	MARCA	n_{iA}	n_{iB}	$\frac{n_{iA}}{h_i}$	$\frac{n_{iB}}{h_i}$	f_{iA}	f_{iB}	F_{iA}	F_{iB}
4	[5,10[7,5	8	1	2	0,25	0,0667	0,0083	0,0667	0,0083
4	[10,15[12,5	16	18	4	4,5	0,1333	0,15	0,2	0,1583
4	[15,20[17,5	40	28	10	7	0,3333	0,2333	0,5333	0,3917
4	[20,25[22,5	25	41	6,25	10,25	0,2083	0,3417	0,7417	0,7333
4	[25,30[27,5	26	22	6,5	5,5	0,2167	0,1833	0,9583	0,9167
4	[30,35[32,5	4	8	1	2	0,0333	0,0667	0,9917	0,9833
5	[35,40]	37,5	1	2	0,2	0,4	0,0083	0,0167	1	1
			n=120	n=120						

n_i - frequência absoluta f_i - frequência relativa F_i - frequência acumulada

Recorrendo ao excel obteve-se os seguintes resultados:

Média aritmética dados classificados	Variância de uma amostra dados classificados
$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^c x_i n_i = \sum_{i=1}^c x_i f_i$	$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^c (x_i - \bar{x})^2 n_i$

Estatística	X_A	X_B
Mínimo	7,5	7,5
Q_1 :1º Quartil	17,5	17,5
m_d : mediana	17,5	22,5
Q_3 :3º Quartil	27,5	27,5
Máximo	37,5	37,5
\bar{X} : Média	20,0417	21,5417
s : desvio-padrão	6,4494	6,0909
m_o : moda	17,5	22,5
Tamanho amostral $[n]$	120	120

Na Região **A** a Média > Moda = Mediana
com skew = -0,1051 e kurt = -0,4016
Na Região **B** a Média < Moda = Mediana
com skew = 0,1119 e kurt = -0,1835

Na prática, considera-se que a qualidade da aproximação é suficientemente boa quando $n \geq 30$.
Pode-se tomar que $\delta \cong s$.

$$\begin{cases} \mu \\ \delta \end{cases} \implies \bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \sim N\left(\mu; \frac{\delta^2}{n}\right)$$

$$\begin{array}{ll} \bar{x}_{A_0} = 20,0417 & \bar{x}_{B_0} = 21,5417 \\ \delta_A = 6,4494 & \delta_B = 6,0909 \end{array}$$




Figura 1: TEE

Tratamento dos dados da Segunda Variável Aleatória

Y_{iA} - "Variável aleatória que representa o número de encomendas entregues pela Expresso na Região **A** por u.t."
 $i=1,2,3, \dots, 90$

Y_{iB} - "Variável aleatória que representa o número de encomendas entregues pela Expresso na Região **B** por u.t."
 $i=1,2,3, \dots, 90$

Abaixo o resultado da tabela NEE:

Y_i	n_{iA}	n_{iB}	f_{iA}	f_{iB}	F_{iA}	F_{iB}
3	6	3	0,0667	0,0333	0,0667	0,0333
4	8	6	0,0889	0,0667	0,1556	0,1
5	19	13	0,2111	0,1444	0,3677	0,2444
6	15	7	0,1667	0,0778	0,5333	0,3222
7	13	19	0,1444	0,2111	0,6778	0,5333
8	11	15	0,1222	0,1667	0,8	0,7
9	6	8	0,0667	0,0889	0,8667	0,7889
10	5	11	0,0556	0,1222	0,9222	0,9111
11	4	3	0,0444	0,0333	0,9667	0,9444
12	0	2	0	0,0222	0,9667	0,9667
13	2	1	0,0222	0,0111	0,9889	0,9778
14	1	0	0,0111	0	1	0,9778
15	0	1	0	0,0111	1	0,9889
16	0	1	0	0,0111	1	1

Estatística	Y_A	Y_B
Mínimo	3	3
Q_1 : 1º Quartil	5	6
m_d : mediana	6	7
Q_3 : 3º Quartil	8	9
Máximo	14	16
\bar{Y} : Média	6,6111	7,5111
s : desvio-padrão	2,3112	2,5140
m_o : moda	5	7
Tamanho amostral $[n]$	90	90




Figura 2: NEE

Na Região **A** a Média > Mediana > Moda

com skew = 0.74553 e kurt = 0.49789

Na Região **B** a Média > Mediana = Moda

com skew = 0.67659 e kurt = 1.01076

$$\begin{cases} \mu \\ \delta \end{cases} \Rightarrow \bar{Y} = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n} \sim N\left(\mu; \frac{\delta^2}{n}\right)$$

$$\bar{y}_{A0} = 6,6111 \quad \bar{y}_{B0} = 7,5111$$

$$\delta_A = 2,3112 \quad \delta_B = 2,5140$$

.3 Metodologia Estatística

.3.1 TEE IC_{95%}

Estimação do tempo médio para as regiões **A** e **B** com um índice de confiança de 95%.

$$IC_{1-\alpha} = [A, B]; \text{ para } 1 - \alpha = 0.95, \alpha = 0.05, \frac{\alpha}{2} = 0.025$$

$$\text{Zona crítica } Z_c = Z_{1-\frac{\alpha}{2}} = \Phi^{-1}(0.975) \cong 1.96$$

$$P(A \leq \mu \leq B) = 1 - \alpha$$

$$\Delta = Z_c \times \frac{\delta}{\sqrt{n}}$$

$$A = \bar{x} - \Delta \quad \text{and} \quad B = \bar{x} + \Delta$$

\therefore

$$IC_{A,0.95} = [18.8877, 21.1956] \quad \text{and} \quad IC_{B,0.95} = [20.4519, 22.6314]$$

Pode-se estimar que o tempo médio $[\mu]$ de entrega na população esta dentro dos intervalos acima mencionados com 95% de confiança.

.3.2 NEE

Verificar se os dados permitem afirmar que existe diferença significativa entre a % de períodos com menos de 6 entregas por u.t. na região **A** e na região **B**. Responda com base num intervalo de confiança de 97%.

Distribuição discreta:

$$\bar{y}_{A0} = 6,6111 \quad \bar{y}_{B0} = 7,5111 \quad n = 90$$

$$\delta_A = 2,3112 \quad \delta_B = 2,5140$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \mu \\ \delta \end{array} \right\} \implies \bar{Y}_{A,B} \sim N(\mu_{A,B}; \delta_{A,B}^2)$$

$$P(X_A < 6) = P(X_A \leq 5) \cong 0,2429 \quad \text{e} \quad P(X_B < 6) = P(X_B \leq 5) \cong 0,1589$$

$$\hat{P}_A - \hat{P}_B \sim N\left(p_A - p_B; \frac{p_A q_A}{n_A} + \frac{p_B q_B}{n_B}\right) \quad \Delta = z_{(1-\frac{\alpha}{2})} \sqrt{\frac{\hat{p}_A \hat{q}_A}{n_A} + \frac{\hat{p}_B \hat{q}_B}{n_B}} \quad q = (1 - p)$$

$$IC_{97\%}(\hat{P}_A - \hat{P}_B) = [(\hat{p}_A - \hat{p}_B) - \Delta; (\hat{p}_A - \hat{p}_B) + \Delta]$$

$$\hat{P}_A - \hat{P}_B \sim N(0,0839; 0,003528) \quad z_{(1-\frac{\alpha}{2})} = \phi^{-1}(0,985) = 2,1701$$

Recorrendo a calculadora casio $fx - 9860GII$:

$$\Delta = InvNorm(0.985) \sqrt{\frac{0.2429(1-0.2429)}{90} + \frac{0.1589(1-0.1589)}{90}} \cong 0.1289$$

\therefore

$$IC_{97\%}(\hat{P}_A - \hat{P}_B) = [0,0839 - 0,1289; 0,0839 + 0,1289] = [-0,045; 0,2128]$$

A Diferença de proporção é de 0,0839 com uma margem de erro de 0,1289, que é bastante significativo

pois pode atingir 21,28% no limit superior.

.3.3 *TESTE REG*

Testar se a região (REG) tem um efeito estatisticamente significativo sobre TEE e NEE ao nível de diferença de médias. Considere uma significância à sua escolha inferior ou igual a 5%. Use o critério do valor de prova para fundamentar a decisão.

.4 Resultados e interpretação

fazer tabela só com resultados

.5 Conclusões

Lista de Figuras

1	TEE	2
2	NEE	3
[]		

Bibliografia

- [1] *Probabilidades e estatística Volume 1*. McGraw-Hill, 1990.
- [2] *Probabilidades e Processos Estocásticos*. Universidade de Aveiro, 2002.

1