



Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Aguacate papelillo | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Ajo | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Arracacha amarilla | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Arroz de primera | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Arroz de segunda | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Arroz sopa cristal | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Arveja verde en vaina | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Arveja verde en vaina pastusa | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Arveja verde seca importada | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Avena en hojuelas | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Avena molida | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Azúcar morena | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Azúcar refinada | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Azúcar sulfitada | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Banano Urabá | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Banano criollo | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Bocachico criollo fresco | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Bocachico importado congelado | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Café molido | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Carne de cerdo, costilla | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Carne de cerdo, espinazo | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Carne de res, cadera | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Carne de res, costilla | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Carne de res, falda | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Carne de res, lomo de brazo | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Carne de res, lomo fino | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Carne de res, paletero | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Carne de res, pecho | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Carne de res, punta de anca | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Cebolla cabezona blanca | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Cebolla cabezona roja importada | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Curuba | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Frijol verde cargamanto | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Fécula de maíz | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Garbanzo importado | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Habichuela | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Harina de trigo | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Harina precocida de maíz | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Huevo rojo A | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Huevo rojo AA | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Huevo rojo extra | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Leche en polvo | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Lechuga Batavia | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Lenteja importada | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Limón Tahití | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Limón común | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Lomitos de atún en lata | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Lulo | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Mango común | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Mango de azúcar | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Manzana nacional | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Manzana roja importada | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Manzana royal gala importada | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Manzana verde importada | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Maracuyá | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Margarina | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Mora de Castilla | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Naranja Sweet | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Naranja Valencia | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Panela cuadrada morena | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Papa R-12 negra | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Papa R-12 roja | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Papa criolla limpia | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Papa criolla sucia | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Papa parda pastusa | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Papa superior | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Papa suprema | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Papa única | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Papaya Maradol | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Papaya tainung | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Pastas alimenticias | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Pechuga de pollo | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Piña gold | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Piña perolera | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Pollo entero fresco sin vísceras | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Queso campesino | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Repollo verde | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Sal yodada | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Tilapia roja entera congelada | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Tilapia roja entera fresca | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Tomate chonto | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Tomate de árbol | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3



Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Tomate larga vida | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3



Metodología B — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — Zanahoria | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3

