


Metodología D — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — ARROZ PARA SECO (Arroz de primera) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95% (varianza acumulada)


Engle-Granger — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.100$ (no coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) | Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)



Metodología D — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — CEBOLLA CABEZONA (Cebolla cabezona blanca) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95% (varianza acumulada)


Engle-Granger — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.010$ (coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) | Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)



Metodología D — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — PAPA (Papa R-12 negra) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95% (varianza acumulada)


Engle-Granger — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.010$ (coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) | Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)



Metodología D — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — PAPA (Papa parda pastusa) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95% (varianza acumulada)


Engle-Granger — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.010$ (coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) | Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)



Metodología D — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — PAPA (Papa suprema) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95% (varianza acumulada)


Engle-Granger — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.010$ (coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) | Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)



Metodología D — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — PAPA (Papa única) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95% (varianza acumulada)


Engle-Granger — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.010$ (coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) | Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)



Metodología D — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — TOMATE (Tomate chonto) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95% (varianza acumulada)


Engle-Granger — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.010$ (coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) | Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)



Metodología D — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — TOMATE (Tomate larga vida) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95% (varianza acumulada)

Engle-Granger — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.010$ (coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) | Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)



Metodología D — ventana2_pronostico

BOGOTA D.C. — ZANAHORIA (Zanahoria) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95% (varianza acumulada)

Engle-Granger — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.016$ (coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) | Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)

