

MATE 5201: Tarea 5

Due on 2 de diciembre

Prof. Alejandro Velez , C41, 2 de diciembre

Sergio Rodriguez

Problem 1

(8 puntos) – Dado $\{a_n\} \in \mathbb{R}$ sucesion con $a_n > 0$ para $n \geq N_0$ (algun $N_0 \in \mathbb{N}$), pruebe que si $\sum a_k$ converge, entonces $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt{|a_k|}}{k}$ converge.

Prueba:

MEP

Problem 2

(8 puntos) – Sea $\{a_n\} \in \mathbb{N}$ sucesion de numeros naturales con $a_n \leq n - 1$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Demuestre que $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{k!} \in \mathbb{Q}$ si y solo si existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que $a_n = n - 1$ para todo $n \geq N_0$.

Prueba:

MEP

Problem 3

(16 puntos) – Dado $a \in (0, 1]$ y $s > 1$, definimos la funcion a-zeta de Riemann por:

$$\zeta(s; a) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(a+k)^s} \quad (1)$$

La funcion zeta de Riemann clasica es cuando $a = 1$, y se denota por $\zeta(s)$.

(a) - (4 puntos) – Pruebe que $\zeta(\cdot; \cdot)$ esta bien definida.

Prueba:

Note que como a es positivo, $\frac{1}{(a+k)^s} \leq \frac{1}{k^s}$, pero $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s}$ converge por que es una p -serie con $p = s > 1$. Entonces $\zeta(s; a)$ converge.

Ahora note que dados $s_1 > 1, s_2 > 1, a_1, a_2 \in (0, 1]$,

$$\begin{aligned} (s_1, a_1) &= (s_2, a_2) \\ \implies s_1 &= s_2 \wedge a_1 = a_2 \end{aligned} \quad (2)$$

Ahora usaremos induccion. Note que $a_1^{s_1} = a_2^{s_2}$. Ahora:

$$\begin{aligned} S_j(s_1, a_1) &= S_j(s_2, a_2) \\ \implies \sum_{k=0}^j (a_1 + k)^{s_1} &= \sum_{k=0}^j (a_2 + k)^{s_2} \\ \implies \sum_{k=0}^j (a_1 + k)^{s_1} + (a_1 + j + 1)^{s_1} &= \sum_{k=0}^j (a_2 + k)^{s_2} + (a_2 + j + 1)^{s_2} \\ \implies \sum_{k=0}^{j+1} (a_1 + k)^{s_1} &= \sum_{k=0}^{j+1} (a_2 + k)^{s_2} \\ \implies S_{j+1}(s_1, a_1) &= S_{j+1}(s_2, a_2) \end{aligned} \quad (3)$$

Entonces:

$$\begin{aligned} S_n(s_1, a_1) &= S_n(s_2, a_2) \\ \implies \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(s_1, a_1) &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(s_2, a_2) \end{aligned} \quad (4)$$

$\therefore \zeta(s_1; a_1) = \zeta(s_2; a_2)$ y ζ esta bien definida.

MEP

(b) - (6 puntos) - Demuestre que $\sum_{j=1}^m \zeta\left(s; \frac{j}{m}\right) = m^s \zeta(s)$.

Prueba:

MEP

(c) - (6 puntos) - Pruebe que $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} k^{-s} = (1 - 2^{1-s}) \zeta(s)$.

Prueba:

MEP

Problem 4

(8 puntos) - Dadas las sucesiones $\{a_n\}, \{b_n\} \subseteq \mathbb{R}$, si $\sum a_k$ converge y $\{b_n\}$ es sucesion monotonica acotada, demuestre que $\sum a_k b_k$ converge.

Prueba:

MEP