

## Decidiendo con la distribución normal estándar

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_

1. Aplica una estandarización normal a las siguientes variables y calcula.

a.  $X \sim N(46, 3)$

•  $P(X > 38)$

$X \sim N(46, 3)$ ,  $\mu = 46$ ,  $\sigma = 3$ , al trabajar con  $Z \sim N(0, 1)$ ,  
se tiene:  $P(X > 38) = P\left(Z > \frac{38 - 46}{3}\right) \approx P(Z > -2,66)$   
 $= P(Z < 2,66) = 0,9803$ .

La probabilidad es 0,9803.

•  $P(39 \leq X < 41)$

$X \sim N(46, 3)$ ,  $\mu = 46$ ,  $\sigma = 3$ , con  $Z \sim N(0, 1)$ ,  
 $P(39 \leq X < 41) = P(X \leq 41) - P(X \leq 39)$   
 $\approx P(Z \leq -1,66) - P(Z \leq -2,33) = 0,02728$

La probabilidad es 0,02728.

b.  $X \sim N(70, 7)$

•  $P(X > 54)$

$X \sim N(70, 7)$ ,  $\mu = 70$ ,  $\sigma = 7$ , con  $Z \sim N(0, 1)$ ,  
se tiene:  $P(X > 54) = P\left(Z > \frac{54 - 70}{7}\right)$   
 $\approx P(Z > -2,29) = P(Z < 2,29) = 0,98899$ .

La probabilidad es 0,98899.


•  $P(X > 75)$

$X \sim N(70, 7)$ ,  $\mu = 70$ ,  $\sigma = 7$ , con  $Z \sim N(0, 1)$ ,  
se tiene:  $P(X > 75) = P\left(Z > \frac{75 - 70}{7}\right)$   
 $\approx P(Z > 0,71) = 1 - P(Z < 0,71) = 0,2389$ .

La probabilidad es 0,2389.

2. Calcula la probabilidad representada a partir de la función de distribución normal.

a




$\mu > 10$

$\sigma > 2$

$P(X < 13) = 0,9332$

b



$\mu > 35$

$\sigma > 5$

$P(X > 30) = 0,1587$

3. Utiliza la tabla de distribución normal estándar para determinar el valor de  $k$  según corresponda.

a.  $X \sim N(18, 2)$  y  $P(X < k) = 0,4522$

La expresión  $P(X < k) = 0,4522$  es equivalente a  $1 - P(X > k) = 0,4522$ , que es lo mismo que  $1 - P(X < -k) = 0,4522$ , despejando se obtiene:  $P(X < -k) = 0,5478$ . De  $X \sim N(18, 2)$  se deduce  $\mu = 18$ ,  $\sigma = 2$ , al trabajar con  $Z \sim N(0, 1)$ , se tiene:  $P(X < -k) = 0,5478 \Rightarrow P\left(Z < -\left(\frac{k-18}{2}\right)\right) = 0,5478$ , buscando los valores en la tabla de la distribución normal debe cumplirse que  $-\left(\frac{k-18}{2}\right) = 0,12$ , al despejar se obtiene  $k = 17,76$ .

El valor de  $k$  es 17,76.

b.  $Y \sim N(15, 4)$  y  $P(Y \geq k) = 0,33$

La expresión  $P(Y \geq k) = 0,33$  es equivalente a  $1 - P(X \leq k) = 0,33$ , despejando se obtiene:  $P(X \leq k) = 0,67$ . De  $Y \sim N(15, 4)$  se deduce  $\mu = 15$ ,  $\sigma = 4$ , al trabajar con  $Z \sim N(0, 1)$ , se tiene:  $P(X \leq k) = 0,67 \Rightarrow P\left(Z \leq \left(\frac{k-15}{4}\right)\right) = 0,67$ , revisando la tabla de la distribución normal se tiene  $\left(\frac{k-15}{4}\right) = 0,44$ , al despejar se obtiene  $k = 16,76$ .

El valor de  $k$  es 16,76.

c. ¿Cuál de las variables es más probable que tome un valor mayor que 21?

$$P(X < 21)$$

$$= P\left(Z < \frac{21-18}{2}\right)$$

$$= P\left(Z < \frac{3}{2}\right)$$

$$P(Y < 21)$$

$$= P\left(Z < \frac{21-15}{2}\right)$$

$$= P\left(Z < \frac{3}{2}\right)$$


Ambas tienen la misma probabilidad.

4. Resuelve los problemas y representa en el gráfico la probabilidad pedida.

a. El consumo de bencina de cierto modelo de automóvil a los 100 km/h tiene una distribución normal con media de 7 litros y desviación estándar de 1 litro. ¿Cuál es la probabilidad de tener uno de esos modelos que consuma entre 5 y 7,5 litros a 100 km/h?

De los datos del problema se tiene  $X \sim N(7, 1)$  se deduce  $\mu = 7$ ,  $\sigma = 1$ , se pide calcular la probabilidad de que consuma entre 5 L y 7,5 L a 100 km/h, lo que es equivalente a calcular:  $P(5 < X < 7,5)$  al trabajar con  $Z \sim N(0, 1)$ , se tiene:  $P\left(\frac{5-7}{1} < Z < \frac{7,5-7}{1}\right) = P(-2 < Z < 0,5)$ , esto equivale a calcular:  $P(Z < 0,5) - P(Z < -2) = P(Z < 0,5) - (1 - P(Z < 2)) = 0,69146 - 0,02275 = 0,66871$ .

La probabilidad es igual a 0,66871.




- b. Según estudios científicos, la temperatura del cuerpo tiene una distribución normal con media de  $36,7^{\circ}\text{C}$  y desviación estándar de  $0,4^{\circ}\text{C}$ . Si una persona se siente saludable con temperatura corporal de entre  $36^{\circ}\text{C}$  y  $37^{\circ}\text{C}$ , ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un individuo en este rango?

De los datos del problema se tiene  $X \sim N(36,7; 0,4)$  se deduce  $\mu = 36,7$ ,  $\sigma = 0,4$ , se pide calcular:  $P(36 < X < 37)$  al trabajar con  $Z \sim N(0, 1)$ , se tiene:  $P(36 < X < 37) \triangleright$

$$P\left(\frac{36 - 36,7}{0,4} < Z < \frac{37 - 36,7}{0,4}\right) = P(-1,75 < Z < 0,75), \text{ esto equivale a calcular: } P(Z < 0,75) - P(-1,75 < Z) = P(Z < 0,75) - (1 - P(Z < 1,75)) = 0,77337 - 0,04006 = 0,73331$$

La probabilidad es 0,73331.



35,9 36,3 36,7 37,1 37,5

## 5. Resuelve los problemas.

- a. El tiempo de vuelo directo desde Arica a Santiago tiene una distribución normal, con media de  $3,5$  h y desviación estándar de  $0,4$  h. Si se analiza uno de esos vuelos:

- ¿Cuál es la probabilidad de que demore más de 4 h?

$$Z = \frac{4 - 3,5}{0,4} = 1,25$$

$$P(Z > 1,25) = 1 - P(Z < 1,25) = 1 - 0,89435 = 0,10565$$

La probabilidad es 0,11, aproximadamente.

- ¿Cuál es la probabilidad de que llegue media hora antes de lo habitual?

$$X = 3,5 - 0,5 = 3$$

$$Z = \frac{3 - 3,5}{0,4} = -1,25$$

$$P(Z < -1,25) = 1 - P(Z < 1,25) = 1 - 0,89435 = 0,10565$$

La probabilidad es 0,11, aproximadamente.

- ¿Cuál es la probabilidad de que demore más de 3,3 h y menos de 3,6 h?

$$3,3 < X < 3,6$$

$$\frac{3,3 - 3,5}{0,4} < Z < \frac{3,6 - 3,5}{0,4} \\ -0,5 < Z < 0,25$$

$$P(-0,5 < Z < 0,25) = P(Z < 0,25) - P(-0,5 < Z) = P(Z < 0,25) - (1 - P(Z < 0,5)) = 0,59871 - (1 - 0,69146) = 0,29017$$

La probabilidad es 0,29, aproximadamente.

- b. Una empresa de baterías para notebook fabrica productos cuya vida útil, en días, tiene una distribución normal con media de 540 días y desviación estándar de 32 días.

- ¿Cuál es la probabilidad de adquirir una batería que dure más de 570 días?

$$Z = \frac{570 - 540}{32} = 0,9375$$

$$\begin{aligned} P(Z > 0,94) &= 1 - P(Z < 0,94) \\ &= 1 - 0,82639 \\ &= 0,17361 \end{aligned}$$

La probabilidad es 0,17, aproximadamente.

- ¿Qué porcentaje de las baterías tiene una vida útil inferior a 500 días?

$$Z = \frac{500 - 540}{32} = -1,25$$

$$\begin{aligned} P(Z < -1,25) &= 1 - P(Z < 1,25) \\ &= 1 - 0,89435 \\ &= 0,10565 \end{aligned}$$

El porcentaje de baterías es 11 %, aproximadamente.

- ¿Qué porcentaje de las baterías tiene vida útil mayor que 500 días y menor que 580 días?

$$500 < X < 580$$

$$\begin{aligned} \frac{500 - 540}{32} < Z < \frac{580 - 540}{32} \\ -1,25 < Z < 1,25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(-1,25 < Z < 1,25) &= 2 \cdot P(Z < 1,25) - 1 \\ &= 2 \cdot 0,89435 - 1 \\ &= 1,7887 - 1 \\ &= 0,7887 \end{aligned}$$

El porcentaje de baterías es 79 %, aproximadamente.

### Reflexiona y responde

- ¿Qué fue lo más destacado que aprendiste sobre la distribución estudiada?
- ¿Qué aplicaciones en tu entorno inmediato podría tener esta distribución?