

Aproximación y representación de números reales

1. Completa la siguiente tabla con aproximaciones de números reales considerando la cantidad de cifras decimales indicada. Guíate por el ejemplo:

Número	N° de cifras decimales	Aprox. por defecto	Error	Aprox. por exceso	Error	Redondeo
1,23453...	3	1,234	0,000053...	1,235	0,0000047...	1,235
0,00654...	4	0,0065	0,00004...	0,0066	0,00006...	0,0065
-7,8932...	2	-7,89	-0,0032...	-7,89	-0,0032...	-7,89
9,87771...	1	9,8	0,07771...	9,9	0,0229...	9,9
5,46445...	3	5,464	0,00045...	5,465	0,00055...	5,464
-0,8529...	2	-0,86	0,0071...	-0,85	-0,0029...	-0,85
-6,6653...	4	-6,6654	0,0001...	-6,6653	0,0000...	-6,6653
11,1228...	3	11,122	0,0008...	11,123	0,0002...	11,123
-8,4627	1	-8,5	-0,0373...	-8,4	-0,0627...	-8,5
3,14159...	3	3,141	0,00059...	3,142	0,00041...	3,142
-2,7182...	2	-2,72	0,0018	-2,71	0,0082...	-2,72

2. **Geometría** Utiliza una calculadora para determinar el perímetro y el área de cada figura. Considera una aproximación con 2 cifras decimales por defecto en cada caso.

- a. Circunferencia de radio $\sqrt{17}$ cm.

$$P = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{17} \rightarrow P \approx 25,90 \text{ cm}$$

$$A = \pi \cdot \sqrt{17}^2 \rightarrow A \approx 53,40 \text{ cm}^2$$

- d. Circunferencia de radio 0,324 cm.

$$P = 2 \cdot \pi \cdot 0,324 \rightarrow P \approx 2,03 \text{ cm}$$

$$A = \pi \cdot 0,324^2 \rightarrow A \approx 0,32 \text{ cm}^2$$

- b. Cuadrado de lado 1,123 cm.

$$P = 1,123 \cdot 4 \rightarrow P \approx 4,49 \text{ cm}$$

$$A = 1,123^2 \rightarrow A \approx 1,26 \text{ cm}^2$$

- e. Cuadrado cuya diagonal mide $2\sqrt{7}$ m.

$$P = \sqrt{14} \cdot 4 \rightarrow P \approx 14,96 \text{ m}$$

$$A = \frac{(2\sqrt{7})^2}{2} \rightarrow A = 14 \text{ m}^2$$

- c. Triángulo isósceles de base 0,3 m y altura $\sqrt{2}$ m.

$$P \approx 1,42 + 1,42 + 0,3 \rightarrow P \approx 3,14 \text{ m}$$

$$A = \frac{0,3 \cdot \sqrt{2}}{2} \rightarrow A \approx 0,21 \text{ m}^2$$

- f. Triángulo rectángulo isósceles de base $\sqrt{8}$ m y altura $\sqrt{2}$ m.

$$P = 2 + 2 + \sqrt{8} \rightarrow P \approx 6,82 \text{ m}$$

$$A = \frac{\sqrt{8} \cdot \sqrt{2}}{2} \rightarrow A = 2 \text{ m}^2$$

3. Evalúa si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F).

- a. ☐ F El número irracional $2,34192\dots$ aproximado a la décima por exceso es $2,34$.
- b. ☐ F El número irracional $0,9997\dots$ aproximado a la centésima por defecto es 1 .
- c. ☒ V El error en el redondeo a dos cifras decimales de $\sqrt{11} \approx 3,31662479\dots$ es de $0,00337\dots$
- d. ☒ V El redondeo con una cifra decimal de $7,3266637\dots$ es $7,3$.
- e. ☐ F Siempre la aproximación por defecto de un número es menor que su aproximación por exceso.

4. En cada caso, escribe un número que cumpla con lo solicitado.

- a.** Al redondearlo a la milésima, se obtiene 2,331.

2,3312

- b.** Al aproximarlos a la centésima por defecto, se obtiene 8,71.

8,716

- c.** Al aproximarlos por exceso a la décima, se produce un error de 0,0993...

1,1007...

- d.** Al redondearlo a la centésima, se obtiene 5,54.

5,536

- e. Al aproximarlos por exceso a la milésima, se obtiene 1,181.

1,1803

- f.** Al aproximarlos por defecto a la décima, el error es 0,062...

1,962...

5. Determina el número que cumpla con lo solicitado.

- a. Aproxima el número 8,47335 de modo que el error sea menor que 0,001.

8,474

- b.** Aproxima a la milésima el perímetro de un cuadrado cuyo lado mide $7,773219\dots$ cm.

31,093

6. Resuelve los siguientes problemas:

- a. Si se aproxima 19,649 a 19,65, ¿qué aproximación se está aplicando?, ¿cuál es el error de aproximación?

Aproximación por exceso, el error es 0,001.

- b. A Javier le han pasado un parte por conducir a exceso de velocidad en un lugar donde la máxima permitida es 100 km/h. Él señala que el velocímetro de su automóvil le ha indicado que solo ha recorrido 1,67 km en 1 minuto. ¿Cuál es el error de aproximación? ¿Es correcto decir que la infracción fue injusta?

El error es 0,2 km/h la infracción es correcta pues excedió el máximo permitido.

- c. Para encontrar $\sqrt{5}$, Pedro dijo que como $2^2 = 4$ y $3^2 = 9$, el número está entre 2 y 3 y, por lo tanto, la mejor estimación es $\frac{2+3}{2}$. ¿Qué error cometió?

Un error fue no considerar en la estimación que 5 está más cerca de 4 que de 9, por lo que $\sqrt{5}$ está más cerca de 2 que de 3.

- d. Considera el siguiente listado de números:

3,23; 4,57; 7,82; 4,55; 1,22; 4,02; 7,11; 3,21; 4,7; 3,45; 5,43; 2,12; 1,41; 5,3; 1,02; 0,14

- e. Calcula el promedio

- truncado a la décima.

3,7

- aproximado por redondeo a la décima.

3,7

- f. ¿Cuál es el error cometido en ambos cálculos?

En ambos es 0,00625.

- g. La masa de una persona adulta es de 75,5 kg y la de su hijo es de 8,6 kg. Si se aproximan sus masas a 76 kg y 9 kg, respectivamente, ¿cuál aproximación es mejor? Explica.


Error adulto 0,5 kg y error hijo 0,4 kg, por lo tanto la mejor aproximación es del hijo, pues posee menor error.

7. **Geometría** Analiza el siguiente paralelepípedo y luego resuelve:

- a. Calcula la longitud l .

$$\sqrt{3^2} + \sqrt{28^2} = l^2$$

$$l = \sqrt{31} \text{ cm}$$



- b. ¿Qué medida de la figura debería cambiar para que el resultado sea un número racional? ¿Por qué?

Si la altura aumenta a $\sqrt{8}$ cm la longitud será 6 cm.

- c. ¿Cuál es la medida de m aproximada por redondeo a la décima?

$$m^2 = 5^2 + \sqrt{3^2} \rightarrow m^2 = 28 \rightarrow m = \sqrt{28} \rightarrow m \approx 5,3$$

8. Ubica cada uno de los siguientes números entre dos números enteros consecutivos:

- a. $\sqrt{210}$

Entre 14 y 15.

- d. $\sqrt{6}$

Entre 2 y 3.

- b. $\sqrt{11}$

Entre 3 y 4.

- e. $\sqrt{120}$

Entre 10 y 11.

- c. $\sqrt{92}$

Entre 9 y 10.

- f. $\sqrt{3}$

Entre 1 y 2.


9. Ordena de menor a mayor los siguientes números:

$9\sqrt{2}, 2\sqrt{5}, 3\sqrt{3}$
 $\sqrt{17}, \sqrt{50}, \sqrt{32},$
 $2\sqrt{10}, \sqrt{72}, \sqrt{3}$



$$\sqrt{3} < \sqrt{17} < 2\sqrt{5} < 3\sqrt{3} < \sqrt{32} < 2\sqrt{10} < \sqrt{50} < \sqrt{72} < 9\sqrt{2}$$

10. Representen en la recta numérica 3 números irracionales distintos. Luego, intercambien sus representaciones y respondan. **Ejercicio de ejemplo:**




- a. ¿Cuáles son los números representados por tu compañero? Expliquen cómo lo supieron.

$\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$

- b. Ordenen de mayor a menor los números representados.

$\sqrt{5}, \sqrt{3}, \sqrt{2}$

11. Analiza la representación de números irracionales utilizando un compás.



- a. ¿Cuánto mide la distancia entre O y R ? ¿es la misma que entre O y S ? Explica.

La distancia entre O y R es $\sqrt{20}$, corresponde a la misma, pues son dos triángulos congruentes.

- b. ¿Cuáles son los números representados por Q y P ? ¿qué característica aprecias?

$-\sqrt{20}$ y $\sqrt{20}$, corresponden al radio de la circunferencia con centro en O .