

Конспект: від інфлатона до СМВ

Зміст

1 Від рівнянь Айнштейна до рівнянь Фрідмана	2
2 Інфлатон і потенціал	3
2.1 Параметри повільного кочення (slow-roll)	4
2.2 Геометрія потенціалу та обмеження спостережень	5
3 Квантові флуктуації і збурення	5
3.1 Походження скалярних збурень у просторі де-Сіттера	6
3.2 Перехід до первинних збурень кривини. Зламаний спектр	6
3.3 Динаміка «Заморожування» та «Розморожування» мод	7
4 Метрика Фрідмана і збурення	7
4.1 Конформно-ньютонівське калібрування	8
4.2 Динаміка первинних гравітаційних хвиль	9
5 Реогрів і народження матерії	9
5.1 Пререогрів та параметричний резонанс	10
5.2 Пертурбативний розпад та термалізація	10
6 Акустичні коливання і СМВ	11
6.1 Спектр потужності СМВ	11
6.2 Від метрики Фрідмана до кривої СМВ	11
6.3 Спектр температурних анізотропій СМВ	12
7 Поляризація СМВ	14
8 Хаотична інфляція Лінде	15
9 Наша задача: зламаний спектр і JWST	15
9.1 Мотивація	15
9.2 Ідея	15
9.3 Чому не суперечить СМВ і σ_8	16
9.4 План роботи	16

1 Від рівнянь Айнштейна до рівнянь Фрідмана

Відправна точка: FLRW-метрика в космологічному часі t

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 \delta_{ij} dx^i dx^j \quad (k = 0, \text{ плоский Всесвіт}) \quad (1)$$

є точним розв'язком рівнянь Айнштейна $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$ для ізотропного однорідного ідеального плинну $T^{\mu\nu} = \text{diag}(\rho, p, p, p)$.

Ненульові компоненти тензора Айнштейна:

$$G^0_0 = -3H^2, \quad G^i_j = -(2\dot{H} + 3H^2) \delta^i_j, \quad H \equiv \frac{\dot{a}}{a}.$$

Підставляючи в рівняння поля, отримуємо **рівняння Фрідмана**:

Перше рівняння Фрідмана ((00)-компонента):

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho + \frac{\Lambda}{3} \quad (2)$$

Друге рівняння Фрідмана ((ii)-компонента, «прискорення»):

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} (\rho + 3p) + \frac{\Lambda}{3} \quad (3)$$

Рівняння збереження ($\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$):

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + p) = 0 \quad (4)$$

Зауваження:

- Рівняння збереження не є незалежним: воно автоматично слідує з двох рівнянь Фрідмана через тотожність Бьянкі $\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0$.
- Космологічна стала Λ еквівалентна ідеальній рідині з $\rho_\Lambda = \Lambda/(8\pi G)$, $p_\Lambda = -\rho_\Lambda$, тобто $w = -1$.
- Відхилення від плоскості ($k = \pm 1$) дає доданок $-k/a^2$ у першому рівнянні; Planck обмежує $|\Omega_k| < 0.005$, тому $k = 0$ — відмінне наближення.

Фонова метрика FLRW у конформному часі η ($d\eta = dt/a$):

$$ds^2 = a(\eta)^2 (-d\eta^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2)$$

де $a(\eta)$ — масштабний фактор, динаміку якого задають рівняння Фрідмана з урахуванням космологічної сталої Λ :

$$\mathcal{H}^2 \equiv \left(\frac{a'}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3} a^2 \bar{\rho} + \frac{\Lambda}{3} a^2, \quad \mathcal{H}' = -\frac{4\pi G}{3} a^2 (\bar{\rho} + 3\bar{p}) + \frac{\Lambda}{3} a^2.$$

Тут і надалі штрих означає похідну за конформним часом η , а $\mathcal{H} = aH$ — конформний параметр Хаббла. Величини $\bar{\rho}(\eta)$ та $\bar{p}(\eta)$ задають ідеально однорідну й ізотропну фонову густину та тиск космічного субстрату відповідно.

Залежно від того, яка саме компонента енергії-імпульсу домінує на певному етапі еволюції Всесвіту, змінюється рівняння стану $w = \bar{p}/\bar{\rho}$, що критично визначає кінематику конформного масштабного фактора:

Епоха	Джерело	$w = \bar{p}/\bar{\rho}$	$a(\eta)$
Інфляція	Інфлатон	≈ -1	$\propto -\frac{1}{H\eta} \quad (\eta < 0)$
Радіаційна	Фотони, нейтрино	$1/3$	$\propto \eta$
Матеріальна	Темна матерія + баріони	0	$\propto \eta^2$
Сьогодні	Темна енергія	≈ -1	$\propto -\frac{1}{H\eta} \quad (\text{асимптотика})$

Рівняння Фрідмана та наведені закони розширення описують ідеалізований, повністю симетричний Всесвіт. Проте наявність реальної великомасштабної структури (галактик та їхніх скупчень) свідчить про те, що реальний космос є неоднорідним. Згідно з концепцією гравітаційної (джинсівської) нестабільності, усі сучасні астрофізичні об'єкти виросли через колапс крихітних початкових флуктуацій.

Математично цей перехід моделюється в рамках лінійної теорії збурень, де повна густина енергії $\rho(\eta, \mathbf{x})$ розкладається на просторово однорідний фон $\bar{\rho}(\eta)$ та малі локальні відхилення $\delta\rho(\eta, \mathbf{x})$:

$$\rho(\eta, \mathbf{x}) = \bar{\rho}(\eta) + \delta\rho(\eta, \mathbf{x}), \quad \text{де } |\delta\rho| \ll \bar{\rho}.$$

Контраст густини $\delta \equiv \delta\rho/\bar{\rho}$ динамічно пов'язаний із геометрією простору. Темп розширення фону $a(\eta)$ діє як ефективне «тертя Хаббла», що протидіє силі тяжіння та консервує ріст збурень на радіаційній епосі, дозволяючи їм лінійно зростати ($\delta \propto a$) лише після настання матеріальної ери. Фізичні механізми, які згенерували ці первинні неоднорідності $\delta\rho$ на найраніших етапах, безпосередньо пов'язані з динамікою скалярних полів, що розглядається у наступному розділі.

2 Інфлатон і потенціал

Найбільш природним і математично узгодженим механізмом генерації початкових неоднорідностей $\delta\rho$ є динаміка гіпотетичного скалярного поля — *інфлатона* $\phi(\eta, \mathbf{x})$, яке домінувало в енергетичному балансі раннього Всесвіту. У кожній точці простору-часу стан цього поля характеризується його амплітудою, а динамічна еволюція визначається формою його потенціальної енергії $V(\phi)$.

Фізично цей процес можна уявити як класичне «кочення» поля з локального максимуму потенціалу вниз, аналогічно до руху масивного тіла в полі тяжіння за наявності сильного в'язкого тертя. Завдяки просторовій однорідності фону, на початковому етапі ми можемо знехтувати просторовими градієнтами полів і розглядати лише його фонове значення $\phi(\eta)$.

Рівняння руху інфлатона (у космологічному часі t):

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V'(\phi) = 0 \quad (5)$$

де $V'(\phi) \equiv dV/d\phi$, а член $3H\dot{\phi}$ описує ефект «хабблівського тертя», зумовлений розширенням самого простору.

Тензор енергії-імпульсу скалярного поля дає такі вирази для фонової

густини енергії та тиску:

$$\bar{\rho}_\phi = \frac{\dot{\phi}^2}{2} + V(\phi), \quad \bar{p}_\phi = \frac{\dot{\phi}^2}{2} - V(\phi). \quad (6)$$

З рівнянь (6) чітко видно природу інфляційного розширення. Якщо кінетична енергія поля є нехтовно малою порівняно з його потенціальною енергією ($\dot{\phi}^2 \ll V(\phi)$), то ефективне рівняння стану задовольняє умову:

$$w_\phi = \frac{\bar{p}_\phi}{\bar{\rho}_\phi} \approx -1.$$

У цьому режимі густина енергії залишається практично сталою ($\bar{\rho}_\phi \approx V(\phi) \approx \text{const}$), що через перше рівняння Фрідмана (2) призводить до сталого параметра Хаббла $H \approx \text{const}$ та експоненційного розширення масштабного фактора:

$$a(t) = a_0 e^{Ht}.$$

2.1 Параметри повільного кочення (slow-roll)

Режим, за якого Всесвіт розширюється прискорено, а поле котиться достатньо повільно, щоб забезпечити тривалу інфляцію (щонайменше $N \sim 50\text{--}60$ e -folds), формалізується за допомогою безрозмірних параметрів slow-roll. У загальному випадку їх визначають через динаміку параметра Хаббла (так звані параметри Хаббла–Пригожина):

Перший і другий параметри повільного кочення:

$$\varepsilon \equiv -\frac{\dot{H}}{H^2} = \frac{\dot{\phi}^2}{2H^2 M_{\text{Pl}}^2}, \quad \eta_{\text{H}} \equiv -\frac{\ddot{\phi}}{H\dot{\phi}}. \quad (7)$$

де $M_{\text{Pl}} = (8\pi G)^{-1/2}$ — редукована планківська маса.

У наближенні повільного кочення, коли прискоренням поля у рівнянні (5) можна знехтувати ($\ddot{\phi} \ll 3H\dot{\phi}$), воно зводиться до першого порядку: $3H\dot{\phi} \approx -V'(\phi)$. Це дозволяє виразити параметри slow-roll безпосередньо через геометричні характеристики самого потенціалу $V(\phi)$. На відміну від першого розділу, де штрих означав диференціювання за конформним часом, тут і надалі у контексті потенціалу штрихами позначено похідні за скалярним полем ϕ , тобто $V'(\phi) \equiv dV/d\phi$ та $V''(\phi) \equiv d^2V/d\phi^2$:

$$\varepsilon \approx \varepsilon_V \equiv \frac{M_{\text{Pl}}^2}{2} \left(\frac{V'}{V} \right)^2, \quad \eta \approx \eta_V \equiv M_{\text{Pl}}^2 \frac{V''}{V}. \quad (8)$$

Умова існування інфляції потребує $\varepsilon < 1$ (що еквівалентно $\ddot{a} > 0$). Для того, щоб цей режим тривав достатньо довго, необхідно виконання нерівностей $\varepsilon \ll 1$ та $|\eta| \ll 1$. Інфляція автоматично завершується в точці потенціалу, де поле прискорюється і перший параметр досягає критичного значення $\varepsilon(\phi_{\text{end}}) = 1$.

Параметри повільного кочення пов'язують фундаментальну фізику надвисоких енергій із космологічними спостереженнями. У першому порядку

теорії збурень спектральні характеристики первинних флуктуацій лінійно виражаються через значення ε та η у момент виходу відповідного масштабу за горизонт:

$$n_s - 1 = -2\varepsilon - \eta, \quad r = 16\varepsilon, \quad (9)$$

де n_s — спектральний індекс скалярних збурень, а r — тензорне відношення. Сучасні обмеження на анізотропію СМВ (Planck 2018 у комбінації з BICEP/Keck 2021) встановлюють жорсткі межі: $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$ та $r < 0.036$. Це дозволяє з високою точністю відсікати класи моделей інфляції, які передбачають занадто крутий нахил потенціалу.

2.2 Геометрія потенціалу та обмеження спостережень

Важливо розуміти, що спостереження реліктового випромінювання дають нам інформацію не про весь потенціал $V(\phi)$, а лише про його дуже вузький проміжок. Масштаби, які ми фіксуємо сьогодні на картах анізотропії температур СМВ, виходили за горизонт Хаббла протягом всього лише $\sim 7\text{--}8$ e -folds (на загальному тлі у $50\text{--}60$ e -folds від початку процесу).

На сьогодні існує понад 100 теоретичних моделей, які конкурують між собою (модель Старобінського R^2 , хіггсова інфляція, моделі спонтанного порушення симетрії тощо). Багато з них дають ідеальний фіт для великих масштабів (дані Planck).

Проте, якщо на ділянці потенціалу, що відповідає значно меншим масштабам ($k \gg 1 \text{ Мpc}^{-1}$), які виходили за горизонт значно пізніше, геометрія потенціалу різко змінюється (наприклад, виникає локальне плато або сходінка), режим повільного кочення тимчасово порушується. Як буде показано далі, такий локальний злом симетрії потенціалу дозволяє суттєво змінити первинний спектр потужності, не руйнуючи при цьому космологічну картину на великих кутах.

3 Квантові флуктуації і збурення

Найбільш фундаментальним досягненням інфляційної парадигми є те, що вона природним чином пояснює походження первинних неоднорідностей Всесвіту. Поверх класичного однорідного фону скалярного поля $\bar{\phi}(\eta)$ та фонові метрики FLRW завжди існують неминучі квантові флуктуації. У лінійному наближенні теорії збурень їх прийнято розділяти на два абсолютно незалежні класи:

1. **Флуктуації інфлатона** $\delta\phi(\eta, \mathbf{x})$ — генерують первинні скалярні збурення густини матерії (адіабатичні збурення кривини).
2. **Флуктуації метрики** $h_{ij}(\eta, \mathbf{x})$ — просторово-тензорні збурення, які представляють собою первинні стохастичні гравітаційні хвилі.

3.1 Походження скалярних збурень у просторі де-Сіттера

Розглянемо квантування легкого безмасового скалярного поля у чисто де-Сіттерівському просторі, де параметр Хаббла є строго сталим ($H = \text{const}$). Переходячи у Фур'є-простір за просторовими координатами $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{k}$, рівняння Клейна–Гордона для k -ї моди флуктуації $\delta\phi_k(\eta)$ набуває вигляду рівняння руху коливальної системи із загасанням у розширюваному фоні [1]:

$$\ddot{\delta\phi}_k + 3H \dot{\delta\phi}_k + \frac{k^2}{a^2} \delta\phi_k = 0, \quad (10)$$

де крапка означає похідну за космологічним часом t , а $k \equiv |\mathbf{k}|$ — комодуляційне хвильове число. Еволюція кожної окремої моди критично *dépendent* від співвідношення між її фізичною довжиною хвилі $\lambda_{\text{phys}} = a/k$ та космологічним горизонтом Хаббла $R_H = H^{-1}$ [2]:

- **Субхаббловий режим** ($k/a \gg H$): На надмалих просторових масштабах (всередині горизонту) ефектами розширення простору можна знехтувати. Рівняння (10) зводиться до рівняння стандартного гармонічного осцилятора у плоскому просторі Мінковського. Відповідний вибір початкового квантового стану — вакуум Банча–Девіса [3] — задає нормування амплітуди коливань нульових флуктуацій: $|\delta\phi_k| \sim k^{-1/2}/(a\sqrt{2})$.
- **Суперхаббловий режим** ($k/a \ll H$): Унаслідок стрімкого інфляційного розширення фізичний масштаб флуктуації переростає радіус горизонту Хаббла. Мода «виходить за горизонт», де градієнтний член k^2/a^2 стає нехтовно малим, і коливальний режим повністю припиняється [4].

У суперхаббловому ліміті ($k \rightarrow 0$) загальний розв'язок рівняння (10) містить сталу (заморожену) та затухаючу моди. Амплітуда флуктуації асимптотично виходить на стаціонарне «заморожене» значення [5]:

$$|\delta\phi_k| \rightarrow \frac{H}{\sqrt{2k^3}},$$

що дозволяє строго визначити безрозмірний безваріантний за масштабом первинний спектр потужності флуктуацій скалярного поля [2]:

$$\mathcal{P}_{\delta\phi}(k) \equiv \frac{k^3}{2\pi^2} |\delta\phi_k|^2 = \left(\frac{H}{2\pi} \right)^2. \quad (11)$$

З термодинамічного погляду, вираз (11) відображає наявність характерної *температури простору де-Сіттера* $T_{\text{ds}} = H/(2\pi)$ [6]. Геометричний космологічний горизонт подій обмежує доступну спостерігачеві інформацію, що призводить до квантування вакуумних станів та теплового випромінювання макроскопічних флуктуацій, концептуально аналогічно до випромінювання Гокінга для чорних дір [7].

3.2 Перехід до первинних збурень кривини. Зламаний спектр

Самі по собі флуктуації поля $\delta\phi$ не є калібрувально-інваріантними. Фізичний зміст мають зумовлені ними первинні збурення просторової кривини $\mathcal{R}_k$ на

суперхабблових масштабах [8]. Вони лінійно пов'язані з $\delta\phi_k$ через швидкість кочення класичного фону $\dot{\phi}$:

$$\mathcal{R}_k = -\frac{H}{\dot{\phi}} \delta\phi_k \Rightarrow \mathcal{P}_{\mathcal{R}}(k) = \frac{H^2}{2\pi^2 \dot{\phi}^2} \left(\frac{H}{2\pi} \right)^2 = \frac{H^4}{4\pi^2 \dot{\phi}^2}. \quad (12)$$

Формула (12) є ключовою для аналізу моделей із модифікованою інфляційною кінематикою. У стандартному режимі повільного кочення параметри фону змінюються плавно, забезпечуючи майже плоско-інваріантний спектр Харісона–Зельдовича. Проте, якщо на шляху інфлатона зустрічається локальна аномалія геометрії потенціалу (наприклад, різка сходинка або ділянка ультра-повільного кочення UR), швидкість поля стрімко падає ($\dot{\phi} \rightarrow 0$).

Оскільки амплітуда збурень обернено пропорційна швидкості кочення ($\mathcal{R}_k \propto 1/\dot{\phi}$), флуктуації, які виходять за горизонт саме в цей момент, зазнають різкого локального підсилення. Це приводить до формування **зламаного спектра потужності** з надлишком амплітуди на фіксованому масштабі k_{break} , що є центральною ідеєю нашої роботи для узгодження з ранніми галактиками від JWST.

3.3 Динаміка «Заморожування» та «Розморожування» мод

Процес еволюції первинних збурень підпорядковується чіткій часовій схемі, зумовленій кінематикою горизонту подій:

1. **Заморожування (Епоха інфляції):** Фізичний простір розширюється прискорено ($a \propto e^{Ht}$), тоді як радіус Хаббла H^{-1} залишається практично сталим. Як наслідок, комодуляційні масштаби один за одним покидають горизонт ($\lambda_{\text{phys}} > H^{-1}$). У суперхаббловій зоні збурення кривини $\mathcal{R}_k$ стають константними (заморожуються) [8], повністю зберігаючи інформацію про локальну мікрофізику потенціалу $V(\phi)$.
2. **Розморожування (Постінфляційні епохи):** Після завершення інфляції Всесвіт розширюється сповільнено. За такої кінематики лінійний розмір горизонту Хаббла росте швидше за масштабний фактор. Збурення починають послідовно **повертатися в горизонт** (розморожуватися) [1]. При цьому першими всередину горизонту заходять малі масштаби (великі k), які вийшли з нього наприкінці інфляції, а значно пізніше — великі масштаби (малі k).

Повертаючись в горизонт, кожна мода стає джерелом для класичної еволюції неоднорідностей метрики та гідродинамічних коливань космічної плазми.

4 Метрика Фрідмана і збурення

Для опису реального неоднорідного Всесвіту, структура якого сформувалася з розглянутих у попередньому розділі квантових флуктуацій $\delta\phi$, необхідно вийти за межі ідеально симетричної фонові геометрії Фрідмана–Леметра–Робертсона–Вокера (FLRW). Малі відхилення метрики простору–

часу $\delta g_{\mu\nu}(\eta, \mathbf{x})$ від її фонового значення $\bar{g}_{\mu\nu}(\eta)$ класифікуються відповідно до їхньої поведінки під дією просторових обертань координатної системи.

Згідно з фундаментальною теоремою Стюарта–Вокера [9], будь-яке тензорне збурення на однорідному й ізотропному фоні однозначно розкладається на три *незалежні* компоненти (так званий SVT-розклад):

$$\delta g_{\mu\nu} = \delta g_{\mu\nu}^{(S)} + \delta g_{\mu\nu}^{(V)} + \delta g_{\mu\nu}^{(T)}. \quad (13)$$

Кожна з цих компонент еволюціонує у лінійному порядку теорії збурень повністю ізольовано, не взаємодіючи з іншими:

- **Скалярні збурення** ($\delta g_{\mu\nu}^{(S)}$): Параметризуються двома незалежними скалярними функціями простору й часу. Вони безпосередньо динамічно пов'язані з локальними флуктуаціями густини матерії $\delta\rho$. Саме скалярні збурення є причиною гравітаційної нестабільності, яка призводить до формування великомасштабної структури Всесвіту.
- **Векторні збурення** ($\delta g_{\mu\nu}^{(V)}$): Описують вихрові рухи космічного субстрату та моменти імпульсу. Оскільки у стандартній космологічній моделі відсутні джерела, здатні постійно підтримувати векторні поля, ці збурення швидко згасають у процесі розширення Всесвіту пропорційно a^{-2} і не відіграють суттєвої ролі у формуванні структури [1].
- **Тензорні збурення** ($\delta g_{\mu\nu}^{(T)}$): Представляють собою вільні поперечні безслідові деформації просторової метрики, які інтерпретуються як первинні стохастичні гравітаційні хвилі. Вони народжуються безпосередньо з квантових флуктуацій метрики під час інфляції і поширюються крізь Всесвіт, практично не взаємодіючи з речовиною.

4.1 Конформно-ньютонівське калібрування

Через загальну коваріантність рівнянь ЗТВ, математичний опис збурень містить фіктивні (калібрувальні) ступені вільності, зумовлені вибором системи координат. Для усунення цих артефактів та фіксації однозначного фізичного змісту ми використовуємо *конформно-ньютонівське калібрування* (також відоме як *поздовжнє*). У такій системі координат збурена метрика Всесвіту, що враховує скалярні потенціали та тензорні гравітаційні хвилі, записується у вигляді:

$$ds^2 = a(\eta)^2 \left[-(1 + 2\Phi) d\eta^2 + ((1 - 2\Psi) \delta_{ij} + h_{ij}) dx^i dx^j \right], \quad (14)$$

де функції $\Phi(\eta, \mathbf{x})$ та $\Psi(\eta, \mathbf{x})$ є безрозмірними калібрувально-інваріантними скалярними потенціалами Бардіна [8]. Кожен із доданків у виразі (14) має чітку фізичну інтерпретацію:

1. Φ — ньютонівський гравітаційний потенціал. Він визначає класичне прискорення пробних частинок і релятивістське зміщення частоти фотонів СМВ при їхньому проходженні крізь просторові неоднорідності.

2. Ψ — потенціал просторової кривини, що характеризує локальне ізотропне стиснення або розтягнення просторових гіперповерхонь. У межах загальної теорії відносності, за відсутності макроскопічного анізотропного напруження у космічному середовищі, просторовий та часовий потенціали є тотожними: $\Phi = \Psi$.
3. h_{ij} — тензорне збурення, яке задовольняє умови поперечності ($\partial^i h_{ij} = 0$) та безслідовості ($h^i_i = 0$). Воно описує два незалежні стани поляризації гравітаційних хвиль (h_+ та $h_\times$).

4.2 Динаміка первинних гравітаційних хвиль

Підстановка тензорної частини метрики (14) у лінеаризовані рівняння Айнштейна за відсутності джерел анізотропного тиску приводить до бездисипативного хвильового рівняння для кожної Фур'є-моди $h_{ij}(\eta, \mathbf{k})$:

$$h''_{ij} + 2\mathcal{H}h'_{ij} + k^2 h_{ij} = 0, \quad (15)$$

де штрих означає диференціювання за конформним часом η . Структура рівняння (15) ідентична до рівняння руху для флуктуацій скалярного поля, де роль коефіцієнта згасання (хабблівського тертя) відіграє конформний параметр Хаббла $\mathcal{H} = a'/a$.

Аналогічно до скалярних флуктуацій, квантування нульових коливань метрики під час інфляції у першому порядку теорії збурень визначає первинний спектр потужності тензорних збурень [10]:

$$\mathcal{P}_h(k) = \frac{2}{\pi^2 M_{\text{Pl}}^2} \left(\frac{H}{2\pi} \right)^2 = \frac{H^2}{\pi^2 M_{\text{Pl}}^2}. \quad (16)$$

Амплітуда тензорного спектра $\mathcal{P}_h(k)$ безпосередньо фіксує енергетичний масштаб інфляції ($V \propto H^2$), що робить експериментальний пошук первинних гравітаційних хвиль критично важливим для фізики надвисоких енергій.

Для кількісного зіставлення масштабів тензорних та скалярних збурень використовують *тензорно-скалярне відношення* r :

$$r \equiv \frac{\mathcal{P}_h(k_*)}{\mathcal{P}_{\mathcal{R}}(k_*)} = 16\varepsilon, \quad (17)$$

де ε — перший параметр повільного кочення, визначений у формулі (7), а k_* — опорний комодуляційний масштаб. Сучасні експерименти з вимірювання поляризації СМВ встановлюють жорстку верхню межу $r < 0.036$ [11], що накладає фундаментальні обмеження на амплітуду інфляційного потенціалу.

5 Реогрів і народження матерії

Після того як інфлатон скочується до мінімуму свого потенціалу $V(\phi)$, період експоненційного розширення простору завершується ($\varepsilon \rightarrow 1$). Проте

Всесвіт у цей момент перебуває у стані екстремально низької ентропії: він є абсолютно пустим, а вся його енергія зосереджена у формі однорідних класичних коливань поля ϕ навколо мінімуму потенціалу. Перехід від цієї «холодної» фази до гарячого Всесвіту, заповненого ультрарелятивістською плазмою у стані теплової рівноваги (що знаменує початок радіаційної епохи), описується теорією *реогріву* (reheating) [12, 13].

Динаміку цього процесу умовно поділяють на дві принципово різні стадії: допертурбативну (пререогрів) та пертурбативну (лінійний розпад).

5.1 Пререогрів та параметричний резонанс

На початковому етапі коливання інфлатона $\phi(t)$ навколо мінімуму потенціалу (наприклад, $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$) відбуваються з високою амплітудою. Якщо інфлатон квантово-механічно пов'язаний з іншими скалярними полями речовини χ (наприклад, через член взаємодії $g^2\phi^2\chi^2$), то рівняння руху для Фур'є-мод поля народжуваних часток χ_k набуває вигляду рівняння Мат'є [14, 15]:

$$\ddot{\chi}_k + 3H\dot{\chi}_k + [k_{\text{phys}}^2 + m_\chi^2 + g^2\Phi_0^2 \sin^2(mt)] \chi_k = 0, \quad (18)$$

де $\Phi_0(t)$ — амплітуда коливань інфлатона, яка поступово затухає через розширення Всесвіту.

Періодична зміна коефіцієнтів у рівнянні (18) призводить до ефекту *параметричного резонансу* у певних частотних діапазонах (зонах нестабільності). Цей процес отримав назву **пререогріву** (preheating). Замість повільного поштучного народження часток, тут відбувається експоненціально швидке, вибухове некогерентне народження квантів поля χ (так зване явище стимульованого випромінювання Бозе–Айнштейна). За лічені осциляції класичне поле інфлатона фрагментується, а густина енергії часток χ стрімко зростає.

5.2 Пертурбативний розпад та термалізація

Коли амплітуда коливань падає, параметричний резонанс вимикається, і подальша еволюція переходить у стадію повільного пертурбативного розпаду. Математично цей процес моделюється введенням феноменологічного члена загасання — швидкості розпаду інфлатона Γ_ϕ — безпосередньо у рівняння балансу енергії для густини інфлатона ρ_ϕ та народжуваної релятивістської плазми (радіації) ρ_r :

$$\dot{\rho}_\phi + 3H\rho_\phi = -\Gamma_\phi\rho_\phi, \quad (19)$$

$$\dot{\rho}_r + 4H\rho_r = +\Gamma_\phi\rho_\phi. \quad (20)$$

Усереднене за часом рівняння стану коливного інфлатона на дні параболічного потенціалу відповідає пилоподібній матерії ($w_\phi = 0$). Тому доки $H \gg \Gamma_\phi$, Всесвіт розширюється за законом матеріальної епохи ($a \propto t^{2/3}$), а густина енергії плазми підживлюється розпадом поля.

Процес закінчується, коли темп розширення Всесвіту зрівнюється зі швидкістю розпаду частинок: $H \sim \Gamma_\phi$. У цей момент залишки інфлатона майже

миттєво розпадаються, а релятивістські продукти розпаду за рахунок пружних та непружних процесів розсіяння зазнають швидкої *термалізації*, встановлюючи єдину температуру середовища.

Температура реогріву Всесвіту (T_{rh}): Визначається з умови $H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_r$ при $H \approx \Gamma_\phi$:

$$T_{\text{rh}} = \left(\frac{90}{8\pi^3 g_*} \right)^{1/4} \sqrt{M_{\text{Pl}} \Gamma_\phi}, \quad (21)$$

де $g_* \sim 100$ — ефективна кількість релятивістських ступенів вільності Стандартної моделі при надвисоких енергіях.

Значення T_{rh} є фундаментальним параметром для подальшої гарячої історії Всесвіту. Воно задає початкову температуру для баріогенезису, фазових переходів та термодинамічного загартування темної матерії. Що найважливіше для нашої моделі збурень — саме в цей момент гаряча фотон-баріонна плазма «успадковує» просторові неоднорідності кривини $\mathcal{R}_k$, які були згенеровані під час інфлятного зламу та «заморожені» на суперхабблових масштабах.

6 Акустичні коливання і СМВ

Після реогріву — гаряча плазма фотонів і баріонів. Нерівномірний розподіл густини від інфлатона стає початковим поштовхом. Тиск фотонів і гравітація породжують **акустичні коливання** — стоячі хвилі в плазмі.

При рекомбінації ($z \approx 1100$, вік $\approx 380\,000$ років) плазма охолола, фотони полетіли — коливання «заморозились». Масштаби що встигли зробити ціле число півперіодів дали **піки** на СМВ.

6.1 Спектр потужності СМВ

Зв'язок між первинним спектром і спостережуваним:

$$C_\ell = \int_0^\infty \frac{dk}{k} P(k) |\Delta_\ell(k)|^2$$

де $\Delta_\ell(k)$ — функція переносу (рахується числово в CAMB/CLASS).

6.2 Від метрики Фрідмана до кривої СМВ

Метрика FLRW через рівняння Фрідмана визначає два ключових масштаби, які керують положенням піків.

Звуковий горизонт — відстань, яку звукова хвиля пройшла в плазмі до рекомбінації η_* :

$$r_s(\eta_*) = \int_0^{\eta_*} c_s(\eta) d\eta, \quad c_s = \frac{c}{\sqrt{3(1+R)}}, \quad R = \frac{3\rho_b}{4\rho_\gamma}$$

де R — відношення барионної та фотонної густини (визначається параметром $\Omega_b h^2$).

Кутова відстань до поверхні останнього розсіяння:

$$d_A(\eta_*) = \int_{\eta_*}^{\eta_0} \frac{d\eta}{1+z}$$

залежить від H_0 , $\Omega_c h^2$, Ω_Λ .

Положення піків. Піки відповідають масштабам, що встигли зробити ціле число півперіодів коливань до рекомбінації:

$$\ell_m \approx m \frac{\pi d_A(\eta_*)}{r_s(\eta_*)}, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

Перший пік $\ell_1 \approx 220$ безпосередньо вимірює відношення d_A/r_s , тобто геометрію Всесвіту.

Акустичний осцилятор. Фотон-барионна рідина в гравітаційній ямі темної матерії описується рівнянням:

$$\Theta'' + \frac{\mathcal{H}(1-3c_s^2)}{1+R} \Theta' + k^2 c_s^2 \Theta = -k^2 \left(\Psi - \frac{\Phi''}{k^2 c_s^2} \right)$$

де $\Theta = \delta T/T$ — температурне збурення, Φ, Ψ — гравітаційні потенціали зі збуреної метрики FLRW. Звідси якісно: непарні піки (стиснення в ямі) вищі за парні — ефект барионного завантаження $R \propto \Omega_b h^2$; темна матерія поглиблює потенціальні ями, підсилюючи всі піки відносно плато.

Плато Закса-Вольфа ($\ell \lesssim 30$). Фотони при вильоті з потенціальної ями отримують гравітаційне червоне зміщення:

$$\left. \frac{\delta T}{T} \right|_{\text{sw}} \approx \frac{1}{3} \Phi(\eta_*) \Rightarrow \mathcal{D}_\ell^{\text{sw}} \approx \frac{A_s}{9} \frac{\ell(\ell+1)}{2\pi} \left(\frac{k}{k_*} \right)^{n_s-1} \Big|_{k \sim \ell/\eta_0}$$

При $n_s = 1$ плато горизонтальне; $n_s < 1$ дає легкий нахил — слід інфляції.

Загасання Силка ($\ell \gtrsim 1000$). Дифузія фотонів розмиває анізотропію на малих масштабах:

$$C_\ell \propto e^{-\ell^2/\ell_D^2}, \quad \ell_D \sim 1500.$$

Два шари інформації в одному знімку СМВ:

- **Нахил під піками** ($n_s \approx 0.965$) — натяк про інфляцію, відбиток форми потенціалу.
- **Самі піки** — акустика плазми, пізніша фізика.

6.3 Спектр температурних анізотропій СМВ

На рисунку 1 показано кутовий спектр потужності температурних анізотропій СМВ (ТТ-спектр):

$$\mathcal{D}_\ell^{TT} \equiv \frac{\ell(\ell+1)}{2\pi} C_\ell^{TT} \quad [\mu\text{K}^2]$$

Точки — збіновані дані Planck 2018 з 1σ похибками. Суцільна крива — теоретичне передбачення базової моделі Λ CDM, розраховане програмою CAMB з параметрами найкращого фіту Planck 2018 (таблиця 1).

Як параметри Λ CDM узгоджуються з кривою:

- $n_s < 1$ — нахил спектра на великих масштабах (плато не горизонтальне).
- $\Omega_b h^2$ — визначає відносну висоту парних і непарних піків (баріони підсилюють стиснення, гальмують розрідження).
- $\Omega_c h^2$ — зсуває положення піків і визначає форму між ними (темна матерія прискорює початок матеріальної епохи).
- H_0 — визначає кутовий масштаб звукового горизонту, тобто положення першого піку по ℓ .
- τ — гасить спектр при $\ell \gtrsim 10$ на рівні $e^{-2\tau}$.
- A_s — загальна вертикальна нормалізація всієї кривої.

Література

- [1] Planck Collaboration, *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*, A&A **641**, A6 (2020), arXiv:1807.06209.
- [2] BICEP/Keck Collaboration, *Improved Constraints on Primordial Gravitational Waves using Autospectra and Cross-Spectra with the WMAP and Planck*




Рис. 1: Кутовий ТТ-спектр потужності СМВ. Точки — дані Planck 2018 [planck2018params]. Крива — базова модель Λ CDM, розрахована CAMB з параметрами таблиці 1. Видно три акустичні піки та плато Закса-Вольфа на великих кутових масштабах ($\ell \lesssim 30$).

Таблиця 1: Параметри базової моделі Λ CDM — найкращий фіт Planck 2018 TT,TE,EE+lowE+lensing [**planck2018params**]. Шостий вільний параметр — A_s або σ_8 . Похідні: $\Omega_\Lambda = 1 - \Omega_b h^2/h^2 - \Omega_c h^2/h^2 \approx 0.685$, $\Omega_m \approx 0.315$.

Параметр	Позначення	Значення	Фізичний зміст
Стала Хаббла	H_0	67.36 ± 0.54 км/с/Мпк	темп розширення сьогодні
Барионна густина	$\Omega_b h^2$	0.02237 ± 0.00015	частка барионної матерії
Темна матерія	$\Omega_c h^2$	0.1200 ± 0.0012	частка холодної темної матерії
Оптична глибина	τ	0.0544 ± 0.0073	реіонізація Всесвіту
Амплітуда спектра	$\ln(10^{10} A_s)$	3.044 ± 0.014	«гучність» флуктуацій
Спектральний індекс	n_s	0.9649 ± 0.0042	нахил інфляційного спектра

Satellites, Phys. Rev. Lett. **127**, 151301 (2021), arXiv:2110.00483.

7 Поляризація СМВ

Механізм поляризації: розсіяння Томсона

Фотони поляризуються при останньому розсіянні на електронах. Томсонівське розсіяння поляризує фотон *лише* якщо навколо електрона існує **квадрупольна** температурна анізотропія: якщо температура однакова з усіх боків — поляризації немає.

Безпосередньо до рекомбінації фотонів і електронів ще достатньо для ізоτροпізації, тому квадруполь малий і поляризація слабка. Але під час самої рекомбінації ($\Delta z \sim 80$) оптична глибина падає швидко — квадруполь встигає вирости і поляризація «відбивається» в поверхні останнього розсіяння.

Напрямок поляризації залежить від **поперечного** перепаду температури навколо точки розсіяння.

Е- і В-моди

Поляризаційне поле $P_{ab}(\hat{n})$ на сфері розкладають на два типи (аналогічно до розкладу вектора на градієнт і ротор):

Тип	Джерело	Статус
Е-моди (градієнтний, симетричний візерунок)	Скалярні флуктуації	Виміряні
В-моди (ротаційний, закручений візерунок)	Тензорні флуктуації (GW)	Поки не знайдені

Чому скалярні збурення не дають В-мод? Скалярні збурення мають потенціальний (паритетно-парний) характер: $\Phi(\mathbf{x})$ визначає поле швидкостей $\mathbf{v} = \nabla\Phi$. Е-моди мають ту ж симетрію паритету — вони парні. В-моди псевдоскалярні (непарні), і лінійний скалярний збурення їх не генерує. Тензорне збурення h_{ij} має обидва стани, в тому числі непарний — звідси В-моди від гравітаційних хвиль. *Практичний забруднювач:* лінзування на великих масштабах перетворює Е-моди в В-моди — треба враховувати при пошуку первинних В-мод.

Знайти В-моди — означає отримати прямий доказ первинних гравітаційних хвиль і квантової природи гравітації в режимі малих збурень. Поточна верхня межа: $r < 0.036$ (95% CL, BICEP/Keck 2021).

8 Хаотична інфляція Лінде

Лінде (1983): початкове значення ϕ хаотичне — різне в різних точках простору. Найпростіший потенціал: $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$.

Де ϕ велике — інфляція іде довго, виникає величезна «бульбашка». Наш Всесвіт — одна з таких бульбашок. Інші бульбашки недсяжні — простір між ними розширюється швидше за світло. Це **вічна інфляція** і мультивсесвіт як математичний наслідок.

9 Наша задача: зламаний спектр і JWST

9.1 Мотивація

JWST знайшов масивні галактики при $z \sim 10-12$, яких у стандартній моделі бути не повинно — не вистачало часу утворитись.

9.2 Ідея

Якщо потенціал інфлатона має **сходінку**, м'яч сповільнюється — $\dot{\phi} \rightarrow 0$ — і флуктуації що заморожуються в цей момент мають більшу амплітуду. Зламаний спектр:

$$P(k) = A_s \left(\frac{k}{k_*} \right)^{n_s-1} \times \mathcal{F}(k; k_{\text{break}}, \Delta n)$$

Більше потужності на малих масштабах $k \gtrsim 1 \text{ Mpc}^{-1}$ — гало тієї самої маси утворюються **раніше** — узгоджується з JWST.

9.3 Чому не суперечить СМВ і σ_8

Planck чутливий до $k \lesssim 0.2 \text{ Мpc}^{-1}$ — злом не бачить. σ_8 визначається масштабом $\sim 8 \text{ Мpc}/h$, тобто $k \sim 0.1\text{--}0.5 \text{ Мpc}^{-1}$ — майже не змінюється.

9.4 План роботи

1. Огляд літератури: чи зроблено вже саме це поєднання.
2. Мінімальна модель: 2 нових параметри (k_{break} , Δn).
3. CAMB/CLASS: розрахунок $P(k)$, C_ℓ , σ_8 .
4. HMF (hmf, Python): порівняння з каталогами JWST.
5. MCMC (Cobaya): posterior по повному набору параметрів.
6. Стаття: чи є сумісна область параметрів для Planck + JWST + σ_8 .

Література

- ¹V. Mukhanov, *Physical Foundations of Cosmology* (Cambridge University Press, Cambridge, 2005), [10.1017/CB09780511790553](https://doi.org/10.1017/CB09780511790553).
- ²V. F. Mukhanov та G. V. Chibisov, “Quantum fluctuations and a nonsingular Universe”, *JETP Letters* **33**, [Pisma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 33 (1981) 549–553], 532–535 (1981).
- ³T. S. Bunch та P. C. W. Davies, “Quantum field theory in de Sitter space: Renormalization by point-splitting”, *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences* **360**, 117–134 (1978) [10.1098/rspa.1978.0060](https://doi.org/10.1098/rspa.1978.0060).
- ⁴S. W. Hawking, “The development of irregularities in a single bubble inflationary universe”, *Physics Letters B* **115**, 295–297 (1982) [10.1016/0370-2693\(82\)90373-2](https://doi.org/10.1016/0370-2693(82)90373-2).
- ⁵A. H. Guth та S.-Y. Pi, “Fluctuations in the New Inflationary Universe”, *Physical Review Letters* **49**, 1110–1113 (1982) [10.1103/PhysRevLett.49.1110](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.49.1110).
- ⁶G. W. Gibbons та S. W. Hawking, “Cosmological event horizons, thermodynamics, and particle creation”, *Physical Review D* **15**, 2738–2751 (1977) [10.1103/PhysRevD.15.2738](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.15.2738).
- ⁷S. W. Hawking, “Particle creation by black holes”, *Communications in Mathematical Physics* **43**, 199–220 (1975) [10.1007/BF02345020](https://doi.org/10.1007/BF02345020).
- ⁸J. M. Bardeen, “Gauge-invariant cosmological perturbations”, *Physical Review D* **22**, 1882–1905 (1980) [10.1103/PhysRevD.22.1882](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.22.1882).
- ⁹J. M. Stewart та M. Walker, “Perturbations of space-times in general relativity”, *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences* **341**, 49–74 (1974) [10.1098/rspa.1974.0172](https://doi.org/10.1098/rspa.1974.0172).
- ¹⁰A. A. Starobinsky, “Spectrum of relict gravitational radiation and the early state of the universe”, *JETP Letters* **30**, [Pisma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 30 (1979) 719–723], 682–681 (1979).

- ¹¹P. A. R. Ade et al. (BICEP/Keck), “BICEP / Keck XV: Constraints on Primordial Gravitational Waves Using Autospectra and Cross-Spectra with the WMAP and Planck Satellites”, [Physical Review Letters](#) **127**, 151301 (2021) [10.1103/PhysRevLett.127.151301](#), [arXiv:2110.00483 \[astro-ph.CO\]](#).
- ¹²A. D. Linde, “A new inflationary universe scenario: A possible solution of the horizon, flatness, homogeneity, isotropy and primordial monopole problems”, [Physics Letters B](#) **108**, 389—393 (1982) [10.1016/0370-2693\(82\)91219-9](#).
- ¹³A. Albrecht et al. P. J. Steinhardt, “Cosmology for Grand Unified Theories with Radiatively Induced Symmetry Breaking”, [Physical Review Letters](#) **48**, 1220—1223 (1982) [10.1103/PhysRevLett.48.1220](#).
- ¹⁴L. Kofman, A. D. Linde et al. A. A. Starobinsky, “Towards the theory of reheating after inflation”, [Physical Review Letters](#) **73**, 3195—3198 (1994) [10.1103/PhysRevLett.73.3195](#), [arXiv:hep-th/9405187](#).
- ¹⁵L. Kofman, A. D. Linde et al. A. A. Starobinsky, “Towards postinflationary reheating”, [Physical Review D](#) **56**, 3258—3295 (1997) [10.1103/PhysRevD.56.3258](#), [arXiv:hep-ph/9704452](#).