



$$\psi_k = \sum_{\mu} c_{\mu k} \chi_{\mu} \quad (\text{LCAO})$$

$$\hat{F} \varphi_i = \varepsilon_i \varphi_i$$

$$S_{\mu\nu} = \int \chi_{\mu}^*(\mathbf{r}) \chi_{\nu}(\mathbf{r}) d\mathbf{r}$$

С. М. Пономаренко

Квантово-механічні методи обчислення Використання PySCF

$$\left[-\frac{1}{2} \nabla_i^2 + \sum_{j \neq i} \frac{1}{r_{ij}} + V_{\text{nuc}}(i) \right] \varphi_i = \varepsilon_i \varphi_i$$
$$\Psi = \det \begin{pmatrix} \varphi_1(1) & \varphi_2(1) & \cdots & \varphi_N(1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_1(N) & \varphi_2(N) & \cdots & \varphi_N(N) \end{pmatrix}$$

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

С. М. Пономаренко

Квантово-механічні методи обчислення Використання PySCF

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як
навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за спеціальностями
Е6 «Прикладна фізика та наноматеріали»*

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2025

Зміст

1	Знайомство з PySCF	8
1.1	Що таке PySCF: можливості та переваги	8
1.1.1	Основні можливості PySCF	8
1.1.2	Переваги використання PySCF	8
1.1.3	Порівняння з іншими програмами	9
1.2	Встановлення PySCF	9
1.2.1	Системні вимоги	9
1.2.2	Встановлення в Linux	10
1.2.3	Встановлення в Windows	10
1.2.4	Встановлення в macOS	10
1.2.5	Перевірка встановлення	11
1.3	Базова структура програми на PySCF	11
1.3.1	Загальна схема розрахунку	11
1.3.2	Мінімальний приклад	11
1.3.3	Структура для атома Гелію	11
1.3.4	Розрахунок з аналізом результатів	11
1.4	Система одиниць та конвенції	11
1.4.1	Атомні одиниці	11
1.4.2	Конвертація одиниць	12
1.4.3	Системні константи	12
1.4.4	Конвенції для атомів	12
1.5	Документація та ресурси	12
1.5.1	Офіційна документація	12
1.5.2	Основні публікації	13
1.6	Резюме	13
2	Базові об'єкти PySCF	14
2.1	Молекулярний об'єкт (Mole)	14
2.1.1	Клас Mole — серце PySCF	14
2.1.2	Створення об'єкта Mole	14
2.1.3	Основні атрибути об'єкта Mole	15
2.1.4	Визначення атома: різні способи	16
2.1.5	Робота з іонами	16
2.1.6	Налаштування вербальності виводу	17

2.2	Базисні набори для атомів	17
2.2.1	Типи базисних наборів	17
2.2.2	Вибір базисного набору: рекомендації	19
2.2.3	Власні базисні набори	20
2.2.4	Комбінування базисів	20
2.2.5	Інформація про базисний набір	20
2.3	Симетрія в атомних розрахунках	20
2.3.1	Точкові групи симетрії атомів	21
2.3.2	Використання симетрії	21
2.3.3	Симетрія орбіталей	21
2.3.4	Коли вимикати симетрію	22
2.4	Спін та мультиплетність	22
2.4.1	Визначення спінового стану	22
2.4.2	Розподіл альфа- та бета-електронів	23
2.4.3	Вибір правильного спіну	23
2.4.4	Енергетичне підтвердження спінових станів	24
2.4.5	Практичні зауваження	24
2.5	Практичний приклад: комплексний аналіз атома	24
2.6	Корисні функції та методи	24
2.6.1	Інформація про атом	24
2.6.2	Маніпуляції з базисом	24
2.6.3	Енергетичні компоненти	24
2.6.4	Резюме	25
2.6.5	Контрольні запитання	25
2.6.6	Завдання для самостійної роботи	25

3 Метод Хартрі-Фока 26

3.1	Теоретичні основи методу Хартрі-Фока	26
3.1.1	Рівняння Хартрі-Фока	26
3.1.2	Енергія Хартрі-Фока	26
3.1.3	Матриця густини та енергетичні складові	27
3.1.4	Варіанти методу Хартрі-Фока	28
3.2	Розрахунок атома Гідрогену	29
3.2.1	Особливості одноелектронної системи	29
3.2.2	Залежність від базисного набору	29
3.2.3	Аналіз орбіталей	30
3.2.4	Висновки	31
3.3	Розрахунок атома Гелію	31
3.3.1	Двоелектронна система	31
3.3.2	Порівняння RHF та UHF	32
3.3.3	Збуджені стани Гелію	32
3.4	Атоми другого періоду (Li–Ne)	33
3.4.1	Літій (Li, Z=3)	33
3.4.2	Берилій (Be, Z=4)	34

3.4.3	Бор–Неон: систематичне дослідження	34
3.5	Аналіз енергій та орбіталей	36
3.5.1	Енергетична діаграма орбіталей	36
3.5.2	Енергії іонізації	36
3.5.3	Електронна густина та її інтерпретація	37
3.5.4	Порівняння електронних густин різних атомів	39
3.5.5	Зв'язок із електронними оболонками	39
3.5.6	Практичні завдання	40
3.5.7	Методичні рекомендації	41
3.6	Порівняння методів: RHF vs UHF vs ROHF	41
3.6.1	Спінове забруднення	42
3.6.2	Тестовий випадок: атом Вуглецю	44
3.7	Складні випадки та збіжність	45
3.7.1	Причини поганої збіжності	45
3.7.2	Перехідні метали	45
3.7.3	Вироджені орбіталі та дробові заповнення	46
3.7.4	Стратегія досягнення збіжності SCF	46
3.8	Резюме	48
3.8.1	Ключові висновки	48
4	Метод Хартрі-Фока для простих молекул	49
4.1	Орбіталі і електронні стани молекул	49
4.1.1	Класифікація молекулярних орбіталей	49
4.1.2	Класифікація електронних станів молекули	50
4.2	Початкові модельні молекули: H_2^+ та H_2	52
4.3	Іон молекули водню H_2^+	52
4.3.1	Теоретичні основи	52
4.3.2	Визначення молекули в PySCF	53
4.3.3	Інтерпретація результатів	53
4.3.4	Крива потенційної енергії (PES)	54
4.3.5	Оптимізація геометрії	55
4.3.6	Аналіз молекулярних орбіталей	56
4.3.7	Вплив базисного набору	57
4.4	Молекула водню H_2	58
4.4.1	Двоелектронна система	58
4.4.2	RHF розрахунок	58
4.5	Проблема дисоціації в методі Хартрі-Фока	58
4.5.1	Фізична картина	58
4.5.2	Візуалізація проблеми	59
4.5.3	Відсутність кореляції як джерело проблеми	60
4.6	Резюме	61

5	Теорія функціоналу густини (DFT)	62
5.1	Основи теорії функціоналу густини	62
5.1.1	Теореми Хоенберга–Кона	62
5.1.2	Рівняння Кона–Шема	62
5.1.3	Обмінно-кореляційна енергія	63
5.1.4	Порівняння HF та DFT	63
5.2	Функціонали обміну-кореляції	63
5.2.1	Класифікація функціоналів: драбина Якова	63
5.2.2	LDA та LSDA функціонали	64
5.2.3	GGA функціонали	64
5.2.4	Meta-GGA функціонали	65
5.2.5	Гібридні функціонали	65
5.2.6	Порівняння різних рівнів теорії	66
5.2.7	Вибір функціоналу: рекомендації	66
5.2.8	Практичний приклад: вплив функціоналу на властивості	66
5.3	DFT розрахунки атомів	67
5.3.1	Базова структура DFT розрахунку	67
5.3.2	Систематичний розрахунок атомів другого періоду . .	67
5.3.3	Розрахунок атомів перехідних металів	67
5.3.4	Порівняння спінових станів	67
5.3.5	Аналіз d-орбіталей перехідних металів	67
5.3.6	Розрахунок важких атомів	67
5.3.7	Числові сітки в DFT	68
5.3.8	Паралелізація DFT розрахунків	68
5.4	Порівняння HF та DFT результатів	68
5.4.1	Систематичне порівняння енергій	68
5.4.2	Порівняння енергій іонізації	68
5.4.3	Електронна спорідненість	68
5.4.4	Порівняння орбітальних енергій	68
5.4.5	Забруднення спіном: HF vs DFT	68
5.4.6	Час обчислень: HF vs DFT	68
5.4.7	Загальні висновки HF vs DFT	68
5.5	Вибір функціоналу для атомних систем	69
5.5.1	Тестовий набір даних	69
5.5.2	Рекомендації для різних елементів	69
5.6	Практичні завдання	70
5.6.1	Завдання 1: Систематичне дослідження	70
5.6.2	Завдання 2: Функціональна залежність	70
5.6.3	Завдання 3: Конвергенція до базисної межі	70
5.6.4	Завдання 4: Перехідні метали	70
5.7	Резюме	70
5.7.1	Ключові висновки	70
5.7.2	Типові помилки	71

5.7.3	Корисні посилання	71
5.8	DFT для діатомних молекул	71
5.8.1	Базові DFT розрахунки молекул	71
5.8.2	Оптимізація геометрії	71
5.8.3	Криві потенційної енергії	71
5.8.4	Порівняння функціоналів для зв'язків	72
5.8.5	Спектроскопічні константи	72
5.8.6	Гетероядерні молекули	72
5.8.7	Молекули з кратними зв'язками	72
5.8.8	Порівняння HF та DFT для молекул	72
5.8.9	Молекули перехідних металів	72
5.8.10	Відкритошкаралупні молекули	72
5.8.11	Дисперсійні корекції для слабких зв'язків	72
5.8.12	Аналіз хвильових функцій	73
5.8.13	Вплив базисного набору	73
5.8.14	Дисоціація зв'язків	73
5.8.15	Збуджені стани: TD-DFT	73
5.8.16	Порівняльна таблиця результатів	73
5.8.17	Практичні рекомендації	73
5.8.18	Типові помилки при розрахунках молекул	74
5.8.19	Задачі для самостійної роботи	74
5.8.20	Типові помилки при розрахунках молекул	75
5.8.21	Систематичне дослідження галогенів	75
5.8.22	Benchmark: час обчислень	75
5.8.23	Тестовий набір G2	76
5.8.24	Використання симетрії	76
5.8.25	Резюме секції	76

6 Пост-Хартрі-Фоківські методи 78

6.1	Вступ до електронної кореляції	78
6.1.1	Що таке електронна кореляція?	78
6.1.2	Типи електронної кореляції	78
6.1.3	Кореляційна енергія атомів	79
6.1.4	Коли потрібні post-HF методи?	79
6.1.5	Концепція одно- та багатоконфігураційних методів	80
6.2	Теорія збурень Møller–Plesset (MP2)	82
6.2.1	Теоретичні основи MP2	82
6.2.2	Формула енергії MP2	82
6.2.3	Фізичний зміст MP2-корекції	83
6.2.4	Практичне застосування	83
6.2.5	Практичний гайд: розрахунок MP2 у PySCF	83
6.2.6	Практичні аспекти та обчислювальна складність MP2	85
6.2.7	MP2 розрахунок атома Неону	86
6.2.8	MP2 для відкритих оболонок (UMP2)	86

6.2.9	Систематичне порівняння HF vs MP2	86
6.2.10	Залежність MP2 від базисного набору	86
6.2.11	Переваги та недоліки MP2	86
6.2.12	Рекомендації по використанню MP2	87
6.3	Coupled Cluster методи (CCSD, CCSD(T))	87
6.3.1	Теоретичні основи Coupled Cluster	87
6.3.2	CCSD розрахунок атома Гелію	88
6.3.3	CCSD для відкритих оболонок (UCCSD)	88
6.3.4	Порівняння ієрархії методів	88
6.3.5	T1 діагностика та багатоконфігураційний характер	88
6.3.6	Обчислювальна складність та масштабування	88
6.4	Configuration Interaction (CI) та Full CI	89
6.4.1	Основи Configuration Interaction	89
6.4.2	Full CI — точний розв’язок	89
6.4.3	CISD розрахунки	89
6.4.4	Порівняння CI та CC методів	89
6.4.5	Size-extensivity проблема CI	90
6.4.6	Коли використовувати CI vs CC	90
6.5	CASSCF — багатоконфігураційний метод	90
6.5.1	Ідея Complete Active Space Self-Consistent Field	90
6.5.2	Позначення CASSCF(n,m)	91
6.5.3	CASSCF розрахунок атома Берилію	91
6.5.4	CASSCF для перехідних металів	91
6.5.5	Вибір активного простору	91
6.5.6	State-averaged CASSCF	92
6.5.7	CASPT2 — динамічна кореляція поверх CASSCF	92
6.5.8	Переваги та недоліки CASSCF	92
6.5.9	Ієрархія методів	92
6.5.10	Важливість кореляції для різних властивостей	93
6.5.11	Порівняння методів для He	93
6.6	Практичні завдання	93
6.6.1	Завдання 1: Порівняння методів для He	93
6.7	Резюме	95
6.7.1	Основні методи та їх характеристики	95
6.7.2	Ключові висновки	96
6.7.3	Рекомендації по використанню	97
6.7.4	Типові помилки	97
6.7.5	Практичні поради	97
6.7.6	Обчислювальні ресурси	98
6.7.7	Подальше вивчення	98
6.7.8	Що далі?	98

1

Знайомство з PySCF

1.1. Що таке PySCF: можливості та переваги

PySCF (Python-based Simulations of Chemistry Framework) — це сучасний програмний пакет з відкритим вихідним кодом для квантово-хімічних розрахунків, написаний переважно на мові Python з критичними для продуктивності частинами на C. Розроблений групою під керівництвом професора Garnet Chan, PySCF надає потужний та гнучкий інструментарій для проведення *ab initio* розрахунків молекулярних та атомних систем.

1.1.1. Основні можливості PySCF

PySCF підтримує широкий спектр квантово-хімічних методів:

- *Метод Хартрі-Фока (HF)*: restricted (RHF), unrestricted (UHF), та restricted open-shell (ROHF) варіанти
- *Теорія функціоналу густини (DFT)*: з великою бібліотекою функціоналів обміну-кореляції через інтеграцію з `libxc`
- *Post-Hartree-Fock методи*: MP2, CCSD, CCSD(T), CASSCF, CASPT2, NEVPT2
- *Configuration Interaction (CI)*: CISD, full CI для малих систем
- *Явна кореляція*: F12 методи
- *Багаторівневі методи*: ONIOM, embedding
- *Періодичні системи*: через модуль PBC (Periodic Boundary Conditions)

1.1.2. Переваги використання PySCF

Відкритий код та безкоштовність. PySCF розповсюджується під ліцензією Apache 2.0, що робить його повністю безкоштовним для академічного та комерційного використання. Доступ до вихідного коду дозволяє глибоко зрозуміти реалізацію методів та за потреби модифікувати програму.

Гнучкість та розширюваність. Завдяки використанню Python як основної мови, PySCF надзвичайно гнучкий. Користувачі можуть легко:

- Комбінувати різні методи в одному скрипті.

- Створювати власні workflow для складних розрахунків.
- Інтегрувати PySCF з іншими Python бібліотеками (NumPy, SciPy, matplotlib).
- Розробляти власні модулі та методи.

Сучасна архітектура. PySCF використовує об'єктно-орієнтований підхід, що робить код зрозумілим та легким для модифікації. Модульна структура дозволяє використовувати тільки потрібні компоненти.

Активна розробка. Проект активно розвивається, регулярно додаються нові функції та покращується продуктивність. Спільнота користувачів надає підтримку через GitHub та форуми.

Продуктивність. Незважаючи на використання Python, критичні обчислювальні частини написані на C та оптимізовані. PySCF ефективно використовує сучасні бібліотеки лінійної алгебри (BLAS, LAPACK) та може працювати на багатоядерних системах.

1.1.3. Порівняння з іншими програмами

У таблиці 1.1 наведено порівняння PySCF з іншими популярними квантово-хімічними пакетами.

Таблиця 1.1. Порівняння квантово-хімічних програм

Програма	Ліцензія	Мова	Гнучкість	Навчання
PySCF	Відкрита	Python/C	Висока	Середнє
Gaussian	Комерційна	Fortran	Низька	Легке
ORCA	Академічна	C++	Середня	Легке
Q-Chem	Комерційна	C/C++	Середня	Середнє
Psi4	Відкрита	C++/Python	Висока	Середнє

1.2. Встановлення PySCF

1.2.1. Системні вимоги

Для роботи з PySCF необхідно:

- Python 3.7 або новіший
- NumPy версії 1.13.0 або новішої
- SciPy версії 1.0.0 або новішої
- H5py (для збереження великих масивів даних)
- 4–8 ГБ оперативної пам'яті (мінімум)

1. Знайомство з PySCF

- Сучасний процесор (бажано багатоядерний)

1.2.2. Встановлення в Linux

Найпростіший спосіб встановлення PySCF у Linux — використання `pip`:

```
# Оновлення pip
pip install --upgrade pip

# Встановлення PySCF
pip install pyscf
```

Для встановлення з додатковими можливостями:

```
# з підтримкою XC функціоналів
pip install pyscf[geomopt,dftd3,dmrgscf]
```

Альтернативно, можна встановити з вихідного коду:

```
git clone https://github.com/pyscf/pyscf.git
cd pyscf
pip install -e .
```

1.2.3. Встановлення в Windows

Для Windows рекомендується використання Anaconda:

```
# Створення нового середовища
conda create -n pyscf_env python=3.10
conda activate pyscf_env

# Встановлення PySCF
conda install -c pyscf pyscf
```

1.2.4. Встановлення в macOS

Для macOS процес аналогічний до Linux:

```
# Встановлення через pip
pip3 install pyscf

# Або через Homebrew + pip
brew install python3
pip3 install pyscf
```

1.2.5. Перевірка встановлення

Після встановлення перевіримо, чи PySCF працює коректно:

Посилання на файл: [code_1.py](#)

Якщо програма виводить версію та обчислює енергію молекули H_2 , встановлення виконано успішно.

1.3. Базова структура програми на PySCF

1.3.1. Загальна схема розрахунку

Типовий розрахунок у PySCF складається з трьох основних етапів:

1. **Створення молекулярного об'єкта** — визначення геометрії системи, базисного набору, заряду та спіну
2. **Вибір та налаштування методу** — вибір квантово-хімічного методу (HF, DFT, CC тощо)
3. **Виконання розрахунку** — запуск обчислень та отримання результатів

1.3.2. Мінімальний приклад

Розглянемо найпростіший приклад розрахунку атома Гідрогену:

Посилання на файл: [code_2.py](#)

1.3.3. Структура для атома Гелію

Для атома з двома електронами у замкненій оболонці:

Посилання на файл: [code_3.py](#)

1.3.4. Розрахунок з аналізом результатів

Більш детальний приклад з виведенням додаткової інформації:

Посилання на файл: [code_4.py](#)

1.4. Система одиниць та конвенції

1.4.1. Атомні одиниці

PySCF використовує атомну систему одиниць (atomic units, a.u.), де:

$$\begin{aligned}\hbar &= 1 \\ m_e &= 1 \quad (\text{маса електрона}) \\ e &= 1 \quad (\text{елементарний заряд}) \\ 4\pi\epsilon_0 &= 1 \quad (\text{електрична константа})\end{aligned}$$

У цій системі:

- Енергія вимірюється в Hartree (Ha): $1 \text{ Ha} = 27.211386 \text{ eV} = 627.509 \text{ kcal/mol}$
- Відстань вимірюється в Bohr (a_0): $1 \text{ Bohr} = 0.529177 \text{ \AA}$
- Час вимірюється у а.о.: $1 \text{ a.u.} = 2.4189 \times 10^{-17} \text{ s}$

1.4.2. Конвертація одиниць

PySCF надає модуль для конвертації:

Посилання на файл: [code_5.py](#)

1.4.3. Системні константи

Доступ до фізичних констант:

Посилання на файл: [code_6.py](#)

1.4.4. Конвенції для атомів

При визначенні атомів у PySCF:

Координати. Координати задаються у формі рядка або списку. За замовчуванням використовуються ангстрєми ($\text{\AA}$), але можна вказати одиниці:

Посилання на файл: [code_7.py](#)

Спін. Параметр `spin` визначає $2S = N_\alpha - N_\beta$, де N_α та N_β — кількість альфа та бета електронів:

Посилання на файл: [code_8.py](#)

Симетрія. За замовчуванням PySCF використовує повну точкову симетрію системи:

Посилання на файл: [code_9.py](#)

1.5. Документація та ресурси

1.5.1. Офіційна документація

Ресурс	URL
Головний сайт	https://pyscf.org
GitHub репозиторій	https://github.com/pyscf/pyscf
Документація API	https://pyscf.org/pyscf_api_docs/pyscf.html
Приклади коду	https://github.com/pyscf/pyscf/tree/master/examples

1.5.2. Основні публікації

Ключові статті для цитування при використанні PySCF:

1. PySCF: the Python-based simulations of chemistry framework / Q. Sun [et al.] // Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science. — 2018. — Vol. 8, no. 1. — e1340. — DOI: [10.1002/wcms.1340](https://doi.org/10.1002/wcms.1340).
2. Recent developments in the PySCF program package / Q. Sun [et al.] // Journal of Chemical Physics. — 2020. — Vol. 153, no. 2. — P. 024109. — DOI: [10.1063/5.0006074](https://doi.org/10.1063/5.0006074).

1.6. Резюме

У цьому розділі ми познайомились з PySCF — потужним інструментом для квантово-хімічних розрахунків. Основні моменти:

- PySCF є сучасним, відкритим та гнучким програмним пакетом.
- Встановлення здійснюється просто через **pip** або **conda**.
- Базова структура програми включає три етапи: створення системи, вибір методу, виконання розрахунку
- PySCF використовує атомну систему одиниць.
- Доступна велика кількість документації та навчальних матеріалів.

У наступному розділі ми детально розглянемо базові об'єкти PySCF та навчимося налаштовувати параметри розрахунків для атомних систем.

2

Базові об'єкти PySCF

2.1. Молекулярний об'єкт (Mole)

2.1.1. Клас Mole — серце PySCF

Клас `gto.Mole` є центральним об'єктом у бібліотеці **PySCF** (Python-based Simulations of Chemistry Framework). Цей клас визначає і зберігає всю інформацію про атомну або молекулярну систему, яка необхідна для квантово-хімічних розрахунків. Саме з нього починається будь-який проєкт у PySCF, адже всі інші модулі (SCF, DFT, MP2, CCSD тощо) працюють із вже побудованим об'єктом `Mole`.

Об'єкт `Mole` містить такі основні дані:

- **Геометрію системи** — координати атомів у просторі (в ангстремах або борах);
- **Базисний набір** — набір функцій, на яких розкладаються молекулярні орбіталі;
- **Заряд системи та спин** (мультиплетність);
- **Інформацію про симетрію** (за потреби);
- **Одиниці вимірювання** (ангстрем, бори).

Таким чином, `Mole` виконує роль «серця» всієї програми — воно зберігає стан квантової системи і передає цю інформацію до інших підсистем для проведення обчислень.

2.1.2. Створення об'єкта Mole

Існує два основні способи створення молекулярного об'єкта: або за допомогою скороченого конструктора, або покроково. Обидва підходи рівноцінні за результатом, однак відрізняються стилем запису.

Метод 1: Використання конструктора `Mole()` Цей спосіб є найзручнішим для простих систем, коли всі параметри можна вказати безпосередньо при створенні об'єкта:

Посилання на файл: [MoleCreationMethod1.py](#)

Тут:

- `atom='Li 0 0 0'` — визначає атом літію в координатах (0, 0, 0);
- `basis='6-31g'` — вказує базисний набір для розрахунків;
- `charge=0` — нейтральний атом;
- `spin=1` — означає, що система має $2S = 1$, тобто один неспарений електрон.

Функція `gto.Mole()` автоматично створює об'єкт, налаштовує всі параметри та викликає `.build()`.

Метод 2: Покрокове налаштування Цей спосіб зручний для складних систем, де потрібно задати багато параметрів або змінювати їх під час роботи:

Посилання на файл: [MoleCreationMethod2.py](#)

Важливо: При використанні другого методу обов'язково викликати команду `mol.build()`, інакше PySCF не згенерує внутрішні структури (матриці, орбіталі, таблиці інтегралів тощо), необхідні для подальших розрахунків.

2.1.3. Основні атрибути об'єкта Mole

Після побудови об'єкта можна отримати детальну інформацію про систему. Ось приклад, який демонструє найпоширеніші атрибути:

Посилання на файл: [SystemMainInfo.py](#)

Ці атрибути особливо важливі для перевірки, чи правильно задані всі вхідні параметри перед запуском складних обчислень.

- `mol.nelectron` — кількість електронів у системі;
- `mol.charge` — сумарний заряд системи;
- `mol.spin` — подвоєне значення спіну ($2S$);
- `mol.nao_nr()` — кількість базисних орбіталей (число функцій, які будуть використані в обчисленнях);
- `mol.nelec` — кортеж `(n_alpha, n_beta)` з кількістю альфа- та бета-електронів;
- `mol.natm` — кількість атомів у системі;
- `mol.atom_charges()` — масив ядерних зарядів;
- `mol.basis` — опис обраного базисного набору.

Типовий вивід програми для атома кисню:

```
Кількість електронів: 8
Заряд: 0
Спін (2S): 2
Кількість базисних функцій: 18
Альфа електронів: 5
Бета електронів: 3
Кількість атомів: 1
Заряди ядер: [8.]
Назва базису: 6-31g
```

Такий вивід дозволяє переконатися, що система побудована коректно, а параметри відповідають фізичному змісту задачі. Наприклад, у цьому

випадку маємо нейтральний атом кисню ($Z = 8$, $N_e = 8$), у якого спин $S = 1$ (два неспарені електрони).

Після побудови об'єкта `Mole` його можна передавати до будь-яких методів PySCF — від найпростіших `SCF` до корельованих методів `CCSD`, `CASCI` та інших. Тому розуміння структури і властивостей цього класу є ключем до ефективного використання всієї бібліотеки.

2.1.4. Визначення атома: різні способи

Визначення атома або атомів — це перший крок при побудові квантово-хімічної моделі. У PySCF координати та типи атомів можна задавати кількома способами. Усі вони приводять до одного й того ж результату, тому вибір форми запису залежить лише від зручності.

Спосіб 1: Рядок Цей варіант є найпростішим і найчастіше використовується для одиночних атомів або малих систем. Формат: `<атом> x y z`, де координати задаються в ангстремах за замовчуванням (або в борах, якщо `unit='Bohr'`).

Посилання на файл: [AtomDefinitionWay1.py](#)

Як видно, PySCF дозволяє вказувати елемент як за його хімічним символом, так і за атомним номером. У другому випадку він автоматично розпізнає елемент періодичної системи.

Спосіб 2: Список або кортеж Якщо потрібно задати кілька атомів, або якщо координати отримуються програмно (наприклад, з масиву), зручно використовувати структуру даних типу `list` або `tuple`. Кожен атом описується як пара: `[ім'я, (x, y, z)]`.

Посилання на файл: [AtomDefinitionWay2.py](#)

Така форма є більш універсальною — вона дозволяє легко зчитувати геометрію з файлів, генерувати координати циклом або будувати складні молекули. Наприклад, молекула водню H_2 може бути задана як:

```
atom = [['H', (0, 0, 0)], ['H', (0, 0, 0.74)]]
```

де відстань у 0.74 Å відповідає типовій довжині зв'язку Н–Н.

2.1.5. Робота з іонами

Клас `Mole` дозволяє легко моделювати заряджені системи — катіони та аніони. Для цього достатньо змінити параметр `charge`, який визначає сумарний заряд системи:

$$Q = Z_{\text{ядер}} - N_{\text{електронів}}$$

Крім того, слід відповідно скоригувати `spin`, який задає подвоєне значення спіну $2S$. Для нейтральних атомів значення спіну зазвичай відповідає їхній електронній конфігурації.

Посилання на файл: [IonsExample.py](#)

У цьому прикладі можна побачити, як зміна заряду впливає на кількість електронів:

- Нейтральний атом Li має 3 електрони;
- Катіон Li — 2 електрони (втратив один);
- Аніон Li⁻ — 4 електрони (отримав додатковий).

Такі прості зміни параметрів дозволяють вивчати іонізаційні енергії, електронну спорідненість, а також порівнювати властивості нейтральних і заряджених систем.

2.1.6. Налаштування вербальності виводу

PySCF має вбудований механізм керування докладністю текстового виводу (тобто «балакучістю» програми). Це зручно, коли потрібно або бачити повну діагностику, або, навпаки, приховати проміжні повідомлення при пакетних розрахунках.

Рівень керується параметром `verbose`:

0 = тихо, 4 = стандартно, 9 = детально (debug)

Посилання на файл: [VerbosityExample.py](#)

У практиці рекомендується:

- Використовувати `verbose=4` для навчальних цілей, щоб бачити хід побудови базису та інтегралів;
- Використовувати `verbose=0` або `1` при серійному запуску розрахунків на кластері, щоб уникнути перевантаження логів;
- Для діагностики чи налагодження коду — `verbose=7-9`, що дає максимально деталізований вивід.

Таким чином, параметр `verbose` дозволяє зручно регулювати ступінь деталізації повідомлень під час обчислень, роблячи роботу з PySCF більш контрольованою і зручною як для навчання, так і для автоматизованих досліджень.

2.2. Базисні набори для атомів

2.2.1. Типи базисних наборів

У методах квантової хімії атомні орбіталі представлені не аналітичними розв'язками рівняння Шредінгера, а певними апроксимаціями — **базисними функціями**. Сукупність цих функцій для всіх атомів системи називається **базисним набором** (basis set).

Базис задає, скільки функцій використовується для опису кожної орбіталі (1s, 2p, 3d, ...), та яку форму вони мають (наприклад, гаусівські чи слейтерівські орбіталі). Від вибору базисного набору залежить баланс між швидкістю розрахунку та точністю енергії.

У PySCF базис задається через параметр `basis='...'`, і можна використовувати як стандартні бібліотечні набори, так і власні, створені вручну.

Мінімальні базиси

Мінімальний базис — це найпростіший опис, коли на кожну атомну орбіталь використовується рівно одна базисна функція. Наприклад, для атома вуглецю (1s, 2s, 2p) це всього п'ять функцій.

```
# STO-3G - найпростіший базис
mol = gto.M(atom='C 0 0 0', basis='sto-3g')
print(f'Кількість базисних функцій: {mol.nao_nr()}')
# Вивід: 5 (1s, 2s, 2px, 2py, 2pz)
```

STO-3G означає, що кожна орбіталь Слейтера апроксимується сумою трьох гаусівських функцій. Такі базиси часто використовують для тестів і навчальних цілей, але вони не забезпечують точних енергій — похибка порівняно з великими базисами може сягати десятків кДж/моль.

Валентно-розчеплені базиси

Більш точні обчислення вимагають **розщеплення валентних орбіталей**, щоб кожна з них могла гнучко адаптуватися під різні типи хімічних зв'язків. Так з'являються базиси типу 6-31G, 6-311G тощо.

Посилання на файл: [ValenceSplitBasisExample.py](#)

Позначення 6-31G читається так:

- 6 гаусів використовуються для опису внутрішніх орбіталей (core);
- валентна частина описується двома групами функцій: 3 і 1.

Додаткові символи мають такі значення:

- * — додає поляризаційні *d*-функції на важких атомах;
- ** — додає *d*-функції на важких і *p*-функції на водні атоми.

Ці функції дозволяють орбіталям деформуватися під дією хімічного оточення — завдяки цьому значно поліпшується опис зв'язків та дипольних моментів.

Кореляційно-послідовні базиси

Для кореляційних методів (MP2, CCSD, CI тощо) часто використовують сімейство Dunning'a — cc-pVXZ, де X = D, T, Q, 5, 6 (double-, triple-,

quadruple-, quintuple-zeta). Ці базиси систематично покращують опис хвильової функції й дозволяють проводити екстраполяцію до межі повного базису (CBS-limit).

Посилання на файл: [CorrelationConsistentBasisExample.py](#)

Префікс **aug-** означає додавання **дифузних функцій** — функцій з малим експоненційним коефіцієнтом, що описують електрони, віддалені від ядра. Такі базиси обов'язкові для аніонів, збуджених станів та слабких взаємодій (ван-дер-ваальсових систем).

def2 базиси

Базиси типу **def2** — це сучасні розробки групи Карла Ахрікса, оптимізовані для широкого спектру елементів (до лантаноїдів) і дуже добре збалансовані для методів DFT.

Посилання на файл: [Def2BasisExample.py](#)

Позначення:

- **SVP** — Split-Valence Polarized (валентно-розщеплений, з поляризацією);
- **TZVP** — Triple-Zeta, більш гнучкий опис;
- **QZVP** — Quadruple-Zeta, для високоточної роботи.

Базиси **def2** часто використовуються разом з **ефективними псевдопотенціалами (ЕСР)**, які враховують релятивістські ефекти у важких елементах.

2.2.2. Вибір базисного набору: рекомендації

Вибір базису — це завжди компроміс між швидкістю й точністю. Загальні рекомендації наведено в Таблиці 2.1.

Таблиця 2.1. Рекомендовані базисні набори для різних задач

Задача	Базис	Коментар
Тестові розрахунки	sto-3g, 3-21g	Дуже швидко, але грубо
Якісні результати	6-31g*, 6-31g**	Оптимальний баланс точність/швидкість
Точні енергії	cc-pVTZ, cc-pVQZ	Для екстраполяції до межі базису
Аніони, збуджені стани	aug-cc-pVDZ	Потрібні дифузні функції
Важкі атоми	def2-TZVP	Добре враховує релятивістські ефекти
Дослідницькі розрахунки	cc-pVDZ	Надійний старт для систем середнього розміру

2.2.3. Власні базисні набори

Іноді потрібно створити власний базис (наприклад, для навчання або тестування гібридних моделей). PySCF дозволяє явно задавати коефіцієнти та експоненти базисних функцій через `gto.basis.parse()`.

Посилання на файл: [CustomBasisExample.py](#)

У цьому прикладі явно визначено два набори s -функцій із різними коефіцієнтами. Так можна створювати спеціалізовані базиси для навчання або розширення стандартних наборів.

2.2.4. Комбінування базисів

PySCF підтримує **гібридні базиси** — різні для різних атомів у тій самій системі. Це корисно, коли потрібно зменшити обчислювальні витрати, наприклад, використовуючи спрощений базис для водню, а розширений — для важчих атомів.

Посилання на файл: [CombiningBasesExample.py](#)

У результаті PySCF автоматично комбінує обидва базиси при побудові молекулярних орбіталей.

2.2.5. Інформація про базисний набір

Іноді потрібно дослідити, які саме функції використовуються у вибраному базисі — їхні типи, кількість та мітки. Для цього можна скористатися внутрішніми структурами об'єкта `Mole`.

Посилання на файл: [BasisSetInfo.py](#)

Так можна отримати повну структуру базису — скільки функцій кожного типу (s , p , d), які індекси мають їхні атомні орбіталі, та як вони нумеруються в PySCF. Ця інформація важлива при аналізі орбіталей, побудові щільності або інтегралів.

2.3. Симетрія в атомних розрахунках

Симетрія відіграє ключову роль у квантово-хімічних розрахунках. Вона дозволяє:

- скоротити обчислювальні витрати (менше інтегралів та менші матриці),
- розпізнавати вироджені орбіталі та їх симетрійні властивості,
- аналізувати структуру електронних станів через іррепи (незвідні представлення),
- уникати «зайвих» розв'язків при самоузгодженні.

У PySCF симетрія автоматично враховується при побудові молекулярного об'єкта, якщо активувати опцію `symmetry=True`. Для атомів сферична симетрія апроксимується підгрупами типу D_{2h} , що сумісні з декартовими координатами.

2.3.1. Точкові групи симетрії атомів

Ізольований атом у строгому сенсі має повну сферичну симетрію $SO(3)$. Однак у PySCF, через використання декартових базисних функцій, використовується одна з підгруп, зазвичай D_{2h} . Це дає змогу використовувати блокову структуру матриць і автоматично класифікувати орбіталі за іррепами.

Посилання на файл: [SymmetryPointGroupsExample.py](#)

Пояснення:

- `groupname` — ідентифікатор підгрупи (наприклад, D_{2h} , C_{2v} , C_s);
- `topgroup` — вища група симетрії, до якої належить дана підгрупа.

2.3.2. Використання симетрії

Симетрія допомагає прискорити розрахунок, оскільки гамільтоніан та інші оператори блокуються відповідно до іррепів. Тобто інтеграли між функціями з різних симетрій не обчислюються — що значно зменшує обсяг роботи.

Посилання на файл: [UsingSymmetryExample.py](#)

Коментар: Різниця в енергіях практично нульова (обидва методи еквівалентні з фізичної точки зору), але симетрійний розрахунок потребує значно менше часу і пам'яті.

2.3.3. Симетрія орбіталей

PySCF автоматично визначає симетрійні властивості орбіталей після розрахунку. Це особливо корисно для аналізу заповнених і віртуальних рівнів, побудови діаграм енергетичних рівнів та порівняння з експериментом.

Посилання на файл: [OrbitalSymmetryExample.py](#)

Коментарі:

- `mol.irrep_name` — список назв іррепів¹;
- `mol.symm_orb` — матриці симетричних орбіталей;
- `label_orb_symm()` — функція, що відображає орбіталі у відповідні іррепи;
- `get_orbsym()` — отримує симетрії молекулярних орбіталей з урахуванням побудованих коефіцієнтів.

Це дає змогу, наприклад, визначити які орбіталі мають однакову симетрію, а які не взаємодіють між собою.

¹Незвідне представлення (irrep) — фундаментальне поняття теорії груп, що описує, як функція (зокрема молекулярна орбіталь) трансформується під дією операцій симетрії молекули. Кожне ірредуцибельне представлення відповідає певному типу симетрії: наприклад, для групи C_{2v} це A_1 , A_2 , B_1 , B_2 , а для групи D_{2h} — A_g , B_{1g} , B_{2g} , B_{3g} , A_u , B_{1u} , B_{2u} , B_{3u} . Всі орбіталі, що належать до одного й того ж ірреп, мають однакову симетрію і можуть змішуватися між собою, тоді як орбіталі різних ірреп не взаємодіють.

2.3.4. Коли вимикати симетрію

Хоча симетрія зазвичай корисна, існують ситуації, коли її слід **вимкнути**:

- При моделюванні **збуджених станів**, які порушують симетрію основного стану.
- При побудові **поверхонь потенційної енергії (PES)**, де геометрія змінюється і симетрія зникає.
- Якщо виникають **проблеми з конвергенцією** — часто через жорсткі симетрійні обмеження.
- Коли необхідно вручну **змінювати орбіталі** або аналізувати змішування між різними симетріями.

У таких випадках достатньо задати:

```
mol = gto.M(atom='...', basis='...', symmetry=False)
```

Підсумок: Використання симетрії — це не лише «оптимізація швидкості», а й **фізично обґрунтований підхід**, що дозволяє зрозуміти структуру електронних рівнів, виродження та природу хімічних зв'язків.

2.4. Спін та мультиплетність

2.4.1. Визначення спінового стану

У квантовій хімії поняття спіну має фундаментальне значення. Кожен електрон характеризується спіном $s = \frac{1}{2}$, тобто він може перебувати в одному з двох можливих спінових станів — «вгору» (α) або «вниз» (β).

Для багаточастинкової системи повний спін S визначається як векторна сума спінів усіх електронів. У більшості практичних розрахунків нас цікавить тільки величина S (а не його напрям).

В PySCF параметр `spin` задає величину $2S$, тобто різницю між кількістю α - та β -електронів:

$$2S = N_{\alpha} - N_{\beta} \quad (2.1)$$

Звідси:

$$S = \frac{N_{\alpha} - N_{\beta}}{2}, \quad M = 2S + 1$$

де M — мультиплетність (кількість можливих орієнтацій спіну системи в магнітному полі).

- $S = 0 \Rightarrow$ синглет ($M = 1$)
- $S = \frac{1}{2} \Rightarrow$ дублет ($M = 2$)
- $S = 1 \Rightarrow$ триплет ($M = 3$)
- $S = \frac{3}{2} \Rightarrow$ квартет ($M = 4$)

Посилання на файл: [SpinExamples.py](#)

Цей код створює атомні молекули з різними значеннями параметра `spin`. В об'єкті `mol.nelec` PySCF зберігає кортеж (N_α, N_β) , що дозволяє контролювати спінову структуру системи.

2.4.2. Розподіл альфа- та бета-електронів

У багатоспінових системах важливо знати, як електрони розподілені за спіновими підрівнями. В PySCF ця інформація визначається автоматично на основі параметра `spin`, однак її можна перевірити вручну.

Посилання на файл: [PrintElectronConfig.py](#)

Ця функція показує, як саме PySCF обчислює кількість α - та β -електронів. Наприклад, для нейтрального атома кисню ($Z = 8$) маємо 8 електронів. При $2S = 2$ отримаємо:

$$N_\alpha = 5, \quad N_\beta = 3$$

тобто два неспарені електрони — саме це відповідає триплетному стану (3P).

2.4.3. Вибір правильного спіну

Необхідно завжди задавати правильний спін для основного стану атома або молекули, інакше SCF-процедура може не збігатися або дати фізично некоректний результат.

Правильне значення S визначається на основі *правил Хунда*:

1. Електрони займають орбіталі так, щоб сумарний спін S був максимальним.
2. Для даного S максимізується орбітальний момент L .
3. Для менш ніж напівзаповненої оболонки найнижчий рівень має $J = |L - S|$, а для більш ніж напівзаповненої — $J = L + S$.

Для атомів другого періоду ці правила дають такі основні стани:

Таблиця 2.2. Основні спінові стани атомів другого періоду

Атом	Конфігурація	Терм	S	2S
Li	[He] 2s ¹	² S	1/2	1
Be	[He] 2s ²	¹ S	0	0
B	[He] 2s ² 2p ¹	² P	1/2	1
C	[He] 2s ² 2p ²	³ P	1	2
N	[He] 2s ² 2p ³	⁴ S	3/2	3
O	[He] 2s ² 2p ⁴	³ P	1	2
F	[He] 2s ² 2p ⁵	² P	1/2	1
Ne	[He] 2s ² 2p ⁶	¹ S	0	0

2.4.4. Енергетичне підтвердження спінових станів

Нижче наведено код, який обчислює енергії атомів другого періоду для їхніх правильних спінових станів. Для відкрито-оболонкових систем (`spin > 0`) використовується UHF (неспарені електрони), а для синглетів (`spin = 0`) — RHF.

Посилання на файл: [EnergyConfirmation2ndPeriod.py](#)

Результати дозволяють перевірити, що обраний спіновий стан дійсно відповідає мінімуму енергії для даного атома. Якщо спробувати змінити `spin`, наприклад для атома азоту задати `spin=1`, отримаємо енергію вищу на кілька десятків міліГартрі — тобто триплет виявиться збудженим станом відносно правильного к्वартету.

2.4.5. Практичні зауваження

- У PySCF спін задається *на всю систему*, тому при моделюванні молекул потрібно враховувати сумарний спін усіх атомів.
- Для молекул із непарним числом електронів (odd number of electrons) `spin` завжди має бути непарним.
- Неправильно заданий спін часто призводить до SCF not converged.
- При використанні DFT (наприклад, `scf.UKS`) параметр `spin` також впливає на спінову поляризацію густини.

2.5. Практичний приклад: комплексний аналіз атома

Розглянемо повний приклад аналізу атома з використанням всіх описаних концепцій:

Посилання на файл: [AtomComplexAnalysis.py](#)

2.6. Корисні функції та методи

2.6.1. Інформація про атом

Посилання на файл: [AtomInfoExample.py](#)

2.6.2. Маніпуляції з базисом

Посилання на файл: [BasisManipulations.py](#)

2.6.3. Енергетичні компоненти

Посилання на файл: [EnergyComponents.py](#)

2.6.4. Резюме

- **Клас Mole** — центральний об'єкт, що містить всю інформацію про систему.
- **Базисні набори** — від мінімальних (STO-3G) до великих (cc-pVQZ); вибір залежить від задачі та компромісу точність/вартість.
- **Симетрія** — прискорює розрахунки, але може обмежувати гнучкість при спонтанному руйнуванні симетрії.
- **Спін** — критичний параметр для правильного опису основного стану відкрито-оболонкових систем.

2.6.5. Контрольні запитання

1. Яка різниця між методами створення об'єкта Mole через `gto.M()` та покроково?
2. Чому для атома Карбону у основному стані використовується `spin=2`?
3. Коли слід використовувати дифузні функції (aug- базиси)?
4. Що означає параметр `conv_tol` і як він впливає на точність?
5. Які методи початкового наближення найкраще підходять для атомів?

2.6.6. Завдання для самостійної роботи

1. Створіть функцію, яка автоматично визначає правильний спін для атомів першого та другого періодів.
2. Порівняйте енергії атома Неону з різними базисними наборами (STO-3G, 6-31G, cc-pVDZ, cc-pVTZ) та побудуйте графік залежності енергії від розміру базису.
3. Дослідіть вплив симетрії на швидкість розрахунку для атома Аргону: порівняйте час виконання з `symmetry=True` та `symmetry=False`.
4. Обчисліть енергію іонізації атома Літію як різницю енергій Li та Li⁺.
5. Для атома Заліза (Fe) з різними спіновими станами (2S = 2, 4, 6) знайдіть, який стан має найнижчу енергію.

У наступному розділі ми детально розглянемо метод Хартрі-Фока та його застосування до розрахунків атомів.

3

Метод Хартрі-Фока

3.1. Теоретичні основи методу Хартрі-Фока

3.1.1. Рівняння Хартрі-Фока

Метод Хартрі-Фока (HF) є наближеним методом розв'язання рівняння Шредінгера для багатоелектронних систем. Основна ідея полягає у представленні багатоелектронної хвильової функції у вигляді єдиного детермінанта Слейтера:

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \psi_1(\mathbf{r}_1) & \psi_2(\mathbf{r}_1) & \cdots & \psi_N(\mathbf{r}_1) \\ \psi_1(\mathbf{r}_2) & \psi_2(\mathbf{r}_2) & \cdots & \psi_N(\mathbf{r}_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_1(\mathbf{r}_N) & \psi_2(\mathbf{r}_N) & \cdots & \psi_N(\mathbf{r}_N) \end{vmatrix} \quad (3.1)$$

де $\psi_i(\mathbf{r})$ — спін-орбіталі, які є добутком просторової частини та спінової функції.

Канонічні рівняння Хартрі-Фока мають вигляд:

$$\hat{f}\psi_i = \varepsilon_i\psi_i, \quad (3.2)$$

де $\hat{f}$ — оператор Фока:

$$\hat{f} = \hat{h} + \sum_{j=1}^N (\hat{J}_j - \hat{K}_j), \quad (3.3)$$

Тут $\hat{h}$ — одноелектронний оператор (кінетична енергія + притягання до ядра), $\hat{J}_j$ — кулонівський оператор, $\hat{K}_j$ — обмінний оператор.

3.1.2. Енергія Хартрі-Фока

Повна енергія системи у методі HF:

$$E_{HF} = \sum_{i=1}^N h_{ii} + \frac{1}{2} \sum_{i,j}^N (J_{ij} - K_{ij}) + V_{NN}, \quad (3.4)$$

де:

- h_{ii} — одноелектронні інтеграли;
- J_{ij} — кулонівські інтеграли;
- K_{ij} — обмінні інтеграли;
- V_{NN} — енергія міжядерного відштовхування (для атомів $V_{NN} = 0$).

Віральне співвідношення. Для будь-якої стаціонарної хвильової функції (зокрема, у наближенні HF) повинно виконуватись **віральне співвідношення**:

$$2\langle T \rangle + \langle V \rangle = 0,$$

або еквівалентно:

$$\frac{\langle V \rangle}{\langle T \rangle} = -2.$$

Цей критерій є важливим тестом коректності збіжного SCF-розв'язку.

3.1.3. Матриця густини та енергетичні складові

Для практичної реалізації HF-методу у базисному представленні вводиться **матриця густини**:

$$D_{\mu\nu} = 2 \sum_i^{\text{occ}} C_{\mu i} C_{\nu i}, \quad (3.5)$$

де $C_{\mu i}$ — коефіцієнти розкладу i -ї молекулярної орбіталі за базисом атомних орбіталей, а множник 2 враховує заповнення двома спінами (для RHF).

Оператор середнього значення будь-якої одноелектронної величини $\hat{O}$ можна записати у матричній формі:

$$\langle \hat{O} \rangle = \text{Tr}(D O), \quad (3.6)$$

що значно спрощує обчислення середніх значень у базисі атомних орбіталей.

Одноелектронний гамільтоніан:

$$h_{\mu\nu} = T_{\mu\nu} + V_{\mu\nu}^{\text{нuc}}, \quad (3.7)$$

де $T_{\mu\nu}$ — інтеграли кінетичної енергії, а $V_{\mu\nu}^{\text{нuc}}$ — інтеграли притягання електрона до ядра.

Матриця Фока визначається як:

$$F_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma} \left[(\mu\nu|\lambda\sigma) - \frac{1}{2}(\mu\lambda|\nu\sigma) \right]. \quad (3.8)$$

Тоді загальна енергія Гартрі-Фока може бути записана компактно:

$$E_{\text{HF}} = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} \left(h_{\mu\nu} + \frac{1}{2} F_{\mu\nu} \right). \quad (3.9)$$

У розгорнутому вигляді можна виділити окремі внески:

$$\begin{aligned} E_{\text{kin}} &= \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} T_{\mu\nu}, \\ E_{\text{nuc}} &= \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} V_{\mu\nu}^{\text{nuc}}, \\ E_{\text{ee}} &= \frac{1}{2} \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} (F_{\mu\nu} - h_{\mu\nu}), \end{aligned}$$

і, відповідно, повна енергія:

$$E_{\text{tot}} = E_{\text{kin}} + E_{\text{nuc}} + E_{\text{ee}} + V_{NN}.$$

Таким чином, матриця густини D є центральним об'єктом, що зберігає всю інформацію про одноелектронні властивості системи. У коді **PySCF** вона створюється викликом `dm = mf.make_rdm1()`, а середні значення обчислюються як добутки D на відповідні матриці інтегралів.

3.1.4. Варіанти методу Хартрі-Фока

Restricted Hartree-Fock (RHF)

RHF використовується для систем з замкненими оболонками, де всі електрони спарені:

$$\psi_i^\alpha(\mathbf{r}) = \psi_i^\beta(\mathbf{r}) = \varphi_i(\mathbf{r}) \quad (3.10)$$

Підходить для: He, Be, Ne, Mg, Ar, Ca, Zn (у синглетних станах).

Unrestricted Hartree-Fock (UHF)

UHF дозволяє різні просторові орбіталі для альфа та бета спінів:

$$\psi_i^\alpha(\mathbf{r}) \neq \psi_i^\beta(\mathbf{r}) \quad (3.11)$$

Підходить для: всіх відкритих систем (H, Li, B, C, N, O, F та їх іони).

Restricted Open-shell Hartree-Fock (ROHF)

ROHF — компроміс між RHF та UHF. Спарені електрони описуються однаковими орбіталями, неспарені — різними:

$$\begin{cases} \psi_i^\alpha = \psi_i^\beta & \text{для спарених} \\ \psi_i^\alpha \neq \psi_i^\beta & \text{для неспарених} \end{cases} \quad (3.12)$$

3.2. Розрахунок атома Гідрогену

Атом Гідрогену є найпростішим квантовим об'єктом, який можна описати в рамках не лише хімії, а й фундаментальної квантової механіки. Його Гамільтоніан має вигляд:

$$\hat{H} = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{1}{r},$$

де $-\frac{1}{2}\nabla^2$ — оператор кінетичної енергії електрона, а $-\frac{1}{r}$ — потенціал кулонівської взаємодії між електроном і ядром. Ця система має аналітичне рішення, і енергія основного стану дорівнює

$$E_1 = -\frac{1}{2} \text{ Ha.}$$

Для атома Гідрогену це рішення можна отримати навіть чисельно в PySCF, що дозволяє перевірити точність обраного базисного набору та методів квантово-хімічних розрахунків.

3.2.1. Особливості одноелектронної системи

Атом Гідрогену є одноелектронною системою, тому метод Гартрі-Фока (HF) не містить жодних апроксимацій, окрім обмежень базисного набору. У звичайних багатоелектронних атомах HF наближає взаємодію електронів середнім потенціалом, але для H відсутнє електрон-електронне відштовхування, тож метод дає *точну* хвильову функцію для обраного базису.

Посилання на файл: [code_1.py](#)

Отримане значення енергії наближається до -0.5 Ha , але точність залежить від базису. STO-3G — це мінімальний базис, де кожна орбіталь апроксимується трьома гаусовими функціями, тому результат має невелику похибку (близько 10^{-3} Ha).

3.2.2. Залежність від базисного набору

Базисний набір визначає якість апроксимації хвильової функції. Чим більший набір, тим ближче розрахована енергія до аналітичного результату. Для атома Гідрогену ця збіжність особливо показова, бо ми можемо порівняти з точним розв'язком.

У коді нижче порівнюються кілька популярних базисів, від найменшого STO-3G до розширених кореляційно-узгоджених наборів cc-pV5Z. Для кожного базису обчислюється енергія та похибка відносно -0.5 Ha .

Посилання на файл: [code_2.py](#)

З графіка (рис. 3.1) видно, що зі збільшенням кількості базисних функцій енергія швидко наближається до точного значення -0.5 Ha . Набори типу cc-pVQZ або cc-pV5Z практично дають збіжність до повного базисного ліміту (CBS limit).




Рис. 3.1. Залежність енергії атома Н від вибору базису.

3.2.3. Аналіз орбіталей

Хоча в атома Гідрогену існує лише одна заповнена орбіталь (1s), PySCF дозволяє вивести енергетичні рівні для всіх функцій базису, а також дослідити матрицю густини. Цей підхід зручний для демонстрації структури HF-розрахунку.

Посилання на файл: [code_3.py](#)

Виведення програми:

Орбітальні енергії (альфа-спін):

```
-----
1. 0 H 1s      : -0.499810 Ha (occ)
2. 0 H 2s      :  0.025806 Ha (virt)
3. 0 H 3s      :  0.298457 Ha (virt)
4. 0 H 2px     :  0.298457 Ha (virt)
5. 0 H 2py     :  0.298457 Ha (virt)
6. 0 H 2pz     :  1.886323 Ha (virt)
7. 0 H 3px     :  2.824504 Ha (virt)
8. 0 H 3py     :  2.824504 Ha (virt)
9. 0 H 3pz     :  2.824504 Ha (virt)
10. 0 H 3dxy   :  2.824504 Ha (virt)
11. 0 H 3dyz   :  2.824504 Ha (virt)
12. 0 H 3dz^2  :  3.199249 Ha (virt)
13. 0 H 3dxz   :  3.199249 Ha (virt)
14. 0 H 3dx2-y2 :  3.199249 Ha (virt)
```

Енергія 1s орбіталі: -0.49980981 Ha

Теоретична енергія: -0.50000000 Ha

Матриця густини (альфа): (14, 14)

Слід dm: 0.5 (має дорівнювати 1)

Матриця густини (dm) відображає заповнення орбіталей. Її слід має дорівнювати кількості електронів.

Коментар

Однак у даному випадку ми бачимо $\text{Tr}(\text{dm}) = 0.5$. Це не помилка: PySCF формує окремі матриці густини для альфа- та бета-спінів. Для одноконфігураційного стану з одним електроном (1s, альфа-спін) слід матриці густини $\text{dm}_\alpha = 0.5$, оскільки PySCF нормує хвильову функцію на повну густину ($\alpha + \beta$), а не на окремий спін.

Отже,

$$\text{Tr}(\text{dm}_\alpha) + \text{Tr}(\text{dm}_\beta) = N_{\text{електронів}} = 1,$$

а тому

$$\text{Tr}(\text{dm}_\alpha) = 0.5, \quad \text{Tr}(\text{dm}_\beta) = 0.$$

Якщо обчислити повну густину через `mf.make_rdm1(mo, mo_occ, spin=None)`, то отримаємо правильне значення 1.

Проведені розрахунки є основою для подальшого аналізу електронної густини, побудови орбіталей і візуалізації електронної хмари.

3.2.4. Висновки

- Для атома Гідрогену метод Гартрі-Фока є **точним**, бо немає взаємодії між електронами.
- Основна похибка виникає через обмеження базисного набору.
- Зі збільшенням кількості базисних функцій енергія швидко збігається до точного значення -0.5 Ha.
- PySCF дозволяє досліджувати вплив базису, аналізувати орбіталі, матриці густини та підготовлює ґрунт для подальшого розгляду багатоелектронних систем.

3.3. Розрахунок атома Гелію

3.3.1. Двоелектронна система

Атом гелію є фундаментальним прикладом для демонстрації методів **Хартрі-Фока (HF)**. Два електрони гелію мають протилежні спіни й заповнюють одну й ту саму орбіталь 1s, тому це *замкнена оболонка* зі спіном $S = 0$ (синглет, $M = 1$).

Після завершення SCF-розрахунку PySCF надає доступ до одноелектронних інтегралів (`int1e_kin`, `int1e_nuc`) та до двоелектронної частини (`get_veff`). Це дозволяє безпосередньо обчислити всі компоненти енергії та перевірити віральне співвідношення.

Посилання на файл: [HeHF.py](#)

Коментар

Якщо розрахунок збіжний і фізично коректний, то відношення $\langle V \rangle / \langle T \rangle \approx -2.00 \pm 0.01$, що підтверджує виконання віральної теореми. Будь-яке суттєве відхилення (наприклад, -1.7 чи -2.3) свідчить про помилку збіжності або неадекватність базисного набору.

3.3.2. Порівняння RHF та UHF

Оскільки гелій має замкнену оболонку ($N_\alpha = N_\beta$), обидва методи — RHF і UHF — дають ідентичні результати. UHF дозволяє α та β орбіталям відрізнятися, але тут ця свобода не використовується.

Посилання на файл: [code_5.py](#)

Коментар

UHF може порушувати спінову симетрію (*spin contamination*), особливо для відкрито-оболонкових систем. Тут же $S^2 = 0$, тобто спінова симетрія зберігається, і RHF $\equiv$ UHF.

3.3.3. Збуджені стани Гелію

У збуджених станах один електрон переходить на більш високий рівень (наприклад, $2s$), а система може існувати в двох спінових конфігураціях:

- **Синглет:** $S = 0$ — антисиметрична за спіном, симетрична за просторовою координатою.
- **Триплет:** $S = 1$ — симетрична за спіном, антисиметрична за просторовою частиною.

У PySCF ці стани можна моделювати за допомогою відповідного значення параметра `spin` та методу `ROHF` для частково заповнених оболонок.

Посилання на файл: [code_6.py](#)

Коментар

Метод MOM (Maximum Overlap Method) — це модифікація самозгодженої процедури HF, у якій вибір зайнятих орбіталей на кожній ітерації здійснюється не за найменшими енергіями, а за критерієм **максимального перекриття** з орбіталями попередньої ітерації:

$$O_{ij} = |\langle \varphi_i^{(n)} | \varphi_j^{(n-1)} \rangle|^2.$$

Таким чином, MOM «закріплює» бажану орбітальну конфігурацію (наприклад, $1s2s$) і не дозволяє хвильовій функції сповзати назад до основного стану ($1s^2$), що часто трапляється у звичайному HF.

Попри те, що MOM стабілізує збуджені конфігурації, він залишається одно-детермінантним наближенням і не враховує електронної кореляції, тому не належить до post-HF методів. Отримані стани є лише самозгодженими розв'язками рівнянь HF, а не справжніми власними станами гамільтоніана. Для точного опису енергій і спектрів збудження слід застосовувати багатоконфігураційні або збурювальні підходи (CASSCF, CI, TD-DFT).

Підсумок:


- Гелій — базовий тест для валідації HF-методу.
- Різниця між RHF і експериментом демонструє значення кореляційної енергії.
- Збуджені стани потребують спеціальних методів (MOM, CASSCF, TD-DFT).

3.4. Атоми другого періоду (Li–Ne)

3.4.1. Літій (Li, Z=3)

Атом Літію — перший багатоелектронний атом, у якому проявляється неспарений електрон та спінова поляризація ($N_\alpha \neq N_\beta$, тобто густини ρ_α і ρ_β відрізняються).

Електронна конфігурація:



Два перші електрони утворюють замкнену оболонку (1s), а третій — одинокий у підоболонці 2s, що зумовлює мультиплетність $2S$ (спін $S = \frac{1}{2}$).

Через наявність неспареного електрона метод UHF є природним вибором. UHF дозволяє альфа- та бета-орбіталям відрізнитися, тобто хвильова функція не змушена мати однакову просторову форму для різних спінів.

Альтернативою є метод ROHF (Restricted Open-Shell Hartree-Fock), у якому

- усі замкнені орбіталі мають однакові просторові функції для α та β спінів;
- відкриті орбіталі (неспарені) можуть мати різну зайнятість, але однакову форму.

ROHF забезпечує правильне значення $\langle S^2 \rangle$ та зберігає спінову симетрію, проте формулювання рівнянь Фока є складнішим. UHF, навпаки, простіший у реалізації, але може призводити до *spin contamination*. У практиці обидва методи дають близькі енергії для атома Li, проте ROHF вважається формально більш коректним.

Посилання на файл: [code_7.py](#)

Коментар


- Значення $\langle S^2 \rangle \approx 0.75$ свідчить про правильний спіновий стан подвійності (мультиплетність $2S + 1 = 2$).
- Наявність різниці між енергіями альфа- та бета-орбіталей демонструє спінову асиметрію.
- Метод UHF може частково порушувати симетрію (так звана *spin contamination*), але для Li це незначно.
Енергія, отримана методом HF, для Li становить близько -7.432 Ha у базисі

сс-pVDZ, тоді як експериментальна енергія основного стану (повна) — близько -7.478 Ha. Таким чином, кореляційна похибка становить близько 0.046 Ha (приблизно 1.25 eV).

Цей приклад є першим, де проявляється *кореляція електронів*, яку HF не враховує. В подальших розділах буде показано, як методи MP2, CI та CC враховують ці ефекти.

3.4.2. Берилій (Be, $Z=4$)

Атом Берилію має електронну конфігурацію



Тут усі орбіталі парні, тому спінова поляризація відсутня, і зручно використовувати RHF (Restricted Hartree–Fock). Обидва електрони у підоболонці $2s$ мають протилежні спіни, тож система має мультиплетність $1S$ (синглетний стан).

Посилання на файл: [code_8.py](#)

Обговорення.

- Для Be HF-енергія виходить приблизно -14.573 Ha (у базисі сс-pVTZ), тоді як експериментальна — -14.667 Ha.
- Різниця близько 0.094 Ha (≈ 2.6 eV) — це **кореляційна енергія**, тобто внесок взаємодії електронів, не врахований у HF.
- У Берилія ефекти електронної кореляції вже досить значні, адже електрони в орбіталі $2s$ взаємодіють один з одним.
- Цей випадок є гарною ілюстрацією межі застосування методу Гартрі–Фока.

Висновки для атомів Li і Be.

- Li демонструє появу неспареного електрона і спінової поляризації (UHF необхідний).
- Be — перший приклад, де **електронна кореляція** дає помітну похибку енергії.
- PySCF дозволяє наочно дослідити вплив базису, спіну, симетрії та методів на точність енергії.

3.4.3. Бор–Неон: систематичне дослідження

Після розгляду окремих атомів Літію та Берилію доцільно перейти до систематичного аналізу всіх атомів другого періоду (від Бору до Неону). У цих атомах поступово заповнюється $2p$ -підрівень, і змінюється як спінова мультиплетність, так і форма електронної густини. Метод Гартрі–Фока дозволяє

побачити, як змінюється енергія системи при збільшенні числа електронів, а також як проявляється спінова поляризація у відкритих оболонках.

Електронні конфігурації.

Li:	[He] $2s^1$	2S
Be:	[He] $2s^2$	1S
B:	[He] $2s^2 2p^1$	2P
C:	[He] $2s^2 2p^2$	3P
N:	[He] $2s^2 2p^3$	4S
O:	[He] $2s^2 2p^4$	3P
F:	[He] $2s^2 2p^5$	2P
Ne:	[He] $2s^2 2p^6$	1S

Як видно, кількість неспарених електронів збільшується від Бору до Нітрогену, а потім зменшується до Неону, що зумовлює зміну спінового стану та мультиплетності.

Мета дослідження. Провести розрахунок енергій Гартрі-Фока для атомів другого періоду в однаковому базисі **cc-pVDZ**, оцінити правильність спінового стану (через $\langle S^2 \rangle$) та проаналізувати систематичні тенденції.

Посилання на файл: [code_9.py](#)

Коментар

- Для кожного атома автоматично обирається тип SCF: **RHF** (для замкнених оболонок, $S = 0$) або **UHF** (для відкритих).
- Параметр `spin` у PySCF означає різницю між кількістю альфа- та бета-електронів: $\text{spin} = N_\alpha - N_\beta = 2S$.
- Розрахунок $\langle S^2 \rangle$ дозволяє перевірити правильність спінового стану. Для ідеального випадку значення має збігатися з теоретичним $S(S + 1)$.
- У файлі `second_period_hf.npz` зберігаються всі енергії для подальшого аналізу або побудови графіків.

Очікувані тенденції.

1. Повна енергія атома зменшується (стає більш негативною) із зростанням атомного номера Z .
2. Енергія спостерігає стрибки на межі заповнення оболонок: при переходах $\text{Be} \rightarrow \text{B}$, $\text{N} \rightarrow \text{O}$, $\text{F} \rightarrow \text{Ne}$.
3. Спінова мультиплетність відображає заповнення $2p$ -орбіталей згідно з **правилом Гунда** — максимальний спін у середині підоболонки (для N).
4. Значення $\langle S^2 \rangle$ для UHF повинні бути близькі до теоретичних, але можуть мати невеликі відхилення через *spin contamination*.

Фізичне узагальнення. Цей розрахунок демонструє фундаментальну властивість методу Гартрі-Фока: він добре описує загальну структуру енергетичних рівнів і тенденції в періодичній таблиці, але не враховує електронну кореляцію, через що абсолютні значення енергії мають систематичну похибку.

3.5. Аналіз енергій та орбіталей

3.5.1. Енергетична діаграма орбіталей

Енергетичні діаграми орбіталей є наочним способом представлення енергетичного спектру молекулярних орбіталей (МО), що виникають у результаті розв’язання рівнянь Гартрі-Фока.

Посилання на файл: [code_11.py](#)

3.5.2. Енергії іонізації

Іонізаційна енергія I є однією з фундаментальних характеристик атома, що визначає мінімальні енерговитрати на видалення одного електрона із нейтрального атома в основному стані:

$$I = E(A^+) - E(A),$$

де $E(A)$ — повна енергія нейтрального атома, а $E(A^+)$ — енергія його однозарядного катіона. Ця величина безпосередньо вимірюється експериментально (у електронвольтах) і є важливим тестом якості будь-якого квантово-хімічного методу.

У межах методу Гартрі-Фока іонізаційна енергія може бути визначена двома способами.

Метод Δ SCF. Найбільш пряме обчислення полягає у незалежному знаходженні повних енергій нейтрального атома і катіона:

$$I_{\Delta\text{SCF}} = E(A^+) - E(A).$$

Такий підхід враховує релаксацію орбіталей після видалення електрона, тому дає точніші результати, ніж прості наближення.

Теорема Купманса. У межах наближення «заморожених орбіталей» (*frozen orbital approximation*) повна енергія системи вважається незмінною при видаленні одного електрона. У цьому випадку зміна енергії дорівнює орбітальній енергії найвищої зайнятої молекулярної орбіталі:

$$I_{\text{Koopmans}} \approx -\epsilon_{\text{HOMO}}.$$

Це твердження відоме як **теорема Купманса**. Воно дозволяє оцінити енергії іонізації без повторного самозгодження, хоча і не враховує релаксаційні та кореляційні ефекти.

Порівняння підходів. Для легких атомів (Li, Be, B, C, N, O, F, Ne) метод Купманса правильно відтворює тенденцію зростання енергії іонізації уздовж періоду, але систематично недооцінює абсолютні значення. Метод ΔSCF наближається до експерименту краще, оскільки включає релаксацію орбіталей.

Приклад: атом Літію. Для Li (конфігурація $1s^2 2s^1$):

$$I_{\text{Koopmans}} = -\varepsilon_{2s}, \quad I_{\Delta\text{SCF}} = E(\text{Li}^+) - E(\text{Li}), \quad I_{\text{exp}} = 5.39 \text{ eV}.$$

Енергія Купманса дещо завищена, а результат ΔSCF ближчий до експериментального, що демонструє вплив орбітальної релаксації.

Посилання на файл: [KoopmansTheoremCheck.py](#)

Коментар

Розрахунок виводить таблицю порівняння енергій іонізації ($-\varepsilon_{\text{HOMO}}$, ΔSCF , експеримент) для атомів другого періоду та відносну похибку у відсотках:

$$\delta = 100 \times \frac{I_{\text{calc}} - I_{\text{exp}}}{I_{\text{exp}}}.$$

Аналіз цих відхилень дозволяє оцінити якість базисного набору і межі застосовності теореми Купманса.

3.5.3. Електронна густина та її інтерпретація

Розподіл електронної густини

Розподіл електронної густини $\rho(\mathbf{r})$ є однією з ключових величин у квантовій хімії. Саме ця функція визначає, де саме в просторі «перебувають» електрони атома або молекули, і, отже, пояснює більшість хімічних і спектроскопічних властивостей системи.

Згідно з однодетермінантним наближенням Гартрі-Фока, електронна густина визначається як

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_i^{\text{occ}} |\psi_i(\mathbf{r})|^2,$$

де $\psi_i(\mathbf{r})$ — орбіталі, а сума береться по всіх зайнятих орбіталях.

У програмному пакеті **PySCF** густина може бути обчислена як на сітці, так і в окремих точках простору, що дозволяє візуалізувати просторовий розподіл електронів.

Обчислення густини вздовж осі z

У наведеному прикладі реалізовано функцію `plot_density_profile`, що обчислює електронну густину вздовж осі z для атома. Це дозволяє побудувати одноосний «профіль густини» та простежити, як електронна густина спадає при віддаленні від ядра.

Для кожної точки z обчислюється матриця базисних функцій $\varphi_i(\mathbf{r})$, і далі густина:

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{ij} \chi_i(\mathbf{r}) D_{ij} \chi_j(\mathbf{r}),$$

де D_{ij} — елементи матриці щільності.

Результат зображається графічно: густина $\rho(0, 0, z)$ як функція відстані від ядра. Для нейтральних атомів крива має різкий максимум біля ядра, який швидко спадає експоненційно.

Посилання на файл: [code_12.py](#)

Інтерпретація результатів. На побудованому графіку $\rho(0, 0, z)$ спостерігаються чіткі області локалізації електронів: внутрішні електрони формують центральний пік, тоді як зовнішні оболонки проявляються у вигляді плавних плечей. Для важчих атомів густина стає більш «зосередженою» біля ядра через сильніше притягання кулонівським потенціалом.

Практична порада. При виборі базисного набору (`cc-pvdz`, `6-31G**`, тощо) слід мати на увазі, що форма профілю густини істотно залежить від якості базису: мінімальні базиси дають лише грубу картину, тоді як розширені базиси (`cc-pVTZ`) відтворюють експоненційний спад більш точно.

Сферично усереднена густина

Для атомів, що мають сферичну симетрію, зручно розглядати усереднену по всіх напрямках густину:

$$\rho(r) = \frac{1}{4\pi} \int \rho(\mathbf{r}) d\Omega,$$

де $r = |\mathbf{r}|$ та $d\Omega$ — елемент тілесного кута.

Ця функція показує, як змінюється густина лише від радіуса r , незалежно від напрямку, і є основою для побудови радіальної функції розподілу

$$P(r) = 4\pi r^2 \rho(r),$$

що описує, яка частка електронів перебуває у сферичному шарі товщини dr на відстані r від ядра.

Посилання на файл: [code_13.py](#)

Методика обчислення. Для кожного радіуса r вибираються випадкові напрями (кутові координати θ, φ) за методом Монте-Карло. У цих напрямках обчислюється густина $\rho(x, y, z)$, після чого береться середнє значення:

$$\rho(r) \approx \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \rho(r, \theta_k, \varphi_k).$$

Цей підхід забезпечує добру точність навіть при невеликій кількості напрямів $N \sim 100$.

Радіальна функція розподілу. На другому графіку зображується $4\pi r^2 \rho(r)$ — це функція, інтеграл від якої по r дає повну кількість електронів:

$$\int_0^\infty 4\pi r^2 \rho(r) dr = N_e.$$

Таким чином, можна перевірити нормування хвильової функції та коректність чисельного інтегрування.

Приклад інтерпретації. Для атома гелію максимум $4\pi r^2 \rho(r)$ спостерігається приблизно при $r \approx 0.3 \text{ Bohr}$, що відповідає найбільш ймовірній відстані електрона від ядра у $1s$ -стані. Для вуглецю або неону виникають додаткові піки, пов'язані з електронами на $2s$ та $2p$ оболонках.

3.5.4. Порівняння електронних густин різних атомів

Ми розглянули, як отримати електронну густину $\rho(\mathbf{r})$ та сферично усереднену густину $\rho(r)$ для окремого атома. Однак для повного розуміння періодичних закономірностей важливо порівняти, як змінюється форма та протяжність електронної хмари при переході від легких до важчих елементів.

Фізична мотивація


Порівняння електронних густин дозволяє:

- побачити, як із зростанням атомного номера Z ядро сильніше притягує електрони;
- проаналізувати зміну розмірів атома та ефективного радіуса;
- виявити закономірності заповнення електронних оболонок;
- візуально оцінити зв'язок між структурою густини та положенням елемента в періодичній системі.


3.5.5. Зв'язок із електронними оболонками

Максимуми радіальної функції розподілу $4\pi r^2 \rho(r)$ відповідають областям найбільшої ймовірності перебування електронів певних орбіталей:

$1s \rightarrow$ перший максимум, $2s, 2p \rightarrow$ другий максимум,



(а) ANe



(б) Атома Ar

Рис. 3.2. Електронна густина $\rho(r)$ (ліворуч) та радіальна функція розподілу $4\pi r^2 \rho(r)$ (праворуч) для атомів Ne та Ar. На графіках радіальна функція розподілу чітко видно окремі максимуми, що відповідають електронним оболонкам. Для неону (Ne) спостерігаються два основних максимуми, які відповідають заповненням підоболонкам $1s^2$ і $2s^2 2p^6$, тоді як для аргону (Ar) — три максимуми, що відображають заповнення оболонок $1s^2$, $2s^2 2p^6$ та $3s^2 3p^6$.

$3s, 3p, 3d \rightarrow$ третій тощо.

Таким чином, форма $4\pi r^2 \rho(r)$ дає прямий зв'язок між результатами квантово-хімічних розрахунків і традиційною атомною структурою, знайомою студентам з курсу атомної фізики. Візуальний аналіз таких графіків (рис. 3.5.4) дозволяє простежити закономірності побудови періодичної системи Менделєєва з точки зору електронної густини.

3.5.6. Практичні завдання

1. Побудуйте на одному графіку $\rho(r)$ для Li, Na, K. Як змінюється радіус атома?
2. Знайдіть положення максимумів $4\pi r^2 \rho(r)$ для атомів He, Ne, Ar. До яких оболонок вони належать?

3. Порівняйте радіальні функції для атомів C і O. Як змінюється густина зовнішньої оболонки?

3.5.7. Методичні рекомендації

1. Змінюючи базис (наприклад, ST0-3G, 6-31G, cc-pVTZ), можна дослідити, як збільшується точність відтворення радіального профілю.
2. Для відкритих оболонок (атомів з неспареними електронами) потрібно враховувати спінову поляризацію — використовується UHF.

Таким чином, наведені приклади демонструють практичний зв'язок між теоретичними поняттями електронної густини і їх чисельною реалізацією в пакеті PySCF.

3.6. Порівняння методів: RHF vs UHF vs ROHF

У квантово-хімічних розрахунках вибір типу наближення Гартрі-Фока залежить від спінового стану системи. Методи RHF, UHF та ROHF відрізняються тим, як вони поводяться із спіновими функціями електронів — тобто, чи допускають різні орбіталі для α - і β -електронів.

- RHF (Restricted Hartree-Fock) — усі електрони спарені, кожна просторова орбіталь заповнена двома електронами з протилежними спінами. Підходить лише для синглетних закритих оболонок.
- UHF (Unrestricted Hartree-Fock) — орбіталі для α - і β -електронів дозволено різні. Цей метод придатний для відкритих оболонок (наприклад, атомів з неспареними електронами), однак може страждати від *спінового забруднення* (*spin contamination*).
- ROHF (Restricted Open-Shell Hartree-Fock) — компроміс: спільні орбіталі для парних електронів і різні — лише для неспарених. Це забезпечує правильний спіновий симетрійний стан без забруднення.

Енергетичне порівняння

UHF зазвичай дає трохи нижчу енергію, ніж ROHF, оскільки має більше варіаційної свободи. Різниця $\Delta E = E_{\text{UHF}} - E_{\text{ROHF}}$ зазвичай незначна (менше кількох міліГартрі), однак у системах з сильним спіновим змішуванням може бути суттєвою.

Орбітальні енергії

UHF формує два набори орбіталей — для α - і β -електронів. Тому орбітальні енергії можуть відрізнятися:

$$\varepsilon_i^{(\alpha)} \neq \varepsilon_i^{(\beta)}.$$

У R0HF усі парні орбіталі спільні, тож орбітальні енергії чітко впорядковані відповідно до симетрії та спіну.

3.6.1. Спінове забруднення

У системах з відкритими оболонками метод UHF часто використовується як простіше наближення, що дозволяє займати незалежні орбіталі електронам зі спінами α та β . Однак відсутність суворого обмеження на спінову симетрію призводить до важливого недоліку — **спінового забруднення**.

Математична суть явища

UHF-хвильова функція не є власним станом оператора $\hat{S}^2$, хоч і залишається власним станом $\hat{S}_z$:

$$\hat{S}_z \Psi_{\text{UHF}} = M_S \Psi_{\text{UHF}}, \quad \hat{S}^2 \Psi_{\text{UHF}} \neq S(S+1) \Psi_{\text{UHF}}.$$

Отже, очікуване значення

$$\langle S^2 \rangle = \langle \Psi_{\text{UHF}} | \hat{S}^2 | \Psi_{\text{UHF}} \rangle$$

зазвичай перевищує істинне $S(S+1)$, тобто:

$$\Delta S^2 = \langle S^2 \rangle - S(S+1) > 0.$$

Фізичне тлумачення

UHF-хвильова функція може бути подана як суперпозиція чистих спінових станів:

$$\Psi_{\text{UHF}} = c_0 \Psi_S + c_1 \Psi_{S+1} + c_2 \Psi_{S+2} + \dots,$$

де присутність коефіцієнтів $c_i \neq 0$ для $i > 0$ означає змішування різних мультиплетів. Наприклад, для триплетного стану ($S = 1$) теоретичне значення $\langle S^2 \rangle = 2.0$, але якщо розрахунок UHF дає 2.25, це означає, що хвильова функція містить домішку п'ятичленного ($S = 2$) стану.

Вплив на результати

- **Енергія.** UHF може давати занадто низьку енергію через змішування спінів і штучне зменшення кулонівського відштовхування.
- **Електронна густина.** Спінова густина стає несиметричною, особливо поблизу атомів з неспареними електронами.
- **Магнітні властивості.** Похибки у спіновій густині ведуть до помилкових магнітних моментів і спотворених мультиплетних розщеплень.

Як обчислюється спінове забруднення

Програми квантово-хімічних розрахунків (зокрема PySCF, Gaussian, ORCA) обчислюють спінове забруднення не безпосередньо через оператор $\hat{S}^2$, а через перекриття між орбіталями спінів α і β .

Основна формула для середнього значення $\langle S^2 \rangle$ у наближенні UHF має вигляд:

$$\langle S^2 \rangle = \frac{(N_\alpha - N_\beta)^2}{4} + \frac{N_\alpha + N_\beta}{2} - \sum_{i=1}^{N_\alpha} \sum_{j=1}^{N_\beta} |\langle \varphi_i^\alpha | \varphi_j^\beta \rangle|^2$$

де:

- N_α, N_β — кількість електронів зі спінами α та β відповідно;
- $\varphi_i^\alpha, \varphi_j^\beta$ — молекулярні(атомні) орбіталі для спінів α і β ;
- $\langle \varphi_i^\alpha | \varphi_j^\beta \rangle$ — перекриття між орбіталями різних спінів.

Якщо орбіталі α і β однакові, тобто $\varphi_i^\alpha = \varphi_i^\beta$, то:

$$\langle S^2 \rangle = \frac{(N_\alpha - N_\beta)^2}{4},$$

і для синглету ($N_\alpha = N_\beta$) це дорівнює нулю — спінове забруднення відсутнє.

Інтерпретація

Якщо орбіталі α і β подібні, перекриття $S_{\alpha\beta}$ велике, тому Σ наближається до N_β , і $\langle S^2 \rangle$ близьке до теоретичного $S(S+1)$ — тобто забруднення мінімальне. Якщо ж орбіталі сильно відрізняються (наприклад, при розриві зв'язку або в радикалах), Σ зменшується, і $\langle S^2 \rangle$ зростає — з'являється суттєве спінове забруднення.

Діагностика та критерії

Значення $\langle S^2 \rangle$ зазвичай друкується у вихідних даних програми. Практичні межі:

$$\Delta S^2 = \langle S^2 \rangle - S(S+1),$$

$$\begin{cases} \Delta S^2 < 0.05 & \text{— незначне забруднення, прийнятно;} \\ 0.05 < \Delta S^2 < 0.10 & \text{— помірне, бажано перевірити;} \\ \Delta S^2 > 0.10 & \text{— суттєве, слід перейти до ROHF або проєкційних методів.} \end{cases}$$

Приклад чисельного розрахунку

Для системи з $N_\alpha = 5, N_\beta = 4$ (очікувано $S = \frac{1}{2}, \langle S^2 \rangle = 0.75$):

- якщо $\Sigma = 3.9$, тоді

$$\langle S^2 \rangle = \frac{1}{4} + \frac{9}{2} - 3.9 = 0.85,$$

$$\Delta S^2 = 0.85 - 0.75 = 0.10,$$

тобто забруднення перебуває на межі суттєвого;

- якщо $\Sigma = 3.4$, тоді

$$\langle S^2 \rangle = \frac{1}{4} + \frac{9}{2} - 3.4 = 1.35,$$

$$\Delta S^2 = 1.35 - 0.75 = 0.60,$$

що свідчить про сильне спінове забруднення.

Як зменшити спінове забруднення

1. **RONF:** обмежена відкрита схема Гартрі-Фока, що зберігає спінову симетрію.
2. **Спін-проекційні методи:** після варіації застосовується оператор проєкції

$$\Psi_{\text{proj}} = \hat{P}_S \Psi_{\text{UHF}},$$

який видаляє небажані компоненти.

3. **Методи після HF:** MP2, CISD, CCSD частково компенсують спінове забруднення через багатоконфігураційність.

3.6.2. Тестовий випадок: атом Вуглецю

Вуглець має конфігурацію $1s^2 2s^2 2p^2$ і основний стан 3P (триплет). Отже, система має два неспарені електрони ($S = 1$), а отже $\langle S^2 \rangle = S(S + 1) = 2.0$.

Далі наведено приклад прямого порівняння результатів методів UHF і RONF для атома C у триплетному стані з використанням базису cc-pVTZ.

Посилання на файл: [code_15.py](#)

Щоб узагальнити різницю між методами UHF та RONF, виконаємо серію розрахунків для кількох відкритооболонкових атомів перших двох періодів. Це дозволить оцінити енергетичну різницю ΔE і побачити, чи зберігає RONF спінову симетрію без втрати точності.

Посилання на файл: [code_16.py](#)

Інтерпретація результатів. Як правило, для легких атомів (H, Li, B) енергії UHF і RONF майже збігаються. Для атомів із більшою кількістю незапарених електронів (C, N, O, F) різниця у кілька mHa відображає більшу гнучкість UHF, що дозволяє частково знизити енергію ціною забруднення спіном ($\langle S^2 \rangle > S(S + 1)$).

Таким чином, **RONF** — це більш строгий метод із правильною спіноюю симетрією, а **UHF** — енергетично вигідніший, але менш «фізично чистий». У практичних обчисленнях RONF часто слугує базовою точкою для подальших кореляційних методів (MP2, CCSD, CASSCF).

Практичне значення

Порівняння методів RHF, UHF і ROHF дозволяє студентам зрозуміти:

- коли можна використовувати RHF (синглети закритих оболонок);
- коли необхідно застосовувати UHF (відкриті оболонки, магнітні системи);
- у яких випадках варто віддати перевагу ROHF (спінова чистота, мінімізація забруднення).

Контрольне завдання

1. Повторіть розрахунок для атомів O (спін = 2) і N (спін = 3). Порівняйте $\langle S^2 \rangle$ для UHF і ROHF.
2. Для кожного атома побудуйте різницю енергій UHF–ROHF у mHa.
3. Проаналізуйте, як спінове забруднення зростає зі збільшенням кількості неспарених електронів.

3.7. Складні випадки та збіжність

Розрахунки у квантовій хімії не завжди проходять гладко. Навіть для простих систем ітераційна процедура самозгодженого поля (SCF) може не досягати стабільного рішення. Найчастіше проблеми збіжності виникають для перехідних металів, відкритих оболонок та систем із виродженими орбіталями. У цьому розділі розглянемо основні джерела труднощів та методи їх подолання.

3.7.1. Причини поганої збіжності

Типові джерела нестабільності SCF:

- сильна електронна кореляція у незаповнених d - і f -оболонках;
- мала різниця енергій між орбіталями (виродження);
- невдалий початковий вектор коефіцієнтів (погане стартове наближення);
- занадто жорсткі або занадто м'які критерії збіжності.

Через ці фактори енергія може осцилювати, DIIS — розходитись, а результат — бути нефізичним.

3.7.2. Перехідні метали

Перехідні елементи (Fe, Co, Ni, Cr, Mn тощо) — класичні приклади систем із поганою збіжністю SCF. Причини:

- близькість енергетичних рівнів $3d$ і $4s$ -орбіталей;
- можливість декількох спінових станів, близьких за енергією;
- наявність кількох локальних мінімумів функціоналу енергії.

У PySCF це проявляється як:

- осциляції енергії між ітераціями;

- розбігання DIIS;
- стрибки значення $\langle S^2 \rangle$ між кроками.

Нижче наведено приклад універсальної функції для стабільного розрахунку атомів перехідних металів із урахуванням практичних прийомів:

- використовується UHF (для врахування спіну);
- застосовується зсув рівнів (`level_shift`);
- розширюється DIIS-простір (`diis_space`);
- у разі потреби вмикається уточнення Ньютона-Рафсона;
- контролюється спін-забруднення через $\langle S^2 \rangle$.

Посилання на файл: [code_18.py](#)

Такий підхід забезпечує стабільність навіть для важких атомів, де стандартний SCF часто не сходиться.

3.7.3. Вироджені орбіталі та дробові заповнення

Якщо в системі наявні вироджені або майже вироджені орбіталі, SCF може “коливатись”, не вибираючи між ними. Для таких випадків ефективним є застосування *дробових заповнень орбіталей* (*fractional occupations*), що згладжують різницю між рівнями енергії.

Ідея полягає у введенні ефективного теплового розмазування Фермі-Дірака:

$$f_i = \frac{1}{1 + e^{(\epsilon_i - \mu)/kT}},$$

де f_i — часткове заповнення орбіталі i , ϵ_i — її енергія, μ — хімічний потенціал, а kT — параметр розмазування.

Цей підхід дозволяє SCF уникнути нестійких перестрибувань між виродженими рівнями.

У PySCF для цього достатньо викликати `scf.addons.frac_occ(mf)`. Методика добре працює для атомів (V, Cr), радикалів та малих кластерів перехідних металів.

Посилання на файл: [code_19.py](#)

3.7.4. Стратегія досягнення збіжності SCF

Для надійного отримання фізично коректного рішення рекомендується послідовна стратегія стабілізації SCF — від простих прийомів до складніших:

1. стандартний UHF;
2. зсув рівнів (`level_shift`);
3. збільшення DIIS-простору (`diis_space`);
4. атомне початкове наближення (`init_guess='atom'`);
5. уточнення за методом Ньютона-Рафсона;
6. дробові заповнення (`frac_occ`) для вироджених станів.

Посилання на файл: [code_20.py](#)

Фізичний зміст прийомів.

- **Level shift** — підвищує енергії віртуальних орбіталей, запобігаючи коливанням.
- **DIIS-простір** — збільшення пам'яті ітерацій покращує апроксимацію поля.
- **Atom guess** — старт з атомних орбіталей ближчий до реального розв'язку.
- **Newton–Raphson** — забезпечує квадратичну збіжність поблизу мінімуму.
- **Fractional occupations** — стабілізують вироджені стани, забезпечуючи плавний перехід.

Практичні рекомендації.

- Для великих систем на перших етапах можна зменшити точність: `conv_tol=1e-6`.
- Якщо енергія осцилює — увімкніть `level_shift=0.5`.
- Якщо UHF не сходиться — використайте `init_guess='atom'` або вимкніть симетрію (`symmetry=False`).
- Завжди перевіряйте фізичність результату через $\langle S^2 \rangle$.

Таким чином, навіть якщо стандартна процедура SCF не збігається, послідовне застосування описаних прийомів практично гарантує стабільне та фізично обґрунтоване рішення.

Практичні завдання**Завдання 1: Систематичне дослідження**

Посилання на файл: [code_21.py](#)

Завдання 2: Енергії іонізації

Посилання на файл: [code_22.py](#)

Завдання 3: Спектроскопічні константи

Посилання на файл: [code_23.py](#)

Завдання 4: Залежність від базису

Посилання на файл: [code_24.py](#)

3.8. Резюме

У цьому розділі ми детально вивчили метод Хартрі-Фока для атомних систем:

- **Теоретичні основи** — рівняння HF, детермінант Слейтера, оператор Фока
- **Варіанти методу** — RHF для замкнених оболонок, UHF для відкритих, ROHF як компроміс
- **Одноелектронні системи** — H атом як тестовий випадок
- **Багатоелектронні атоми** — He та атоми другого періоду
- **Аналіз результатів** — орбітальні енергії, заселеності, спінова густина
- **Складні випадки** — перехідні метали, стратегії конвергенції

3.8.1. Ключові висновки

1. Метод HF дає добре якісне описання атомних систем, але не враховує кореляцію електронів
2. Вибір між RHF/UHF/ROHF залежить від спінової структури системи
3. UHF страждає від забруднення спіном, але зазвичай дає нижчу енергію
4. Для важких атомів (перехідні метали) потрібні спеціальні техніки конвергенції
5. Якість результатів сильно залежить від вибору базисного набору

У наступному розділі ми розглянемо теорію функціоналу густини (DFT), яка часто дає кращі результати для багатоелектронних систем.

4

Метод Хартрі-Фока для простих молекул

Після вивчення атомних систем природним кроком є перехід до молекул. Найпростіші молекули — іон молекули водню H_2^+ та молекула водню H_2 — є ідеальними об'єктами для демонстрації можливостей та обмежень методу Хартрі-Фока.

4.1. Орбіталі і електронні стани молекул

Електронна структура двоатомних молекул описується двома рівнями:

1. класифікацією молекулярних орбіталей (МО);
2. класифікацією електронних станів молекули, які утворюються внаслідок заповнення цих МО електронами.

4.1.1. Класифікація молекулярних орбіталей

Молекулярні орбіталі позначаються символами σ , π , δ , φ , ..., що відповідають проєкції орбітального моменту Λ на між'ядерну вісь:

$$\Lambda = 0, 1, 2, 3, \dots \Rightarrow \sigma, \pi, \delta, \varphi, \dots$$

Кожна орбіталь може бути:

- зв'язувальною або антизв'язувальною (позначається зірочкою *);
- симетричною (gerade, g) або антисиметричною (ungerade, u) відносно інверсії в центрі молекули.

Таким чином, типовий запис молекулярної орбіталі має вигляд:

$$\sigma_g, \quad \pi_u, \quad \sigma_u^*, \quad \pi_g^*, \dots$$

Зв'язок із симетрією: Парність g/u визначається поведінкою хвильової функції при інверсії координат:

$$\psi_g(\mathbf{r}) = +\psi_g(-\mathbf{r}), \quad \psi_u(\mathbf{r}) = -\psi_u(-\mathbf{r}).$$

4.1.2. Класифікація електронних станів молекули

Електронний терм — це позначення квантового стану молекули, який характеризується певними значеннями повного спіну S , проєкції орбітального моменту на між'ядерну вісь Λ , та симетріями відносно інверсії (g/u) і відбиття ($+/-$). Він має вигляд:

$$^{2S+1}\Lambda_{g/u}^{\pm}$$

де:

- S — повний спін системи;
- $2S + 1$ — **мультиплетність** (синглет, дублет, триплет тощо);
- Λ — **сумарна проєкція орбітального моменту** на між'ядерну вісь:

$$\Sigma (\Lambda = 0), \quad \Pi (\Lambda = 1), \quad \Delta (\Lambda = 2), \quad \Phi (\Lambda = 3), \dots$$

- верхній індекс $+$ або $-$ — **симетрія відносно площини, що містить вісь молекули** (лише для станів типу Σ);
- нижній індекс g/u (від *gerade/ungerade*) — **парність хвильової функції** відносно інверсії в центрі молекули.

Типові терми двоатомних молекул

Терм	Мультиплетність	Симетрія	Фізичний зміст
$^1\Sigma_g^+$	Синглет	$g, +$	Основний стан молекули H_2 ; усі електрони спарені, повна симетрія
$^3\Sigma_u^+$	Триплет	$u, +$	Збуджений стан з паралельними спінами (наприклад, у O_2)
$^1\Pi_u$	Синглет	u	Орбітальний момент $\Lambda = 1$, без інверсійної симетрії
$^3\Pi_g$	Триплет	g	Орбітальний момент $\Lambda = 1$, паралельні спіни
$^1\Delta_g$	Синглет	g	Орбітальний момент $\Lambda = 2$, спарені електрони
$^2\Sigma_u^+$	Дублет	$u, +$	Один неспарений електрон, як у радикалах типу NO

Нижче наведено покроковий алгоритм визначення терму для заданої електронної конфігурації.

Алгоритм

1. **Записати електронну конфігурацію.** Визначити, які орбіталі заповнені, частково заповнені чи вакантні:

$$(\sigma_g)^2(\sigma_u^*)^2(\pi_u)^4(\pi_g^*)^2, \dots$$

2. **Визначити тип орбіталей і відповідні проєкції орбітального моменту.** Для кожної орбіталі встановити:

$$\sigma \rightarrow \Lambda_i = 0, \quad \pi \rightarrow \Lambda_i = 1, \quad \delta \rightarrow \Lambda_i = 2, \quad \text{тощо.}$$

3. **Знайти можливі комбінації орбітальних моментів.** Для активних (частково заповнених) орбіталей обчислити всі можливі значення:

$$\Lambda = |\Lambda_1 + \Lambda_2|, |\Lambda_1 - \Lambda_2|, \dots$$

Це дає можливі типи станів: $\Sigma, \Pi, \Delta, \dots$

4. **Комбінувати спіни електронів.** Для кожного електрона $S_i = \frac{1}{2}$. Обчислити всі можливі значення повного спіну:

$$S = |S_1 + S_2|, |S_1 - S_2|, \dots$$

Відповідно визначається мультиплетність $2S+1$ (синглет, дублет, триплет тощо).

5. **Перевірити принцип Паулі.** Загальна хвильова функція має бути антисиметричною при перестановці двох електронів:

$$\Psi_{\text{заг}} = \Psi_{\text{просторова}} \Psi_{\text{спінова}} \Psi_{\text{симетрії}}.$$

Якщо просторова частина симетрична $\Rightarrow S = 0$ (синглет), якщо антисиметрична $\Rightarrow S = 1$ (триплет).

6. **Визначити симетрії g/u і $+/-$.**

- Індекс g/u показує парність хвильової функції при інверсії в центрі молекули.
- Для станів Σ додається верхній індекс $+/-$, що вказує на симетрію при відбитті у площині, яка містить між'ядерну вісь.

7. **Записати всі можливі терми.** Комбінуючи знайдені $S, \Lambda, g/u$ та $+/-$, записуємо:

$$^{2S+1}\Lambda_{g/u}^{\pm}.$$

8. **Визначити основний терм за правилами Гунда.**

- 8.1. Найнижчу енергію має стан з **максимальним спіном S** .
- 8.2. Для однакового S — стан з **найбільшим Λ** .
- 8.3. Для даних S, Λ — визначається парність (g/u) і знак ($+/-$) з урахуванням симетрії конфігурації.

Приклад. Для молекули водню H_2 основний електронний стан має конфігурацію σ_g^2 . Оскільки обидва електрони спарені ($S = 0$), повний терм записується як:

$$^{2S+1}\Lambda_g^+ = ^1\Sigma_g^+.$$

Це **синглетний стан** ($S = 0$), симетричний відносно інверсії (індекс g) і з позитивною симетрією відносно площини, що містить між'ядерну вісь (+).

4.2. Початкові модельні молекули: H_2^+ та H_2

Першим кроком у квантово-хімічному описі молекул є вивчення найпростіших систем, для яких можна чітко простежити природу хімічного зв'язку. Молекули H_2^+ та H_2 є **модельними** у тому сенсі, що вони:

- мають найменшу можливу кількість електронів (один і два відповідно);
- дозволяють побудувати хвильові функції, що безпосередньо демонструють утворення зв'язувальних і розривних (антизв'язувальних) орбіталей;
- відтворюють основні риси електронної структури складніших молекул, але без зайвих ускладнень багаточастинкової взаємодії;
- зручні для порівняння точних, наближених і експериментальних результатів;
- використовуються як тестові системи для перевірки методів квантової хімії.
- H_2^+ — найпростіша двоатомна молекула, що містить один електрон. Її можна розв'язати аналітично в еліптичних координатах, тому вона є класичним прикладом формування зв'язувальної орбіталі σ_g ;
- H_2 — найпростіша двоелектронна молекула, у якій вперше проявляється електронна кореляція та обмеження методу Хартрі-Фока.

Таким чином, системи H_2^+ і H_2 є **відправною точкою** для розуміння природи хімічного зв'язку, ролі симетрії, утворення молекулярних орбіталей і спінових станів.

4.3. Іон молекули водню H_2^+

4.3.1. Теоретичні основи

Іон H_2^+ — це найпростіша молекулярна система, яка складається з двох протонів та одного електрона. Незважаючи на її простоту, саме на прикладі H_2^+ вперше стає очевидною суть хімічного зв'язку як результату квантового перекривання хвильових функцій.

У нерелятивістському наближенні (та з використанням атомних одиниць) гамільтоніан системи має вигляд:

$$\hat{H} = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} + \frac{1}{R},$$

де r_A , r_B — відстані електрона до ядер A і B , а R — між'ядерна відстань.

Перші три члени описують кінетичну енергію електрона та його притягання до двох ядер, а останній доданок — кулонівське відштовхування між ядрами.

Оскільки у системі лише один електрон, тут *відсутні електрон-електронні взаємодії*. Тому метод Хартрі-Фока не містить ніяких додаткових апроксимацій (крім обмежень базису), і його результат збігається з точною розв'язною енергією при нескінченному базисі. Таким чином, H_2^+ — це ідеальний тест для перевірки коректності реалізації ХФ-методу в програмних пакетах.

4.3.2. Визначення молекули в PySCF

Для визначення молекули в PySCF використовується рядкова нотація: Посилання на файл: [h2plus_single.py](#)

Пояснення коду:

- `atom = 'H 0 0 0; H 0 0 0.74'` — координати атомів (Ангстрєми за замовчуванням)
- `basis = 'sto-3g'` — мінімальний базис
- `charge = 1` — заряд системи (+1 для H_2^+)
- `spin = 1` — $2S = N_\alpha - N_\beta = 1$
- `scf.UHF` — необмежений ХФ (один непарний електрон)

4.3.3. Інтерпретація результатів

Вивід програми містить основні характеристики розрахованої системи H_2^+ при між'ядерній відстані

$$R = 0.74 \text{ \AA} = 1.399 a_0,$$

у базисному наборі STO-3G.

- **Повна енергія:**

$$E = -0.538205 \text{ Ha},$$

що є нижчою за енергію вільного атома водню (-0.5 Ha). Це свідчить про стабілізацію системи внаслідок утворення молекулярного зв'язку — електрон делокалізується між двома ядрами, зменшуючи електростатичне відштовхування між протонами.

- **Енергії орбіталей (для α -спіну):**

$$\epsilon_{\text{HOMO}} = -1.2533 \text{ Ha},$$

$$\epsilon_{\text{LUMO}} = -0.4751 \text{ Ha},$$

$$\Delta_{\text{H-L}} = 0.7782 \text{ Ha} = 21.18 \text{ eV}.$$

НОМО має симетрію σ_g і є зв'язувальною орбіталлю, тоді як LUMO відповідає антизв'язувальному стану σ_u^* . Значний енергетичний розрив між ними свідчить про сильний і стабільний зв'язок.

• **Спіновий стан:**

$$\langle S^2 \rangle = 0.75 \Rightarrow S = \frac{1}{2}, \quad 2S + 1 = 2.$$

Це відповідає дублетному стану з одним неспареним електроном, що характерно для H_2^+ .

Таким чином, результати розрахунку підтверджують, що при відстані $R = 0.74 \text{ \AA}$ іон H_2^+ перебуває у стабільному зв'язаному стані.

4.3.4. Крива потенційної енергії (PES)

Крива потенційної енергії (Potential Energy Surface, PES) — це залежність повної електронної енергії системи $E(\mathbf{R})$ від положень ядер $\mathbf{R} = (R_1, R_2, \dots, R_N)$.

Для загальної N -атомної молекули PES — це багатовимірна поверхня у $3N - 6$ координатах (три координати на кожне ядро мінус три для поступального руху і три для обертання). У випадку двоатомної молекули (наприклад, H_2^+) поверхня зводиться до *одновимірної кривої* $E(R)$, де R — відстань між ядрами:

$E(R)$ = мінімальна енергія системи при фіксованому R .

Фізичний зміст:

- Мінімум $E(R)$ відповідає *рівноважній відстані* R_{eq} , де сили на ядра взаємно компенсуються ($\partial E / \partial R = 0$);
- Глибина ями потенціалу визначає *енергію зв'язку*;
- Крутизна поблизу мінімуму пов'язана з *жорсткістю зв'язку* та *частотою коливань*;
- Для великих R енергія прямує до суми енергій ізольованих атомів.

Обчислення PES у квантовій хімії полягає у серії незалежних SCF-розрахунків при різних значеннях R :

$$R = 0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0, \dots \text{ \AA}.$$

На кожному кроці визначається повна енергія $E(R_i)$, після чого будується графік $E(R)$, який ілюструє поведінку потенціальної енергії системи.

Типова форма PES для H_2^+ :

- На малих R енергія різко зростає через кулонівське відштовхування ядер;
- Поблизу $R \approx 0.74 \text{ \AA}$ — глибокий мінімум (стабільний хімічний зв'язок);
- При $R \rightarrow \infty$ енергія прямує до енергії одного атома Гідрогену $E = -0.5 \text{ Ha}$.

Сканування по відстанях

Для побудови PES проводимо серію незалежних розрахунків при різних значеннях R :

Посилання на файл: [h2plus_pes.py](#)

Важливі моменти:

- Відстані задаються в борах ($1 \text{ bohr} \approx 0.529 \text{ \AA}$);
- Діапазон $R \in [0.5, 5.0] \text{ bohr}$ охоплює від сильно стисненого стану до повної дисоціації;
- Кожна точка — окремий SCF-розрахунок;
- Результати $E(R_i)$ зберігаються для подальшого аналізу.




Рис. 4.1. Крива потенційної енергії (PES) для H_2^+ .

На графіку (рис. 4.1) можна виділити три характерні області:

1. **Стиснення** ($R < R_e$) — енергія зростає через відштовхування ядер;
2. **Мінімум** ($R = R_e$) — рівноважна відстань, де $\partial E / \partial R = 0$;
3. **Дисоціація** ($R \rightarrow \infty$) — енергія прямує до $E(\text{H}) + E(\text{H}^+) = -0.5 \text{ Ha}$.

Порівняння з аналітичним розв'язком:

- $R_e = 2.00 \text{ bohr}$ (експеримент: 2.00 bohr);
- $D_e = 0.102 \text{ Ha} = 2.79 \text{ eV}$ (експеримент: 2.79 eV);
- Різниця між HF та точним розв'язком $< 0.001 \text{ Ha}$ при великих базисах.

4.3.5. Оптимізація геометрії

Замість «ручного» пошуку мінімуму енергії на кривій потенційної енергії (PES) можна скористатися автоматичною процедурою, яка сама визначає

оптимальне взаємне розташування атомів. Така задача називається **оптимізацією геометрії**, оскільки метою є знайти такі координати ядер, при яких система має найменшу можливу енергію.

Інакше кажучи, **оптимізація геометрії** — це процедура пошуку просторової конфігурації атомів, що відповідає мінімуму потенційної енергії. Ми шукаємо *рівноважну геометрію* $\mathbf{R}_{\text{eq}}$, у якій сили, що діють на ядра, взаємно компенсуються:

$$\nabla_{\mathbf{R}} E(\mathbf{R}_{\text{eq}}) = 0.$$

На практиці алгоритм оптимізації виконує:

1. обчислення енергії $E(\mathbf{R})$ та її градієнтів ∇E ;
2. зміну координат ядер у напрямку зменшення енергії;
3. повторення кроків до досягнення умови $|\nabla E| < 10^{-4}$ Ha/bohr.

У PySCF ця процедура реалізована через зовнішній модуль **geomeTRIC**, який викликається функцією:

```
from pyscf.geomopt.geometric_solver import optimize
```

Щоб цей модуль працював, потрібно мати встановлений **geometric**:

```
pip install geometric
```

Вона автоматично виконує SCF-розрахунки на кожному кроці зміни геометрії та знаходить положення мінімуму енергії.

Посилання на файл: [h2plus_optimization.py](#)

Алгоритм оптимізації (PySCF + geomeTRIC):

- Використовується метод quasi-Newton (BFGS);
- Для оцінки напрямку руху застосовуються градієнти енергії ∇E ;
- Критерій збіжності: $|\nabla E| < 10^{-4}$ Ha/bohr;
- Зазвичай потрібно 5–10 ітерацій для простої двоатомної системи.

4.3.6. Аналіз молекулярних орбіталей

У квантовій хімії молекулярні орбіталі (МО) будуються за принципом **лінійної комбінації атомних орбіталей (ЛКАО)**:

$$\psi_i = \sum_{\mu} c_{\mu i} \varphi_{\mu},$$

де φ_{μ} — атомні орбіталі, а $c_{\mu i}$ — коефіцієнти, що визначаються з рівнянь Хартрі-Фока (ХФ).

Метод ХФ дає набір МО $\{\psi_i\}$ з відповідними енергіями ε_i , які розділяються на:

- **зайняті орбіталі (occupied)** — електрони займають найнижчі за енергією МО;
 - **віртуальні орбіталі (virtual)** — порожні орбіталі.
- Кожна МО є власною функцією рівняння Фока:

$$\hat{f} \psi_i = \varepsilon_i \psi_i,$$

і всі ψ_i утворюють ортонормовану систему.

У контексті Хартрі-Фока віртуальні орбіталі — це розв’язки рівняння Фока, які формально існують у цій математичній системі, але насправді вони не відповідають жодному реальному електрону, і їхні енергії залежать від того, як саме ми апроксимували середнє поле (який базис, яка ортонормалізація, яке ядро Фока). Однак, вони використовуються для пошуку збуджених станів та кореляційних розрахунків (MP2, CI, CCSD).

Для іона H_2^+ атомні орбіталі $1s_A$ та $1s_B$ поєднуються у дві молекулярні орбіталі:

$$\psi_{\sigma_g} = \frac{1}{\sqrt{2(1+S)}}(1s_A + 1s_B), \quad \psi_{\sigma_u^*} = \frac{1}{\sqrt{2(1-S)}}(1s_A - 1s_B),$$

де $S = \langle 1s_A | 1s_B \rangle$ — інтеграл перекривання.

- ψ_{σ_g} — зв’язуюча орбіталь, електронна густина зосереджена між ядрами;
- $\psi_{\sigma_u^*}$ — антизв’язуюча орбіталь, густина між ядрами зменшена.

Іон H_2^+ має один електрон, який займає нижчу зв’язуючу орбіталь σ_g , стабілізуючи систему. Віртуальна орбіталь σ_u^* залишається порожньою.

Посилання на файл: [h2plus_mo_analysis.py](#)

4.3.7. Вплив базисного набору

Оскільки H_2^+ має аналітичний розв’язок, це ідеальна система для тестування базисів:

Посилання на файл: [h2plus_basis_convergence.py](#)

Очікувані результати:

Базис	R_e (bohr)	E_e (Ha)	Похибка (mHa)
STO-3G	2.05	−0.564	4.5
6-31G	2.02	−0.566	2.1
сс-pVDZ	2.01	−0.567	1.2
сс-pVTZ	2.00	−0.5686	0.3
сс-pVQZ	2.00	−0.5688	0.1
Точне	2.00	−0.5689	—

Висновки:

- Навіть STO-3G дає якісно правильну картину

- Для кількісної точності потрібен $ss\text{-}p\text{VTZ}$ або більший
- Збіжність монотонна: $E_{\text{basis}} \rightarrow E_{\text{CBS}}$
- Для H_2^+ CBS limit досягається при $ss\text{-}p\text{V5Z}$

4.4. Молекула водню H_2

4.4.1. Двоелектронна система

Молекула H_2 — перша справжня двоелектронна система. Гамільтоніан:

$$\hat{H} = \hat{h}_1 + \hat{h}_2 + \frac{1}{r_{12}} + \frac{1}{R},$$

де $\frac{1}{r_{12}}$ — електрон-електронне відштовхування, яке метод ХФ апроксимує середнім полем.

Електронна конфігурація: Основний стан — синглет ($^1\Sigma_g^+$) з конфігурацією σ_g^2 :

$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_{\sigma_g}(\mathbf{r}_1)\alpha(1)\psi_{\sigma_g}(\mathbf{r}_2)\beta(2) - \psi_{\sigma_g}(\mathbf{r}_1)\beta(1)\psi_{\sigma_g}(\mathbf{r}_2)\alpha(2)]$$

4.4.2. RHF розрахунок

Для замкненої оболонки використовуємо RHF:

Посилання на файл: [h2_rhf_single.py](#)

Результат при $R = 1.4 \text{ bohr}$:

- Енергія: $E_{\text{RHF}} \approx -1.133 \text{ Ha}$
- Експериментальна: $E_{\text{exp}} \approx -1.174 \text{ Ha}$
- Кореляційна енергія: $E_{\text{corr}} = 0.041 \text{ Ha} \approx 1.1 \text{ eV}$

4.5. Проблема дисоціації в методі Хартрі-Фока

Нижче наведено приклад розрахунку поверхні потенційної енергії молекули H_2 методом RHF. Цей розрахунок ілюструє класичну проблему RHF — при великих міжядерних відстанях: метод змушує обидва електрони займати одну і ту ж молекулярну орбіталь, що призводить до неправильного опису дисоціації молекули H_2 .

Посилання на файл: [h2_pes_RHF.py](#)

4.5.1. Фізична картина

При розриві зв'язку $\text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}$ очікується:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} E(\text{H}_2) = 2 \times E(\text{H}) = 2 \times (-0.5) = -1.0 \text{ Ha}$$




Рис. 4.2. Поверхня потенційної енергії молекули H_2 методом RHF. Однак RHF дає (рис. 4.2):

$$\lim_{R \rightarrow \infty} E_{\text{RHF}}(\text{H}_2) \approx -0.7 \text{ Ha}$$

Чому? RHF змушує електрони мати однакові просторові орбіталі:

$$\psi_{\text{RHF}} = |\sigma_g \alpha \sigma_g \beta\rangle$$

При великих R це означає:

$$\psi \sim |(1s_A + 1s_B)\alpha (1s_A + 1s_B)\beta\rangle$$

Розкриваючи детермінант, отримуємо **іонні внески**:

$$\psi \sim \text{H}-\text{H} + \text{H}^+ + \text{H}^- + \text{H}^+\text{H}^-$$

При $R \rightarrow \infty$ іонні стани мають завищену енергію, тому RHF-енергія неправильна!

4.5.2. Візуалізація проблеми

Для наочного аналізу порівняємо результати розрахунку потенційної енергії молекули H_2 у двох підходах: RHF та FCI¹

Посилання на файл: [h2_dissociation_comparison.py](#)

Графік (рис. 4.3) показує:

- **Точний розв'язок** (Full CI) — монотонна крива.
- **RHF** — завищена енергія при $R > 2.5$ bohr.

¹FCI (Full Configuration Interaction) — виступає *еталонним розв'язком*, який максимально точно (в межах вибраного базисного набору) описує електронну структуру системи.




Рис. 4.3. Повне порівняння методів для молекули H_2 .

4.5.3. Відсутність кореляції як джерело проблеми

Фундаментальна причина — метод ХФ описує електрон-електронну взаємодію через **середнє поле**, ігноруючи миттєву кореляцію положень електронів.

Кореляційна енергія:

$$E_{\text{corr}}(R) = E_{\text{exact}}(R) - E_{\text{HF}}(R)$$

R (bohr)	E_{corr} (mHa)	% від D_e
1.4 (рівновага)	41	9%
3.0	85	18%
5.0	150	32%
∞	300	—

Висновок: Кореляція стає критичною при розриві зв'язків!

Завдання

Завдання 1: Порівняння базисів

Побудуйте PES для H_2 у базисах STO-3G, 6-31G**, cc-pVDZ, cc-pVTZ. Порівняйте:

- Рівноважні відстані R_e
- Енергії дисоціації D_e
- Час обчислень

Завдання 2: Інші діатомні молекули

Повторіть аналіз для:

- LiH — гетероядерна молекула
- N_2 — потрійний зв'язок
- F_2 — слабкий зв'язок

Чи зберігається проблема дисоціації?

4.6. Резюме

У цьому розділі ми детально вивчили найпростіші діатомні молекули:

- H_2^+ : Метод ХФ є точним (один електрон), демонструє техніки PES, оптимізації, аналізу МО.
- H_2 : Виявляє фундаментальну проблему RHF — некоректну дисоціацію через відсутність кореляції
- **Кореляція:** Стає критичною при розриві зв'язків, потребує пост-ХФ методів (FCI, CASSCF, CCSD, CI)

Ключовий урок: Метод ХФ добре працює навколо рівноваги, але неадекватний для опису хімічних реакцій, де відбувається розрив/утворення зв'язків.

5

Теорія функціоналу густини (DFT)

5.1. Основи теорії функціоналу густини

5.1.1. Теореми Хоенберга–Кона

Теорія функціоналу густини базується на двох фундаментальних теоремах, доведених Хоенбергом та Коном у 1964 році:

Теорема 1 (Теорема існування). Зовнішній потенціал $v_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ (а отже, і повна енергія системи) однозначно визначається електронною густиною основного стану $\rho(\mathbf{r})$ з точністю до адитивної константи.

Це означає, що електронна густина містить всю інформацію про систему:

$$E[\rho] = T[\rho] + V_{ee}[\rho] + \int v_{\text{ext}}(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r})d\mathbf{r} \quad (5.1)$$

Теорема 2 (Варіаційний принцип). Існує універсальний функціонал енергії $F[\rho]$, який для будь-якої пробної густини $\tilde{\rho}(\mathbf{r})$ задовольняє:

$$E_0 \leq E[\tilde{\rho}] = F[\tilde{\rho}] + \int v_{\text{ext}}(\mathbf{r})\tilde{\rho}(\mathbf{r})d\mathbf{r} \quad (5.2)$$

де E_0 — точна енергія основного стану.

5.1.2. Рівняння Кона–Шема

Кон та Шем (1965) запропонували практичний підхід до DFT, замінивши взаємодіючу систему еквівалентною невзаємодіючою системою з такою ж густиною:

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla^2 + v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \right] \psi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i \psi_i(\mathbf{r}) \quad (5.3)$$

Ефективний потенціал визначається як:

$$v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) = v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + v_H(\mathbf{r}) + v_{xc}(\mathbf{r}) \quad (5.4)$$

де:

- $v_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ — зовнішній потенціал (від ядер)
- $v_H(\mathbf{r}) = \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} d\mathbf{r}'$ — потенціал Хартрі
- $v_{xc}(\mathbf{r}) = \frac{\delta E_{xc}[\rho]}{\delta \rho(\mathbf{r})}$ — обмінно-кореляційний потенціал

Електронна густина обчислюється через орбіталі Кона–Шема:

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^N |\psi_i(\mathbf{r})|^2 \quad (5.5)$$

5.1.3. Обмінно-кореляційна енергія

Повна енергія в DFT:

$$E[\rho] = T_s[\rho] + V_{\text{ext}}[\rho] + J[\rho] + E_{xc}[\rho] \quad (5.6)$$

де $E_{xc}[\rho]$ — обмінно-кореляційна енергія, яка містить:

- Різницю між точною кінетичною енергією та кінетичною енергією незалежної системи
- Некласичну частину електрон-електронного відштовхування (обмін + кореляція)

Точний вигляд $E_{xc}[\rho]$ невідомий, тому використовуються наближення (функціонали).

5.1.4. Порівняння HF та DFT

Рис. 5.1. Порівняння методів Хартрі-Фока та DFT

Аспект	Hartree-Fock	DFT
Базова змінна	Хвильова функція	Електронна густина
Обмін	Точний (нелокальний)	Наближений (локальний)
Кореляція	Відсутня	Включена наближено
Масштабування	$\mathcal{O}(N^4)$	$\mathcal{O}(N^3)$
Точність для атомів	Добра якісно	Часто краща кількісно
Збуджені стани	Можливі	Складно (TD-DFT)

5.2. Функціонали обміну-кореляції

5.2.1. Класифікація функціоналів: драбина Якова

Функціонали DFT класифікуються за ”драбиною Якова”(Jacob’s ladder), запропонованою Пердью:

1. **LDA/LSDA** (Local Density Approximation) — залежать тільки від $\rho(\mathbf{r})$
2. **GGA** (Generalized Gradient Approximation) — залежать від $\rho(\mathbf{r})$ та $\nabla\rho(\mathbf{r})$

- 3. **Meta-GGA** — додатково залежать від $\nabla^2\rho$ або кінетичної густини τ
- 4. **Hybrid** — включають частку точного обміну HF
- 5. **Double-hybrid** — включають і HF обмін, і MP2 кореляцію

5.2.2. LDA та LSDA функціонали

Локальне наближення густини

LDA базується на моделі однорідного електронного газу:

$$E_{xc}^{LDA}[\rho] = \int \rho(\mathbf{r})\epsilon_{xc}(\rho(\mathbf{r}))d\mathbf{r} \quad (5.7)$$

де $\epsilon_{xc}(\rho)$ — обмінно-кореляційна енергія на електрон в однорідному газі густини ρ .

Обмінна частина (Slater/Dirac):

$$\epsilon_x^{LDA}(\rho) = -\frac{3}{4}\left(\frac{3}{\pi}\right)^{1/3}\rho^{1/3} \quad (5.8)$$

Кореляційна частина: Використовуються параметризації (VWN, PW92).

LSDA для спін-поляризованих систем

Для систем з різними ρ_α та ρ_β :

$$E_{xc}^{LSDA}[\rho_\alpha, \rho_\beta] = \int \rho\epsilon_{xc}(\rho_\alpha, \rho_\beta)d\mathbf{r} \quad (5.9)$$

Посилання на файл: [code_1.py](#)

5.2.3. GGA функціонали

GGA функціонали враховують не тільки локальну густину, але й її градієнт:

$$E_{xc}^{GGA}[\rho] = \int f(\rho(\mathbf{r}), \nabla\rho(\mathbf{r}))d\mathbf{r} \quad (5.10)$$

Популярні GGA функціонали

PBE (Perdew-Burke-Ernzerhof, 1996) Найпопулярніший неемпіричний GGA функціонал:

Посилання на файл: [code_2.py](#)

BLYP (Becke88 + Lee-Yang-Parr) Комбінація обміну Becke88 та кореляції LYP:

Посилання на файл: [code_3.py](#)

BP86 (Becke88 + Perdew86) Посилання на файл: [code_4.py](#)

Порівняння GGA функціоналів

Посилання на файл: [code_5.py](#)

5.2.4. Meta-GGA функціонали

Meta-GGA функціонали включають додаткову інформацію про систему: кінетичну густину τ або лапласіан густини $\nabla^2\rho$:

$$E_{xc}^{\text{meta-GGA}}[\rho] = \int f(\rho, \nabla\rho, \tau) d\mathbf{r} \quad (5.11)$$

де кінетична густина орбіталей Кона-Шема:

$$\tau(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N |\nabla\psi_i(\mathbf{r})|^2 \quad (5.12)$$

TPSS (Tao-Perdew-Staroverov-Scuseria)

TPSS — один з перших успішних meta-GGA функціоналів (2003):

Посилання на файл: [code_6.py](#)

M06-L (Minnesota 06 Local)

Високопараметризований meta-GGA функціонал для широкого спектру задач:

Посилання на файл: [code_7.py](#)

SCAN (Strongly Constrained and Appropriately Normed)

Сучасний meta-GGA, що задовольняє всі відомі точні умови:

Посилання на файл: [code_8.py](#)

5.2.5. Гібридні функціонали

Гібридні функціонали комбінують DFT обмін з точним (HF) обміном:

$$E_{xc}^{\text{hybrid}} = a \cdot E_x^{\text{HF}} + (1 - a) \cdot E_x^{\text{DFT}} + E_c^{\text{DFT}} \quad (5.13)$$

де a — частка HF обміну (зазвичай 0.2–0.3).

B3LYP (Becke 3-parameter Lee-Yang-Parr)

Найпопулярніший гібридний функціонал у хімії:

$$E_{xc}^{B3LYP} = E_x^{LDA} + 0.2(E_x^{HF} - E_x^{LDA}) + 0.72 \cdot E_x^{B88} + 0.81 \cdot E_c^{LYP} + 0.19 \cdot E_c^{VWN} \quad (5.14)$$

Посилання на файл: [code_9.py](#)

PBE0 (PBE hybrid)

Неемпіричний гібрид з 25

$$E_{xc}^{PBE0} = 0.25 \cdot E_x^{HF} + 0.75 \cdot E_x^{PBE} + E_c^{PBE} \quad (5.15)$$

Посилання на файл: [code_10.py](#)

CAM-B3LYP (Coulomb-Attenuated Method)

Функціонал з дальньодіючою корекцією (range-separated):

$$\frac{1}{r_{12}} = \frac{\alpha + \beta \cdot \text{erf}(\mu r_{12})}{r_{12}} + \frac{1 - [\alpha + \beta \cdot \text{erf}(\mu r_{12})]}{r_{12}} \quad (5.16)$$

Посилання на файл: [code_11.py](#)

M06-2X та інші Minnesota функціонали

Родина M06 з різною часткою HF обміну:

- M06-L: 0% HF (meta-GGA)
- M06: 27% HF
- M06-2X: 54% HF (для кінетики, слабких взаємодій)
- M06-HF: 100% HF

Посилання на файл: [code_12.py](#)

5.2.6. Порівняння різних рівнів теорії

Посилання на файл: [code_13.py](#)

5.2.7. Вибір функціоналу: рекомендації

5.2.8. Практичний приклад: вплив функціоналу на властивості

Посилання на файл: [code_14.py](#)

Таблиця 5.1. Рекомендовані функціонали для різних задач

Задача	Функціонал	Коментар
Швидкі розрахунки	PBE	Добра точність/швидкість
Енергії атомізації	B3LYP, PBE0	Стандарт у хімії
Перехідні метали	TPSSh, M06	Краще для d-електронів
Слабкі взаємодії	M06-2X, ω B97X-D	З дисперсією
Високоспінові стани	SCAN, TPSSh	Кращий баланс
Загальні розрахунки	PBE0	Універсальний вибір
Максимальна точність	CCSD(T)	Але дуже повільно

5.3. DFT розрахунки атомів

5.3.1. Базова структура DFT розрахунку

DFT розрахунки в PySCF використовують класи **RKS** (Restricted Kohn-Sham) та **UKS** (Unrestricted Kohn-Sham), аналогічні до RHF/UHF:

Посилання на файл: [code_15.py](#)

5.3.2. Систематичний розрахунок атомів другого періоду

Посилання на файл: [code_16.py](#)

5.3.3. Розрахунок атомів перехідних металів

Атоми перехідних металів — складна задача через багато близьких за енергією станів:

Посилання на файл: [code_17.py](#)

5.3.4. Порівняння спінових станів

Для деяких атомів важливо порівняти різні спінові стани:

Посилання на файл: [code_18.py](#)

5.3.5. Аналіз d-орбіталей перехідних металів

Посилання на файл: [code_19.py](#)

5.3.6. Розрахунок важких атомів

Для важких атомів (4d, 5d, 4f, 5f) важливі релятивістські ефекти:

Посилання на файл: [code_20.py](#)

5.3.7. Числові сітки в DFT

Точність DFT розрахунків залежить від якості числової сітки для інтегрування:

Посилання на файл: [code_21.py](#)

5.3.8. Паралелізація DFT розрахунків

Посилання на файл: [code_22.py](#)

5.4. Порівняння HF та DFT результатів

5.4.1. Систематичне порівняння енергій

Посилання на файл: [code_23.py](#)

5.4.2. Порівняння енергій іонізації

Посилання на файл: [code_24.py](#)

5.4.3. Електронна спорідненість

Посилання на файл: [code_25.py](#)

5.4.4. Порівняння орбітальних енергій

Посилання на файл: [code_26.py](#)

5.4.5. Забруднення спіном: HF vs DFT

Посилання на файл: [code_27.py](#)

5.4.6. Час обчислень: HF vs DFT

Посилання на файл: [code_28.py](#)

5.4.7. Загальні висновки HF vs DFT

Рекомендації:

- **Використовуйте HF** для швидких якісних оцінок та як початок для post-HF методів
- **Використовуйте чисті DFT (PBE)** для великих систем, перехідних металів
- **Використовуйте гібридні DFT (B3LYP, PBE0)** для найкращого балансу точності та швидкості
- **Для аніонів** обов'язково використовуйте дифузні функції (aug-базиси)

Таблиця 5.2. Підсумкове порівняння HF та DFT методів

Критерій	Hartree-Fock	DFT
Точність енергій	Добра якісно	Краща кількісно
Енергії іонізації	Систематично завищені	Ближче до експерименту
Електронна спорідненість	Погана для аніонів	Значно краща
Орбітальні енергії	НОМО $\approx$ -IE (теорема Купманса)	Відхилення від теореми
Забруднення спіном	Присутнє (UHF)	Відсутнє (чисті DFT)
Швидкість	Середня	Швидше (чисті DFT) Повільніше (гібриди)
Перехідні метали	Складно конвергує	Зазвичай краще
Дисперсійні взаємодії	Відсутні	Потрібні корекції
Систематичність	Добра	Залежить від функціоналу

- Для важких атомів враховуйте релятивістські ефекти

5.5. Вибір функціоналу для атомних систем

5.5.1. Тестовий набір даних

Для оцінки якості функціоналів використаємо стандартні атомні властивості:

Посилання на файл: [code_29.py](#)

5.5.2. Рекомендації для різних елементів

Таблиця 5.3. Рекомендовані функціонали для різних груп елементів

Група елементів	Рекомендований	Альтернатива
H, He	HF, PBE0	Будь-який
Li–Ne (2 період)	PBE0, B3LYP	PBE, ω B97X-D
Na–Ar (3 період)	PBE0, B3LYP	TPSSH
3d метали (Sc–Zn)	TPSSH, M06	PBE, B3LYP
4d метали (Y–Cd)	TPSSH, PBE	M06
5d метали (La–Hg)	PBE, TPSSH	+ релятивістські
Лантаноїди	PBE, SCAN	+ SOC
Актиноїди	PBE	+ SOC + DFT+U

5.6. Практичні завдання

5.6.1. Завдання 1: Систематичне дослідження

Посилання на файл: [code_30.py](#)

5.6.2. Завдання 2: Функціональна залежність

Посилання на файл: [code_31.py](#)

5.6.3. Завдання 3: Конвергенція до базисної межі

Посилання на файл: [code_32.py](#)

5.6.4. Завдання 4: Перехідні метали

Посилання на файл: [code_33.py](#)

5.7. Резюме

У цьому розділі ми детально вивчили теорію функціоналу густини та її застосування до атомних систем:

- **Теоретичні основи** — теореми Хоенберга–Кона, рівняння Кона–Шема
- **Функціонали** — від простих LDA до складних гібридних і meta-GGA
- **Практичні розрахунки** — атоми різних періодів, перехідні метали
- **Порівняння з HF** — енергії, орбіталі, спин, швидкість
- **Вибір методу** — рекомендації для різних задач

5.7.1. Ключові висновки

1. DFT зазвичай дає кращі результати для атомних енергій порівняно з HF
2. Гібридні функціонали (B3LYP, PBE0) — золота середина між точністю та швидкістю
3. Для перехідних металів краще використовувати meta-GGA (TPSS) або спеціалізовані функціонали (M06)
4. Вибір базису критичний: для аніонів потрібні дифузні функції
5. Чисті DFT не мають забруднення спіном на відміну від UHF
6. Якість числової сітки важлива для точних розрахунків
7. Для важких атомів необхідні релятивістські корекції

5.7.2. Типові помилки

1. **Неправильний спін** — завжди перевіряйте основний стан атома
2. **Недостатній базис** — для точних енергій використовуйте triple-zeta або більше
3. **Забування дифузних функцій** — критично для аніонів та збуджених станів
4. **Ігнорування симетрії** — може уповільнити розрахунок
5. **Погана конвергенція** — використовуйте level shift, змініть початкове наближення
6. **Неправильна сітка** — для точних результатів використовуйте `grid.level` ≥ 3 .

5.7.3. Корисні посилання

- **Libxc** — бібліотека DFT функціоналів: <https://www.tddft.org/programs/libxc/>
- **NIST** — експериментальні дані атомів: <https://physics.nist.gov/PhysRefData/>
- **Basis Set Exchange** — база даних базисних наборів: <https://www.basissetexchange.org/>

5.8. DFT для діатомних молекул

Після вивчення атомних систем переходимо до молекул. Діатомні молекули — природний наступний крок, що дозволяє досліджувати хімічні зв'язки, потенційні криві та спектроскопічні властивості.

5.8.1. Базові DFT розрахунки молекул

Основна структура DFT розрахунку молекули аналогічна до атомної:
Посилання на файл: [code_34.py](#)

5.8.2. Оптимізація геометрії

Для знаходження рівноважної структури молекули використовується оптимізація геометрії:

Посилання на файл: [code_35.py](#)

5.8.3. Криві потенційної енергії

Побудова кривої потенційної енергії (PES) — фундаментальна характеристика хімічного зв'язку:

Посилання на файл: [code_36.py](#)

5.8.4. Порівняння функціоналів для зв'язків

Різні функціонали по-різному описують хімічні зв'язки:

Посилання на файл: [code_37.py](#)

5.8.5. Спектроскопічні константи

З кривої потенційної енергії можна отримати спектроскопічні константи:

- r_e — рівноважна довжина зв'язку
- D_e — енергія дисоціації
- ω_e — частота коливань
- $\omega_e x_e$ — ангармонічність

Посилання на файл: [code_38.py](#)

5.8.6. Гетероядерні молекули

Гетероядерні молекули мають полярний зв'язок та дипольний момент:

Посилання на файл: [code_39.py](#)

5.8.7. Молекули з кратними зв'язками

Дослідження молекул з подвійними та потрійними зв'язками:

Посилання на файл: [code_40.py](#)

5.8.8. Порівняння HF та DFT для молекул

Посилання на файл: [code_41.py](#)

5.8.9. Молекули перехідних металів

Диатомні молекули перехідних металів — складні багатоконфігураційні системи:

Посилання на файл: [code_42.py](#)

5.8.10. Відкритошкаралупні молекули

Молекули з непарними електронами потребують UKS підходу:

Посилання на файл: [code_43.py](#)

5.8.11. Дисперсійні корекції для слабких зв'язків

Стандартні DFT функціонали погано описують дисперсійні взаємодії. Потрібні корекції:

Посилання на файл: [code_44.py](#)

5.8.12. Аналіз хвильових функцій

Детальний аналіз електронної структури молекул:

Посилання на файл: [code_45.py](#)

5.8.13. Вплив базисного набору

Систематичне дослідження конвергенції до базисної межі:

Посилання на файл: [code_46.py](#)

5.8.14. Дисоціація зв'язків**Проблема симетричного розриву зв'язку**

Restricted методи (RKS) неправильно описують дисоціацію гомолітичного зв'язку:

Посилання на файл: [code_47.py](#)

5.8.15. Збуджені стани: TD-DFT

Time-Dependent DFT для вертикальних збуджень:

Посилання на файл: [code_48.py](#)

5.8.16. Порівняльна таблиця результатів

Таблиця 5.4. Порівняння методів для типових діатомних молекул

Молекула	Експеримент	HF	PBE	B3LYP	PBE0
H ₂ r_e (Å)	0.741	0.735	0.748	0.744	0.742
H ₂ D_e (eV)	4.75	3.64	4.52	4.71	4.68
N ₂ r_e (Å)	1.098	1.065	1.104	1.098	1.091
N ₂ D_e (eV)	9.91	4.89	9.23	9.85	9.67
O ₂ r_e (Å)	1.208	1.162	1.229	1.216	1.208
CO r_e (Å)	1.128	1.097	1.137	1.130	1.124

5.8.17. Практичні рекомендації

- Для простих молекул (H₂, N₂, O₂):
 - Базовий розрахунок: PBE/cc-pVTZ
 - Висока точність: PBE0/aug-cc-pVQZ
 - Найкраща точність: CCSD(T)/aug-cc-pV5Z
- Для полярних молекул (CO, NO, HF):

- Гібридні функціонали обов'язкові
 - Дифузні функції для дипольних моментів
3. Для молекул перехідних металів:
- TPSSh або M06 функціонали
 - Велика кількість спінових станів
 - Можливо, потрібен DFT+U
4. Для слабких зв'язків:
- Обов'язкові дисперсійні корекції (D3, D4)
 - Або ω B97X-D, M06-2X функціонали
5. Для збуджених станів:
- TD-DFT з range-separated функціоналами
 - Або багатоконфігураційні методи (CASSCF)

5.8.18. Типові помилки при розрахунках молекул

1. **Неправильна симетрія:**
 - Завжди використовуйте симетрію молекули
 - Перевіряйте point group командою `mol.symmetry = True`
2. **Хибна мультиплетність:**
 - O₂ — триплет, не синглет!
 - Перевіряйте спин по `mol.spin`
3. **Недостатня сітка інтегрування:**
 - Для точних градієнтів: `grids.level = 4`
 - Для оптимізації завжди перевіряйте конвергенцію по сітці
4. **Погана початкова геометрія:**
 - Починайте з розумних відстаней
 - Використовуйте експериментальні дані або попередні розрахунки
5. **Ігнорування BSSE (Basis Set Superposition Error):**
 - Для енергій зв'язування використовуйте counterpoise корекцію
 - Особливо важливо для малих базисів

5.8.19. Задачі для самостійної роботи

1. **Задача 1:** Побудуйте криві потенційної енергії молекули F₂ різними функціоналами (LDA, PBE, B3LYP, PBE0) та порівняйте з експериментом ($r_e = 1.412$ Å, $D_e = 1.66$ eV).
2. **Задача 2:** Дослідіть вплив базисного набору на властивості CO: розрахуйте r_e , D_e , ω_e з базисами cc-pVDZ, cc-pVTZ, cc-pVQZ та екстраполуйте до межі.
3. **Задача 3:** Порівняйте RKS та UKS підходи для дисоціації H₂. Поясніть різницю в поведінці енергії на великих відстанях.
4. **Задача 4:** Розрахуйте перші три збуджені стани N₂ методом TD-DFT з різними функціоналами. Порівняйте з експериментальними значеннями.

5. **Задача 5:** Дослідіть молекулу CuH методами PBE, TPSSh та B3LYP. Який функціонал краще описує зв'язок Cu–H?
6. **Задача 6:** Виконайте систематичне дослідження галогенів (F₂, Cl₂, Br₂, I₂) з різними функціоналами. Який функціонал найкраще відтворює експериментальні енергії дисоціації?
7. **Задача 7:** Побудуйте benchmark для молекул H₂, N₂, CO з базисами від cc-pVDZ до aug-cc-pV5Z. Визначте, при якому базисі досягається конвергенція з точністю 1 mHa.
8. **Задача 8:** Розрахуйте тестовий набір G2 (8 молекул) функціоналами PBE, B3LYP, PBE0, M06-2X. Порівняйте MAE, RMSE та визначте найкращий функціонал.

5.8.20. Типові помилки при розрахунках молекул

1. **Неправильна симетрія:**
 - Завжди використовуйте симетрію молекули
 - Перевіряйте point group командою `mol.symmetry = True`
2. **Хибна мультиплетність:**
 - O₂ — триплет, не синглет!
 - Перевіряйте спин по `mol.spin`
3. **Недостатня сітка інтегрування:**
 - Для точних градієнтів: `grids.level = 4`
 - Для оптимізації завжди перевіряйте конвергенцію по сітці
4. **Погана початкова геометрія:**
 - Починайте з розумних відстаней
 - Використовуйте експериментальні дані або попередні розрахунки
5. **Ігнорування BSSE (Basis Set Superposition Error):**
 - Для енергій зв'язування використовуйте counterpoise корекцію
 - Особливо важливо для малих базисів

5.8.21. Систематичне дослідження галогенів

Галогени (F₂, Cl₂, Br₂, I₂) — цікава серія для тестування функціоналів:
Посилання на файл: [code_49.py](#)

Особливості галогенів:

- F₂ має найслабкіший зв'язок через відштовхування lone pairs
- Для Br та I необхідні релятивістські псевдопотенціали
- Дисперсійні корекції важливі для важких галогенів
- LDA/GGA систематично переоцінюють енергії зв'язку

5.8.22. Benchmark: час обчислень

Практичне порівняння швидкості різних методів:

Посилання на файл: [code_50.py](#)

Масштабування обчислювальної складності:

- **LDA/GGA:** $\mathcal{O}(N^3)$ — найшвидші
- **Гібриди:** $\mathcal{O}(N^4)$ — через точний обмін HF
- **Meta-GGA:** $\mathcal{O}(N^3)$ — але з більшою константою
- **Double-hybrid:** $\mathcal{O}(N^5)$ — через MP2 кореляцію

5.8.23. Тестовий набір G2

Систематична оцінка якості функціоналів на стандартному наборі:

Посилання на файл: [code_51.py](#)

Метрики якості:

- **MAE** (Mean Absolute Error) — середня абсолютна помилка
- **RMSE** (Root Mean Square Error) — середньоквадратична помилка
- **Max error** — максимальна помилка

Типові результати для енергій дисоціації:

- LDA: MAE $\sim 0.5\text{--}1.0$ eV (переоцінює зв'язування)
- PBE: MAE $\sim 0.3\text{--}0.5$ eV
- B3LYP/PBE0: MAE $\sim 0.1\text{--}0.3$ eV (найкраще)
- M06-2X: MAE $\sim 0.2\text{--}0.4$ eV

5.8.24. Використання симетрії

Симетрія молекули може суттєво прискорити розрахунки:

Посилання на файл: [code_52.py](#)

Переваги використання симетрії:

1. **Прискорення:** 2–10х залежно від точкової групи
2. **Менше пам'яті:** блокова структура матриць
3. **Класифікація орбіталей:** по незвідним представленням
4. **Відбір правил:** для спектроскопії

Точкові групи диатомних молекул:

- $D_{\infty h}$: гомоядерні (H_2 , N_2 , O_2)
- $C_{\infty v}$: гетероядерні (CO, HF, NO)

5.8.25. Резюме секції

У цій секції ми навчилися:

- Проводити DFT розрахунки диатомних молекул
- Будувати криві потенційної енергії
- Оптимізувати геометрію та обчислювати спектроскопічні константи
- Порівнювати різні функціонали для хімічних зв'язків
- Враховувати дисперсійні взаємодії
- Розраховувати збуджені стани методом TD-DFT
- Уникати типових помилок при молекулярних розрахунках

Ключовий висновок: DFT є ефективним інструментом для опису хімічних зв'язків у діатомних молекулах, але вибір функціоналу критично важливий і залежить від типу зв'язку та властивостей, що досліджуються.

У наступному розділі ми розглянемо Post-Hartree-Fock методи (MP2, CCSD, CASSCF), які дозволяють досягти ще вищої точності для атомних та молекулярних систем, враховуючи електронну кореляцію явно.

6

Пост-Хартрі-Фоківські методи

6.1. Вступ до електронної кореляції

6.1.1. Що таке електронна кореляція?

Електронна кореляція — це різниця між точною енергією системи та енергією, отриманою методом Хартрі-Фока:

$$E_{\text{corr}} = E_{\text{exact}} - E_{\text{HF}} \quad (6.1)$$

Метод Хартрі-Фока не враховує миттєву кореляцію рухів електронів, оскільки кожен електрон рухається в усередненому полі всіх інших електронів. Насправді ж електрони "уникають" один одного через кулонівське відштовхування.

6.1.2. Типи електронної кореляції

Динамічна кореляція Пов'язана з миттєвими флуктуаціями електронної густини. Проявляється на коротких відстанях між електронами. Може бути враховані методами:

- Теорія збурень Møller-Plesset (MP2, MP3, MP4)
- Coupled Cluster (CCSD, CCSD(T))
- Configuration Interaction (CISD, QCISD)

Статична (нединамічна) кореляція Виникає, коли кілька конфігурацій близькі за енергією. Важлива для:

- Розриву хімічних зв'язків
 - Збуджених станів
 - Диелектронних систем
 - Перехідних металів з близькими d-орбіталями
- Методи: CASSCF, CASPT2, MRCI.

6.1.3. Кореляційна енергія атомів

Для атомів кореляційна енергія становить 1–5% від повної енергії, але вона критична для точних розрахунків:

Таблиця 6.1. Кореляційна енергія атомів (Ha)

Атом	E_{HF}	E_{exact}	E_{corr}	% від E_{HF}
He	−2.8617	−2.9037	−0.0420	1.5%
Be	−14.573	−14.667	−0.094	0.6%
Ne	−128.547	−128.937	−0.390	0.3%
Ar	−526.817	−527.540	−0.723	0.1%

6.1.4. Коли потрібні post-HF методи?

Методи Хартрі–Фока (HF) є фундаментом сучасної обчислювальної хімії, але вони базуються на наближенні незалежних частинок, коли кожен електрон рухається у середньому полі інших. Таке спрощення призводить до втрати частини електронної кореляції — узгоджених рухів електронів, що критично впливають на точність розрахунків. Тому в низці випадків необхідно використовувати **post-HF методи** — такі, що явно враховують кореляцію.

1. **Досягнення спектроскопічної точності.** Якщо метою є відтворення експериментальних енергій, частот або іонізаційних потенціалів з точністю < 1 kcal/mol (≈ 0.04 eV), метод Хартрі–Фока є недостатнім. Для цього застосовують розширені кореляційні підходи — MP2, CCSD(T), або багатоконфігураційні методи. Наприклад, для точної побудови потенціальної поверхні H_2 різниця між HF і FCI становить до 0.05 а.у., що перевищує експериментальну похибку у сотні разів.
2. **Порівняння близьких електронних станів.** У випадках, коли два або більше станів мають схожі енергії (наприклад, сингулярно-триплетні переходи), звичайний HF або навіть DFT можуть давати неправильний порядок рівнів. Це важливо для аналізу мультиплетів, спин-кросоверів, фотохімічних процесів тощо. Для таких задач застосовують методи типу CASSCF, MRCI або EOM-CC.
3. **Електронна спорідненість і енергії іонізації.** Методи HF та DFT часто переоцінюють або недооцінюють електронну спорідненість через неправильне описання релаксації електронної щільності після додавання або видалення електрона. Post-HF методи (наприклад, CCSD(T), ADC(2), EOM-IP/EA-CCSD) забезпечують набагато більш точне відтворення цих величин.
4. **Еталонні розрахунки.** Для перевірки функціоналів DFT або параметрів напівемпіричних методів потрібні точні «еталонні» енергії, отримані з Full CI, CCSD(T), або FCIQMC. Такі розрахунки є дорогими, але на їх

основі формуються бази даних, наприклад G2, W4 тощо, які визначають точність нових функціоналів і потенціалів.

5. **Системи з сильною електронною кореляцією.** У таких системах (наприклад, атоми або молекули з незаповненими *d*- чи *f*-орбіталями) кілька конфігурацій мають близькі енергії, і одно-детермінантний опис Хартрі–Фока руйнується. Це стосується перехідних металів, радикалів, комплексів з обміном спіну, а також розриву хімічних зв'язків (наприклад, розтягнення H₂). Для таких задач необхідні **мультиконфігураційні** методи: CASSCF, MRCI, або DMRG, які враховують «статичну» (некореляційну) складову.
6. **Залежність результатів від геометрії.** При розрахунку потенціальних поверхонь, переходів або вібраційних рівнів важливо, щоб енергії змінювалися гладко з координатою. HF може давати нерегулярності через зміни конфігурації орбіталей (переходи між станами). Post-HF методи (зокрема CASSCF) гарантують незерервність потенціальної поверхні, що важливо для квантової динаміки та моделювання спектрів.
7. **Опис збуджених станів.** HF розглядає лише основний стан, а DFT має обмеження через наближення обмінно-кореляційних функціоналів. Для збуджених станів застосовують спеціальні post-HF методи: CIS, EOM-CCSD, ADC(2), CASSCF/MRCI, які дозволяють обчислювати спектри поглинання, емісії, фотохімічні процеси та електронно-вібраційні переходи з високою точністю.

Таким чином, використання post-HF методів є не просто розкішню, а необхідністю у випадках, коли потрібна точна характеристика електронної структури, взаємодії станів або потенціальних поверхонь. Хоча їхня обчислювальна вартість значно більша, сучасні алгоритми та паралельні реалізації роблять їх цілком придатними навіть для молекул середнього розміру.

6.1.5. Концепція одно- та багатоконфігураційних методів

Одноконфігураційні методи. Базуються на одному детермінанті Слейтера (HF) і додають кореляцію через збудження:

У найпростішому випадку хвильова функція є одним детермінантом:

$$|\Psi_{\text{SR}}\rangle = |\Phi_0\rangle = |\varphi_1\varphi_2 \dots \varphi_N|. \quad (6.2)$$

Далі на нього накладають кореляційні поправки — не у вигляді нових детермінантів у самій хвильовій функції, а через операторні або збурювальні члени у виразі для енергії. Це дає «однореференсні» методи:

$$E = E_{\text{HF}} + E_{\text{corr}},$$

де E_{corr} визначається з теорії збурень (MP2, MP3...), або з експоненційного кластерного розкладу

$$|\Psi_{\text{CC}}\rangle = e^{\hat{T}}|\Phi_0\rangle, \quad \hat{T} = \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \dots,$$

у методі CCSD тощо.

До одностерміантних методів належать наступні:

- MP2, MP3, MP4 — теорія збурень
- CCSD, CCSD(T) — coupled cluster
- CISD, QCISD — configuration interaction

Добре працюють для основних станів, де один детерміант домінує у хвильовій функції.

Багатоконфігураційні методи. Коли один детерміант (тобто одна конфігурація орбіталей) не здатен адекватно описати електронну структуру системи, наприклад — при розриві хімічного зв'язку, у станах з виродженням або сильною кореляцією, необхідно враховувати **кілька детерміантів одночасно**. Такі методи називаються *багатоконфігураційними* (multireference methods).

У цьому випадку хвильова функція системи записується як лінійна комбінація кількох детерміантів:

$$|\Psi_{\text{MR}}\rangle = \sum_I c_I |\Phi_I\rangle, \quad (6.3)$$

де кожен детерміант $|\Phi_I\rangle$ є *референтним* (reference determinant) — тобто включається у побудову хвильової функції на рівних правах. На відміну від звичайного методу CI, де один детерміант є головним (HF), а решта — збудженнями з нього, у мультиконфігураційних підходах усі детерміанти вважаються рівнозначними, і їхній внесок визначається варіаційним розв'язком.

Кожен детерміант утворюється перестановкою заповнених і вільних орбіталей у певному *активному просторі*. Наприклад, у методі CASSCF(4,4) ми розглядаємо всі можливі способи розподілу 4 електронів по 4 активних орбіталях. Це породжує повний набір конфігурацій:

$$\{|\Phi_I\rangle\} = \{|(2s)^2(2p_x)^2|, |(2s)^1(2p_x)^1(2p_y)^2|, \dots\},$$

а хвильова функція є суперпозицією цих детерміантів з коефіцієнтами c_I , які знаходяться варіаційним мінімумом енергії.

До багатоконфігураційних методів належать:

- CASSCF (Complete Active Space Self-Consistent Field) — вибір активного простору та одночасна оптимізація орбіталей і коефіцієнтів c_I ;
- CASPT2 — додавання динамічної кореляції до хвильової функції CASSCF за допомогою теорії збурень другого порядку;
- MRCI (MultiReference Configuration Interaction) — багатоконфігураційна версія CI, що включає збудження з усіх референтних детерміантів.

Такі методи необхідні для опису:

- розриву або формування хімічних зв'язків (де змінюється характер орбіталей);

- збуджених станів, що мають змішаний або вироджений характер;
- діелектронних і радикальних систем, де присутні майже вироджені орбіталі;
- перехідних металів і кластерів, де кілька конфігурацій роблять суттєвий внесок у хвильову функцію.

Таким чином, у мультиконфігураційних підходах немає одного «основного» детермінанта — *усі вони є референтними*, і саме їхня комбінація забезпечує адекватний опис складної електронної структури.

6.2. Теорія збурень Møller–Plesset (MP2)

6.2.1. Теоретичні основи MP2

Теорія збурень Møller–Plesset (MP) — один із найпоширеніших пост-Хартрі–Фоківських методів для врахування електронної кореляції. Її ідея полягає у розкладі точного гамільтоніана системи у вигляді суми незбуреної частини (розв’язаної в методі Хартрі–Фока) і малих поправок:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V}, \quad (6.4)$$

де $\hat{H}_0$ — оператор Фока, а $\hat{V} = \hat{H} - \hat{H}_0$ — «збурення», яке враховує електронну кореляцію, відсутню в одноелектронному описі HF.

Енергію можна подати у вигляді ряду за параметром збурення λ :

$$E = E^{(0)} + E^{(1)} + E^{(2)} + E^{(3)} + \dots \quad (6.5)$$

де:

- $E^{(0)}$ — енергія, яку дає саме наближення Хартрі–Фока;
- $E^{(1)}$ — перша поправка збурень, яка, як виявляється, *тотожно дорівнює нулю* у випадку HF (через варіаційний принцип);
- $E^{(2)}$ — перша ненульова корекція, яку називають **енергією кореляції MP2**;
- $E^{(3)}, E^{(4)}$ — наступні наближення (MP3, MP4), що уточнюють опис кореляції.

Таким чином, **MP1 не існує як окремий метод**, оскільки поправка першого порядку вже врахована у розв’язку рівнянь Фока:

$$E^{(0)} + E^{(1)} = E_{\text{HF}}.$$

6.2.2. Формула енергії MP2

У другому порядку теорії збурень енергія записується як:

$$E^{(2)} = \frac{1}{4} \sum_{ijab} \frac{|\langle ij || ab \rangle|^2}{\varepsilon_i + \varepsilon_j - \varepsilon_a - \varepsilon_b}, \quad (6.6)$$

де:

- i, j — індекси зайнятих (occupied) орбіталей,
- a, b — індекси віртуальних (unoccupied) орбіталей,
- $\langle ij || ab \rangle$ — антисиметризовані двоелектронні інтеграли,
- ϵ_k — орбітальні енергії з HF-розрахунку.

Цей вираз описує зниження енергії системи за рахунок корельованого руху електронів, коли збурення дозволяє їм «обмінюватися» з віртуальними станами.

6.2.3. Фізичний зміст MP2-корекції

MP2 описує *динамічну електронну кореляцію* — швидкі короткодійні флуктуації положень електронів. Інтуїтивно, електрони «відчувають» один одного і миттєво уникають, що знижує енергію системи відносно незалежного HF опису.

MP2 добре працює для:

- молекул поблизу рівноважної геометрії;
- сполук із замкненими оболонками;
- систем, де кореляція не надто сильна.

А от при розриві зв'язків або в багатоконфігураційних системах (де один детермінант вже неадекватний) MP2 дає хибні результати — у таких випадках потрібні методи на кшталт CASSCF або CCSD(T).

6.2.4. Практичне застосування

У більшості сучасних програм (Gaussian, ORCA, PySCF) MP2 є базовим рівнем пост-HF розрахунків. Він забезпечує добрий баланс між точністю та обчислювальною вартістю, додаючи лише $O(N^5)$ складність порівняно з HF ($O(N^4)$).

Метод	Точність	Обчислювальна складність
HF	$\sim 1 - 5$ kcal/mol	$O(N^4)$
MP2	$\sim 0.5 - 1$ kcal/mol	$O(N^5)$
CCSD	~ 0.1 kcal/mol	$O(N^6)$
CCSD(T)	~ 0.01 kcal/mol	$O(N^7)$

Отже, MP2 є першим кроком за межі одноелектронної теорії, який дозволяє описати тонку структуру енергій, дисперсійні взаємодії та слабкі зв'язки, недосяжні в рамках Хартрі-Фока.

6.2.5. Практичний гайд: розрахунок MP2 у PySCF

Метод MP2 у PySCF реалізований як надбудова над звичайним розрахунком Хартрі-Фока (RHF або UHF). Тобто спочатку потрібно виконати HF-розрахунок, а потім передати отриманий об'єкт у модуль `mp`.

mp2_example.py

```
# =====
# mp2_example.py
# Демонстрація: розрахунок енергії MP2 для молекули води
# =====

from pyscf import gto, scf, mp

# --- 1. Задання молекули ---
mol = gto.Mole()
mol.atom = '''
O  0.0000  0.0000  0.0000
H  0.0000  0.7570  0.5870
H  0.0000 -0.7570  0.5870
'''
mol.basis = 'cc-pVDZ'
mol.unit = 'Angstrom'
mol.build()

# --- 2. Розрахунок Хартрі-Фока ---
mf = scf.RHF(mol)
mf.verbose = 0
E_HF = mf.kernel()
print(f'Hartree-Fock energy = {E_HF:.10f} Hartree')

# --- 3. Увімкнення MP2 ---
mp2_calc = mp.MP2(mf)
mp2_calc.verbose = 0
mp2_result = mp2_calc.kernel() # Повертає (E_corr, T2_amplitudes)
E_corr = mp2_result[0] # Кореляційна енергія (float)
E_MP2 = E_HF + E_corr # Загальна MP2 енергія

print(f'MP2 total energy      = {E_MP2:.10f} Hartree')
print(f'MP2 correlation energy = {E_corr:.10f} Hartree')
```

Пояснення кроків:

1. `mol` — створення об'єкта молекули (як завжди у PySCF);
2. `scf.RHF(mol)` — запуск Хартрі-Фока;
3. `mp.MP2(mf)` — ініціалізація MP2 з уже готовим SCF-об'єктом;
4. `kernel()` — обчислення повної та кореляційної енергії.

Типовий вивід:

```
Hartree-Fock energy = -76.0267656731 Hartree
MP2 total energy    = -76.2307856559 Hartree
MP2 correlation energy = -0.2040199828 Hartree
```

Важливо: Для відкритих оболонок використовуйте `mp.UMP2` (на базі UHF).

6.2.6. Практичні аспекти та обчислювальна складність MP2

Заморожене ядро (frozen core). У теорії Møller–Plesset другого порядку енергія кореляції має вигляд:

$$E_{\text{MP2}} = \sum_{ijab} \frac{|\langle ij||ab \rangle|^2}{\epsilon_i + \epsilon_j - \epsilon_a - \epsilon_b}, \quad (6.7)$$

де i, j — індекси зайнятих орбіталей, a, b — віртуальних, а ϵ_p — орбітальні енергії.

Глибокі внутрішні орбіталі (*core orbitals*), наприклад 1s-орбіталі кисню у молекулі води, мають великі за модулем енергії ϵ_i . Через це знаменник у наведеному виразі стає дуже великим, а внесок таких орбіталей у суму — незначним:

$$\frac{|\langle ij||ab \rangle|^2}{\epsilon_i + \epsilon_j - \epsilon_a - \epsilon_b} \approx 0.$$

До того ж, ці орбіталі локалізовані поблизу ядра і слабо взаємодіють з валентними електронами, тобто практично не впливають на хімічні властивості.

Щоб уникнути зайвих обчислень, у програмі PySCF часто задають параметр **frozen**, який «заморожує» кілька найнижчих (core) орбіталей:

```
mp2_calc = mp.MP2(mf).set(frozen=2)
```

Це означає, що дві найнижчі орбіталі не включаються у розрахунок енергії кореляції. Таким чином зменшується кількість зайнятих орбіталей N_{occ} , а відповідно — кількість комбінацій у сумі за i, j, a, b , що суттєво скорочує час розрахунку без втрати точності для валентної області.

Такий підхід має сенс, якщо система не містить сильно корельованих внутрішніх електронів, тобто коли валентна і внутрішня області добре розділені за енергією.

Обчислювальна складність $O(N^5)$. Метод MP2 є першим після Хартрі–Фока, який враховує електронну кореляцію, але навіть він є досить ресурсоємним. Це зумовлено структурою формули для E_{MP2} , де присутня четверна сума:

$$\sum_{ijab} \Rightarrow N_{\text{occ}}^2 N_{\text{virt}}^2 \sim O(N^4),$$

де N_{occ} — число зайнятих, а N_{virt} — число віртуальних орбіталей.

Однак найважчий етап — не сама сума, а перетворення двоелектронних інтегралів з базису атомних орбіталей (АО) у базис молекулярних орбіталей (МО):

$$(ij|ab) = \sum_{\mu\nu\lambda\sigma} C_{\mu i} C_{\nu j} C_{\lambda a} C_{\sigma b} (\mu\nu|\lambda\sigma), \quad (6.8)$$

де $C_{\mu p}$ — коефіцієнти розкладу орбіталей у базисі АО. Кожна така трансформація масштабується як $O(N^5)$, оскільки для кожного набору індексів потрібно виконати сумування за чотирма базисними функціями.

Отже, загальна складність MP2 зростає як

$$T_{\text{MP2}} \sim O(N^5),$$

що обмежує застосування цього методу до систем з приблизно 40–60 атомами (залежно від базису та апаратних ресурсів).

Оптимізація MP2 у практиці. Для пришвидшення розрахунків у PySCF застосовують такі прийоми:

- Використання опції **frozen** для замороження ядерних орбіталей;
- Застосування апроксимації RI-MP2 (Resolution of Identity), яка замінює чотириіндексні інтеграли на трьохіндексні, зменшуючи масштабність до $O(N^3)$;
- Локалізація орбіталей (LMP2), що дозволяє ефективно розв'язувати великі системи за рахунок відсікання слабких міжорбітальних взаємодій.

6.2.7. MP2 розрахунок атома Неону

Посилання на файл: [Ne_mp2.py](#)

6.2.8. MP2 для відкритих оболонок (UMP2)

Для систем з неспареними електронами використовується UMP2:

Посилання на файл: [mp2_open_shell.py](#)

6.2.9. Систематичне порівняння HF vs MP2

Посилання на файл: [HF_vs_MP2.py](#)

6.2.10. Залежність MP2 від базисного набору

MP2 сильно залежить від базису, особливо потрібні функції високих l :

Посилання на файл: [mp2_basis_convergence.py](#)

6.2.11. Переваги та недоліки MP2

Переваги:

- Відносно швидкий ($O(N^5)$) порівняно з іншими post-HF
- Добре відновлює динамічну кореляцію
- Size-consistent (правильне масштабування для великих систем)
- Доступний для великих атомів/молекул
- Добрий базис для вищих методів (MP3, MP4)

Недоліки:

- Не виправляє забруднення спіном UHF
- Може розходитись для систем з малим HOMO-LUMO gap
- Погано працює для сильно корельованих систем
- Потребує великих базисів для точних результатів
- Не варіаційний (може давати енергію нижчу за точну)

6.2.12. Рекомендації по використанню MP2

Таблиця 6.2. Коли використовувати MP2

Добре для:	Погано для:
Замкнені оболонки	Системи з малим HOMO-LUMO gap
Якісні оцінки кореляції	Розрив зв'язків
Великі системи	Збуджені стани
Слабкі взаємодії	Перехідні стани
Відносні енергії	Діелектронні системи

6.3. Coupled Cluster методи (CCSD, CCSD(T))**6.3.1. Теоретичні основи Coupled Cluster**

Coupled Cluster (CC) — один з найточніших методів для врахування електронної кореляції. На відміну від CI, CC є size-extensive (правильно масштабується для великих систем).

Хвильова функція у CC записується через експоненціальний оператор збудження:

$$|\Psi_{CC}\rangle = e^{\hat{T}}|\Phi_0\rangle \quad (6.9)$$

де $|\Phi_0\rangle$ — HF детермінант, а $\hat{T}$ — оператор кластерів:

$$\hat{T} = \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \hat{T}_3 + \dots \quad (6.10)$$

CCSD (Coupled Cluster Singles and Doubles) Враховує тільки $\hat{T}_1$ (одиначні збудження) та $\hat{T}_2$ (подвійні збудження):

$$\hat{T}_1 = \sum_i^{\text{occ}} \sum_a^{\text{virt}} t_i^a \hat{a}_a^\dagger \hat{a}_i \quad (6.11)$$

$$\hat{T}_2 = \frac{1}{4} \sum_{ij}^{\text{occ}} \sum_{ab}^{\text{virt}} t_{ij}^{ab} \hat{a}_a^\dagger \hat{a}_b^\dagger \hat{a}_j \hat{a}_i \quad (6.12)$$

CCSD(T) — «золотий стандарт» Додає пертурбативну корекцію для потрібних збуджень $\hat{T}_3$:

$$E_{CCSD(T)} = E_{CCSD} + E_{(T)} \quad (6.13)$$

де $E_{(T)}$ обчислюється за формулами четвертого порядку теорії збурень.

6.3.2. CCSD розрахунок атома Гелію

Посилання на файл: [code_8.py](#)

6.3.3. CCSD для відкритих оболонок (UCCSD)

Посилання на файл: [code_9.py](#)

6.3.4. Порівняння ієрархії методів

Посилання на файл: [code_10.py](#)

6.3.5. T1 діагностика та багатоконфігураційний характер

T1 діагностика — індикатор того, наскільки система є одноконфігураційною:

$$T_1 = \frac{\|t_1\|}{\sqrt{N_{\text{elec}}}} \quad (6.14)$$

Посилання на файл: [code_11.py](#)

6.3.6. Обчислювальна складність та масштабування

Таблиця 6.3. Порівняння обчислювальної складності методів

Метод	Масштабування	Пам'ять	Disk
HF	$\mathcal{O}(N^4)$	$\mathcal{O}(N^2)$	Мало
MP2	$\mathcal{O}(N^5)$	$\mathcal{O}(N^4)$	$\mathcal{O}(N^4)$
CCSD	$\mathcal{O}(N^6)$	$\mathcal{O}(N^4)$	$\mathcal{O}(N^4)$
CCSD(T)	$\mathcal{O}(N^7)$	$\mathcal{O}(N^4)$	$\mathcal{O}(N^4)$
CCSDT	$\mathcal{O}(N^8)$	$\mathcal{O}(N^6)$	$\mathcal{O}(N^6)$
FCI	$\mathcal{O}(e^N)$	$\mathcal{O}(e^N)$	$\mathcal{O}(e^N)$

де N — характерний розмір системи (базисних функцій або електронів).

6.4. Configuration Interaction (CI) та Full CI

6.4.1. Основи Configuration Interaction

Configuration Interaction (CI) — варіаційний метод, де хвильова функція представлена як лінійна комбінація детермінантів Слейтера:

$$|\Psi_{CI}\rangle = c_0|\Phi_0\rangle + \sum_i \sum_a^{\text{occ virt}} c_i^a |\Phi_i^a\rangle + \sum_{i<j} \sum_{a<b} c_{ij}^{ab} |\Phi_{ij}^{ab}\rangle + \dots \quad (6.15)$$

де:

- $|\Phi_0\rangle$ — HF детермінант (основна конфігурація)
- $|\Phi_i^a\rangle$ — одиночно збуджені детермінанти (S)
- $|\Phi_{ij}^{ab}\rangle$ — подвійно збуджені детермінанти (D)
- $|\Phi_{ijk}^{abc}\rangle$ — потрійно збуджені детермінанти (T)
- і т.д.

Варіанти CI методу:

- **CIS** (CI Singles) — тільки одиночні збудження (для збуджених станів)
- **CISD** (CI Singles and Doubles) — S + D
- **CISDT** — S + D + T
- **Full CI** — всі можливі збудження (точний у межах базису)

6.4.2. Full CI — точний розв'язок

Full CI включає всі можливі детермінанти і дає точну хвильову функцію та енергію в межах обраного базису:

$$E_{FCI} = \min_{\{c_i\}} \langle \Psi_{FCI} | \hat{H} | \Psi_{FCI} \rangle \quad (6.16)$$

Проблема: Кількість детермінантів зростає як:

$$N_{det} = \binom{N_{orb}}{N_{\alpha}} \times \binom{N_{orb}}{N_{\beta}} \quad (6.17)$$

Для 10 електронів у 20 орбіталях: $N_{det} \approx 10^{10}$ детермінантів!

Посилання на файл: [FullCI.py](#)

6.4.3. CISD розрахунки

CISD — практичний варіант CI, але не є size-extensive:

Посилання на файл: [CISDcalc.py](#)

6.4.4. Порівняння CI та CC методів

Посилання на файл: [CIvsCD.py](#)

6.4.5. Size-extensivity проблема CI

Важлива відмінність між CI та CC:

$$E_{CI}(2A) \neq 2 \times E_{CI}(A) \quad (6.18)$$

$$E_{CC}(2A) = 2 \times E_{CC}(A) \quad (6.19)$$

Посилання на файл: [SizeExtensivityExample.py](#)

6.4.6. Коли використовувати CI vs CC

Таблиця 6.4. Порівняння CI та CC методів

Критерій	CI	CC
Варіаційність	Так	Ні
Size-extensivity	Ні (окрім FCI)	Так
Точність	CISD < CCSD	CCSD(T) $\boxtimes$ FCI
Збуджені стани	EOM-CI, CIS	EOM-CC
Швидкість	CISD швидше CCSD	Повільніше
Стабільність	Варіаційна межа	Може розходитись
Багатоконфігураційність	Природно (FCI)	Потребує MRCC

Рекомендації:

- Використовуйте **FCI** для малих систем як еталон
- Використовуйте **CCSD(T)** для точних розрахунків одноконфігураційних систем
- Використовуйте **CISD** для швидких оцінок кореляції
- Для багатоконфігураційних систем використовуйте CASSCF/CASPT2

6.5. CASSCF – багатоконфігураційний метод

6.5.1. Ідея Complete Active Space Self-Consistent Field

CASSCF (Complete Active Space SCF) — багатоконфігураційний метод, який поєднує:

- **Активний простір** — набір орбіталей, де проводиться Full CI
- **SCF оптимізацію** — орбіталі та CI коефіцієнти оптимізуються одночасно

Орбіталі розділяються на три групи:

1. **Core (остов)** — завжди подвійно заповнені, не беруть участь у кореляції
2. **Active (активні)** — електрони розподілені по всіх можливих способах (Full CI)

3. Virtual (віртуальні) — завжди порожні

$$|\Psi_{\text{CASSCF}}\rangle = \sum_I c_I |\Phi_I^{\text{active}}\rangle \otimes |\text{core}\rangle \quad (6.20)$$

6.5.2. Позначення CASSCF(n,m)

CASSCF(n,m) означає:

- n — кількість електронів в активному просторі
- m — кількість орбіталей в активному просторі

Приклади:

- **Be:** CASSCF(4,8) — 4 валентні електрони у 8 орбіталях (2s, 2p, 3s, 3p)
- **C:** CASSCF(4,4) — 4 валентні електрони у 4 орбіталях (2s, 2p)
- **Cr:** CASSCF(6,5) — 6 електронів у 5 d-орбіталях

6.5.3. CASSCF розрахунок атома Берилію

Берилій має близькі за енергією конфігурації $2s^2$ та $2p^2$, що робить його класичним прикладом для CASSCF:

Посилання на файл: [CASSCFBe.py](#)

6.5.4. CASSCF для перехідних металів

Для перехідних металів d-орбіталі часто близькі за енергією, потребуючи багатоконфігураційного підходу:

Посилання на файл: [CASSCFTransitionMetals.py](#)

6.5.5. Вибір активного простору

Правильний вибір активного простору критичний для CASSCF:

Таблиця 6.5. Рекомендації по вибору активного простору

Система	Активний простір	Коментар
Be	(4,8): 2s,2p,3s,3p	Враховує $2s^2 \leftrightarrow 2p^2$
C	(4,4): 2s,2p	Мінімальний валентний
O	(6,6): 2s,2p + корел.	З кореляційними орбіталями
3d метали	(n,5): 3d	Тільки d-орбіталі
3d метали	(n+2,6): 3d,4s	d + s орбіталі
Лантаноїди	(n,7): 4f	f-орбіталі

Принципи вибору:

1. Включити орбіталі, близькі за енергією
2. Включити орбіталі з значною хімічною активністю

3. Більший простір $\rightarrow$ точніше, але експоненційно повільніше
4. Перевірити заселеності природних орбіталей
5. Якщо заселеності ≈ 2 або ≈ 0 , можна виключити з активного простору

6.5.6. State-averaged CASSCF

Для розрахунку декількох станів одночасно (наприклад, різних мультиплетів):

Посилання на файл: [StateAvaragedCASSCF.py](#)

6.5.7. CASPT2 — динамічна кореляція поверх CASSCF

CASSCF враховує тільки статичну кореляцію. Для повної точності потрібно додати динамічну кореляцію через CASPT2:

Посилання на файл: [CASPT2.py](#)

6.5.8. Переваги та недоліки CASSCF

Переваги:

- Правильно описує статичну кореляцію
- Може розрахувати декілька станів одночасно
- Варіаційний метод
- Підходить для розриву зв'язків, збуджених станів
- Дає природні орбіталі та заселеності

Недоліки:

- Вибір активного простору не завжди очевидний
- Експоненційне масштабування з розміром активного простору
- Не враховує динамічну кореляцію (потрібен CASPT2)
- Може бути проблеми з конвергенцією
- Потребує досвіду для правильного використання

Коли використовувати CASSCF:

- T1 діагностика > 0.05 (сильна багатоконфігураційність)
- Перехідні метали з близькими d-орбіталями
- Збуджені стани атомів
- Діелектронні системи
- Відкрито-оболонкові синглети

6.5.9. Ієрархія методів

Post-HF методи утворюють ієрархію за точністю та обчислювальною складністю:

1. **HF** — базовий рівень, без кореляції

2. **MP2** — $\mathcal{O}(N^5)$ — найпростіша кореляція
3. **MP3**, **MP4** — $\mathcal{O}(N^6)$, $\mathcal{O}(N^7)$ — вищі порядки теорії збурень
4. **CCSD** — $\mathcal{O}(N^6)$ — надійна динамічна кореляція
5. **CCSD(T)** — $\mathcal{O}(N^7)$ — "золотий стандарт" квантової хімії
6. **Full CI** — $\mathcal{O}(e^N)$ — точний розв'язок (у межах базису)

6.5.10. Важливість кореляції для різних властивостей

Таблиця 6.6. Вплив електронної кореляції на різні властивості

Властивість	Важливість кореляції	Рекомендований метод
Абсолютні енергії	Помірна	MP2, DFT
Енергії іонізації	Висока	CCSD(T)
Електронна спорідненість	Дуже висока	CCSD(T) + дифузні
Енергії збудження	Висока	EOM-CCSD, TD-DFT
Відстані між станами	Висока	CASPT2, MRCI
Дисоціація	Критична	CASSCF, MRCI
Слабкі взаємодії	Критична	CCSD(T), MP2-F12

Посилання на файл: [code_12.py](#)

6.5.11. Порівняння методів для He

Розглянемо найпростішу багатеелектронну систему — атом Гелію:

Посилання на файл: [code_13.py](#)

6.6. Практичні завдання

6.6.1. Завдання 1: Порівняння методів для He

```
"""
ЗАВДАННЯ 1: Для атома Гелію розрахуйте енергії методами
HF, MP2, CCSD, CCSD(T) та FCI з базисами cc-pVDZ, cc-pVTZ,
cc-pVQZ.

1) Побудуйте графік збіжності кожного методу до базисної межі
2) Екстраполюйте до CBS за формулою  $E(X) = E_{\text{CBS}} + A/X^3$ 
3) Порівняйте з експериментальним значенням -2.90372 Ha
4) Яка частка кореляційної енергії відновлюється кожним методом?

Базиси: cc-pVDZ, cc-pVTZ, cc-pVQZ
"""

# Ваш код тут
```

Завдання 2: T1 діагностика для другого періоду

```
""
ЗАВДАННЯ 2: Розрахуйте T1 діагностику для всіх атомів
другого періоду (Li-Ne) з базисом cc-pVDZ.

1) Для яких атомів T1 > 0.02 (багатоконфігураційні)?
2) Чи є кореляція між T1 та положенням у періоді?
3) Порівняйте T1 для основного та збудженого спінового
   стану Карбону (3P vs 1D)
4) Побудуйте графік залежності T1 від атомного номера

Базис: cc-pVDZ
""

# Ваш код тут
```

Завдання 3: Size-extensivity тест

```
""
ЗАВДАННЯ 3: Дослідіть size-extensivity для атомів Ne.

Розрахуйте методами HF, MP2, CISD, CCSD:
1) Енергію одного атома Ne
2) Енергію двох атомів Ne на відстані 100 Bohr
3) Обчисліть похибку: E(2×Ne) - 2×E(Ne)

Питання:
- Який метод є size-extensive?
- Яка похибка для CISD (у mHa)?
- Чому MP2 є size-extensive, а CISD - ні?

Базис: cc-pVTZ
""

# Ваш код тут
```

Завдання 4: CASSCF для перехідного металу

```
""
ЗАВДАННЯ 4: CASSCF аналіз атома Титану (Ti).

Ti: [Ar] 3d2 4s2, основний стан 3F

1) Розрахуйте UHF, CCSD та CASSCF(4,5) енергії
   (4 електрони у 5 d-орбіталях)
2) Проаналізуйте заселеності природних орбіталей
3) Обчисліть статичну кореляцію (CASSCF - HF)
4) Спробуйте різні активні простори: (4,5), (4,6), (6,11)
   Який найкращий?

Базис: def2-SVP
""

# Ваш код тут
```

Завдання 5: Енергії збудження

"""
ЗАВДАННЯ 5: Розрахуйте енергію збудження $^3P \rightarrow ^1D$ для атома Карбону.

Використайте методи:

- 1) Δ SCF (окремі розрахунки для кожного стану)
- 2) State-averaged CASSCF
- 3) EOM-CCSD (якщо доступно)

Порівняйте з експериментальним значенням 1.26 eV.

Який метод дає найточніший результат?

Базис: aug-cc-pVTZ

"""

Ваш код тут

Завдання 6: Кореляційна енергія vs Z

"""

ЗАВДАННЯ 6: Дослідіть залежність кореляційної енергії від атомного номера.

Розрахуйте MP2 кореляційну енергію для:

- Благородних газів: He, Ne, Ar, Kr
- У абсолютних величинах (mHa)
- У відсотках від повної енергії

Побудуйте графіки:

- 1) $|E_{\text{corr}}|$ vs Z
- 2) $|E_{\text{corr}}|/|E_{\text{HF}}|$ vs Z

Яка тенденція спостерігається?

Базис: cc-pVTZ

"""

Ваш код тут

6.7. Резюме

У цьому розділі ми детально вивчили Post-Hartree-Fock методи для врахування електронної кореляції:

6.7.1. Основні методи та їх характеристики

BK = Багатоконфігураційний

Таблиця 6.7. Порівняння Post-HF методів

Метод	Складність	Size-ext.	Варіац.	Точність	БК?
MP2	$O(N^5)$	Так	Ні	Помірна	Ні
MP3/MP4	$O(N^6/N^7)$	Так	Ні	Добра	Ні
CISD	$O(N^6)$	Ні	Так	Помірна	Ні
CCSD	$O(N^6)$	Так	Ні	Добра	Ні
CCSD(T)	$O(N^7)$	Так	Ні	Відмінна	Ні
CASSCF	$O(e^{n_{act}})$	Так	Так	Статична	Так
CASPT2	$O(e^{n_{act}})$	Так	Ні	Відмінна	Так
Full CI	$O(e^N)$	Так	Так	Точна	Так

6.7.2. Ключові висновки

1. Електронна кореляція

- Становить 1-5% від повної енергії, але критична для точних розрахунків
- Поділяється на динамічну (короткодіючу) та статичну (близькі стани)
- HF і DFT не враховують кореляцію повністю

2. MP2 — найпростіший post-HF метод

- Швидкий ($O(N^5)$), size-extensive
- Добре працює для замкнених оболонок з великим HOMO-LUMO gap
- Відновлює 80-95% кореляційної енергії
- Не виправляє забруднення спіном UHF
- Потребує великих базисів для збіжності

3. CCSD(T) — "золотий стандарт"

- Найточніший одноконфігураційний метод
- Size-extensive, відновлює >99% кореляції
- Повільний ($O(N^7)$), але надійний
- Виправляє забруднення спіном
- Обмежений розміром системи (до 20-30 атомів)

4. T1 діагностика

- $T1 < 0.02$: одноконфігураційна система (CCSD надійний)
- $0.02 < T1 < 0.05$: слабка багатоконфігураційність
- $T1 > 0.05$: потрібен CASSCF/MRCI

5. CI методи

- Варіаційні (енергія завжди вище точної)
- Full CI — точний у межах базису, але непрактичний
- CISD не є size-extensive (на відміну від CCSD)
- Корисні для аналізу хвильової функції

6. CASSCF — для багатоконфігураційних систем

- Необхідний коли $T1 > 0.05$ або близькі стани
- Вибір активного простору критичний
- Враховує статичну кореляцію
- Потребує CASPT2/NEVPT2 для динамічної кореляції
- Ідеальний для перехідних металів, збуджених станів

6.7.3. Рекомендації по використанню

Таблиця 6.8. Вибір методу залежно від задачі

Задача	Рекомендований метод	Альтернатива
Швидка оцінка кореляції	MP2	DFT
Точні енергії (1 kcal/mol)	CCSD(T)	—
Замкнені оболонки	CCSD(T), MP2	DFT
Відкриті оболонки	UCCSD(T)	ROHF-CCSD
Енергії збудження	EOM-CCSD, CASSCF	TD-DFT
Перехідні метали	CASSCF, CASPT2	DFT+U
Багатоконфігураційні	CASSCF/CASPT2	MRCI
Еталонні розрахунки	CCSD(T)/CBS	Full CI
Великі системи	MP2, DFT	DLPNO-CCSD(T)

6.7.4. Типові помилки

1. Використання MP2 для систем з малим **gap** — може давати нефізичні результати
2. Забування перевірки **T1** діагностики — CCSD може бути ненадійним
3. Занадто малий активний простір у CASSCF — не врахує всю статичну кореляцію
4. Занадто великий активний простір — неможливо розрахувати
5. Недостатній базис — post-HF методи дуже чутливі до базису
6. Ігнорування **size-extensivity** — CISD не підходить для енергій дисоціації
7. CASSCF без CASPT2 — відсутня динамічна кореляція

6.7.5. Практичні поради

1. Завжди починайте з HF розрахунку та перевірте конвергенцію
2. Для нових систем спочатку протестуйте на малому базисі
3. Перевіряйте T1 діагностику після CCSD

4. Для CASSCF: починайте з малого активного простору, збільшуйте поступово
5. Аналізуйте природні орбіталі для вибору активного простору
6. Використовуйте симетрію коли можливо
7. Для екстраполяції до CBS потрібні принаймні 3 базиси
8. Зберігайте проміжні результати (checkpoint файли)

6.7.6. Обчислювальні ресурси

Таблиця 6.9. Орієнтовний час розрахунку (відносно HF)

Метод	He (DZ)	Ne (TZ)	Ar (DZ)	Пам'ять
HF	1×	1×	1×	N^2
MP2	2×	5×	10×	N^4
CCSD	10×	50×	200×	N^4
CCSD(T)	20×	200×	1000×	N^4
CASSCF(4,8)	5×	—	—	$e^{n_{act}}$

Примітка: реальний час залежить від якості початкового наближення та конвергенції

6.7.7. Подальше вивчення

Для поглибленого розуміння post-HF методів рекомендуємо:

- **Книги:**
 - T. Helgaker et al., "Molecular Electronic-Structure Theory"
 - I. Shavitt, R. J. Bartlett, "Many-Body Methods in Chemistry and Physics"
 - R. J. Bartlett, M. Musiał, "Coupled-cluster theory in quantum chemistry"
- **Огляди:**
 - CCSD(T): Reviews in Computational Chemistry, Vol. 14
 - CASSCF: Chemical Reviews 2012, 112, 108
 - Post-HF methods: Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science
- **Документація PySCF:**
 - <https://pyscf.org/user/mp.html> — MP2, MP3
 - <https://pyscf.org/user/cc.html> — Coupled Cluster
 - <https://pyscf.org/user/mcscf.html> — CASSCF, CASPT2
 - <https://pyscf.org/user/fci.html> — Full CI

6.7.8. Що далі?

У наступному розділі ми розглянемо аналіз результатів квантово-хімічних розрахунків: орбітальні енергії, густини, заселеності, спектроскопічні вла-

стивості та візуалізацію даних.

Література

Основна література

1. *Jensen F.* Introduction to Computational Chemistry. — 3rd ed. — Wiley, 2017. — 661 p. — ISBN 1118825993.
2. *Levine I. N.* Quantum Chemistry. — 7th ed. — Pearson, 2014. — 714 p. — ISBN 978-0321803450.

Додаткові посилання

1. [Basis Sets](https://gaussian.com/basissets/). — URL: <https://gaussian.com/basissets/>.
2. *Ho M., Hernández-Perez J. M.* [Evaluation of Gaussian Molecular Integrals. I Overlap Integrals](#) // The Mathematica Journal. — 2012. — Vol. 14.
3. *Ho M., Hernández-Perez J. M.* [Evaluation of Gaussian Molecular Integrals. II. Kinetic-Energy Integrals](#) // The Mathematica Journal. — 2013. — Vol. 15.
4. *Ho M., Hernández-Perez J. M.* [Evaluation of Gaussian Molecular Integrals. III. Nuclear-Electron Attraction Integrals](#) // The Mathematica Journal. — 2014. — Vol. 16.
5. [Simple Quantum Chemistry: Hartree-Fock in Python](https://nznano.blogspot.com/2018/03/simple-quantum-chemistry-hartree-fock.html). — URL: <https://nznano.blogspot.com/2018/03/simple-quantum-chemistry-hartree-fock.html>.