

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

Термодинаміка та молекулярна фізика

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний
посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями Еб «Прикладна
фізика та наноматеріали»*

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2025

3	Другий закон термодинаміки та його основні наслідки	3
3.1	Необоротні процеси	3
3.2	Формулювання другого принципу термодинаміки	4
3.3	Еквівалентність формулювань другого принципу термодинаміки	4
3.4	Перша теорема Карно	5
3.5	Друга теорема Карно	7
3.6	Абсолютна шкала температур	7
3.7	Основний наслідок другого принципу термодинаміки	9
3.8	Ентропія	10
3.9	Зв'язок між термічним і калоричним рівнянням стану	12
3.10	Калібрування емпіричного термометра	13
3.11	Обрахунок ентропії	14
3.12	Приклад обрахунку ентропії	14
3.13	Альтернативний приклад обрахунку ентропії	15
3.14	К.К.Д. циклу Карно	16
3.15	Другий принцип і нерівноважні процеси. Нерівність Клаузіуса .	17
3.16	Ентропія і стріла часу	19
3.17	Нерівність Клаузіуса і умови термодинамічної рівноваги	20
3.18	Теплова смерть Всесвіту	20
3.19	Парадокс Гібса. Ентропія ідеального газу	21

3

Другий закон термодинаміки та його основні наслідки

3.1 Необоротні процеси

Перший закон термодинаміки не накладає ніяких обмежень щодо взаємного перетворення тепла в роботу і навпаки. Отже, він в принципі не дає відповідь на запитання про напрямок протікання процесів в природі. Також перший закон припускає сценарій, коли камінь, що впав з певної висоти і не пружно ударився об землю, викликав при цьому власне і її нагрівання, може самочинно почати охолоджуватися і підійматися на ту ж висоту, використовуючи при цьому роботу, еквівалентну теплоті, взятій від навколишнього середовища. Ніхто і ніколи не спостерігав подібне і в цьому сенсі теплота не еквівалентна роботі. З іншого боку, неважко навести приклад, коли вся теплота може бути переведена в роботу: ізотермічно нагріваючи ідеальний газ, ми можемо підіймати вантаж. Але при цьому об'єм газу змінюється і в природі залишаються необоротні зміни. З подібними прикладами ми стикаємося кожен день. Наш досвід, вся вікова робота людства вчать, що зокрема:

- а) неможливо ніяким способом обернути процес, при якому тепло виникає завдяки тертю;
- б) неможливо повністю обернути процес, при якому газ розширюється, не виконуючи над ним роботи і не передаючи тепла ззовні;
- в) неможливо повністю обернути процеси дифузії і теплопровідності;
- г) те ж саме можемо сказати про процес вибуху і багато інших.

Таким чином, існують процеси, необоротні по своїй природі. Важливо, що по закінченню таких процесів, ніяким чином неможливо повернути Природу в попередній стан нічого не змінюючи. Виконуючи таку спробу, ми обов'язково повинні виконати роботу, на виконання якої потрібна деяка кількість теплоти, віднятої у резервуару (наприклад, із допомогою циклу Карно). Таким чином, стан природи буде незворотною чином змінено. Зауважимо, що існування необоротних процесів не витікає логічним чином із якихось теоретичних міркувань; навпаки з механічної точки зору цьому нема пояснення, оскільки всі закони механіки є обернені у часі. Отже,



Вільгельм
Оствальд
(1853 – 1932)

вказані приклади і спостереження – експериментальні факти. Другий закон узагальнює їх, надаючи строге математичне формулювання, дозволяючи на цій основі будувати подальшу теорію.

3.2 Формулювання другого принципу термодинаміки

Існує кілька еквівалентних формулювань другого закону; деякі з них наведемо зараз, інші — в міру розвитку теми. Ці формулювання називають принципами. Найбільш широко послуговуються декількома, що дійсно узагальнюють відомі експериментальні факти:

- а) **Принцип Клаузіуса.** *Процес, при якому не відбувається ніяких інших змін системи, окрім передачі теплоти від термічно однорідного тіла з більшою температурою до тіла з нижчою температурою — необоротний, або ж «теплота не може спонтанно перейти від більш холодного тіла до більш гарячого без яких-небудь інших змін в системі».*
- б) **Принцип Томсона (Кельвіна).** *Процес, при якому робота переходить в тепло без ніяких інших змін системи необоротний, або ж «неможливо перетворити в роботу всю кількість теплоти, взятої від термічно однорідного тіла з повсюди однаковою температурою, не виконуючи ніяких інших змін в системі».*

І в першому і в другому формулюванні важливі уточнення «ніяких інших змін системи». Еквівалентні їм формулювання без цих уточнень будуть містити вираз «циклічний процес». В цьому випадку останній принцип формульовано, як неможливість створення *perpetuum mobile* другого роду або вічного двигуна Томсона-Планка:

- в) **Принцип Оствальда.** *Неможливо побудувати циклічно діючу машину, яка може підіймати вантаж, лише за рахунок поглинання тепла із одного теплового резервуару із повсюди однаковою температурою.*

3.3 Еквівалентність формулювань другого принципу термодинаміки

Всі наведені формулювання еквівалентні. Отже, можна користуватися будь яким залежно від того, що необхідно довести або спростувати. В такому випадку слід приймати до уваги міркування зручності.

Доведемо, наприклад, еквівалентність перших двох принципів. Для цього необхідно довести, що якщо невірний один, то невірний і другий, і навпаки. Припустимо, що несправедливе формулювання Кельвіна. Тоді, взявши від теплового резервуару з температурою T_1 , деяку кількість теплоти, перетворимо її всю в роботу. Цю ж роботу ми можемо перетворити в теплоту (так, наприклад, як це

робив Джоуль) і передати її тепловому резервуару з $T_2 > T_1$. Результатом цих двох процесів буде передача тепла від резервуару з T_1 до резервуару з $T_2 > T_1$, без інших змін в системі, що суперечить принципу Клаузіуса.

Для доведення зворотного, нам буде потрібно використовувати *теплову машину* (рис. 3.1) — термодинамічну систему, здатну виконувати циклічний оборотний процес, при якому:

- поглинається деяка кількість тепла $Q_2 > 0$ від термічно однорідного тіла з температурою T_2 .
- віддається тепло $Q_1 > 0$ в термостат з температурою T_1 .
- перехід між ізотермами виконується адіабатично.
- виконується додатна робота $A = Q_2 - Q_1$.




Рис. 3.1. Теплова машина, що виконує роботу A віднімаючи тепло Q_1 у нагрівача та віддаючи тепло Q_2 холодильнику

Припустимо, що формулювання Клаузіуса неправдиве. Нехай існує деякий процес, при якому певна кількість тепла Q_2 від термостату з температурою T_1 самочинно передається до термостату з температурою $T_2 > T_1$. Примусимо працювати теплову машину між цими температурами в такому режимі, щоб в одному циклі від резервуару з температурою T_2 віднімалось якраз Q_2 теплоти. Кінцевим результатом буде виконання роботи із теплоти $Q_2 - Q_1$, віднятої від термостата з температурою T_1 , тобто тільки за рахунок теплоти одного теплового резервуару, оскільки стан другого резервуару залишається незмінним. Це протирічить формулюванню Кельвіна.

3.4 Перша теорема Карно

Уважний читач відразу впізнав в тепловій машині, використаній для доведення еквівалентності формулювань, машину Карно. Саді Карно в своїй єдиній

праці «Роздуми про рушійну силу вогню і про машини, здатні розвивати ці сили» вказував, що такий цикл є найбільш вигідний з точки зору отримання корисної роботи від машини, що працює від теплового резервуару. Але значення теорем, які відносяться до циклу Карно, істотно важливіші і будуть використані в подальшому найширшим чином.

Отже, перша теорема Карно стверджує, що: *Всі оборотні теплові машини, маючи тепловий контакт з навколишнім середовищем лише при температурах θ_1 і θ_2 , мають однаковий К.К.Д. (коефіцієнт корисної дії), який визначається тільки температурами θ_1 і θ_2 і не залежить від природи робочої речовини і граничних адіабат.*




Рис. 3.2. Доведення першої теореми Карно

Для доведення теореми розглянемо дві теплові машини M і M' , таких що їх К.К.Д. співвідносяться як:

$$\eta_M > \eta_L \quad (3.1)$$

при тому, що обидві працюють між температурами θ_1 і θ_2 і виконують рівні роботи $A = \eta_M Q$. Із (3.1) слідує:

$$\eta_M = \frac{|A|}{Q} < \frac{|A|}{Q'} \quad (3.2)$$

де Q та $Q' = Q \frac{\eta_M}{\eta_L}$ — тепло, отримане від нагрівача машинами M і M' , відповідно. Примусимо працювати машину M' , як холодильник. Роботу, необхідну для цього, будемо отримувати від машини M . Результатом їх взаємної дії буде:

- передача в циклі теплоти $\Delta Q = Q' - Q = Q \left(\frac{\eta_M}{\eta_L} - 1 \right)$ від більш холодного тіла до більш гарячого;
- робота не виконується і немає ніяких змін в навколишньому середовищі, що неможливо за формулюванням Клаузіуса.

Такі ж міркування можемо навести припускаючи, що $\eta_L > \eta_M$. Обернувши дію машини, ми знову отримуємо суперечність. Звідси випливає, що $\eta_L = \eta_M$. Зауважимо, що в силу довільності вибору адіабат та робочої речовини, К.К.Д. такої машини від них не залежить. Таким чином К.К.Д. не залежить від параметрів

адіабат, а отже є тільки функцією температур нагрівача і холодильника:

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = f(\theta_1, \theta_2) \quad (3.3)$$

3.5 Друга теорема Карно

Друга теорема Карно стверджує, що: *К.К.Д. всіх оборотних теплових машин, що мають тепловий контакт з навколишнім середовищем лише при температурах θ_1 і θ_2 становить $\eta = 1 - \theta_2/\theta_1$* . Оскільки к.к.д. теплової машини Карно не залежить від робочої речовини і конструкції машини (положення адіабат), для конкретизації виразу К.К.Д. знайдемо його для будь-якого циклу Карно, наприклад для циклу, що працює на ідеальному газі. Користуючись лемою Карно, маємо:

$$\eta = 1 - \frac{\theta_2}{\theta_1} \quad (3.4)$$

де θ_1 і θ_2 — значення температур, виміряних емпіричним термометром в ідеальній газовій шкалі.

3.6 Абсолютна шкала температур




Рис. 3.3. Обґрунтування абсолютної шкали температур Кельвіна

Відношення (3.4) дозволило Томсону (Кельвіну) запропонувати абсолютну термодинамічну шкалу, тобто такий термометр, покази якого не залежать від природи термометричного тіла. Розглянемо дві теплові машини, що працюють між тепловими резервуарами θ_1 і θ_0 та θ_0 і θ_2 , відповідно (рис. 3.3). θ_0

обираємо довільно, при чому для одної машини резервуар з температурою θ_0 є холодильником, а для іншої нагрівачем. Тоді справедливе відношення

$$\frac{Q_1}{Q_0} = \varphi(\theta_1, \theta_0); \quad \frac{Q_0}{Q_2} = \varphi(\theta_0, \theta_2), \quad (3.5)$$

де Q_0 – тепло, віддане в холодильник першою машиною і отримане іншою. Тоді, власне кажучи, проміжний термостат може бути виключений. Для цього перемножимо перше і друге відношення в (3.5). Отримаємо

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \varphi(\theta_1, \theta_0) \cdot \varphi(\theta_0, \theta_2) \quad (3.6)$$

що еквівалентно

$$\varphi(\theta_1, \theta_0) \cdot \varphi(\theta_0, \theta_2) = \varphi(\theta_1, \theta_2) \quad (3.7)$$

У виродженому випадку $\theta_1 = \theta_2$, знайдемо:

$$\varphi(\theta_1, \theta_0) = \frac{1}{\varphi(\theta_0, \theta_1)} \quad (3.8)$$

оскільки очевидно, що $\varphi(\theta_1, \theta_1) = 1$, тобто К.К.Д. циклічного процесу, нагрівачем і холодильником якого є один і той самий тепловий резервуар, дорівнює нулю. Використовуючи (3.8), перепишемо (3.7) як:

$$\varphi(\theta_1, \theta_2) = \frac{\varphi(\theta_1, \theta_0)}{\varphi(\theta_2, \theta_0)} \quad (3.9)$$

Але, оскільки в повному циклі θ_0 не фігурує, то:

$$\varphi(\theta_1, \theta_2) = \frac{\varphi(\theta_1)}{\varphi(\theta_2)} \quad (3.10)$$

Поклавши тепер, як це було зроблено Томсоном в 1848 році, що $T = \varphi(\theta)$ отримуємо:

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{T_1}{T_2} \quad (3.11)$$

Це дає принциповий спосіб побудови температурної шкали. Практичний спосіб, що дозволяє пов'язати покази реального термометра θ із абсолютною температурою T , розглянемо згодом. А зараз зазначимо наступні важливі особливості:

- визначення абсолютної шкали не пов'язано з особливостями термометричного тіла, а визначається лише другим законом термодинаміки;
- гранична температура $T_1 = 0$ називається абсолютним нулем. Абсолютний нуль існує як математична абстракція, в тому сенсі, що реалізувати цикл Карно з температурою холодильника $T_1 = 0$ неможливо, оскільки в такому циклі все тепло перетворюється в роботу. Але зауважимо, звідси не витікає неможливість досягнення абсолютного нуля.

в) із (3.11) випливає, що температура може бути або додатною, або від'ємною.

Довести невід'ємність або від'ємність температури немає можливості. Її знак визначається додатковою домовленістю, яка температура більша, а яка менша. Ми вважаємо, що при передачі тілу за рівноважних умов деякої кількості тепла при фіксованих зовнішніх параметрах, його внутрішня енергія збільшується, що еквівалентно твердженню про невід'ємність теплоємності:

$$C_X = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_X \geq 0 \quad (3.12)$$

3.7 Основний наслідок другого принципу термодинаміки

Не варто розглядати теплову машину, як деяку машину, придатну лише для виконання корисної роботи. Навпаки, в силу унікальності її властивостей, що сліднують із другого закону термодинаміки, наслідки і висновки, отримані при дослідженні її роботи, мають дати нам уявлення про універсальні закономірності, яким сліднують термодинамічні системи без винятку. Зокрема, в подальшому тепловою машиною Карно будемо називати будь-який фізичний процес і в будь-якій системі, що виконує цикл Карно.




Рис. 3.4. Нескінченно малий цикл Карно на індикаторній діаграмі в довільній фізичній системі.

Розглянемо цикл Карно, утворений безкінечно близькими ізотермами T і $T - \Delta T$ в деякій довільній фізичній системі, що описується змінними T, P, V (рис. 3.4). Тепло, отримане від термостату з температурою T буде:

$$Q_{12} = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \Delta V, \quad (3.13)$$

де ΔV може бути обрано малим, щоб диференціали можна було замінити приростом, а $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$ і вважати незмінними. З іншого боку робота в циклі, з точністю до малих вищого порядку, дорівнює площі паралелограма 123'4'

$$A = \Delta P \Delta V \quad (3.14)$$

Відношення (3.14) до (3.13) дає К.К.Д. машини Карно:

$$\eta = \frac{A}{Q_{12}} = \frac{\Delta P \Delta V}{\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P\right] \Delta V} = \frac{\Delta T}{T} \quad (3.15)$$

Відношення (3.15) тим точніше виконується, чим більші ми «стягуємо» цикл 1234 в точку 1. Звідси, переходячи до границі, отримаємо

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P = T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \quad (3.16)$$

Неважко зрозуміти, що отримане співвідношення є універсальним в тому сенсі, що виконується для будь-якої системи, описаної змінними P, V, T , а по-друге, легко може бути узагальнено на інші системи формальною заміною $P \rightarrow F$, а $V \rightarrow x$, де F — узагальнена сила, а x — узагальнений зовнішній параметр. Нарешті зауважимо, що в приведеному доведенні добре проглядається взаємозв'язок методу циклів і диференціального підходу Клаузіуса. Почавши з першого, ми зрештою отримаємо диференціальне відношення (3.16).

3.8 Ентропія




Рис. 3.5. До виводу рівняння Клаузіуса

Для нескінченно тонкого циклу Карно із нескінченно близькими адіабатами, але кінцевою різницею температур T_1 і T_2 , кількість підведеного і відведеного тепла безкінечно мала і тоді

$$\frac{\delta Q_1}{T_1} = \frac{\delta Q_2}{T_2} \quad (3.17)$$


Розглянемо на індикаторній діаграмі довільний фізично можливий цикл¹. Покриємо увесь процес сукупністю нескінченно тонких циклів Карно (рис. 3.5). Для того, щоб це зробити, необхідно, щоб адіабати не перетинались, а ізотерми перетинались з адіабатами лише один раз, що легко доводиться методом циклів з використанням II закону. Між іншим, із перетину адіабати з ізотермою лише в одній точці можна сформулювати другий закон, як принцип *адіабатичної недосяжності Каратеодорі*: «*поблизу будь-якого термічно рівноважного стану термічно однорідної системи існує як завгодно близький інший стан, який ніколи не може бути досягнутий адіабатичним шляхом*». Для кожного із безкінечно тонких циклів Карно виконується співвідношення (3.17). Тоді для суми по всіх циклах це також виконується. В результаті, в границі зубчаста форма покриття циклу зникає, а (3.17) переходить в:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0. \quad (3.18)$$

Звісно, такий цикл повинен бути оборотним, бо тоді покриття оберненими циклами Карно не буде адекватним. Умова (3.19) є необхідною і достатньою умовою існування повного диференціала:

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \quad (3.19)$$

а сама функція S є функцією стану. Неважко побачити, що отримана функція еквівалентна тій, яка була знайдена для ідеального газу і була названа ентропією. В перекладі з грецької (*εντροπία*) означає здатність до перетворення. Вираз (3.18) отримав назву *рівність Клаузіуса* для рівноважних циклічних процесів, а (3.19) є фактично математичним змістом другого закону. Деякі автори так його і формулюють, визначаючи разом із температурою та внутрішньою енергією ще одну функцію стану — ентропію. По Зоммерфельду: «*Кожна термодинамічна система має функцію стану названу ентропією. Ентропія розраховується так. Система переводиться із вибраного початкового стану в кінцевий квазістатично; обраховуються при цьому всі підведені до системи порції теплоти δQ і діляться на відповідну температуру; всі приведені теплоти підсумовуються*».



Арнольд
Зоммерфельд
(1868 – 1951)

¹Суттєво, щоб обраний цикл можна було вкрити сіткою адіабат та ізотерм

3.9 Зв'язок між термічним і калоричним рівнянням стану

Вираз (3.19) має сенс, якщо кількість теплоти δQ підводиться оборотним способом (тобто при використанні всієї доступної системи роботи). Якщо δQ задовольняє I закон, то:

$$TdS = dU + PdV, \quad (3.20)$$

або в загальному випадку:

$$TdS = dU + \sum_{i=1}^n F_i dx_i, \quad (3.21)$$

Ці рівняння є базовими при аналізі всіх термодинамічних систем з постійною кількістю речовини. Взагалі для такого аналізу нам було потрібне як термодинамічне, так і калоричне рівняння стану. Рівняння (3.21) дає нам можливість користуватися лише одним із них. Дійсно:

$$dS = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{x_1, \dots, x_n} dT + \frac{1}{T} \sum \left[\left(\frac{\partial U}{\partial x_i} \right)_{T, F_{i \neq j}} + F_i \right] dx_i \quad (3.22)$$

Диференціюючи по dT_i по dx_i знайдемо

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{x_i} = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{x_1, \dots, x_n}; \quad \left(\frac{\partial S}{\partial x_i} \right)_{T, F_{i \neq j}} = \frac{1}{T} \left[\left(\frac{\partial U}{\partial x_i} \right)_{F_{i \neq j}} + F_i \right] \quad (3.23)$$

Оскільки змішані похідні повинні бути рівними, тобто

$$\frac{\partial^2 S}{\partial T \partial x_i} = \frac{\partial^2 S}{\partial x_i \partial T} \quad (3.24)$$

отримуємо:

$$T \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{x_i} = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + F_i \quad (3.25)$$

що в окремому випадку $F_i = P$ збігається із (3.16):

$$T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \quad (3.26)$$

Отриманий вираз пов'язує термічне і калоричне рівняння стану, значно спрощуючи розв'язок термодинамічних задач. Наприклад, для ідеального газу із рівняння Менделєєва-Клапейрона знайдемо, що $\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \frac{R}{V}$. Звідси із (3.26)

знайдемо, що:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0 \quad (\text{Закон Джоуля-Томпсона}), \quad (3.27)$$

що дає можливість проінтегрувати вираз для dU :

$$U = \int dU = \int \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \int \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV = \int C_V dT = C_V T + U_0 \quad (3.28)$$

Для різниці теплоємностей $C_P - C_V$ із першого закону знайдемо:

$$C_P - C_V = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \quad (3.29)$$

З урахуванням (3.26), отримаємо:

$$C_P - C_V = T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = V_0 T \frac{\alpha^2}{\beta} \quad (3.30)$$

Для ідеального газу

$$C_P - C_V = V_0 T \frac{1}{T^2} P = R \quad (\text{рівняння Маєра}) \quad (3.31)$$

3.10 Калібрування емпіричного термометра

Вираз (3.26) дає нам ключ до практичного реалізації калібрування емпіричної шкали температури Θ (наприклад, газової) за абсолютною термодинамічною (T). Із закону Бойля-Маріотта $PV = R\Theta$:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial \Theta} \right)_V = \frac{R}{V} = \frac{P}{\Theta}. \quad (3.32)$$

Із (3.26) випливає:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_\Theta = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0. \quad (3.33)$$

Підставляючи (3.32) і (3.33) в (3.26), отримуємо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \frac{P}{T} = \left(\frac{\partial P}{\partial \Theta} \right)_V \left(\frac{\partial \Theta}{\partial T} \right) = \frac{P}{\Theta} \frac{d\Theta}{dT}, \quad (3.34)$$

де враховано, що зв'язок між температурними шкалами є однозначним. Інтегруючи отриманий вираз, знайдемо:

$$T = C\Theta. \quad (3.35)$$

Таким чином, абсолютна і газова шкали збігаються з точністю до константи. Якщо використовувати один і той же масштаб — 1°C , то множник дорівнює 1. Отже, ідеально-газова шкала тотожна абсолютній. Загалом то для створення

термометра, що дає показання в шкалі Кельвіна, можна скористатися будь-яким термометричним тілом. Це впливає із (3.26), якщо прийняти до уваги, що $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial P}{\partial \Theta}\right)_V \frac{d\Theta}{dT}$. Користуючись (3.26):

$$\frac{d\Theta}{d(\ln T)} = \frac{\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_\Theta + P}{\left(\frac{\partial P}{\partial \Theta}\right)_V}. \quad (3.36)$$

Оскільки всі показання в правій частині (3.36) доступні експериментальним вимірам з використанням емпіричної шкали, то це встановлює однозначну відповідність між Q і T . На сьогодні для калібрування використовується газовий термометр в діапазоні $4 \div 1500^\circ\text{K}$, магнітні властивості деяких речовин при $T < 4^\circ\text{K}$ і властивості випромінювання при $T > 1500^\circ\text{K}$.

3.11 Обрахунок ентропії

Формулювання другого закону термодинаміки Зоммерфельдом вказує нам метод обрахунку ентропії. При цьому не важливо, по якому шляху проходить інтегрування. В такому разі його можна і потрібно обирати найзручнішим чином. Єдине, чого потрібно дотримуватися, щоб обраний процес був оборотнім, що впливає із визначення ентропії (3.18). Звичайно, таким чином ми можемо обчислити тільки зміну ентропії. Розглянемо, наприклад, процес Гей-Люссака (рис. ??), при якому газ, що знаходиться в об'ємі V_1 , розширившись в вакуум і зайняв об'єм V_2 . Обчислити зміну ентропії в такому процесі неможливо, тому що він незворотній. Але скористаємося незмінністю температури в цьому процесі в початковому і кінцевому стані. Тоді, стиснувши газ, що розширився ізотермічно до об'єму V_1 , можна знайти ΔS :

$$\Delta S = \int_{V_2}^{V_1} \frac{\delta Q}{T} = \frac{1}{T} \int_{V_2}^{V_1} P dV = R \int_{V_2}^{V_1} \frac{dV}{V} = R \ln \frac{V_1}{V_2} \quad (3.37)$$

Неважко переконатися, що цей же результат може бути отриманий з використанням формули (24.3), розрахованої для ентропії ідеального газу в загальному випадку.

3.12 Приклад обрахунку ентропії

Те, що ентропія є функцією стану, робить її потужним інструментом при вирішенні практичних задач. Нехай термодинамічний цикл складається із ізотерми 12, адіабати 31 і процесу 23, при якому теплоємність змінюється

по закону $C = kT^2$. Нам не потрібно знати, про яку робочу речовину йде мова. Зауважимо, що теплоємність $C = T \frac{dS}{dT}$. Звідси випливає, що $\frac{dS}{dT} = \frac{C}{T}$. Якщо відомі температури T_1 і T_2 , теплоти Q_{12} , то К.К.Д. такого циклу легко розраховується, як відношення площ на діаграмі TS .

3.13 Альтернативний приклад обрахунку ентропії

Альтернативний приклад. Необхідно знайти роботу циклу, що складається з двох ізотерм і двох політроп. Нехай на ізотермі 12 отримано тепло Q . На діаграмі TS такий цикл буде зображений у вигляді двох паралельних осі S відрізків і двох однакових кривих, з'єднуючих їх в точках 1 – 4 і 2 – 3 (рис. 3.6). Їх подібність випливає з того, що:

$$S = S_0 + \int_{T_H}^T \frac{CdT}{T} = S_0 + C \ln \frac{T}{T_H},$$

тобто з постійності теплоємностей на політропах. Повна робота дорівнює повному теплу, отриманому в циклі і, отже, площі на діаграмі TS (подібно площі на індикаторній діаграмі). Звідси:

$$A = (T_2 - T_1)\Delta S = \frac{(T_2 - T_1)}{T_2}Q.$$




Рис. 3.6. Використання $T - S$ діаграми для обрахунку роботи в циклі

Зауважимо, що цей же результат ми отримали б для будь-якого процесу, теплоємність якого є функцією температури $C(T)$ і не залежить від об'єму.

Дійсно, і в цьому випадку:

$$\Delta S_{23} = \int C(T) \frac{dT}{T} = \Delta S_{41}.$$

Цікаво, що формальний вираз для роботи в такого роду циклах, такий же, як і для циклу Карно — добуток теплоти, отриманої на ізотермі, на К.К.Д. циклу Карно $\frac{\Delta T}{T}$. Звісно, справжній К.К.Д. менший, оскільки робота є добутком всього тепла, отриманого в циклі, на К.К.Д. $A = (Q_{41} + Q_{12})\eta$. Отримане тепло ж, рівне площі під кривими 41 і 12. Лише для циклу Карно паралелограм 1234 перетворюється на паралелепіпед і, відповідно, $Q_{41} = 0$, а відношення $\frac{\Delta T}{T}$ — справжній К.К.Д.

3.14

К.К.Д. циклу Карно

Подібним чином, з використанням діаграми TS , можна показати, що К.К.Д. циклу Карно більший, ніж К.К.Д. будь-якого рівноважного циклу, в якого максимальна і мінімальна температури дорівнюють температурам нагрівача і холодильника в циклі Карно (друга теорема Карно для рівноважних процесів).




Рис. 3.7. Використання $T - S$ діаграми для доведення максимального К.К.Д. циклу Карно.

Дійсно, розглянемо довільний цикл на 1234 на діаграмі TS . Порівняємо К.К.Д. цього циклу η_{1234} із К.К.Д. циклу Карно η_C , що працює між температурами нагрівача і холодильника, які дорівнюють максимальній T_2 та мінімальній T_4 температурам, що спостерігаються в циклі 1234. Оскільки, відповідно до першої теореми Карно, К.К.Д. циклу Карно не залежить від граничних адіабат, оберемо

для порівняння цикл Карно $BCDE$, в який вписується цикл 1234 (рис. 3.7). Робота, що виконується в такому циклі Карно C дорівнює площі прямокутника $BCDE$. Це є наслідком першого принципу термодинаміки для циклічних процесів, адже сума всіх теплот в циклі дорівнює інтегралу від TdS по замкненому контуру. Аналогічно робота в циклі 1234 дорівнює площі фігури описаною циклом і, як видно із рисунку, становить $C - q_1 - q_2$. Теплота, отримана в циклі Карно Q_C дорівнює площі прямокутника $ACDF$, а теплота, отримана в циклі 1234, площі під кривою 123 і становить $Q_C - q_1$. Перевіримо, чи виконується нерівність $\eta_C \geq \eta_{1234}$

$$\eta_C = \frac{A_C}{Q_C} \geq \frac{A_C - q_1 - q_2}{Q_C - q_1} = \eta_{1234}. \quad (3.38)$$

помноживши чисельник і знаменник з лівої частини нерівності на знаменник і чисельник відповідно із правої частини отримаємо:

$$A_C Q_C - A_C q_1 \geq A_C Q_C - Q_C q_1 - Q_C q_2, \quad (3.39)$$

$$Q_C(q_1 + q_2) \geq A_C q_1 \quad (3.40)$$

після не складних перетворень маємо нерівність:

$$1 + \frac{q_1}{q_2} \geq \eta_C \quad (3.41)$$

що завжди виконується! Таким чином, твердження доведено.

3.15 Другий принцип і нерівноважні процеси. Нерівність Клаузіуса

Сформулюємо тепер другий закон термодинаміки для нерівноважних процесів. Для цього розглянемо перехід із стану 1 в 2 рівноважним та нерівноважним способом. І в тому, і в іншому випадку кількість переданої (затраченої) теплоти визначається першим законом:

$$\delta Q_{\text{нр}} = dU + \delta A_{\text{нр}} \quad (3.42)$$

$$\delta Q = dU + \delta A \quad (3.43)$$

Віднімаючи (3.43) від (3.42), отримаємо:

$$\delta Q_{\text{нр}} - \delta Q = \delta A_{\text{нр}} - \delta A \quad (3.44)$$

Рівняння (3.44) є математичним записом першого принципу термодинаміки для циклічного процесу $2 \rightarrow IR \rightarrow 1 \rightarrow R \rightarrow 2$. Перехід $2 \rightarrow IR \rightarrow 1$ — необоротний, а, отже, повернення із 1 в 2 без ніяких змін в природі неможливе. Різниця не може дорівнювати нулю, бо це означало б, що необоротний




Рис. 3.8. До виводу нерівності Клаузіуса

процес переходу із стану 2 в 1 можна рівноважно обернути без змін в навколишньому середовищі. Вона не може бути додатною, тому що це означало б, що додатна робота $\delta A_{\text{пр}} - \delta A > 0$ була б виконана речовиною в циклічному процесі лише за рахунок теплоти джерела без відповідної компенсації (без змін в навколишньому середовищі). Від'ємне значення (3.44) можливе, оскільки в цьому випадку теплота $\delta Q_{\text{пр}} - \delta Q > 0$ передається джерелу тепла за рахунок роботи $\delta A_{\text{пр}} - \delta A > 0$, що дозволяється другим законом (вся робота може бути переведена в теплоту). Звідси випливає, що:

$$\delta Q_{\text{пр}} < \delta Q; \quad \delta A_{\text{пр}} < \delta A; \quad (3.45)$$

або

$$dS > \frac{\delta Q_{\text{пр}}}{T}. \quad (3.46)$$

Інтегруючи,

$$S_2 - S_1 > \int_1^2 \frac{\delta Q_{\text{пр}}}{T} \quad (3.47)$$

Із (3.46) і (3.47) робимо висновок, що:

- а) перехід системи із одного стану в інший, виконаний адіабатою квазістатично, неможливо виконати адіабатично нерівноважно;
- б) При адіабатично нерівноважному процесі ($\delta Q_{\text{пр}} = 0$)

$$dS > 0, \quad (3.48)$$

ентропія системи зростає.

Якщо скористатися означенням ентропії, то співвідношення (3.47) можна узагальнити:

$$S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \frac{\delta Q_{\text{нр}}}{T}, \quad (3.49)$$

де знак рівності відноситься до випадку рівноважних оборотних процесів. Для циклічних процесів нерівність (3.49) матиме вигляд:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0, \quad (3.50)$$

де знак рівності відноситься до рівноважних оборотних процесів. Вираз (3.50) отримав назву *нерівність Клаузіуса*. Вона складає математичну суть другого закону і розкриває фізичну суть ентропії, як міру необоротності нерівноважних процесів. В еквівалентному вигляді:

$$S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}, \quad (3.51)$$

з якого випливає, що в ізольованих системах в будь-яких процесах ентропія не зменшується. Основне рівняння, що об'єднує I і II закони, можна тоді переписати:

$$TdS \geq dU + \sum_i F_i dx_i \quad (3.52)$$

3.16 Ентропія і стріла часу

Рівняння (3.51) не слід розуміти так, що при нерівноважному переході між станами 1 і 2 зміна ентропії інша, ніж при рівноважному переході. Ентропія — функція стану і однозначно визначається станами 1 і 2. Знак нерівності означає, що обчислений інтеграл менший у випадку нерівноважного процесу, ніж в рівноважному, для якого його значення дає можливість обчислити ентропію. Аналогічно, для адіабатних систем (3.51) означає, що нерівноважна система може перейти в стан з великим значенням ентропії, але ніколи з меншим. Оскільки всі реальні процеси нерівноважні, то в таких системах ентропія завжди зростає. Звідси випливає, що *«природні процеси в ізольованих (чи лише в адіабатно ізольованих системах) проходять в напрямку росту ентропії»*. Тим самим, другий закон виділяє стрілу часу — напрямок протікання природних процесів (рис. 3.9). Зауважимо, що цей закон не може бути отриманий з перших принципів, тобто із знання руху мікроскопічних часток: всі механічні і квантовомеханічні закони оборотні в часі. Оборотність мікроскопічних законів руху і необоротність макроскопічних — виклик людству, кинутий Природою, остаточної відповіді на який, поки що не знайдено.




Рис. 3.9. Стріла часу як її бачать автори. За репродукцією картини Сальвадора Далі «Стійкість пам'яті (La persistencia de la memoria)»¹

3.17 Нерівність Клаузіуса і умови термодинамічної рівноваги

Для довільних процесів (не обов'язково адіабатних) процес переходу із 1 в 2 не може бути реалізований, якщо при цьому буде порушуватися нерівність (3.51). Це значить, що якщо на систему накладені деякі обмеження, її стан може мінятися лише так, щоб виконувалася нерівність (3.51) при таких обмеженнях. Якщо жодне з можливих обмежень не задовольняє нерівність, то система може знаходитися в такому стані нескінченно довго. Можна поглянути на це з дещо інших позицій — нерівність (3.51) можна розглядати, як умову рівноваги при різних обмеженнях.

3.18 Теплова смерть Всесвіту

Всі вищенаведені міркування у вигляді близькому до сучасних, були зроблені Рудольфом Клаузіусом. Але узагальнення, зроблені ним про системи космічного масштабу (Всесвіт), привели до парадоксальних висновків про те-

¹Сам Далі заявляв, що не знає сенсу твору і це дало мистецтвознавцям і вченим багато можливостей інтерпретувати картину різними способами, зокрема як ілюстрація ідей Айнштейна про відносність часу. Проте хто сказав що це не може бути гарною ілюстрацією Стріли часу і невідворотності зростання ентропії і безладу в природних процесах?

пову смерть Всесвіту. Хід думок приблизно такий: якщо будь-які процеси проходять зі збільшенням ентропії, то рано чи пізно Всесвіт буде знаходитись в абсолютній рівновазі, коли ніякі процеси в ній не будуть можливі, оскільки буде виконуватися нерівність Клаузіуса.

Насправді перенесення законів, виведених на основі спостереження систем в земних умовах, неправомірне, оскільки для гравітаційних систем не виконуються, як мінімум, пропорційність енергії системи її об'єму. Чудовий приклад, що це підтверджує, — чорні діри. Окрім цього, Всесвіт можна назвати сильно флуктуюючою системою (рис. 3.10). Оскільки стан термодинамічної системи, яку ми так назвали, це лише найбільш ймовірний, то опис великих відхилень методами термодинаміки неадекватний і може бути зроблений лише методами статистики. В цьому плані Всесвіт, хоч це і макроскопічна система, яка має в собі величезну кількість часток, подібний системі, яка має всього десяток часток. По дотепному зауваженню Планка, для десяти молекул, що знаходяться в замкненому об'ємі, перший закон термодинаміки справедливий, але з такої системи не можна сконструювати теплової машини внаслідок великих флуктуаційних явищ — для таких систем другий закон просто не має сенсу.




Рис. 3.10. Структура Всесвіту **а** та окремих молекул **б** як приклади сильно флуктуючих та неоднорідних систем

3.19 Парадокс Гібса. Ентропія ідеального газу

Виконаємо корисну вправу, що дозволить встановити деякі властивості ентропії. Нехай два гази 1 та 2, по одному молю кожен, займають рівні об'єми V і розділені перегородкою (рис. 3.11а). Температура газів однакова, а, отже, і тиски однакові. Видалимо перегородку. По закінченню дифузії два гази займуть об'єм $2V$ (рис. 3.11б). Дослід показує, що температура газів не поміняється, тиск також внаслідок закону Дальтона.

Для знаходження різниці ентропій газів можна скористатися двома способами. Можна знайти різницю як різницю ентропій після змішування і суму ентропій газів до змішування. Оскільки *температура не помінялась*, то до

змішування:

$$S = R \ln V + R \ln V + S_{01} + S_{02}, \quad (3.53)$$

а після змішування:

$$S = R \ln 2V + R \ln 2V + S_{01} + S_{02} \quad (3.54)$$

де S_{01}, S_{02} — початкові значення ентропій газів 1 і 2. Звідси $\Delta S = 2R \ln 2$.

Зауважимо, що оскільки $T = \text{const}$, то $\Delta U_{12} = 0$, робота газами не виконується, отже, $\delta Q_{1,2} = 0$. В такому випадку:

$$\int_I^{\text{II}} \frac{\delta Q}{T} = 0 < R \ln 2, \quad (3.55)$$

що підтверджує, що процес є необоротним.

Для обчислення ентропії другим способом необхідно придумати оборотний процес, що відновлює вихідний стан. Скористаємося напівпроникними перегородками A і B , одна із яких (A) прозора для газу 1, а інша (B) для газу 2. Ізотермічно пересунемо перегородки в положення O . Для цього потрібно виконати роботу:


$$A = 2A_1 = 2A_2 = 2 \int_{2V}^V \frac{RT}{V} dV = -2RT \ln 2 \quad (3.56)$$

В силу того, що $T = \text{const}$, $Q = A$. Звідси:

$$\Delta S_{\text{II} \rightarrow \text{I}} = \frac{\Delta Q}{T} = -2R \ln 2, \quad (3.57)$$

де знак «-» обумовлений тим, що ми шукали зміну ентропії в зворотному процесі. Величини (3.55) і (3.56) називаються *ентропією змішування*. Якщо припустити, що гази однакові, то прийдемо до парадоксу (*парадокс Гіббса*). Ясно, що якщо прибрати перегородку між двома однаковими газами, то ніяких макроскопічних і мікроскопічних змін не відбудеться і відповідно ΔS повинно дорівнювати 0. Але ж вона обраховується! Парадокс вирішується, якщо збагнути, що як завгодно близьких за властивостями газів не буває. Будь-які властивості (маса молекули, спин тощо), що дозволяють розрізнити гази, принципово припускають конструювання фільтру, що розрізняє гази, а отже, і обрахувати ΔS способом запропонованим вище, тобто, витрачаючи роботу при ізотермічному стисненні. Якщо ж немає такої властивості, то гази тотожні і ми не здатні провести поділ газів напівпроникними перегородками.

Але ж якщо для розрахунку ΔS користуватись виразом для ентропії ідеального газу, то знову маємо парадокс — отримаємо той же результат (3.55).



Джон Дальтон
(1766 – 1844)




Рис. 3.11. До ілюстрації парадоксу Гібса: **а** два гази розділені теплопровідною перегородкою, **б** гази після змішування, **в**) гази після розділення завдяки руху двома напівпроникливими окремо для кожного з них перегородками

Парадокс перетворюється на параксизм, якщо згадати, що ентропія, вочевидь, екстенсивна величина — подвоєння об'єму речовини приводить до необхідності подвоєння кількості тепла, що передається. Для того, щоб задовольнити цю властивість, необхідно ввести питому ентропію, що приходить на один моль. Тоді і другу екстенсивну величину, що входить в вираз для ентропії слід відносити до кількості молів.

$$S = \nu(C_V \ln T + R \ln \frac{V}{\nu}). \quad (3.58)$$

Дійсно, якщо розділити певний об'єм навпіл, ентропія зменшується вдвічі лише в тому разі, якщо густина газу залишається незмінною і тим самим стан газу не міняється. Більш наочним ці міркування стають якщо виразити ентропію через інтенсивні величини. Підставивши питомий об'єм $\frac{V}{\nu} = \frac{RT}{P}$ в (3.58) дістанемо:

$$S = \nu(C_P \ln T - R \ln P). \quad (3.59)$$

Використовуючи вирази (3.58) або (3.59) для однакових газів отримаємо $\Delta S = 0$ і тим самим спростуємо парадокс.