МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

С. М. Пономаренко

Елементи фізики плазми

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями Е6 Прикладна фізика та наноматеріали.

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2026

УДК 537(075.8)
ББК 22.31я73
П 563

Рецензенти:

Відповідальний редактор: С. А. Смирнов, к.ф.-м.н., доцент, голова методичної ради НН ФТІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № Х від ХХ.ХХ.2026 р.) за поданням Вченої ради Навчально-наукового Фізико-технічного інституту (протокол № ХХ від ХХ.ХХ.2026 р.)

Електронне мережне навчальне видання

Пономаренко Сергій Миколайович, к.ф.-м.н., доцент

Елементи фізики плазми

Елементи фізики плазми: [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей Е6 «Прикладна фізика та наноматеріали» / С. М. Пономаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 789 кБ). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026. — 212 с.

Для студентів фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, які навчаються за спеціальностями Е6 Прикладна фізика та наноматеріали.

© С. М. Пономаренко, 2026 р.
© КПІ ім. Ігоря Сікорського (НН ФТІ), 2026 р.

Зміст

Зміст **3**

Передмова **7**

1 Плазма: від іонізованого газу до колективного середовища **9**
1.1 Що таке плазма? 9
1.2 Іонізація: формула Саха 11
1.3 Температура плазми та два компоненти 13
1.4 Квазінейтральність і масштаб розділення зарядів . . . 14
1.5 Дебаївське екранування 15
1.6 Дебаївська сфера. Умова колективності 19
1.7 Слабкозв'язана та сильнозв'язана плазма 21
1.8 Нелінійне екранування біля зарядженої поверхні: шар Гуї — Чепмена 23
1.9 Шар біля стінки: критерій Бома і зонд Ленгмюра . . . 24
1.10 Екранування в виродженому газі: довжина Томаса — Фермі 30

2 Колективні коливання та хвилі в плазмі **34**
2.1 Плазмові коливання та плазмова частота 34
2.2 Діелектрична проникність холодної плазми 36
2.3 Закон дисперсії. Частота відсікання 38
2.4 Поздовжні (ленгмюрівські) хвилі 40
2.5 Зіткнення й поглинання електромагнітних хвиль . . . 41
2.6 Відбиття електромагнітних хвиль від плазми 43
2.7 Іоносфера і далекий радіозв'язок 44
2.8 Як це вимірюють: інтерферометрія і рефлектометрія . 45

3 Рух зарядженої частинки в електромагнітних полях 51
3.1 Однорідне магнітне поле . . . 51
3.2 Дрейфи в схрещених полях . . . 52
3.3 Поляризаційний дрейф . . . 56
3.4 Магнітний момент і адіабатичний інваріант . . . 57
3.5 Магнітне дзеркало і конус втрат . . . 60
3.6 Подовжній інваріант . . . 61
3.7 Диполь Землі та радіаційні пояси . . . 62
3.8 Як це вимірюють: аналізатор енергій і ЕЦЕ . . . 64

4 Зіткнення, провідність та перенос у плазмі 68
4.1 Кулонівські зіткнення . . . 68
4.2 Провідність плазми . . . 71
4.3 Теплопровідність плазми . . . 73
4.4 Дифузія в плазмі. Амбіполярна дифузія . . . 73
4.5 Як це вимірюють: температура з опору і з ширини ліній 74

5 Гідродинамічний та магнітогідродинамічний опис 78
5.1 Гідродинамічний опис не є синонімом частих зіткнень 78
5.2 Дворідинний опис . . . 78
5.3 Від дворідинної моделі до однорідинної МГД . . . 79
5.4 Основне рівняння магнітної гідродинаміки . . . 81
5.5 Альвенівська хвиля . . . 84
5.6 МГД-рівновага та магнітні поверхні . . . 85
5.7 Енергія електромагнітного поля та плазми . . . 87
5.8 Діамагнетизм плазми . . . 88
5.9 Вмороженість магнітного поля . . . 88
5.10 Перез'єднання силових ліній . . . 90
5.11 Дві мови опису: окремі частинки й суцільне середовище 91
5.12 Як це вимірюють: магнітні виміри . . . 96

6 МГД-хвилі та хвилі в замагніченій плазмі 101
6.1 Що в плазмі може бути відновлювальною силою? . . . 101
6.2 Звукова хвиля . . . 102
6.3 Лінеаризована МГД і загальне дисперсійне рівняння . 103
6.4 Альвенівська хвиля . . . 104
6.5 Магнітозвукові хвилі . . . 105
6.6 Три основні МГД-хвилі . . . 106
6.7 Хвилі в холодній замагніченій плазмі . . . 107
6.8 Іонно-звукова хвиля . . . 110
6.9 Межі застосовності МГД-хвиль . . . 111

7 Кінетичний опис плазми **115**
7.1 Функція розподілу та фазовий простір 115
7.2 Моменти функції розподілу 116
7.3 Кінетичне рівняння 117
7.4 Максвеллівський розподіл і температура 118
7.5 Від кінетики до гідродинаміки 119
7.6 Дворідинна картина та її зв'язок із МГД 120
7.7 Перший міст між кінетикою та рідинним описом: дисперсія Ленгмюра 120
7.8 Лінеаризація кінетичного рівняння та хвильовий відгук 120
7.9 Загасання Ландау 126
7.10 Коли потрібен кінетичний опис? 129
7.11 Як це вимірюють: томсонівське розсіяння 130

8 Загальний принцип нестійкості плазми **136**
8.1 Що означає нестійкість? 136
8.2 Лінеаризація: як знайти долю малого збурення 137
8.3 Хвиля, що може рости 137
8.4 Дисперсійне рівняння 138
8.5 Звідки береться енергія нестійкості? 139
8.6 Рівновага та стійкість у магнітному полі 140
8.7 Перетяжка як найпростіший приклад нестійкості . . . 141
8.8 Лінійна та нелінійна стадії 142
8.9 Нестійкість Релея — Тейлора та жолобкова нестійкість 142
8.10 Двопотокова нестійкість та нестійкість пучка 144
8.11 Нестійкості анізотропної плазми 145
8.12 Енергетичний принцип 146
8.13 Дрейфові хвилі та аномальний перенос 147
8.14 Від загального принципу до конкретних нестійкостей 148
8.15 Як це вимірюють: котушки Мірнова і м'який рентген 149

9 Магнітне утримання плазми **153**
9.1 Проблема утримання 153
9.2 Відкриті пастки: магнітне дзеркало 153
9.3 Пінч-ефект 154
9.4 Рівновага z-пінча. Співвідношення Беннета 155
9.5 Рівновага θ-пінча 156
9.6 Нестійкості пінча 157
9.7 Тороїдальні системи: токамак і стеларатор 159
9.8 Захоплені частинки й неокласичний перенос 160
9.9 Рівновага тора: зсув Шафранова та межа за тиском . 162
9.10 Як це вимірюють: магнітна реконструкція рівноваги . 162

10 Керований термоядерний синтез **166**
10.1 Реакції та паливо 166
10.2 Чому потрібна саме така температура: бар'єр і тунелювання 166
10.3 Баланс потужностей і критерій Лоусона 168
10.4 Втрати 169
10.5 Дві стратегії: магнітне й інерційне утримання 170
10.6 Від реакції до розетки 170
10.7 Що ще треба вирішити 172
10.8 Інерційний шлях 173
10.9 Як це вимірюють: нейтронна діагностика 174

11 Низькотемпературна плазма та газовий розряд **177**
11.1 Елементарні процеси: іонізація і її швидкість 177
11.2 Пробій газу: механізм Таунсенда і закон Пашена . . . 178
11.3 Тліючий розряд і дуга 179
11.4 Приелектродний шар у розряді 181
11.5 Глобальна модель розряду 182
11.6 Високочастотні джерела плазми 183
11.7 Плазмова обробка матеріалів 185
11.8 Як це вимірюють: оптична емісія і ВЧ-зонди 187

12 Основні масштаби, режими та межі моделей **191**
12.1 Просторові та часові масштаби 191
12.2 Зіткнювальний та беззіткнювальний режими 192
12.3 Як за масштабами вибирають модель 193
12.4 Типова ієрархія масштабів у магнітному утриманні . . 194
12.5 Від кінетики до МГД 195
12.6 Безрозмірні параметри МГД 195
12.7 Межі простих моделей 196
12.8 Основні масштаби та формули 197
12.9 Що вимірюють на якому масштабі 198

Підсумки **202**

Додатки **204**

А Таблиця позначень 204
Б Словник термінів 209

Література **211**

Передмова

Переважна більшість баріонної речовини у Всесвіті — зорі, міжзоряний газ, сонячний вітер — перебуває в стані плазми. На Землі плазма — це блискавка, полярні сяйва, іоносфера, газовий розряд у лампах, зварювальна дуга, плазмове травлення мікросхем і плазма, яку намагаються утримувати в установках керованого термоядерного синтезу.

Спільна риса всіх цих явищ — колективна поведінка заряджених частинок. У всьому посібнику важливо відрізняти *масштабну оцінку* від точної теорії. Якщо результат отримано в простій моделі, ми спочатку з'ясуємо фізичний зміст цієї моделі, а потім зазначимо, де вона перестає працювати.

Фізика плазми поєднує кілька рівнів опису. Спочатку ми визначимо, коли система заряджених частинок справді поводиться як плазма, і введемо її характерні просторові та часові масштаби (розд. 1). Потім розглянемо рух *окремої* частинки в електромагнітному полі (розд. 2), зіткнення та перенос (розд. 3). Після цього перейдемо до *колективних* коливань і хвиль у холодній плазмі (розд. 4), далі — до гідродинамічного та магнітогідродинамічного опису (розд. 5), МГД-хвиль та хвиль у замагніченій плазмі (розд. 6) і кінетичної теорії, де з'являється загасання Ландау (розд. 7). Нарешті розглянемо нестійкості (розд. 8) й застосуємо ці моделі до магнітного утримання (розд. 9) і керованого термоядерного синтезу (розд. 10), а також до низькотемпературної плазми газового розряду (розд. 11); довідкові масштаби й формули зібрано в розд. 12.

Для кого цей посібник. Він розрахований на студентів-фізиків прикладного напряму, які вже пройшли курси загальної та теоретичної фізики: ми спираємося на електродинаміку, класичну й статистичну механіку, але не вимагаємо знання плазмових понять. Розділи побудовано за принципом «оцінка — модель — межі застосовності»; у кінці розділів є задачі та контрольні питання.

Головний принцип посібника: одна й та сама плазма може потребувати різних моделей залежно від масштабу явища. Тому щоразу будемо ставити три питання: *який просторовий масштаб? який часовий масштаб? які фізичні процеси встигають відбутися?*

Система одиниць

У цьому посібнику, як і в більшості наведених нижче формул, використано систему СГС-Гаусса: сила Лоренца має вигляд $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}/c)$, а закон Ампера — $\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} = (4\pi/c)\mathbf{j} + (1/c)\partial_t \mathbf{E}$. Наприкінці посібника (розд. 12) наведено практичні формули в СГС. Перехід до СІ простий, але множники c та 4π в окремих рівняннях змінюються.

1 Плазма: від іонізованого газу до колективного середовища

1.1. Що таке плазма?

Плазма (від грец. *plasma* — виліплене, оформлене) — це частково або повністю іонізований газ, у якому густини позитивних і негативних зарядів практично однакові, а заряджені частинки поводяться *колективно*. Обидва виділені слова мають точний зміст, який ми з'ясуємо поступово в цьому розділі (квазінейтральність — у § 1.4, колективність — у § 1.6). Термін «плазма» запропонував І. Ленгмюр наприкінці 1920-х років; 1929 р. Л. Тонкс і Ленгмюр описали власні коливання електронного газу, які ми розглянемо в розд. 2.

План розділу. Спершу з'ясуємо, як виникає плазма (формула Саха) і що означають температури її компонент. Далі — головне: квазінейтральність, дебаївське екранування й умови, за яких плазма справді колективна (три умови: $N_D \gg 1$, $\lambda_D \ll L$, $\omega\tau \gg 1$; умова слабкого зв'язку $\Gamma \ll 1$ — це те саме, що $N_D \gg 1$). Наприкінці — застосування й узагальнення: нелінійне екранування, шар біля стінки з критерієм Бома, зонд Ленгмюра та екранування у виродженому газі.

Ступінь іонізації характеризують величиною

$$\alpha = \frac{n_i}{n_i + n_n}, \tag{1.1}$$

де n_i і n_n — концентрації іонів та нейтральних частинок. У плазмі можуть одночасно бути присутніми електрони, кілька сортів іонів і нейтральні атоми чи молекули. Залежно від α розрізняють *слабо іонізовану* (частки відсотка), *помірно іонізовану* (кілька відсотків) і *повністю іонізовану* ($\alpha \to 1$) плазму.

Чим плазма відрізняється від нейтрального газу? Не просто наявністю заряджених частинок. У нейтральному газі частинки майже вільні й обмінюються імпульсом у короткочасних зіткненнях. У плазмі кулонівська сила спадає повільно ($\propto r^{-2}$): кількість частинок у шарі радіуса r зростає як r^2, тож далекі частинки дають не менший внесок, ніж близькі, і кожна заряджена частинка *одночасно* взаємодіє з великою кількістю інших. Сила, що діє на частинку, формується

усередненим полем багатьох частинок, а не парними зіткненнями. Такі «колективні взаємодії» породжують екранування зарядів, плазмові коливання, хвилі й нестійкості. Тому плазма не зводиться до сукупності незалежних частинок: її макроскопічні властивості визначаються спільною електромагнітною взаємодією. Скільки саме частинок взаємодіє одночасно, визначає число N_D у сфері екранування (§ 1.6): кулонівська сила спадає повільно, але далі за дебаївський радіус поле заряду екранується (§ 1.5), тож колективно діють лише частинки всередині цієї сфери.

Друга особливість — тісний зв'язок механіки з електродинамікою. Плазма не лише рухається в зовнішньому електромагнітному полі, а й сама створює макроскопічні поля та струми, які діють назад на її рух.

Теоретичні відомості **Температура в енергетичних одиницях**

Температуру T вимірюємо в енергетичних одиницях ($k_B = 1$, тож $k_B T$ пишемо просто як T); практично T дають в еВ, 1 еВ $\approx 11\,600$ К. Температура — це параметр максвеллівського розподілу $f \propto \exp(-mv^2/2T)$; середня кінетична енергія поступального руху $\langle mv^2/2\rangle = \frac{3}{2}T$. Поки не сказано інакше, мова йде саме про такий розподіл. Для оцінок зручні числа (СГС): $e = 4{,}8\times10^{-10}$ СГС, $e^2 \approx 1{,}44\times10^{-7}$ еВ·см, 1 СГС напруженості поля = 300 В/см.

Плазма виникає різними способами: термічною іонізацією (нагрівання), електричним розрядом, фотоіонізацією, ударною іонізацією, бомбардуванням частинками. Залежно від температури її поділяють на *низькотемпературну* ($T \lesssim 10^5$ К, тобто $\lesssim 10$ еВ) і *високотемпературну* ($T \gtrsim 10^6$ К, тобто $\gtrsim 100$ еВ; у термоядерних установках — до 10^8 К ≈ 10 кеВ і вище). Саме високотемпературна плазма потрібна для реакцій *керованого термоядерного синтезу*. Діапазон реальних плазм надзвичайно широкий (табл. 1.1).

Концентрації в таблиці відрізняються на 25 порядків (від 10 до 10^{26} см$^{-3}$). У правих стовпцях наведено похідні величини: дебаївську довжину λ_{De}, середню відстань між частинками $a = n^{-1/3}$, число частинок у дебаївській сфері N_D і параметр зв'язку Γ (їх означено в § 1.6 і § 1.7). Для плазм із $N_D \gg 1$ маємо $\lambda_{De} \gg a$, тобто колективність; ядро Сонця ($N_D \sim 5$, $\Gamma \sim 0{,}07$) лежить на межі застосовності (за Γ плазма слабкозв'язана, але $N_D \sim 5$ — «багато» вже сумнівне, див. § 1.7), а електрони в металі *вироджені* (їхня енергія визначається не теплом, а принципом Паулі: $T \ll E_F$) й потребують квантового опису (§ 1.10); E_F — енергія Фермі, тобто найбільша енергія електронів при $T = 0$. Діаграму на рис. 1.1 читають так: кожна точка — плазма з даними n і T, а лінії відокремлюють області, де змінюється фізика ($\hbar$ — стала Планка, c — швидкість світла).

Таблиця 1.1. Орієнтовні параметри різних плазм (значення наведено за порядком величини).

Плазма	n_e, см$^{-3}$	T, **еВ**	λ_{De}, **см**	$a = n^{-1/3}$, **см**	N_D	Γ
Іоносфера	10^5	0,1	0,74	$2{,}2 \times 10^{-2}$	$1{,}7 \times 10^5$	7×10^{-5}
Міжзоряний газ	10	1	$2{,}4 \times 10^2$	0,46	5×10^8	3×10^{-7}
Сонячна корона	10^8	10^2	0,74	$2{,}2 \times 10^{-3}$	$1{,}7 \times 10^8$	7×10^{-7}
Ядро Сонця	10^{26}	10^3	$2{,}4 \times 10^{-9}$	$2{,}2 \times 10^{-9}$	5	7×10^{-2}
Токамак	10^{14}	10^4	$7{,}4 \times 10^{-3}$	$2{,}2 \times 10^{-5}$	$1{,}7 \times 10^8$	7×10^{-7}
Сонячний вітер (1 а.о.)	10	10	$7{,}4 \times 10^2$	0,46	$1{,}7 \times 10^{10}$	3×10^{-8}
Газовий розряд	10^{12}	3	$1{,}3 \times 10^{-3}$	10^{-4}	9×10^3	5×10^{-4}
Електрони в металі	10^{23}	вироджені, $E_F \sim 5$	—	2×10^{-8}	—	—

1.2. Іонізація: формула Саха

Скільки енергії потрібно, щоб газ став плазмою? Енергія іонізації атома водню $I = 13{,}6$ еВ, що відповідає $1{,}6 \times 10^5$ К, проте газ іонізується помітно при значно нижчих температурах. Пояснює це формула Саха, яка визначає ступінь іонізації газу в стані термодинамічної рівноваги.

Теоретичні відомості Нагадаємо зі статистичної фізики

Для ідеального газу з концентрацією n хімічний потенціал $\mu = T\ln(n\lambda_T^3/g)$, де $\lambda_T = \sqrt{2\pi\hbar^2/mT}$ — теплова довжина хвилі де Бройля, g — статистична вага (кратність виродженого внутрішнього стану; для електрона зі спіном $g_e = 2$). Умова хімічної рівноваги реакції атом $\rightleftharpoons$ іон + електрон: $\mu_a = \mu_i + \mu_e$. Енергія іонізації I зсуває нуль енергії: атом лежить на I нижче за пару «іон + електрон», тобто $\mu_a = T\ln(n_n\lambda_{Ta}^3/g_a) - I$ (n_n — концентрація атомів). Підставляючи, маємо $\ln\dfrac{n_e\lambda_{Te}^3}{g_e} + \ln\dfrac{n_i\lambda_{Ti}^3}{g_i} = \ln\dfrac{n_n\lambda_{Ta}^3}{g_a} - \dfrac{I}{T}$, звідки $\dfrac{n_e n_i}{n_n} = \dfrac{g_e g_i}{g_a}\dfrac{\lambda_{Ta}^3}{\lambda_{Te}^3\lambda_{Ti}^3}\,e^{-I/T}$. Оскільки $m_a \approx m_i$, то $\lambda_{Ta} \approx \lambda_{Ti}$, і залишається $\dfrac{n_e n_i}{n_n} = \dfrac{g_e g_i}{g_a}\,\lambda_{Te}^{-3}\,e^{-I/T}$. Для водню $g_e g_i/g_a = 2 \cdot 1/2 = 1$. Тут T — температура електронів, а газ вважа-




Рис. 1.1. Діаграма $\lg n$–$\lg T$ видів плазми: лінії $N_D \sim 1$ (орієнтовна межа слабкозв'язаної плазми; практично потрібно $N_D \gtrsim 100$), $T = E_F$ (виродження) та $T = m_e c^2$ (релятивізм) обмежують область класичної ідеальної плазми $\max\{e^2 n^{1/3}, \hbar^2 n^{2/3}/m_e\} \ll T \ll m_e c^2$

ємо ідеальним і рівноважним. (Врізку можна пропустити при першому читанні: далі важливий лише результат — формула Саха.)

Для водню формула Саха має вигляд

$$\frac{n_e n_i}{n_n} = \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{I}{T}\right) \approx 2{,}4 \times 10^{15}\, T^{3/2}\, e^{-I/T}\ \text{см}^{-3}, \qquad (1.2)$$

де в числовій формі T підставляють у кельвінах, а тоді й I в показнику експоненти треба виразити в кельвінах: $I/k_\mathrm{B} \approx 1{,}58 \times 10^5$ К (тут, і лише тут, повертаємо k_B явно). Для інших елементів у правій частині з'являється відношення статистичних ваг $g_e g_i / g_a$.

Дві обставини визначають зміст формули. По-перше, експоненціальний множник: ступінь іонізації стає помітним, коли T лише у 10–20 разів менша за I. По-друге, перед експонентою стоїть величина $n_q = (mT/2\pi\hbar^2)^{3/2} = \lambda_{Te}^{-3}$, обернена до квантового об'єму електрона (λ_{Te} — теплова довжина хвилі де Бройля з врізки вище). Об'єм λ_{Te}^3 — це

«клітинка», яку займає один квантовий стан електрона, тож $n_q = \lambda_{Te}^{-3}$ — кількість станів, доступних електрону в одиниці об'єму (для $T = 1$ еВ $n_q \approx 3\times10^{21}$ см$^{-3}$). Класична статистика застосовна, поки $n_e \ll n_q$. Для типової розрідженої плазми $n_q/n = 1/(n\lambda_{Te}^3) \sim 10^6$–$10^{10}$: на кожен електрон припадає величезна кількість вільних станів, тому вільний стан значно вигідніший за зв'язаний в атомі (виграш ентропії) і перекриває больцманівський фактор $e^{-I/T}$ уже при $T \sim I/10 \ldots I/20$. Звідси ще один наслідок: за однакової температури *чим розрідженіший газ, тим легше він іонізується* — менша n означає більше вільних станів на електрон.

Для контрасту візьмемо кімнатну температуру ($T \approx 0{,}026$ еВ) і газ з $I = 14{,}6$ еВ при $n \approx 3\times10^{19}$ см$^{-3}$ (атоми азоту; реальний N_2 молекулярний, але порядок величини той самий): $e^{-I/T} \sim 10^{-245}$, тож ступінь іонізації $\alpha \sim 10^{-122}$, тобто практично нуль. А водень при 1 еВ і густині 10^{17} см$^{-3}$ іонізований уже на $\sim 20\%$. Щоб знайти α, зауважимо: кожен акт іонізації народжує пару іон + електрон, тож $n_e = n_i$. Позначивши повну концентрацію частинок $n = n_i + n_n$, маємо $n_e = n_i = \alpha n$, $n_n = (1-\alpha)n$, і рівняння (1.2) набуває вигляду $\alpha^2/(1-\alpha) = n_q\, e^{-I/T}/n$ — квадратне рівняння відносно α. Для водню з повною концентрацією частинок $n = 10^{17}$ см$^{-3}$ його розв'язок дає

$$\alpha \approx 1{,}3\times10^{-4}\ (0{,}5\text{ еВ}), \qquad \alpha \approx 0{,}18\ (1\text{ еВ}), \qquad \alpha \approx 0{,}99\ (2\text{ еВ}).$$

Газ іонізується у вузькому інтервалі температур (рис. 1.2): для водню з повною концентрацією 10^{17} см$^{-3}$ — між 0,5 і 2 еВ (при іншій густині інтервал зсувається логарифмічно). Перехід *плавний*: $\alpha(T)$ — гладка функція, розриву немає, тобто це *кросовер*[1], а не фазовий перехід. Так є в розрідженому газі, де застосовна формула (1.2). У дуже густій речовині (сильнозв'язана плазма) можливий і справжній фазовий перехід, але це вже окреме питання. У розрядах і під дією випромінювання ступінь іонізації може значно відрізнятися від рівноважного, тому формула (1.2) дає лише орієнтир.

1.3. Температура плазми та два компоненти

У плазмі електрони й іони можуть мати різні середні кінетичні енергії, тому взагалі треба вводити дві температури T_e та T_i. У фізиці плазми температуру часто виражають в енергетичних одиницях: «температура в еВ» означає величину T в електронвольтах (співвідношення з кельвінами 1 еВ $\approx 11\,600$ К — у врізці в § 1.1).

[1] Кросовер — плавний перехід між двома станами системи при зміні параметра (тут температури): без стрибка властивостей і без певної температури переходу, на відміну від фазового переходу, як-от кипіння води




Рис. 1.2. Залежність ступеня іонізації водню від температури (формула Саха); пунктиром позначено $T = I/10 \approx 1{,}4$ еВ, де іонізація вже помітна, хоча $T \ll I$

У газорозрядній плазмі енергія від зовнішнього поля спершу передається електронам: струм, а отже й джоулеве тепло $\mathbf{j}\cdot\mathbf{E}$, переносять переважно вони, бо значно рухливіші за іони. Через велику різницю мас ($m_i \geq 1836\, m_e$) електрон при пружному зіткненні з іоном передає тому лише частку $\delta E/E \leq 4m_e m_i/(m_e+m_i)^2 \approx 4m_e/m_i \approx 0{,}2\%$ (для протона) своєї енергії — як тенісний м'ячик, що відскакує від вантажівки (центральний пружний удар з теоретичної механіки), тому часто $T_e > T_i$. Лише за достатньо великої густини та тривалого часу електрон-іонні зіткнення вирівнюють температури: $T_e = T_i = T$. Отже, вираз «температура плазми» без уточнення неоднозначний, і в нерівноважній плазмі T_e та T_i слід вказувати окремо. Якщо $T_e \neq T_i$, плазму називають *двотемпературною*. Яскравий приклад — позитивний стовп тліючого розряду (довга світна однорідна ділянка розряду в трубці між катодом і анодом) при тиску $\sim 0{,}1$ мм рт. ст.: температура електронів досягає $\sim 5\times10^4$ К (≈ 4 еВ), тоді як іони мають лише кілька сотень кельвінів. Різні часи релаксації (розд. 4) пояснюють, чому така система існує тривалий час: спочатку встановлюється максвеллівський розподіл електронів, потім іонів, і лише згодом вирівнюються їхні температури.

1.4. Квазінейтральність і масштаб розділення зарядів

Якби в плазмі була присутня велика кількість нескомпенсованих зарядів, виникали б сильні поля, які приводили б заряди в рух. Тому

на макроскопічних масштабах густини позитивного й негативного зарядів практично збігаються.

Нехай у плазмі з концентраціями n_e електронів (заряд $-e$) та n_i іонів (заряд $+Ze$) виникла просторова локальна різниця густин. За теоремою Гаусса виникне кулонівське поле:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho = 4\pi e(Zn_i - n_e). \tag{1.3}$$

Оскільки питомий заряд електрона e/m_e величезний, а іони важкі й повільні, це поле за дуже короткий час створить потужні сили, які змістять електрони так, щоб знівелювати розділення зарядів. Характерний час — λ_{De}/v_{Te}, де $v_{Te} \sim \sqrt{T_e/m_e}$ — теплова швидкість електронів; для $n = 10^{12}$ см$^{-3}$, $T = 1$ еВ це $\sim 2\times10^{-11}$ с. Цей час є оберненою *плазмовою частотою* ω_p^{-1} (її виведемо в розд. 2); поки що важливо лише, що вирівнювання дуже швидке. Оцінимо силу цього поля: плазма з $n = 10^{12}$ см$^{-3}$ і розміром $L = 1$ см, розділення зарядів лише на 1%, $\delta n = 10^{10}$ см$^{-3}$. Тоді $E \sim 4\pi e\,\delta n\,L \approx 60$ СГС$\approx 2\times10^4$ В/см, тоді як тепловому руху при $T = 1$ еВ відповідає поле $T/(eL) \sim 1$ В/см (поле суттєве, якщо його робота eEL на відстані L порівнянна з тепловою енергією T). Навіть відхилення $\delta n/n \sim 10^{-6}$ дає $E \sim 2$ В/см, тобто порівнянне з тепловим: розділення зарядів неможливе вже на рівні 10^{-6}. Загальну оцінку дано наприкінці § 1.5.

Тому на макроскопічних масштабах плазма є *квазінейтральною*:

$$\rho = \sum_s q_s n_s = e(Zn_i - n_e) \approx 0 \quad \Rightarrow \quad n_e \approx Zn_i. \tag{1.4}$$

> **!** *Квазінейтральність — це не тотожний нуль у кожній точці, а макроскопічне наближення. Локальні відхилення від нейтральності можливі й саме вони лежать в основі екранування та плазмових коливань.*

1.5. Дебаївське екранування

Внесемо в плазму малий пробний заряд q. У вакуумі його поле спадає як $1/r$ і сягає як завгодно далеко. У плазмі ж є рухливі заряджені частинки, які реагують на це поле: частинки протилежного знака притягуються до заряду, однойменного — відштовхуються. Заряд виявляється оточеним «шубою» частинок протилежного знака, і його поле зменшується (рис. 1.3). Тому, попри далекодійність кулонівської взаємодії, на великих відстанях поле окремого заряду не відчувається. Тепловий рух не дає такій «шубі» стиснутися до точки: вона розмазана на деяку характерну відстань порядку λ_D (повний її заряд при цьому дорівнює $-q$, див. нижче). Знайдемо цю відстань, на якій відбувається це екранування.




Рис. 1.3. Пробний додатний заряд оточений електронною «шубою», яка екранує його поле

Кожен сорт частинок s (заряд q_s, концентрація n_s) перебуває в стаціонарному потенціалі $\varphi(\mathbf{r})$ у тепловій рівновазі зі своєю температурою T_s, тому розподіл частинок за Больцманом

$$n_s = n_{s0} \exp\left(-\frac{q_s\varphi}{T_s}\right).$$

Тут n_{s0} — незбурена концентрація вдалині від заряду, де $\varphi \to 0$, а сумарний заряд плазми нульовий: $\sum_s q_s n_{s0} = 0$. Густина заряду плазми

$$\rho = \sum_s q_s n_{s0} \exp\left(-\frac{q_s\varphi}{T_s}\right).$$

Для слабкого поля $|q_s\varphi| \ll T_s$ розкладемо експоненти. Нульовий доданок зникає завдяки нейтральності, залишається

$$\rho \simeq -\varphi \sum_s \frac{n_{s0} q_s^2}{T_s}.$$

Підстановка в рівняння Пуассона $\Delta\varphi = -4\pi(\rho + q\delta(\mathbf{r}))$ дає (дельта-функція $\delta(\mathbf{r})$ описує точковий пробний заряд і забезпечує кулонівську поведінку потенціалу при $r \to 0$)

$$\Delta\varphi - \frac{\varphi}{\lambda_D^2} = -4\pi q\,\delta(\mathbf{r}), \qquad \boxed{\frac{1}{\lambda_D^2} = 4\pi \sum_s \frac{n_{s0} q_s^2}{T_s}}. \tag{1.5}$$

Величина λ_D називається *дебаївською довжиною* (радіусом екранування).

Поле пробного заряду сферично симетричне, $\varphi = \varphi(r)$, і при $r > 0$ маємо $\Delta\varphi = \dfrac{1}{r}\dfrac{d^2(r\varphi)}{dr^2}$. Для $u = r\varphi$ рівняння (1.5) спрощується до $u'' = u/\lambda_D^2$, загальний розв'язок якого $u = Ae^{-r/\lambda_D} + Be^{r/\lambda_D}$. Умова $\varphi \to 0$ при $r \to \infty$ виключає зростаючий доданок ($B = 0$), а близько до заряду потенціал має збігатися з кулонівським q/r, звідки $A = q$:

$$\varphi(r) = \frac{q}{r} \exp\left(-\frac{r}{\lambda_D}\right). \tag{1.6}$$




Рис. 1.4. Дебаївське екранування пробного заряду: потенціал швидко спадає на відстанях порядку λ_D

Кулонівське поле заряду експоненціально послаблюється на відстанях порядку λ_D (рис. 1.4). Цей результат у 1923 р. одержали П. Дебай і Е. Хюккель для електролітів; плазма — його найчистіший прояв.

Знайдемо заряд «шуби». Густина заряду плазми $\rho = -\Delta\varphi/4\pi = -\varphi/(4\pi\lambda_D^2)$ при $r > 0$, тому

$$\int \rho\, 4\pi r^2 dr = -\frac{q}{\lambda_D^2}\int_0^\infty r e^{-r/\lambda_D} dr = -q.$$

Отже, повний заряд оболонки в точності компенсує q, а її характерний радіус — λ_D. Для спостерігача на відстані $\gg \lambda_D$ пробний заряд разом з оболонкою практично нейтральний. Те саме стосується кожної зарядженої частинки самої плазми: для решти частинок вона «пробна», тож усюди в плазмі частинка оточена шубою завтовшки λ_D (це використаємо в § 1.6).

Скільки сортів частинок бере участь в екрануванні?. Для електронів і одноразово заряджених іонів

$$\frac{1}{\lambda_D^2} = \frac{1}{\lambda_{De}^2} + \frac{1}{\lambda_{Di}^2}, \qquad \lambda_{De} = \sqrt{\frac{T_e}{4\pi n_e e^2}}, \quad \lambda_{Di} = \sqrt{\frac{T_i}{4\pi n_i e^2}}.$$

При $T_e = T_i = T$ маємо

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{T}{8\pi n e^2}} = \frac{\lambda_{De}}{\sqrt{2}}. \tag{1.7}$$

Практично $\lambda_{De} \approx 743\sqrt{T_e[\text{еВ}]/n_e[\text{см}^{-3}]}$ см.

Формули вище припускають, що *обидва* сорти встигають перебудуватися в полі заряду, тобто що процес повільний порівняно з часом руху іонів на відстань λ_D ($\sim \lambda_D/v_{Ti}$). Якщо процес швидкий, іони лишаються практично на місцях, екранують лише електрони, і замість λ_D слід брати λ_{De}. Зауважимо: у двотемпературній плазмі з $T_i \ll T_e$ сума дає $\lambda_D \approx \lambda_{Di} \ll \lambda_{De}$ — холодні іони екранують *статичний* заряд ефективніше за гарячі електрони, але лише якщо встигли досягти рівноваги з температурою T_i. У літературі під «дебаївською довжиною» найчастіше розуміють саме λ_{De}, тому в кожній задачі слід перевіряти, які компоненти встигають перебудуватися.

Умова застосовності. Лінеаризація експонент потребує $|q_s\varphi| \ll T_s$ принаймні на відстанях $r \gtrsim \lambda_D$. Для $q = e$ на $r = \lambda_D$ це $e^2/\lambda_D \ll T$, або, підставивши (1.5), $1/(8\pi n\lambda_D^3) \ll 1$ (для двох сортів $T = 8\pi ne^2\lambda_D^2$). Тобто теорія виконується лише тоді, коли *в сфері радіуса λ_D міститься багато частинок* (їхню кількість N_D означено в § 1.6; $1/(8\pi n\lambda_D^3)$ — це, з точністю до числового множника, $1/N_D$). Це не технічна деталь, а фізичний зміст колективного опису: екранування повинно створюватися статистично усередненим полем багатьох частинок.

Зауважимо, що зовсім близько до пробного заряду ($r \lesssim e^2/T$) потенціал кулонівський і $|q\varphi| \gtrsim T$, тож лінеаризація там порушується. Але ця область набагато менша за λ_D (їхнє відношення $e^2/(T\lambda_D) \sim 1/(n\lambda_D^3)$ — той самий малий параметр $1/N_D$), тому на масштабі екранування формула (1.6) справедлива.

Тепер можна уточнити зміст квазінейтральності. Нехай на масштабі L виникла локальна неоднорідність концентрації δn. З рівняння Пуассона $\varphi/L^2 \sim 4\pi e\,\delta n$, а потенціал не може суттєво перевищити T/e: за $e\varphi \gg T$ електрони з тепловими енергіями $\sim T$ були б виштовхані або втягнені полем, і відхилення зникло б. Тож $\varphi \lesssim T/e$ і

$$\frac{\delta n}{n} \lesssim \frac{T}{4\pi ne^2L^2} = \left(\frac{\lambda_{De}}{L}\right)^2.$$

Отже, квазінейтральність виконується тим точніше, чим менша дебаївська довжина порівняно з розміром плазми L:

$$\lambda_D \ll L. \tag{1.8}$$

(У нерівностях такого типу різницею між λ_D і λ_{De} нехтуємо — вона лише в множнику $\sqrt{2}$.) Біля стінок, електродів та інших меж ця умова порушується — там існують *дебаївські шари*, де квазінейтральності немає.

1.6. Дебаївська сфера. Умова колективності

Електричне поле зарядженої частинки в плазмі екранується іншими частинками. Щоб зрозуміти, наскільки цей процес є колективним, розглянемо область простору радіуса λ_{De} навколо даної частинки. Її називають *дебаївською сферою*.

Кількість електронів у такій сфері дорівнює

$$N_D = \frac{4\pi}{3} n_e \lambda_{De}^3. \tag{1.9}$$

Отже, N_D — це просто число частинок у області, на масштабі якої відбувається дебаївське екранування. Тут береться саме електронна довжина λ_{De}; заміна на $\lambda_D = \lambda_{De}/\sqrt{2}$ змінила б N_D лише в $2^{3/2} \approx 2{,}8$ раза, що для умови $N_D \gg 1$ несуттєво.

Якщо

$$N_D \gg 1, \tag{1.10}$$

то в екрануванні бере участь дуже багато частинок. У цьому випадку не можна говорити про взаємодію даної частинки з одним конкретним сусідом: поле, що виникає в результаті перерозподілу зарядів, визначається сумарною дією великої кількості частинок. Екранування має *колективний* характер.

Саме тому умова (1.10) є основною умовою колективності плазми.

Є й спостережуваний наслідок. Парні зіткнення змінюють імпульс частинки з частотою $\nu \sim \omega_p \ln N_D / N_D$ (орієнтовно; виведемо в розд. 4; логарифм дають далекі проліти, а не лише близькі зіткнення), де $\omega_p = v_{Te}/\lambda_{De}$ — плазмова частота, тобто швидкість колективної відповіді (наступний розд. 2; числово $\omega_p \approx 5{,}6 \times 10^4 \sqrt{n[\text{см}^{-3}]}$ рад/с). Тому за $N_D \gg 1$ колективні ефекти домінують над парними зіткненнями: $\nu \ll \omega_p$. Саме це робить «усереднене поле багатьох частинок» головною силою в плазмі.

Зрозуміємо тепер, коли ця умова виконується. Концентрація n визначає характерну відстань між частинками. Оскільки на одну частинку в середньому припадає об'єм порядку $1/n$, маємо

$$a^3 \sim \frac{1}{n}, \qquad a \sim n^{-1/3},$$

де a — характерний масштаб міжчастинкової відстані.

Тоді


$$N_D \sim \left(\frac{\lambda_D}{a}\right)^3.$$

Отже, умова $N_D \gg 1$ просто означає

$$\lambda_D \gg a.$$


Інакше кажучи, дебаївська довжина повинна бути набагато більшою за відстань між сусідніми частинками. Тільки тоді в області екранування міститься багато частинок і екранування може бути колективним. Отже, «велика» дебаївська сфера означає велике *число частинок* у ній, а не просто велике значення λ_D.

Те саме «на пальцях». Уявіть, що ви йдете вулицею. Якщо людей мало і поруч лише одна-дві, ваш рух визначають саме вони: хто з ким зіткнувся — це *парні* взаємодії, як у розрідженому газі (а за ще більшої скупченості — як у рідині, де кожна частинка відчуває насамперед найближчих сусідів). Якщо ж у радіусі «відчуття» навколо вас сотні людей, окремий сусід нічого не вирішує: ви рухаєтеся в загальному потоці. Для плазми «радіус відчуття» — це λ_D, а «відстань між людьми» — a (рис. 1.5). Коли $\lambda_D \gg a$, дебаївські сфери сусідніх частинок сильно *перекриваються*: у кожній точці одночасно «чують» одна одну сотні частинок, тому поле в ній є гладким усередненим результатом багатьох слабких внесків — це і є колективна поведінка. Формально: сфери двох частинок перекриваються, коли відстань між ними менша за $2\lambda_D$, а будь-яка точка плазми лежить одразу в N_D сферах (стільки частинок міститься на відстані λ_D від неї). Тож за $N_D \gg 1$ сфери зливаються в одне суцільне середовище з єдиним узгодженим полем (рис. 1.6 а). Коли ж $\lambda_D \lesssim a$, сфери окремі, кожна частинка майже сама в своїй сфері, і важливими стають парні зіткнення (рис. 1.6 б): у сфері лишаються одиниці частинок, домінують пари, колективного екранування вже немає — це область сильного зв'язку (§ 1.7).



(а) $\lambda_D \gg a$ **(б)** $\lambda_D \sim a$

Рис. 1.5. Одна й та сама дебаївська сфера (штрихове коло радіуса λ_D), схематично, за різного числа частинок у ній: (а) багато — поле в центрі є сумою багатьох слабких внесків (тонкі лінії), сфери сусідів перекриваються; (б) лише кілька — переважають парні взаємодії з найближчими сусідами (товсті лінії). Червоні й сині точки — частинки протилежних знаків



(а) $\lambda_D \gg a$ **(б)** $\lambda_D \lesssim a$

Рис. 1.6. Об'єм плазми, заповнений дебаївськими сферами одного й того самого радіуса λ_D (схематично): (а) сфер багато і вони густо перекриваються — у кожній точці $N_D \gg 1$ сфер, плазма поводиться як суцільне колективне середовище; (б) сфери не перекриваються — частинки взаємодіють насамперед парами

! *Слабка взаємодія окремих частинок не означає відсутності колективних ефектів. Навпаки, колективність виникає саме тому, що слабкі внески великої кількості заряджених частинок складаються. Тому «ідеальна» плазма — не плазма без дальніх сил: частинка рухається майже вільно в гладкому спільному полі всіх інших, а парні зіткнення й кореляції дають лише малі поправки* $\sim 1/N_D$.

1.7. Слабкозв'язана та сильнозв'язана плазма

Є ще один спосіб оцінити, наскільки важливою є кулонівська взаємодія між сусідніми частинками. Порівняємо потенціальну енергію їхньої взаємодії

$$U_C \sim \frac{e^2}{a}$$

з характерною енергією теплового руху

$$U_T \sim T.$$

Їхнє відношення називають *параметром зв'язку*:

$$\Gamma = \frac{U_C}{U_T} = \frac{e^2}{a\,T}, \qquad a = n^{-1/3}. \tag{1.11}$$

Таким чином, Γ безпосередньо показує, наскільки сильна кулонівська взаємодія порівняно з тепловим рухом.

При

$$\Gamma \ll 1$$

теплова енергія значно більша за кулонівську. Частинки взаємодіють слабко, а плазму називають *слабкозв'язаною*. У цьому режимі

$$N_D \gg 1,$$

і екранування має колективний характер.

Навпаки, при

$$\Gamma \gtrsim 1$$

кулонівська взаємодія між сусідніми частинками стає порівнянною з тепловою або перевищує її. Частинки рухаються вже не як майже незалежні частинки, а їхній рух суттєво корельований. Таку систему називають *сильнозв'язаною*.

Для нашого визначення $a = n^{-1/3}$ зв'язок між Γ та N_D отримується безпосередньо з формули для дебаївської довжини. Справді, $T = e^2 n^{1/3}/\Gamma$, тож $\lambda_{De}^2 = T/(4\pi n e^2) = 1/(4\pi n^{2/3}\Gamma)$ і $N_D = \frac{4\pi}{3} n \lambda_{De}^3 = \frac{4\pi}{3}(4\pi)^{-3/2}\Gamma^{-3/2}$, тобто

$$N_D = \frac{1}{6\sqrt{\pi}}\,\Gamma^{-3/2}. \tag{1.12}$$

Тому

$$\Gamma \ll 1 \qquad \Longleftrightarrow \qquad N_D \gg 1.$$

Числові множники тут важливі: $N_D = (6\sqrt{\pi})^{-1}\Gamma^{-3/2} \approx 0{,}09\,\Gamma^{-3/2}$, тож $\Gamma = 0{,}07$ дає лише $N_D \approx 5$. Через малий коефіцієнт на практиці знак «$\gg$» слід читати як $\Gamma \lesssim 0{,}01$, тобто $N_D \gtrsim 100$; ядро Сонця ($\Gamma \approx 0{,}07$, $N_D \approx 5$) — межа застосовності колективного опису.

Це два способи описати один і той самий режим: Γ говорить про силу взаємодії між сусідніми частинками, а N_D — про кількість частинок, що бере участь у колективному екрануванні.

Для слабкозв'язаної плазми, крім того, справедливе наближення ідеального газу (поправка Дебая — Хюккеля: потенціал оболонки в точці самої частинки відрізняється від кулонівського на $-q/\lambda_D$, тож кореляційна енергія $W_{\text{кор}} \approx -e^2/2\lambda_D$ на частинку, а відносно $|W_{\text{кор}}|/T \sim e^2/(\lambda_D T) \sim 1/N_D \ll 1$; вона дає лише малу поправку до тиску):

$$p \simeq \sum_s n_s T_s. \tag{1.13}$$

Нарешті, умова колективності сама по собі ще не гарантує квазінейтральності всієї системи: для цього потрібна ще умова (1.8), $\lambda_D \ll L$. Тоді на макроскопічних масштабах, значно більших за λ_D, зарядові неоднорідності швидко згладжуються і $n_e \simeq Z n_i$.

Отже, маємо три різні умови з різним фізичним змістом:

1. $N_D \gg 1$ — колективність екранування;
2. $\lambda_D \ll L$ — квазінейтральність на масштабі системи;
3. $\omega\tau \gg 1$ — плазма поводиться як плазма, а не як нейтральний газ (ω — характерна частота процесу): за час $1/\omega$ заряджена частинка встигає відчути колективне поле, а не лише зіткнутися з нейтральним атомом (τ — середній час між зіткненнями заряджених частинок з нейтральними атомами). У слабко іонізованому газі з частими зіткненнями з нейтральними атомами ця умова порушується, і газ веде себе як звичайний, хоч $N_D \gg 1$. Докладніше — в розд. 2.

Саме ці властивості дають змогу розглядати плазму як колективне квазінейтральне середовище.

1.8. Нелінійне екранування біля зарядженої поверхні: шар Гуї — Чепмена

Лінійна теорія екранування вимагає $|q_s\varphi| \ll T_s$. Біля стінок камери, зондів і електродів ця умова може порушуватися. Тоді сама ідея дебаївського масштабу залишається корисною, але експоненціальна формула для потенціалу вже не є точною. Цей приклад важливий передусім як нагадування: *дебаївська довжина є масштабом колективної перебудови, а не універсальною формою потенціалу*. Для плоскої геометрії нелінійну задачу можна розв'язати точно.

Нехай півпростір $x > 0$ заповнено плазмою з електронів і однозарядних іонів (концентрація вдалині n, $T_e = T_i = T$), а на межі $x = 0$ розташована площина з поверхневою густиною заряду σ. За Больцманом концентрації $n^{\pm} = n\exp(\mp e\varphi/T)$, тому густина заряду $\rho = e(n^+ - n^-) = -2ne\sinh(e\varphi/T)$, а рівняння Пуассона дає ($E = -d\varphi/dx$)

$$\frac{dE}{dx} = 4\pi\rho = -8\pi ne\sinh\frac{e\varphi}{T}.$$

Помножимо обидві частини на $2E$: ліворуч вийде $2E\,E' = (E^2)'$, а праворуч, з огляду на $E\,dx = -d\varphi$,

$$d(E^2) = 16\pi ne\sinh\frac{e\varphi}{T}\,d\varphi.$$

Це «інтеграл енергії», той самий прийом, що й для рівняння $\ddot{x} = F(x)$ в механіці (множимо на $2\dot{x}$ і отримуємо $\frac{1}{2}\dot{x}^2 + U(x) = \text{const}$), з x у ролі часу, φ — координати, а E^2 — кінетичної енергії. Інтегруємо з умовою $E \to 0$ при $\varphi \to 0$ ($x \to \infty$) і користуємося тотожністю $\cosh y - 1 = 2\sinh^2(y/2)$:

$$E^2 = 16\pi nT\left(\cosh\frac{e\varphi}{T} - 1\right) = 32\pi nT\sinh^2\frac{e\varphi}{2T}.$$

Знак кореня такий, що E і φ мають однаковий знак (бо $E=-d\varphi/dx$, а $|\varphi|$ спадає від стінки вглиб плазми до нуля), отже

$$-\frac{d\varphi}{dx}=4\sqrt{2\pi nT}\,\sinh\frac{e\varphi}{2T}.$$

Це рівняння з відокремлюваними змінними. З $y=e\varphi/T$ воно має вигляд $dy/\sinh(y/2)=-2\,dx/\lambda_D$, а інтеграл

$$\int\frac{dy}{\sinh(y/2)}=2\ln\tanh\frac{y}{4}$$

легко перевірити диференціюванням ($\sinh(y/2)=2\sinh(y/4)\cosh(y/4)$). Його розв'язок

$$\tanh\frac{e\varphi}{4T}=\tanh\frac{e\varphi_0}{4T}\,e^{-x/\lambda_D},\qquad \lambda_D=\sqrt{\frac{T}{8\pi ne^2}},\tag{1.14}$$

де $\varphi_0=\varphi(0)$. Коефіцієнт в експоненті збігається з дебаївською довжиною (1.7) (з урахуванням обох сортів при $T_e=T_i=T$, тобто $\lambda_D=\lambda_{De}/\sqrt{2}$), тобто вона є точним масштабом і у нелінійному режимі. Зв'язок φ_0 з σ дає теорема Гаусса: усередині плазми екрануючий заряд компенсує σ, поза площиною поля немає, тому $E(0)=4\pi\sigma$, звідки

$$\sinh\frac{e\varphi_0}{2T}=\sigma\sqrt{\frac{\pi}{2nT}}.$$

Два граничні випадки. При $e\varphi_0\ll T$ маємо $\varphi=\varphi_0e^{-x/\lambda_D}$ з $\varphi_0=4\pi\sigma\lambda_D$, як і в лінійній теорії. При $e\varphi_0\gg T$ права частина (1.14) прямує до одиниці, і поблизу поверхні ($x\ll\lambda_D$) $\varphi\approx(2T/e)\ln(2\lambda_D/x)$: потенціал зростає до стінки лише логарифмічно, а товщина шару залишається порядку λ_D. Саме такі *дебаївські шари* утворюються біля стінок і зондів, де квазінейтральність порушена. Порівняння точного розв'язку з лінійною теорією для $e\varphi_0=6T$ показано на рис. 1.7: далеко від стінки обидва спадають з тим самим масштабом λ_D, але нелінійний потенціал менший: його амплітуда $(4T/e)\tanh(e\varphi_0/4T)$ менша за φ_0 (потенціал «насичується»).

1.9. Шар біля стінки: критерій Бома і зонд Ленгмюра

Розв'язок Гуї — Чепмена описує шар у рівновазі з Больцмановим розподілом *обох* сортів частинок. Біля реальної стінки, яка поглинає частинки, ситуація інша: електрони значно швидші за іони ($v_{Te}/v_{Ti}\sim\sqrt{m_i/m_e}$), тож спочатку вони досягають стінки й заряджають її негативно відносно плазми. Утворюється шар додатного просторового заряду, який відштовхує електрони й прискорює іони (рис. 1.8). Цей шар визначає потоки на стінку, а отже, і навантаження на першу стінку термоядерного реактора, і роботу зондів.




Рис. 1.7. Потенціал біля зарядженої площини при $e\varphi_0 = 6T$ (вісь φ логарифмічна): точний розв'язок Гуї — Чепмена (1.14) і лінійна теорія $\varphi_0 e^{-x/\lambda_D}$. Далеко від стінки спад експоненціальний із тим самим λ_D, але з меншою амплітудою; біля стінки — логарифмічний

Критерій Бома. *Чому іони мають прийти в шар прискореними.* Нехай u — швидкість іонів у напрямку стінки. При русі до стінки потенціал φ спадає, іони прискорюються, а їхня концентрація зменшується (збереження потоку $n_i u = \text{const}$). Електрони відштовхуються стінкою, і їхня концентрація зменшується за Больцманом, $\propto \exp(e\varphi/T_e)$. Щоб шар мав позитивний об'ємний заряд ($n_i > n_e$), густина іонів має спадати *повільніше* за густину електронів. Якщо іон входить у шар повільно, то в слабкому полі він різко прискорюється, і його густина падає швидше, ніж електронна, а отже, виникає надлишок *негативного* заряду, який не дає шарові існувати. Тому іони мають прийти до шару вже з помітною швидкістю (рис. 1.9). Кількісно цю умову дає такий розрахунок.

Відлічуватимемо потенціал від межі шару ($\varphi = 0$ там, де починається область $n_i \neq n_e$; концентрацію на межі шару позначимо n_{sh}). Нехай холодні іони входять туди зі швидкістю u_0 в напрямку стінки, а електрони розподілені за Больцманом. Із закону збереження енергії $\frac{1}{2}m_i u^2 = \frac{1}{2}m_i u_0^2 - e\varphi$ та потоку $n_i u = n_{\text{sh}} u_0$ для іонів $n_i = n_{\text{sh}}\bigl(1 - 2e\varphi/m_i u_0^2\bigr)^{-1/2}$, а $n_e = n_{\text{sh}} \exp(e\varphi/T_e)$. Введемо безрозмірний потенціал $\chi = -e\varphi/T_e > 0$ і параметр

$$c_s = \sqrt{\frac{T_e}{m_i}} \quad (T_i \ll T_e,\ Z = 1), \tag{1.15}$$

який має розмірність швидкості й називається *іонно-звуковою швидкістю* (чому саме так, з'ясуємо в розд. 6.8). Тоді $n_i = n_{\text{sh}}\bigl(1 + 2\chi c_s^2/u_0^2\bigr)^{-1/2} \approx$




Рис. 1.8. Профіль потенціалу біля поглинальної стінки: квазінейтральний передшар, де іони набирають швидкість $\gtrsim c_s$, і дебаївський шар, у якому $n_i > n_e$




Рис. 1.9. Концентрації біля стінки (схематично): у передшарі $n_i = n_e$, у шарі електрони відштовхуються і їхня концентрація n_e падає за Больцманом швидше, ніж концентрація прискорених іонів n_i, тож $n_i > n_e$

$n_{\rm sh}\bigl(1 - \chi c_s^2/u_0^2\bigr)$ і $n_e = n_{\rm sh}e^{-\chi} \approx n_{\rm sh}(1-\chi)$ при малих χ, звідки $n_i - n_e \approx n_{\rm sh}\chi\,(1 - c_s^2/u_0^2)$. Рівняння Пуассона $\varphi'' = -4\pi e(n_i - n_e)$ у змінній χ набуває вигляду $\chi'' = \chi\,(1 - c_s^2/u_0^2)/\lambda_{De}^2$, де $\lambda_{De}^2 = T_e/4\pi n_{\rm sh}e^2$. Якби $1 - c_s^2/u_0^2 < 0$, це було б рівняння гармонічного осцилятора: потенціал коливався б, а шар має монотонно відокремлювати плазму від стінки. Отже, на самій межі шару, де χ ще мале (тому лінеаризації досить), потрібен експоненціальний, а не коливний розв'язок (монотонне наростання потенціалу в бік стінки); він можливий лише за умови

$$\boxed{u_0 \geq c_s = \sqrt{T_e/m_i}.} \qquad (1.16)$$

Це *критерій Бома*: іони мають увійти в шар зі швидкістю не меншою за іонно-звукову. Прискорюються вони в квазінейтральному *передшарі*: там $n_i = n_e$ з високою точністю, але потенціал усе ж повільно спадає на масштабі $L \gg \lambda_D$ (довжина пробігу або розмір плазми). Електрони за Больцманом «відчувають» це спадання, а іони, що зникають на стінці, втягуються полем у потік до неї. Оцінимо перепад

у граничному випадку $u_0 = c_s$: іони, що почали рух із малої швидкості, набирають $\frac{1}{2}m_i u_0^2 = \frac{1}{2}T_e$, тож падіння потенціалу в передшарі $\approx T_e/2e$, а електрони за Больцманом дають $n_{\text{sh}} = n_0 \exp(-1/2) \approx 0{,}61\, n_0$ (квазінейтральність: $n_i = n_e$), де n_0 — концентрація в незбуреній плазмі, далеко від стінки. Це оцінка, а не строге виведення: реальний перепад залежить від того, як іони народжуються й гальмуються в передшарі (іонізація, зіткнення), і не менший за $T_e/2e$.

Плаваючий потенціал і потік енергії на стінку. Ізольований зонд (чи стінка) набуває потенціалу φ_f відносно плазми, за якого сумарний струм дорівнює нулю. Тепер потенціал відлічуємо від незбуреної плазми (на відміну від виводу критерію Бома, де нуль стояв на межі шару), тож перепад $T_e/2e$ передшару входить у φ_f. Потік іонів на стінку $j_i = n_{\text{sh}} c_s = n_0 \exp(-1/2)\, c_s$. Електрони розподілені за Больцманом у всьому перепаді від плазми до стінки, тому до стінки доходить потік $j_e = \frac{1}{4} n_0 \bar{v}_e \exp(e\varphi_f/T_e)$, де $\bar{v}_e = \sqrt{8T_e/\pi m_e}$ (однобічний потік $\frac{1}{4}n\bar{v}$ нагадуємо з молекулярної фізики: $n\int_{v_x>0} v_x f\, d^3v = n\bar{v}/4$). Прирівнюючи, маємо

$$\varphi_f = -\frac{T_e}{2e}\left(\ln\frac{m_i}{2\pi m_e} + 1\right), \tag{1.17}$$

що для водню дає $\varphi_f \approx -3{,}3\, T_e/e$, для дейтерію — $\approx -3{,}7\, T_e/e$. Із цього перепаду $T_e/2e$ припадає на передшар, решта ($\approx 2{,}8\, T_e/e$ для водню) — на дебаївський шар. Іон, пройшовши весь перепад, приносить на стінку енергію $|e\varphi_f|$, тобто кілька T_e. Разом з електронами (кожен, що подолав бар'єр, приносить в середньому $\approx 2T_e$) і початковою тепловою енергією іонів ($\approx 2{,}5T_i$) повний потік енергії на стінку $q \approx \gamma T_e\, j_i$ з множником $\gamma \approx 2 + e|\varphi_f|/T_e + 2{,}5\, T_i/T_e$; для водню при $T_i \sim T_e$ це $\gamma \approx 7$–8.

Товщина шару (для допитливих). Оцінимо товщину дебаївського шару d. Нехай у шарі є лише іони (електрони відштовхнуто), які для простоти стартують з нуля (насправді з c_s, але $\frac{1}{2}m_i c_s^2 = \frac{1}{2}T_e \ll |e\varphi_s|$, тож це лише невелика поправка) і падають у потенціалі $\varphi(x)$, відлічуваному від межі шару ($x = 0$) у бік стінки і взятому за модулем. Збереження енергії дає $v = \sqrt{2e\varphi/m_i}$, а стала густина струму $j = en_i v$ дає $n_i = j/(ev)$. Рівняння Пуассона $\varphi'' = 4\pi e n_i = 4\pi j\sqrt{m_i/2e}\;\varphi^{-1/2}$ має розв'язок $\varphi = Cx^{4/3}$ (підстановкою: $\frac{4}{9}C^{3/2} = 4\pi j\sqrt{m_i/2e}$), тобто $\varphi \propto x^{4/3}$ (закон Чайлда — Ленгмюра). Якщо падіння потенціалу в шарі $|\varphi_s|$ досягається при $x = d$, то $C = |\varphi_s|/d^{4/3}$ і

$$j = \frac{1}{9\pi}\sqrt{\frac{2e}{m_i}}\,\frac{|\varphi_s|^{3/2}}{d^2}, \qquad \text{звідки} \qquad d \propto |\varphi_s|^{3/4} \text{ при заданому } j.$$

Підставивши $j = e\,n_{\mathrm{sh}} c_s$ і $|\varphi_s| = \xi\,T_e/e$, отримуємо $d \approx 0{,}8\,\xi^{3/4}\lambda_{De}$ (з точністю до того, що $n_{\mathrm{sh}} \approx n$). Для водню $\xi \approx 2{,}8$ (з попереднього абзацу), тож $d \approx 1{,}7\,\lambda_{De}$: товщина шару зростає із падінням потенціалу повільно, а за порядком величини лишається λ_{De}.

Зонд Ленгмюра. Нехай зонд — малий електрод площею S і характерним розміром r_p, потенціал якого V відраховують від опорного електрода (наприклад, заземленої камери). Потенціал самої плазми щодо опорного електрода позначимо V_p, плаваючий потенціал зонда — V_f; тоді $\varphi_f = V_f - V_p < 0$ — та сама величина, що в формулі (1.17). Змінюючи V, вимірюють струм I на зонд; додатним вважаємо електронний струм (з плазми на зонд), а іонний струм має від'ємний знак. Вольт-амперна характеристика (рис. 1.10) має три ділянки.




Рис. 1.10. Вольт-амперна характеристика одиночного зонда Ленгмюра (V_p — потенціал плазми, V_f — плаваючий потенціал)

1. $V \ll V_f$: струм іонного насичення $I_{is} \approx 0{,}6\,e\,n_0 c_s S$ (коефіцієнт $0{,}6 \approx \exp(-1/2)$ дає n_{sh}/n_0; S — площа зонда);
2. $V_f < V < V_p$: електрони гальмуються. До зонда долітають лише ті, чия енергія перевищує бар'єр $e(V_p - V)$; їхня частка в максвеллівському розподілі $\exp[-e(V_p-V)/T_e]$, тому $I_e \propto \exp\big(e(V-V_p)/T_e\big)$. Звідси з нахилу $\ln(I + I_{is})$ як функції V знаходять T_e: $d\ln I_e/dV = e/T_e$;
3. $V \geq V_p$: електронне насичення, $I_{es} = \frac{1}{4} e n_0 \bar{v}_e S$.

Отже, одиночний зонд дає T_e (нахил), V_p (злам) і n_0 (з I_{is} при відомому T_e) — локальні параметри плазми, яких не знайти іншими простими методами.

Числовий ескіз (водень, $T_e = 3$ еВ, $n = 10^{10}$ см$^{-3}$): $c_s \approx 1{,}7 \times 10^6$ см/с; $I_{is}/S \approx 0{,}6\,e n c_s \approx 1{,}6$ мА/см^2; $I_{es}/S = \frac{1}{4} e n \bar{v}_e \approx 46$ мА/см^2; $\varphi_f \approx -3{,}3\,T_e/e \approx -10$ В. Нахил $\ln I(V)$ дає $1/T_e$ (больцманівська частина електронного струму), а I_{is} не залежить від V, бо критерій Бома фіксує потік іонів.

Подвійний зонд і межі застосовності. Одиночний зонд потребує опорного електрода, що торкається плазми, а розряд з високочастотними коливаннями потенціалу спотворює характеристику. Цього уникають *подвійним зондом* — двома однаковими електродами, між якими прикладено напругу V, а вся система плаває. Струм у колі замкнений через плазму: що тече в один електрод, те витікає з іншого. Нехай електроди мають потенціали V_1, V_2 відносно плазми, $V = V_1 - V_2$. Кожен збирає іонний струм насичення I_{is} (однаковий, бо електроди однакові) і електронний $I_{ek} \propto \exp(eV_k/T_e)$ (як у ділянці 2 характеристики одиночного зонда), тож $I = I_{e1} - I_{is} = -(I_{e2} - I_{is})$. Звідси $I_{e1} + I_{e2} = 2I_{is}$ і $I_{e1}/I_{e2} = \exp(eV/T_e)$, а $I = \frac{1}{2}(I_{e1} - I_{e2})$. Підставивши, отримаємо

$$I = I_{is}\,\frac{\exp(eV/T_e) - 1}{\exp(eV/T_e) + 1} = I_{is}\tanh\frac{eV}{2T_e}, \qquad T_e = \frac{e\,I_{is}}{2\,(dI/dV)_{V=0}}. \tag{1.18}$$

Струм не перевищує I_{is}, тому збурення плазми мале. Температура визначається нахилом характеристики в нулі (рис. 1.11).




Рис. 1.11. Характеристика подвійного зонда (1.18): симетрична, насичується на $\pm I_{is}$; нахил у нулі дає T_e

Зонд працює лише тоді, коли він не руйнує плазму, яку вимірює:

- розмір зонда має бути значно меншим за довжину вільного пробігу λ_{fp} (відстань між зіткненнями, розд. 4), інакше струм визначається зіткненнями, а не шаром;
- розмір зонда має бути значно більшим за товщину шару: $r_p \gg \lambda_D$; лише тоді струм $I_{is} \approx 0{,}6\,e\,n_0 c_s S$ збирається з площі S, а шар можна вважати тонким;
- у магнітному полі потрібно $r_{Le} \gtrsim r_p$, де r_{Le} — ларморівський радіус електрона (радіус кола, яким він обертається навколо силової лінії; формула (3.1) у розд. 3). Практично $r_{Le} \approx 2{,}4\sqrt{T_e[\text{еВ}]}\,/B[\text{Гс}]$ см. Якщо $r_{Le} \ll r_p$, електрони майже не рухаються впоперек поля й потрапляють на зонд лише вздовж силових ліній: збір струму залежить

від орієнтації зонда щодо **B**, тобто *анізотропний*, і формули цього розділу не працюють;
- у гарячій плазмі ($T_e \gtrsim 50$ еВ, великі потоки) зонд перегрівається, тому в токамаках його використовують лише на периферії;
- за наявності швидких електронів (розподіл не максвеллівський) нахил $\ln I(V)$ зменшується на великих V, і T_e виходить завищеною.

1.10. Екранування в виродженому газі: довжина Томаса — Фермі

Виведення дебаївського екранування спирається не на закон Больцмана як такий, а лише на чутливість концентрації електронів до потенціалу. Нехай електрони перебувають у рівновазі з хімічним потенціалом μ (нерухомий іонний фон). У потенціалі φ електрон має додаткову енергію $-e\varphi$, тому рівновага вимагає, щоб локальна величина $\mu_{\text{лок}}(n) - e\varphi$ була сталою. Звідси зміна концентрації $\delta n = (\partial n/\partial \mu)\, e\varphi$, густина заряду $\rho = -e\,\delta n$, і рівняння Пуассона набуває вигляду $\Delta\varphi = \varphi/\lambda^2$ з

$$\frac{1}{\lambda^2} = 4\pi e^2 \frac{\partial n}{\partial \mu}. \tag{1.19}$$

Для невиродженого газу $n \propto e^{\mu/T}$, $\partial n/\partial\mu = n/T$, і одержуємо λ_{De}. Для виродженого електронного газу металу ($T \ll E_F$) $n \propto \mu^{3/2}$, тобто $\partial n/\partial\mu = 3n/2E_F$, і

$$\lambda_{TF} = \sqrt{\frac{E_F}{6\pi n e^2}} \approx 0{,}5\sqrt{a_B\, n^{-1/3}}, \qquad a_B = \frac{\hbar^2}{me^2} = 0{,}53 \times 10^{-8}\ \text{см}, \tag{1.20}$$

де використано $E_F = (\hbar^2/2m)(3\pi^2 n)^{2/3}$. Тобто в квантовій плазмі металу тепловий масштаб T замінюється енергією Фермі, а екранування визначається середньою відстанню між електронами. Для міді ($n \approx 8{,}5 \times 10^{22}$ см$^{-3}$, $E_F \approx 7$ еВ) $\lambda_{TF} \approx 0{,}55 \times 10^{-8}$ см: заряд провідника зосереджений у шарі завтовшки в частці міжатомної відстані. Це й пояснює, чому в електростатиці так добре працює наближення «заряд розподілений по поверхні». Тут важлива не стільки сама оцінка λ_{TF}, скільки ідея: *масштаб екранування визначається властивостями розподілу частинок*, а не самим фактом наявності заряду. Для плазми це не екзотика: у щільних астрофізичних об'єктах (білі карлики, ядра планет) електрони вироджені, і замість λ_{De} працює λ_{TF}.

Головне в розділі

- Плазма — квазінейтральний частково чи повністю іонізований газ із колективною поведінкою заряджених частинок.
- За формулою Саха газ помітно іонізується вже за $T \ll I$: вільний електрон має величезний фазовий об'єм, і виграш ентропії компенсує больцманівський множник $e^{-I/T}$.
- Дебаївська довжина λ_D — масштаб екранування заряду; на відстанях $L \gg \lambda_D$ плазма квазінейтральна.
- Електрони й іони можуть мати різні температури ($T_e \gg T_i$ у розрядах), бо при зіткненні електрон віддає іону лише частку $\sim m_e/m_i$ енергії.
- Колективність потребує великого числа частинок у дебаївській сфері, $N_D \gg 1$; це те саме, що слабка зв'язаність $\Gamma \ll 1$ ($N_D \approx 0{,}09\,\Gamma^{-3/2}$).
- Плазма — це ще й $\lambda_D \ll L$ (квазінейтральність на масштабі системи) та $\omega\tau \gg 1$ (немає домінування зіткнень з нейтральними атомами).
- Біля поглинальної стінки іони входять у шар об'ємного заряду зі швидкістю $u \geq c_s$ (критерій Бома); на цьому ґрунтується зонд Ленгмюра.
- У виродженому газі (метали) тепловий масштаб T замінюється енергією Фермі: екранування задає довжина Томаса — Фермі.

Задачі

1.1. Виразіть температуру поверхні Сонця ($T \approx 5800$ К) в електронвольтах, ергах і джоулях. *Відповідь:* $T \approx 0{,}5$ еВ $\approx 8\times10^{-13}$ ерг $\approx 8\times10^{-20}$ Дж.

1.2. Зонд Ленгмюра площею $S = 0{,}1$ см^2 у водневій плазмі з $T_e = 3$ еВ реєструє струм іонного насичення 1,6 мА. Знайдіть концентрацію n_0 і плаваючий потенціал відносно плазми. *Відповідь:* $c_s \approx 1{,}7\times10^6$ см/с, $n_0 = I/(0{,}6\,e\,c_s S) \approx 10^{11}$ см$^{-3}$, $\varphi_f \approx -3{,}3\,T_e/e \approx -10$ В.

1.3. Подвійний зонд (формула (1.18)) показує струм насичення 0,5 мА, а нахил характеристики в нулі $dI/dV = 0{,}1$ мА/В. Знайдіть T_e. *Відповідь:* $T_e = eI_{is}/[2\,dI/dV] = 0{,}5/(2\cdot0{,}1) = 2{,}5$ еВ.

1.4. За формулою Саха знайдіть ступінь іонізації водню з повною концентрацією 10^{17} см$^{-3}$ при $T = 1$ еВ і оцініть температуру, при якій $\alpha = 1/2$. *Відповідь:* $\alpha \approx 0{,}18$; $\alpha = 1/2$ при $T \approx 1{,}2$ еВ.

1.5. Знайдіть дебаївську довжину λ_{De}, число частинок у дебаївській сфері N_D та параметр зв'язку Γ для плазми з $n_e = 10^{12}$ см$^{-3}$,

? $T_e = 2$ еВ. *Відповідь:* $\lambda_{De} \approx 1{,}05 \times 10^{-3}$ см, $N_D \approx 4{,}9 \times 10^3$, $\Gamma \approx 7 \times 10^{-4}$.

? **1.6.** Для $n = 10^{14}$ см$^{-3}$, $T = 10$ еВ знайдіть λ_{De}, a і N_D. Перевірте співвідношення (1.12). Чи виконується умова колективності? *Відповідь:* $a \approx 2{,}2 \times 10^{-5}$ см, $\lambda_{De} \approx 2{,}4 \times 10^{-4}$ см ($\lambda_{De}/a \approx 11$), $N_D \approx 5 \times 10^3 \gg 1$; умова виконується.

? **1.7.** Оцініть час відновлення квазінейтральності $\tau \sim \lambda_{De}/v_{Te}$, $v_{Te} = \sqrt{T_e/m_e}$, для іоносфери та токамака з табл. 1.1. *Відповідь:* $\tau \approx 6 \times 10^{-8}$ с (іоносфера), $\tau \approx 2 \times 10^{-12}$ с (токамак).

? **1.8.** Для плазми з $n = 10^{12}$ см$^{-3}$, $T_e = 3$ еВ, $T_i = 0{,}03$ еВ знайдіть λ_{De}, λ_{Di} і λ_D. Яку довжину екранування слід брати для швидкого й для повільного (порівняно з λ_D/v_{Ti}) процесу? *Відповідь:* $\lambda_{De} \approx 1{,}3 \times 10^{-3}$ см, $\lambda_{Di} \approx 1{,}3 \times 10^{-4}$ см, $\lambda_D \approx \lambda_{Di}$; для швидкого процесу — λ_{De}, для повільного — λ_D.

? **1.9.** Водневий розряд: $n_{\mathrm{sh}} = 10^{11}$ см$^{-3}$, $T_e = 4$ еВ, $T_i \ll T_e$. Знайдіть мінімальну швидкість іонів на межі шару (критерій Бома), їхню енергію та потік на стінку. *Відповідь:* $u_0 = c_s \approx 2{,}0 \times 10^6$ см/с, енергія $\frac{1}{2} m_i c_s^2 = T_e/2 = 2$ еВ, $j_i = n_{\mathrm{sh}} c_s \approx 2 \times 10^{17}$ см$^{-2}$с$^{-1}$.

? **1.10.** Плазма з $n = 10^{12}$ см$^{-3}$, $T = 1$ еВ межує із зарядженою площиною (розд. 1.8). Знайдіть λ_D і поверхневу густину заряду σ, при якій $e\varphi_0 = T$. Покажіть, що при малих σ маємо $\varphi_0 = 4\pi\sigma\lambda_D$. *Відповідь:* $\lambda_D \approx 5{,}3 \times 10^{-4}$ см, $\sigma \approx 0{,}5$ СГС.

? **1.11.** Пристінкова плазма токамака водню: $n = 10^{13}$ см$^{-3}$, $T_e = 30$ еВ, $T_i \lesssim T_e$. (а) Оцініть λ_{De} і N_D. (б) Знайдіть плаваючий потенціал стінки відносно плазми за формулою (1.17). (в) Оцініть теплове навантаження на стінку $q \approx \gamma T_e j_i$, де $j_i = n_{\mathrm{sh}} c_s$, $n_{\mathrm{sh}} \approx \exp(-1/2)\, n \approx 0{,}6\, n$ (густина на межі шару), $\gamma \approx 7$ (оцінка — у тексті § 1.9). *Відповідь:* $\lambda_{De} \approx 13$ мкм, $N_D \sim 10^5$; $\varphi_f \approx -100$ В; $c_s \approx 5{,}4 \times 10^6$ см/с, $j_i \approx 3 \times 10^{23}$ м$^{-2}$с$^{-1}$, $q \sim 10$ МВт/м^2.

? **1.12.** Оцініть довжину Томаса — Фермі для міді ($n = 8{,}5 \times 10^{22}$ см$^{-3}$). Порівняйте з міжатомною відстанню та поясніть, у якому сенсі заряд провідника «розподілений по поверхні». *Відповідь:* $\lambda_{TF} \approx 5 \times 10^{-9}$ см (поряд із міжатомною відстанню $\sim 2 \times 10^{-8}$ см).

? Контрольні питання

1. Чим плазма відрізняється від нейтрального газу? Що означає «колективна» поведінка?
2. Чому газ іонізується помітно при температурі, багато меншій за енергію іонізації? Що виражає формула Саха?
3. Чому в газовому розряді $T_e \gg T_i$ і що таке двотемпературна плазма?
4. Що таке квазінейтральність? Оцініть, наскільки вона порушується на масштабі L.
5. Виведіть дебаївське екранування. Чому потрібен множник e^{-r/λ_D} і чому відкидається зростаючий розв'язок?
6. Чому в слабкозв'язаній плазмі $N_D \gg 1$? Як зв'язані N_D і Γ?
7. Чому дебаївський шар біля стінки має товщину $\sim \lambda_D$ навіть при великому потенціалі?
8. Як змінюється довжина екранування у виродженому електронному газі? Що таке довжина Томаса — Фермі?
9. За яких умов плазма «колективна»? Назвіть три умови, їхній фізичний зміст і співвідношення між N_D та Γ.
10. Чому іони мають увійти в шар біля стінки зі швидкістю $u \geq c_s$? Звідки береться плаваючий потенціал $\approx -3\,T_e/e$ і що вимірює зонд Ленгмюра?

2 Колективні коливання та хвилі в плазмі

Дебаївська довжина λ_D задає просторовий масштаб колективної відповіді плазми. Тут ми введемо її часовий аналог — плазмову частоту ω_p — і розглянемо колективні збурення, що змінюються і в просторі, і в часі. При цьому з'являються два різні класи хвиль: поперечні електромагнітні хвилі та поздовжні електростатичні плазмові хвилі. Їх об'єднує спільне джерело — колективний рух заряджених частинок, але фізика поширення в них різна. Обидва класи можна збудити ззовні (антена, пучок, хвиля), але вони виникають і самі, з теплових флуктуацій, як тихий шум (див. кінець розд. 2.4).

2.1. Плазмові коливання та плазмова частота

Дебаївське екранування описує, як плазма просторово перебудовується навколо внесеного заряду. Розглянемо тепер, як плазма реагує на збурення, що змінюється з часом. Воно може бути зовнішнім (антена, пучок частинок, хвиля) або власним: тепловий рух самих частинок теж весь час трохи збурює плазму (див. кінець розд. 2.4). Нехай електронний компонент однорідної плазми змістився відносно нерухомого іонного фону на невелику відстань x (рис. 2.1). Іони можна вважати нерухомими, оскільки $m_i \gg m_e$.

На краях шару виникають заряди з поверхневою густиною $\sigma = \mp n_e e x$, і між ними — поле плоского конденсатора, напрямлене так, щоб повернути електрони назад:

$$E = 4\pi n_e e x.$$

Рівняння руху електрона (його заряд $-e$)

$$m_e \ddot{x} = -eE = -4\pi n_e e^2 x \quad \Rightarrow \quad \ddot{x} + \omega_{pe}^2 x = 0, \tag{2.1}$$

де

$$\boxed{\omega_{pe} = \sqrt{\frac{4\pi n_e e^2}{m_e}} \approx 5{,}64 \times 10^4 \sqrt{n_e[\text{см}^{-3}]}\ \text{с}^{-1}} \tag{2.2}$$

називається *електронною плазмовою* (або *ленгмюрівською*) *частотою*. Електрони гармонічно коливаються відносно іонів з цією частотою, і ці коливання називають *плазмовими*.




Рис. 2.1. Модель плазмових коливань: електронний компонент зміщений відносно нерухомого позитивного фону, виникає повертаюче електричне поле

Той самий результат дає й опис без уявного конденсатора. З рівняння неперервності $\partial_t \rho + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ та рівняння руху $m_e \partial_t \mathbf{v} = -e\mathbf{E}$ при $\mathbf{j} = -n_e e \mathbf{v}$ маємо $\partial_t^2 \rho = -\nabla \cdot \partial_t \mathbf{j} = -(n_e e^2/m_e) \nabla \cdot \mathbf{E}$, а за теоремою Гаусса $\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$. Тому

$$\frac{\partial^2 \rho}{\partial t^2} + \omega_{pe}^2 \rho = 0.$$

Тобто плазмова частота — це частота, з якою плазма «відновлює» порушену квазінейтральність, а ω_{pe}^{-1} — характерний час цього відновлення.

Якщо врахувати рух іонів (заряд Ze, маса m_i), для холодної двокомпонентної плазми повна частота довгохвильових поздовжніх коливань

$$\omega_p^2 = \omega_{pe}^2 + \omega_{pi}^2 = 4\pi e^2 \left(\frac{n_e}{m_e} + \frac{Z^2 n_i}{m_i} \right) \simeq \omega_{pe}^2.$$

Іонний внесок мізерний (у задачі 2.2 його необхідно оцінити), тому далі, якщо не сказано інакше, $\omega_p \equiv \omega_{pe}$. Крім того, коливання в реальній плазмі загасають (зіткнення, теплове розмазування), а при врахуванні теплового руху їхня частота залежить від хвильового числа (розд. 2.4). Тому ω_{pe} слід розуміти насамперед як базову *масштабну* частоту плазми.

Зв'язок двох масштабів. Ми вже знаємо просторовий масштаб відповіді плазми. Тепер поставимо природне наступне питання: *як швидко* плазма відновлює порушену квазінейтральність? Дебаївську довжину та плазмову частоту поєднує проста формула

$$\boxed{\lambda_{De} = \frac{v_{Te}}{\omega_{pe}}, \qquad v_{Te} = \sqrt{\frac{T_e}{m_e}} \approx 4{,}2 \times 10^7 \sqrt{T_e[\text{еВ}]}\ \text{см/с}}. \tag{2.3}$$

Дебаївська довжина — це відстань, яку електрон із тепловою швидкістю проходить за час порядку ω_{pe}^{-1}. Одразу видно, що плазма на масштабах, менших за λ_D, «не встигає» колективно відповідати: за час ω_{pe}^{-1} електрон вилітає з такої області раніше, ніж поле встигне його повернути, тож тепловий рух розмиває ефект. Фізичний зміст двох масштабів:

1. час колективної реакції $\sim \omega_{pe}^{-1}$;
2. довжина колективної реакції $\sim \lambda_{De}$.

Ці самі масштаби стоять за знайомою вже «шубою»: усереднена в часі, вона має товщину λ_{De}, а її миттєвий вигляд випадково змінюється за час порядку ω_{pe}^{-1}. Така мерехтлива шуба і є «дрижанням» плазми, про яке мова в розд. 2.4. Для швидких оцінок зручна формула $\lambda_{De} \approx 7{,}43 \times 10^2 \sqrt{T_e[\text{еВ}]/n_e[\text{см}^{-3}]}$ см.

Отже, в плазмі виникає принципова ієрархія просторових масштабів:

$$a \ll \lambda_D \ll L. \tag{2.4}$$

Перша нерівність — умова $N_D \gg 1$, друга — квазінейтральність в об'ємі (докладніше — у розд. 1). Для хвиль звідси випливає головне: на масштабах $L \gg \lambda_D$ можна вводити гладкі макроскопічні поля та густини.

2.2. Діелектрична проникність холодної плазми

Нехай на плазму падає електромагнітна хвиля з частотою ω (рис. 2.2). Знайдемо відповідь плазми на змінне поле. Зробимо чотири припущення, які в типових умовах виконуються.

1. Рухаються переважно електрони. Маса іона не менша за $1836\,m_e$, тому струм іонів малий порівняно зі струмом електронів (внесок іонів пропорційний m_e/m_i).
2. Швидкість електронів мала, $v \ll c$, тому силою Лоренца від магнітного поля хвилі ($\sim (v/c)eE$) можна знехтувати.
3. На масштабі руху електронів поле можна вважати однорідним. Для теплового руху це означає $kv_{Te} \ll \omega$: за період коливання електрон проходить відстань v_{Te}/ω, набагато меншу за довжину




Рис. 2.2. Електромагнітна хвиля, що падає з вакууму на шар плазми

хвилі, тож він «бачить» однорідне поле й рухається лише під дією $\mathbf{E}$. Амплітуда вимушеного руху також має бути малою, щоб зберігалася лінеаризація.

4. Зіткненнями можна знехтувати на часі одного коливання: $\nu \ll \omega$. Рівняння руху електрона $m_e\ddot{\mathbf{r}} = -e\mathbf{E}$ має розв'язок

$$\mathbf{r} = \frac{e}{m_e\omega^2}\mathbf{E},$$

тобто зміщення збігається за напрямом з полем $\mathbf{E}$. Це означає, що воно перебуває в протифазі до сили $-e\mathbf{E}$, яка діє на електрон (так буває при вимушених коливаннях на частоті, вищій за власну; у вільної частинки власна частота нульова). Електрони плазми подібні до зв'язаних зарядів діелектрика, оскільки вони лише коливаються відносно початкового положення. Зміщення створює ефективний дипольний момент електрона $\mathbf{p} = -e\mathbf{r} = -e^2\mathbf{E}/(m_e\omega^2)$, напрямлений проти поля, а вектор поляризації одиниці об'єму плазми

$$\mathbf{P} = n_e\mathbf{p} = -\frac{n_e e^2}{m_e\omega^2}\mathbf{E} \equiv \chi\mathbf{E}.$$

Оскільки $\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P} = \varepsilon\mathbf{E}$, діелектрична проникність $\varepsilon = 1 + 4\pi\chi$:

$$\boxed{\varepsilon(\omega) = 1 - \frac{4\pi n_e e^2}{m_e\omega^2} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}. \qquad (2.5)$$

Той самий результат дає опис через струм. Швидкість електрона $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = -i\omega\mathbf{r}$, густина струму $\mathbf{j} = -n_e e\mathbf{v} = i\dfrac{n_e e^2}{m_e\omega}\mathbf{E} \equiv \sigma(\omega)\mathbf{E}$, тому

$$\sigma(\omega) = i\frac{\omega_p^2}{4\pi\omega}, \qquad \varepsilon = 1 + \frac{4\pi i\sigma}{\omega} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}. \qquad (2.6)$$

Провідність уявна: струм відстає від поля на чверть періоду (дія інерції електронів), тому енергія не поглинається. Формула (2.5) — окремий випадок *моделі Лоренца* — класичної моделі діелектрика, де кожен електрон пружно прив'язаний до свого атома: $m_e\ddot{\mathbf{r}} = -e\mathbf{E} - m_e\omega_0^2\mathbf{r}$, а ω_0 — власна частота такого осцилятора. Та сама підстановка $\mathbf{r} \propto e^{-i\omega t}$ дає $\varepsilon = 1 + 4\pi n_e e^2/[m_e(\omega_0^2 - \omega^2)]$. У плазмі електрони *вільні*, повертаючої сили немає, тобто $\omega_0 = 0$, і одержуємо (2.5).

Результат якісно відрізняється від електростатики діелектриків: тут $\varepsilon < 1$, а при $\omega < \omega_p$ взагалі $\varepsilon < 0$. Звернімо увагу ще на одне. Статичне екранування (розд. 1) теж можна записати мовою діелектричної проникності: Фур'є-образ потенціалу (1.6) дорівнює $\varphi_k = 4\pi q/(k^2 + \lambda_D^{-2}) = 4\pi q/(k^2\varepsilon(k))$, де $\varepsilon(0,k) = 1 + 1/(k\lambda_D)^2$. Це не суперечить (2.5): та формула виведена для $\omega \gg kv_{Te}$ (допущення 3), а статичне екранування — протилежна границя $\omega \ll kv_{Te}$, де електрони встигають розподілитися за Больцманом. Тобто статичне поле в плазмі сильно перебудовується через перерозподіл зарядів, а високочастотне поле бачить уже іншу, інерційну відповідь електронів. Це хороший приклад того, що *одне й те саме середовище має різну електричну відповідь на різних часових масштабах*.

2.3. Закон дисперсії. Частота відсікання

Теоретичні відомості Нагадаємо з електродинаміки

З рівнянь Максвелла $\nabla\times\mathbf{E} = -\frac{1}{c}\partial_t\mathbf{B}$, $\nabla\times\mathbf{B} = \frac{1}{c}\partial_t\mathbf{D}$ (струми вже враховано в $\mathbf{D} = \varepsilon\mathbf{E}$) маємо

$$\nabla\times\nabla\times\mathbf{E} = -\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{D}}{\partial t^2}.$$

Для плоскої хвилі $\mathbf{E} \propto e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-i\omega t}$ оператор $\nabla \to i\mathbf{k}$, $\partial_t \to -i\omega$, тому $\nabla\times\nabla\times\mathbf{E} \to -\mathbf{k}\times(\mathbf{k}\times\mathbf{E}) = k^2\mathbf{E} - \mathbf{k}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{E})$, і

$$(k^2c^2 - \varepsilon\omega^2)\mathbf{E} = c^2\,\mathbf{k}\,(\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}). \tag{2.7}$$

Поперечна хвиля ($\mathbf{k}\cdot\mathbf{E} = 0$): $k^2c^2 = \varepsilon\omega^2$. Поздовжня ($\mathbf{E} \parallel \mathbf{k}$): ліва частина стає $-\varepsilon\omega^2\mathbf{E}$ після скорочення $k^2c^2\mathbf{E}$ з правою, тобто $\varepsilon\omega^2\mathbf{E} = 0$, а отже $\varepsilon = 0$. Обидва типи хвиль — з однієї формули: поперечна гілка — нуль «знаменника» $k^2c^2 - \varepsilon\omega^2$, поздовжня — $\varepsilon = 0$.

Для плоскої поперечної хвилі $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0\exp(ikx - i\omega t)$ ($\mathbf{k}\cdot\mathbf{E} = 0$), отже, $k^2c^2 = \varepsilon\omega^2$. Підставляючи (2.5), одержуємо закон дисперсії

$$\boxed{\omega^2 = \omega_p^2 + c^2k^2} \tag{2.8}$$

(рис. 2.3). Множачи на $\hbar^2$, бачимо, що це релятивістський зв'язок

$\mathcal{E}^2 = (\hbar\omega_p)^2 + (\hbar ck)^2$: у плазмі фотон поводиться як частинка з «масою» $\hbar\omega_p/c^2$.




Рис. 2.3. Закон дисперсії поперечної електромагнітної хвилі в холодній плазмі. Частота ω_p — границя поширення в однорідній плазмі

Хвилі з $\omega > \omega_p$ поширюються з довжиною $\lambda = 2\pi c/\sqrt{\omega^2 - \omega_p^2}$, а показник заломлення $N = \sqrt{\varepsilon} < 1$ (літеру n лишено для концентрації). Швидкості

$$v_{\text{ф}} = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2}} > c, \qquad v_{\text{гр}} = \frac{d\omega}{dk} = c\sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} < c, \qquad v_{\text{ф}} v_{\text{гр}} = c^2.$$

Фазова швидкість більша за швидкість світла, і це не суперечить теорії відносності, адже переносять енергію й сигнал хвильові пакети з груповою швидкістю $v_{\text{гр}} < c$.

Хвилі з $\omega < \omega_p$. Тоді $k^2 = (\omega^2 - \omega_p^2)/c^2 < 0$. Покладемо $k = i\kappa$, $\kappa = \sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}/c$:

$$E = E_0 \exp(-\kappa x - i\omega t).$$

Поле експоненціально спадає в глибину плазми, а середній потік енергії дорівнює нулю (**E** і **B** зсунуті за фазою на чверть періоду). Глибина проникнення $\delta = 1/\kappa \approx c/\omega_p$ при $\omega \ll \omega_p$ (*безколізійна скін-довжина*). Для $n_e = 10^{12}$ см$^{-3}$ вона становить $\approx 0{,}5$ см.

Отже, у цій простій моделі однорідної, немагнітної та беззіткнювальної плазми поперечні електромагнітні хвилі поширюються лише за $\omega > \omega_p$. Магнітне поле, градієнти густини та зіткнення змінюють цю картину. Частоту ω_p називають *частотою відсікання* (англ. *cutoff*).

2.4. Поздовжні (ленгмюрівські) хвилі

Те саме рівняння, що дало поперечну гілку, дає й поздовжню (рівняння (2.7)). Запис $\mathbf{D} = \varepsilon\mathbf{E}$ і рівняння $\nabla \cdot \mathbf{D} = 0$ дають $\varepsilon\,\mathbf{k}\cdot\mathbf{E} = 0$. Є дві можливості: або $\mathbf{k}\cdot\mathbf{E} = 0$ (поперечна хвиля, розглянута вище), або $\varepsilon(\omega) = 0$ (поздовжня хвиля, $\mathbf{E} \parallel \mathbf{k}$). З (2.5) умова $\varepsilon = 0$ дає $\omega = \omega_p$ — це відомі плазмові коливання (розд. 2.1). У холодній плазмі їхня частота не залежить від k: кожен електрон повертає лише власне зміщення й сусідів не відчуває. Групова швидкість нульова, і збурення не поширюється.

Ситуація змінюється, якщо врахувати тепловий рух: тиск зв'язує сусідні шари. Розглянемо одновимірні поздовжні хвилі малої амплітуди ($n_e = n_0 + n_1$, $p = p_0 + p_1$, швидкість v, поле E; іони нерухомі). Це *гідродинамічний* опис: електрони розглядаємо як суцільне середовище з густиною, швидкістю й тиском, не стежачи за окремими частинками (систематично — у розд. 5). Потрібні три рівняння: неперервності (електрони не зникають: густина змінюється лише через дивергенцію потоку), руху електронного «флюїду» (сила поля й градієнт тиску прискорюють одиницю об'єму) та Гаусса (поле створює зайвий електронний заряд):

$$\frac{\partial n_1}{\partial t} + n_0\frac{\partial v}{\partial x} = 0, \qquad m_e n_0\frac{\partial v}{\partial t} = -e n_0 E - \frac{\partial p_1}{\partial x}, \qquad \frac{\partial E}{\partial x} = -4\pi e n_1.$$

Стискання відбувається вздовж одного напрямку й швидко: за період електрон не встигає вилетіти з області стискання ($kv_{Te} \ll \omega \approx \omega_{pe}$; оскільки $\lambda_{De} = v_{Te}/\omega_{pe}$, це те саме, що $k\lambda_{De} \ll 1$), тому воно адіабатичне. Для одного ступеня свободи показник адіабати $\gamma = (f+2)/f = 3$, тобто $p \propto n^3$, і $p_1 = 3T_e\, n_1$. Виключаючи v і E, одержуємо

$$\frac{\partial^2 n_1}{\partial t^2} = -\omega_{pe}^2 n_1 + 3v_{Te}^2\frac{\partial^2 n_1}{\partial x^2} \quad\Rightarrow\quad \boxed{\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2 v_{Te}^2}. \tag{2.9}$$

Це співвідношення Бома — Гросса. Тепер збурення поширюється з груповою швидкістю $v_{\text{гр}} = 3kv_{Te}^2/\omega \neq 0$. Формула справедлива при $k\lambda_{De} \ll 1$ (ця умова вже використана вище для адіабатичності): ми описували електрони як суцільне середовище з тиском $p_1 = 3T_e n_1$ і не враховували, що швидкості окремих електронів різні. Коли $k\lambda_{De}$ перестає бути малим, таке наближення втрачає точність, і потрібний опис, що враховує розподіл електронів за швидкостями. Зокрема, поблизу резонансу електрони, швидкість яких близька до фазової швидкості хвилі, можуть забирати енергію хвилі навіть за відсутності зіткнень (загасання Ландау, 1946 р.; детально — у розд. 7.9). Сила цього ефекту залежить від форми розподілу та параметра $k\lambda_{De}$; це не просто поріг, після якого будь-яка хвиля миттєво згасає. Цей ефект

неможливо одержати, описуючи електрони як суцільне середовище з тиском: він пов'язаний саме з розподілом електронів за швидкостями. Образ серфінгіста: електрони, трохи повільніші за хвилю, вона підганяє, і вони забирають енергію; трохи швидші — гальмуються й віддають її. У максвеллівському розподілі повільних електронів більше, тому хвиля загасає (резонанс $v_\varphi = \omega/k \sim v_{Te}$ настає при $k\lambda_{De} \sim 1$, коли умова $kv_{Te} \ll \omega$ порушується).

Ці хвилі не обов'язково приходять ззовні. Навіть у плазмі, залишеній саму по собі, густина заряду в кожну мить випадково відхиляється від середнього, бо частинки хаотично переміщуються. Довільне таке відхилення можна розкласти на гармоніки (ряд Фур'є на відрізку довжини L):


$$n_1(x,t) = \sum_k n_k(t)\, e^{ikx}, \qquad k = \frac{2\pi m}{L}, \quad m = 0, \pm1, \pm2, \ldots,$$

де $n_k = L^{-1}\int n_1 e^{-ikx}\,dx$ — внесок синусоїдної складки густини з періодом $\lambda = 2\pi/k$. Рівняння (2.9) лінійне, тому гармоніки не впливають одна на одну, і кожна коливається зі своєю частотою $\omega(k)$. Довгохвильові складки ($k\lambda_{De} \ll 1$) коливаються на частоті, близькій до ω_{pe}; у коротких ($k\lambda_{De} \gtrsim 1$) електрони розлітаються швидше, ніж поле встигає їх повернути, і колективного коливання нема. Випадковими є лише початкові значення n_k та поштовхи від теплового руху, а не закон $\omega(k)$. Так виникає тихе «дрижання» рівноважної плазми на власних частотах. Приклад такого розкладу — на рис. 2.4: випадкова карта густини заряду в площині й її складові різного масштабу, як карту реліктового випромінювання розкладають на мультиполі.

Це дрижання не є однією лінією на ω_{pe}: частота гармоніки залежить від k (формула Бома–Гросса), а загасання Ландау (розд. 7.9) надає кожному піку скінченну ширину, тож спектр розмитий; у холодній плазмі не було б ні дрижання, ні розмиття. Тепловий рух ці коливання збуджує, а загасання гасить, і вони врівноважують одне одного: рівень шуму стаціонарний, хвилі не наростають (наростання з того самого шуму можливе лише в нерівноважній плазмі, розд. 8.11). Дрижить і електромагнітне поле: випадкові струми електронів збуджують поперечні хвилі, які майже не загасають, бо їхня фазова швидкість перевищує c; це і є теплове випромінювання плазми. Його, як і розсіяння на флуктуаціях густини, використовують для діагностики (розд. 3.8 і 7.11).

2.5. Зіткнення й поглинання електромагнітних хвиль

Досі зіткненнями ми нехтували. Врахуємо їх у найпростішій формі (частоту $\nu \equiv \nu_{ei}$ обчислимо в розд. 4; тут вона — просто параметр):



(а) повна карта (б) $k\lambda_{De} \approx 0{,}4$–$0{,}8$ (в) $k\lambda_{De} \approx 1$–2 (г) $k\lambda_{De} \approx 3$–8

Рис. 2.4. Випадкові флуктуації густини заряду в плазмі без зовнішніх збурень (модель: гауссове поле зі спектром $1/\varepsilon(0,k) = k^2\lambda_{De}^2/(1+k^2\lambda_{De}^2)$; сторона карти $16\lambda_{De}$, коло — радіус λ_{De}; враховано $k\lambda_{De} \le 8$). Карта (а) є сумою всіх гармонік, панелі (б)–(г) — її складові з вибраних діапазонів k (кожну нормовано окремо). Внизу — внесок гармонік у флуктуацію: довгі складки слабші через екранування, а короткі виглядають як білий шум

електрон гальмується силою тертя $-m_e\nu\mathbf{v}$, де ν — ефективна частота зіткнень з іонами та нейтральними атомами. Рівняння руху в полі $\mathbf{E}\,e^{-i\omega t}$

$$m_e\dot{\mathbf{v}} = -e\mathbf{E} - m_e\nu\mathbf{v} \quad\Rightarrow\quad \mathbf{v} = \frac{-ie\mathbf{E}}{m_e(\omega+i\nu)},$$

звідки провідність $\sigma(\omega) = ie^2 n_e/[m_e(\omega+i\nu)]$ і діелектрична проникність

$$\varepsilon(\omega) = 1 + \frac{4\pi i\sigma}{\omega} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega+i\nu)}. \tag{2.10}$$

Тепер ε комплексна, отже, і хвильове число $k = (\omega/c)\sqrt{\varepsilon}$ має уявну частину: хвиля поглинається. Є дві граничні ситуації.

- $\omega \gg \nu$ (високочастотна границя). Тоді $\operatorname{Im}\varepsilon \approx \omega_p^2\nu/\omega^3$, і амплітуда спадає як $e^{-\operatorname{Im} k\,x}$ з

$$\operatorname{Im} k \approx \frac{\nu}{2c}\,\frac{\omega_p^2/\omega^2}{\sqrt{1-\omega_p^2/\omega^2}}.$$

  Поглинання пропорційне ν і різко зростає поблизу відсікання $\omega \to \omega_p$ (формула годиться, поки $\operatorname{Im}\varepsilon \ll \operatorname{Re}\varepsilon$; там $v_{\text{гр}} \to 0$: хвиля

повільна й довше взаємодіє з електронами). Фізично: коливний рух електрона тим сильніше переходить у тепло, чим частіше він зіштовхується (доки $\nu \ll \omega$; при $\nu \gtrsim \omega$ часті зіткнення не дають електрону розігнатися, і поглинання з ростом ν падає — максимум при $\nu \sim \omega$). Цей механізм поглинає радіохвилі в шарі D іоносфери.

- $\omega \ll \nu$ (низькочастотна границя). Електрони рухаються як у постійному полі: $\sigma \to \sigma_0 = \omega_p^2/4\pi\nu$, плазма поводиться як звичайний провідник з товщиною скін-шару $\delta = c/\sqrt{2\pi\sigma_0\omega}$. Оскільки $\nu \propto T^{-3/2}$, провідність $\sigma_0 \propto T^{3/2}$ зростає з нагріванням плазми, а скін-шар, навпаки, стає тоншим: $\delta \propto \sigma_0^{-1/2} \propto T^{-3/4}$.

Отже, *чи є плазма поглинальною, вирішує порівняння ω з ν*, а чи відбивальною — порівняння ω з ω_p. Джоулеве тепло $\langle \mathbf{j}\cdot\mathbf{E}\rangle = \operatorname{Re}\sigma\,|E|^2/2$ використовують для нагрівання плазми НВЧ-полем.

2.6. Відбиття електромагнітних хвиль від плазми

Чому $\varepsilon < 0$ означає відбиття? При $\omega < \omega_p$ електрони встигають зміститися й екранувати зовнішнє поле швидше, ніж воно змінює знак. Струм електронів випромінює хвилю, яка гасить падаючу всередині плазми й утворює відбиту назовні — так само поводиться метал (провідник — «дзеркало» до ω_p). При $\omega > \omega_p$ інерція електронів не дає їм встигнути, і хвиля проходить. Аналогія з механікою: осцилятор, який збуджують нижче резонансу, рухається у фазі з силою, а вище резонансу — у протифазі; для вільних електронів «резонанс» стоїть на нулі, тож відгук завжди в протифазі, а ω_p лише визначає, чи перевищує поляризація за величиною саме поле ($-4\pi\chi > 1$), тобто чи $\varepsilon < 0$.

Нехай на межу плазми ($x > 0$) нормально падає хвиля з вакууму. Амплітудний коефіцієнт відбиття (формули Френеля, $\mu = 1$)

$$r = \frac{1-\sqrt{\varepsilon}}{1+\sqrt{\varepsilon}}.$$

При $\omega < \omega_p$ величина $\sqrt{\varepsilon} = i\kappa$ чисто уявна, тому

$$R = |r|^2 = \left|\frac{1-i\kappa}{1+i\kappa}\right|^2 = 1.$$

При $\omega \gg \omega_p$ показник заломлення наближається до одиниці, $N \to 1$, а коефіцієнт відбиття прямує до нуля, $R \to 0$. Плазма стає прозорою для електромагнітного випромінювання.

Саме тому високочастотне випромінювання, для якого $\omega \gg \omega_p$, може проходити крізь плазму; до такого діапазону, зокрема, належить рентгенівське випромінювання для багатьох плазмових середовищ.

Похиле падіння. При $\omega > \omega_p$ плазма — середовище з дійсним показником заломлення $N = \sqrt{\varepsilon} < 1$, тобто вакуум для хвилі оптично густіший. Тому можливе повне внутрішнє відбиття при $\sin\theta \geq N$. Критичний кут $\sin\theta_{\text{кр}} = \sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2}$ прямує до нуля при $\omega \to \omega_p + 0$, і плазма відбиває при будь-якому куті падіння.

Плавна межа. Реальні плазми (іоносфера) мають концентрацію, що повільно зростає з глибиною: $n_e = n_e(x)$ на відстанях порядку довжини хвилі змінюється слабко. Тому можна використати локальне значення хвильового числа

$$k^2(x) = \frac{1}{c^2}\left[\omega^2 - \frac{4\pi e^2}{m_e} n_e(x)\right].$$

При нормальному падінні $k(x)$ перетворюється на нуль, де концентрація досягає *критичного значення*

$$n_{\text{кр}} = \frac{m_e \omega^2}{4\pi e^2} \approx 1{,}24 \times 10^4 \, f^2[\text{МГц}] \ \text{см}^{-3}, \qquad f = \frac{\omega}{2\pi}. \tag{2.11}$$

У цій точці («плазмове дзеркало») хвиля повертається назад. Строго кажучи, наближення локального $k(x)$ у самій точці повороту непридатне (потрібне розв'язання рівняння Ейрі), але положення точки воно визначає правильно.

При похилому падінні під кутом θ_0 з вакууму в шарувате середовище зберігається тангенційна складова хвильового вектора, тобто закон Снелліуса $\sqrt{\varepsilon(x)}\sin\theta(x) = \sin\theta_0$. Поворот відбувається там, де $\theta = 90°$:

$$\varepsilon(x_t) = \sin^2\theta_0 \quad \Rightarrow \quad n_e(x_t) = n_{\text{кр}}\cos^2\theta_0.$$

Тому хвилю, що падає похило, плазма відбиває за меншої концентрації: максимальна частота, яку може відбити шар з максимальною концентрацією $n_{\max}$, дорівнює $f_{\max} = f_p(n_{\max})/\cos\theta_0$ («закон секанса»).

2.7. Іоносфера і далекий радіозв'язок

Іоносфера — шар верхньої атмосфери (від висоти ~ 60 км), у якому газ іонізований ультрафіолетовим і рентгенівським випромінюванням Сонця та космічними променями. Ступінь іонізації невелика, але концентрація електронів (від $\sim 10^4$ см$^{-3}$ в нижніх областях до $\sim 10^6$ см$^{-3}$ у максимумі шару F на висотах 200–400 км вдень) достатня для відбиття радіохвиль. Для $n_e = 10^6$ см$^{-3}$ частота $f_p \approx 9$ МГц, тобто короткі хвилі (декаметрові) відбиваються, а ультракороткі й мікрохвилі проходять крізь іоносферу — тому ними користуються для зв'язку з космічними апаратами.

Відбиття від іоносфери дозволяє приймати радіосигнали за горизонтом (рис. 2.5). Довгі та середні хвилі поводяться інакше: вдень їх поглинає нижній шар D через часті зіткнення електронів з нейтральними молекулами (розд. 4), а вночі шар D зникає, і сигнали відбиваються від вищих шарів. Звідси відомий факт: вночі середньохвильові радіостанції чути значно далі.




Рис. 2.5. Далекий радіозв'язок завдяки відбиттю від іоносфери

Той самий ефект проявляється в інших ситуаціях. Під час входу космічного апарата в атмосферу навколо нього утворюється плазмова оболонка з концентрацією $n_e \gtrsim 10^{11}$ см$^{-3}$, що за формулою (2.11) відсікає радіозв'язок на частотах нижче кількох гігагерц («радіозатемнення»). Метали мають вільні електрони з $n_e \sim 10^{23}$ см$^{-3}$ і $\hbar\omega_p \sim 10$ еВ (ультрафіолет): вони відбивають видиме світло за тим самим механізмом, що й плазма радіохвилі, а в ультрафіолеті для багатьох металів (наприклад, лужних) стають прозорими.

2.8. Як це вимірюють: інтерферометрія і рефлектометрія

Закон дисперсії $\omega^2 = \omega_p^2 + k^2c^2$ пов'язує поширення хвилі з концентрацією електронів, тому електромагнітна хвиля сама є зондом густини плазми. Можливі два режими. Якщо $\omega \gg \omega_p$, хвиля проходить крізь плазму, але набирає додаткову фазу — на цьому працює *інтерферометр*. Якщо частота досягає ω_p, хвиля відбивається від шару відсікання (розд. 2.6) — на цьому працює *рефлектометр*. Обидва методи не вносять у плазму сторонніх тіл (на відміну від зонда Ленгмюра) і тому придатні для гарячої плазми.


Інтерферометр. Показник заломлення поперечної хвилі $N = \sqrt{\varepsilon} = \sqrt{1 - n_e/n_{\text{кр}}}$, де критична концентрація $n_{\text{кр}}(\omega)$ дається формулою (2.11). Для $n_e \ll n_{\text{кр}}$ маємо $1-N \approx n_e/2n_{\text{кр}}$, і на хорді крізь плазму хвиля відстає за фазою від хвилі у вакуумі на

$$\Delta\varphi = \frac{\omega}{c}\int (1-N)\,dl \approx \frac{\omega}{2cn_{\text{кр}}}\int n_e\,dl = \boxed{r_e\lambda\int n_e\,dl}, \qquad (2.12)$$

де $r_e = e^2/m_ec^2 = 2{,}82\times10^{-13}$ см — класичний радіус електрона. Він з'являється тут природно: $n_{\text{кр}} = \pi/(r_e\lambda^2)$, або в практичних одиницях $n_{\text{кр}} \approx 1{,}1\times10^{15}/\lambda^2[\text{мм}]$ см$^{-3}$.

Набіг фази вимірюють, порівнюючи хвилю, що пройшла плазму, з опорною хвилею, яка йде в обхід (схема Маха — Цендера, рис. 2.6 а). Під час розряду інтенсивність на детекторі проходить через максимуми й мінімуми; кожна «смуга» відповідає $\Delta\varphi = 2\pi$.

Оцінка. Для $\lambda = 2$ мм, хорди $L = 1$ м і $n_e = 10^{13}$ см$^{-3}$ маємо $\Delta\varphi = 2{,}82{\times}10^{-13}{\cdot}0{,}2{\cdot}10^{15} \approx 56$ рад, тобто близько 9 смуг. При цьому $n_{\text{кр}}(2\text{ мм}) \approx 2{,}8\times10^{14}$ см$^{-3}$, тож $n_e/n_{\text{кр}} \approx 0{,}04$, і розклад кореня виправданий.



(а) (б)

Рис. 2.6. Мікрохвильова діагностика густини: (а) інтерферометр Маха — Цендера вимірює $\int n_e\,dl$ уздовж хорди; (б) рефлектометр: хвиля частоти f відбивається від шару, де $n_e(x) = n_{\text{кр}}(f)$, і повертається із затримкою $\tau(f)$

Межі застосовності інтерферометра.

- Метод дає не n_e у точці, а *лінійний інтеграл* $\int n_e\,dl$. Щоб відновити профіль $n_e(r)$, вимірюють уздовж кількох хорд і для осесиметричної плазми виконують обернення Абеля.
- Фаза відома з точністю до 2π: смуги треба відстежувати неперервно протягом усього розряду. Швидка зміна густини або втрата сигналу дає «перескок смуги» — похибку на ціле число 2π.
- Вибір λ — компроміс. Корисний сигнал $\Delta\varphi \propto \lambda$, а рефракція (відхилення променя градієнтом густини) зростає як λ^2; поблизу $n_{\text{кр}}$

ще й ламається лінійний зв'язок (2.12). Тому для густої плазми беруть коротші хвилі (субміліметрові й CO_2-лазери, 10,6 мкм). Але тоді вібрації дзеркал на δl дають паразитну фазу $\delta\varphi = 2\pi\,\delta l/\lambda$, і її компенсують другим інтерферометром на іншій довжині хвилі, який «бачить» переважно вібрації.

- У замагніченій плазмі формула (2.12) лишається точною для звичайної хвилі (O-моди, $\mathbf{E} \parallel \mathbf{B}$), бо її рух уздовж $\mathbf{B}$ не відчуває сили Лоренца (розд. 6.7).

Рефлектометр. Якщо підвищувати частоту зондувальної хвилі, шар відбиття $x_c(f)$, на якому $n_e(x_c) = n_{\text{кр}}(f)$, переміщується вглиб плазми (рис. 2.6 б). Вимірюють фазу відбитої хвилі $\varphi = 2(\omega/c)\int_0^{x_c} N\,dx - \pi/2$ (стрибок $-\pi/2$ дає точка повороту) або, що зручніше, групову затримку

$$\tau(f) = \frac{d\varphi}{d\omega} = \frac{2}{c}\int_0^{x_c} \frac{dx}{N(x)}.$$

Тут використано $d(\omega N)/d\omega = 1/N$ (доданок від залежності межі $x_c(\omega)$ зникає, бо $N(x_c) = 0$), тобто хвильовий пакет рухається з груповою швидкістю $v_g = cN$ і сповільнюється біля шару відбиття. Знаючи $\tau(f)$ на всьому діапазоні частот від нуля до F, положення шару відновлюють оберненням Абеля:

$$\boxed{x_c(F) = \frac{c}{\pi}\int_0^{F} \frac{\tau(f)\,df}{\sqrt{F^2 - f^2}}}.$$

Перевірка: для металевої стінки на відстані d маємо $\tau = 2d/c$ при всіх f, і формула дає $x_c = d$.

Це той самий принцип, за яким працює *іоносонда* (розд. 2.7): вертикальний імпульс у діапазоні 1–20 МГц, а результат — іонограма, залежність «віртуальної висоти» $h' = c\tau/2$ від частоти. Оскільки $N < 1$, віртуальна висота завжди більша за справжню висоту відбиття. У токамаках рефлектометри працюють у діапазоні десятків гігагерц і зондують край плазми.

Межі застосовності рефлектометра:

- профіль має бути монотонним: шар за максимумом густини недосяжний, і область за ним метод не бачить;
- обернення потребує $\tau(f)$ від найнижчих частот, тобто профілю на самому краї, який часто доводиться екстраполювати;
- флуктуації густини розсіюють хвилю біля шару відбиття. Для вимірювання профілю це завада, але її ж використовують, щоб вимірювати турбулентність;

- для незвичайної хвилі (X-моди, $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$) частота відсікання залежить ще й від B (розд. 6.7); це ускладнює обробку, зате дозволяє зондувати плазму з боку малої густини.

Отже, обидва методи ґрунтуються на одній формулі $\varepsilon = 1 - \omega_p^2/\omega^2$: інтерферометр працює далеко від відсікання і вимірює інтеграл густини, рефлектометр працює саме на відсіканні і вимірює положення шарів однакової густини.

Головне в розділі

- Плазмова частота ω_p — частота власних коливань електронів відносно іонів; вона задає часовий масштаб колективного відгуку.
- Діелектрична проникність холодної плазми $\varepsilon = 1 - \omega_p^2/\omega^2$; поперечні хвилі поширюються лише за $\omega > \omega_p$.
- При $\omega < \omega_p$ хвиля відбивається: так працюють іоносфера й далекий радіозв'язок.
- Поздовжні ленгмюрівські хвилі мають тепловий поправковий член у законі дисперсії; зіткнення призводять до поглинання хвиль.
- Інтерферометр ($\omega \gg \omega_p$) вимірює $\int n_e\, dl$ через набіг фази; рефлектометр використовує відсікання й за груповою затримкою відновлює профіль $n_e(x)$.

Задачі

2.1. Знайдіть плазмову частоту ω_{pe}, частоту $f = \omega_{pe}/2\pi$ та період коливань для $n_e = 10^{10}$ см$^{-3}$. До якого діапазону електромагнітних хвиль належить ця частота? *Відповідь:* $\omega_{pe} \approx 5{,}6\times10^9$ с$^{-1}$, $f \approx 0{,}9$ ГГц, період $\approx 1{,}1$ нс (мікрохвильовий діапазон).

2.2. Покажіть, що відношення іонного та електронного внесків у ω_p^2 для водневої плазми дорівнює m_e/m_i, і оцініть відносну поправку до плазмової частоти. *Відповідь:* $\omega_{pi}^2/\omega_{pe}^2 = m_e/m_i = 1/1836$, відносна поправка до частоти $\approx m_e/2m_i \approx 2{,}7\times10^{-4}$.

2.3. Для електронної плазми з температурою T_e оцініть поправку $3k^2v_{Te}^2$ до квадрата ленгмюрівської частоти. За яких умов ця поправка мала порівняно з ω_{pe}^2? *Відповідь:* $3k^2v_{Te}^2/\omega_{pe}^2 = 3k^2\lambda_{De}^2 \ll 1$, тобто $k\lambda_{De} \ll 1$.

2.4. Радіохвиля частоти 1 МГц падає на область плазми з концентрацією $n_e = 10^6$ см$^{-3}$. Чи проникне хвиля в плазму? Оцініть глибину проникнення. *Відповідь:* $f_p \approx 9$ МГц > 1 МГц: хвиля відби-

? вається; глибина проникнення $c/\omega_p \approx 5$ м.

? **2.5.** Максимальна концентрація шару F дорівнює 10^6 см$^{-3}$. Яку максимальну частоту хвилі може відбити іоносфера при кутах падіння 0° і 70°? Чому сигнал 100 МГц практично не відбивається? *Відповідь:* $f_{\max} = f_p \approx 9$ МГц при 0° і $f_p/\cos\theta \approx 26$ МГц при 70°; для 100 МГц потрібен $\cos\theta \approx 0{,}09$ ($\theta \approx 85°$), практично недосяжно.

? **2.6.** Чи може у вакуумі існувати хвиля $\mathbf{E} = \mathbf{e}_x E_0 e^{i(kx-\omega t)}$? Чому? А в плазмі? *Відповідь:* у вакуумі ні: $\nabla \cdot \mathbf{E} = ikE_0 \neq 0$ при $\rho = 0$, електромагнітні хвилі поперечні. У плазмі така поздовжня хвиля існує — це ленгмюрівське коливання з $\omega \approx \omega_p$.

? **2.7.** Радіохвилі з частотою нижче 400 МГц не проходять крізь шар плазми. Знайдіть його концентрацію. *Відповідь:* $n_e \approx 2 \times 10^9$ см$^{-3}$.

? **2.8.** Показник заломлення іоносфери для хвилі 10 МГц дорівнює $N = 0{,}90$. Знайдіть n_e, а також фазову й групову швидкості; перевірте, що $v_\varphi v_g = c^2$. *Відповідь:* $n_e \approx 2{,}4 \times 10^5$ см$^{-3}$, $v_\varphi = c/0{,}9$, $v_g = 0{,}9c$.

? **2.9.** Мікрохвильовий інтерферометр працює на довжині хвилі $\lambda = 2$ мм; хорда в плазмі $L = 1$ м, $n = 10^{13}$ см$^{-3}$. Використайте $\Delta\varphi = r_e \lambda \int n\,dl$ ($r_e = 2{,}8 \times 10^{-13}$ см) і знайдіть набіг фази в радіанах і в інтерференційних смугах. Перевірте, що $\omega \gg \omega_p$. *Відповідь:* $\Delta\varphi \approx 56$ рад, ≈ 9 смуг.

? **2.10.** Для токамака з $n_e = 10^{14}$ см$^{-3}$ і хордою $L = 1$ м порівняйте два інтерферометри: $\lambda = 1$ мм і $\lambda = 10{,}6$ мкм (CO_2-лазер). Для кожного знайдіть $n_{\text{кр}}$, набіг фази $\Delta\varphi$ і паразитну фазу від вібрації дзеркал з амплітудою $\delta l = 10$ мкм. Який із них потребує компенсації вібрацій? *Відповідь:* для 1 мм $n_{\text{кр}} \approx 1{,}1 \times 10^{15}$ см$^{-3}$, $\Delta\varphi \approx 280$ рад (≈ 45 смуг), $\delta\varphi \approx 0{,}06$ рад; для 10,6 мкм $\Delta\varphi \approx 3$ рад, $\delta\varphi \approx 6$ рад — вібрація більша за сигнал, потрібна компенсація (зате рефракція в 10^4 разів менша).

? **2.11.** Концентрація лінійно зростає від краю плазми: $n_e = n_0 x/a$. Покажіть, що групова затримка хвилі, яка відбивається від шару x_c, дорівнює $\tau = 4x_c/c$, тобто «віртуальна» глибина вдвічі більша за справжню. Який діапазон концентрацій охоплює рефлектометр із перестроюванням частоти 20–75 ГГц? *Відповідь:*

? $\tau = (2/c)\int_0^{x_c} dx/\sqrt{1 - x/x_c} = 4x_c/c$; $n_{\text{кр}} \approx 5 \times 10^{12}$–$7 \times 10^{13}$ см$^{-3}$.

? Контрольні питання

1. Чому плазма відбиває хвилі з $\omega < \omega_p$ повністю? Що відбувається при $\omega > \omega_p$?
2. Як пояснити далекий радіозв'язок на коротких хвилях? Чому ультракороткі хвилі проходять крізь іоносферу?
3. Чому при поширенні в плазмі з'являється поглинання? Що вирішує: $\omega \gg \nu$ чи $\omega \ll \nu$? Чому поглинання зростає поблизу ω_p?
4. Поясніть фізичну природу плазмових коливань. Чому частота не залежить від k у холодній плазмі?
5. Як з діелектричної проникності плазми одержати закон дисперсії? Чому $v_\varphi > c$ не порушує теорії відносності?
6. Чому метали блищать, а в вакуумному ультрафіолеті стають прозорими?
7. Що саме вимірює мікрохвильовий інтерферометр: n у точці чи $\int n\,dl$?
8. Чому інтерферометр працює далеко від відсікання, а рефлектометр — саме на ньому?

3 Рух зарядженої частинки в електромагнітних полях

Колективний опис не скасовує руху окремих частинок. Щоб зрозуміти магнітне утримання, спочатку треба побачити найпростішу механіку однієї зарядженої частинки. Вона дає природні просторовий і часовий масштаби r_L та ω_c^{-1}, після чого стають зрозумілими дрейфи, магнітне дзеркало і межі застосовності МГД.

3.1. Однорідне магнітне поле

У магнітному полі на частинку з зарядом q діє сила Лоренца $\mathbf{F} = (q/c)\,\mathbf{v}\times\mathbf{B}$. Вона перпендикулярна швидкості й роботи не виконує, тому v зберігається. Розкладемо швидкість $\mathbf{v} = \mathbf{v}_\parallel + \mathbf{v}_\perp$. Складова $v_\parallel$ вздовж поля не змінюється, а перпендикулярна складова обертається по колу з *циклотронною частотою* і *ларморівським радіусом*

$$\boxed{\omega_c = \frac{|q|B}{mc}, \qquad r_L = \frac{v_\perp}{\omega_c} = \frac{mc\,v_\perp}{|q|B}} \,. \tag{3.1}$$

Траєкторія — гвинтова лінія (рис. 3.1). Іони й електрони обертаються в протилежні боки: якщо дивитися з кінця вектора $\mathbf{B}$, позитивні частинки обертаються за годинниковою стрілкою, негативні — проти. Частота обертання не залежить від енергії частинки. Для практичних оцінок

$$\omega_{ce} \approx 1{,}76\times10^{7}\,B[\text{Гс}]\ \text{с}^{-1}, \qquad \omega_{ci} \approx 9{,}58\times10^{3}\,\frac{Z}{A}\,B[\text{Гс}]\ \text{с}^{-1},$$

а ларморівські радіуси при $v_\perp = \sqrt{T/m}$: $r_{Le} \approx 2{,}4\sqrt{T_e[\text{еВ}]}/B[\text{Гс}]$ см, $r_{Li} \approx 10^{2}\sqrt{A\,T_i[\text{еВ}]}/(Z\,B[\text{Гс}])$ см. Через малу масу електрони мають радіус у $\sqrt{m_i/m_e}\sim 40$ разів менший за іонний при однакових температурах.

Числа. Для токамака ($T = 10$ кеВ, $B = 5\times10^{4}$ Гс): $r_{Le}\approx 5\times10^{-3}$ см, $r_{Li}\approx 0{,}2$ см (протон), 0,3 см (дейтрон). Для іоносфери ($T\approx 0{,}1$ еВ,




Рис. 3.1. Гвинтовий рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі: уздовж поля — рівномірний, поперек — обертання з частотою ω_c

$B \approx 0{,}3$ Гс): $r_{Le} \approx 2$–3 см, $r_{Li} \approx 1$ м для протона і ≈ 4 м для O^+ (основний іон F-шару). Тут $r_L = v_T/\omega_c$, $v_T = \sqrt{T/m}$.

Плазму називають *замагніченою*, якщо частинка встигає зробити багато обертів між зіткненнями, $\omega_c \gg \nu$ (частоту зіткнень ν детально розглянуто в розд. 4), і радіус орбіти малий порівняно з розміром неоднорідності поля, $r_L \ll L$. Довжину вільного пробігу означимо як $\lambda_{\text{пр}} = v_T/\nu$. Тоді частинка «прив'язана» до силової лінії, і рух поперек поля пригнічений. Оцінимо перенесення. Вздовж поля частинка блукає з кроком $\lambda_{\text{пр}}$ і $D_\parallel \sim v^2/\nu$; поперек крок дорівнює r_L, а частота кроків — ν, тому $D_\perp \sim r_L^2 \nu$. Звідси

$$\frac{D_\perp}{D_\parallel} \sim \left(\frac{\nu}{\omega_c}\right)^2 \ll 1, \qquad D_\perp \propto \frac{1}{B^2}.$$

Це *класична дифузія* поперек поля. Вона лежить в основі магнітного утримання: сильне поле різко зменшує поперечні втрати.

3.2. Дрейфи в схрещених полях

Дрейфове наближення. Усю тему можна звести до трьох тверджень. (1) Поля зовнішні й сильні, частинки рухаються незалежно. (2) Якщо $r_L \ll L$ і $\omega \ll \omega_c$, рух розпадається на швидке обертання навколо ведучого центру й повільний дрейф самого центру. (3) *Загальне правило*: будь-яка стала сила $\mathbf{F} \perp \mathbf{B}$ викликає дрейф $\mathbf{v}_d = c\,\mathbf{F} \times \mathbf{B}/(qB^2)$. Якщо $\mathbf{F}$ не залежить від заряду (гравітація, відцентрова сила, $-\mu\nabla B$), дрейф має різний знак для електронів та іонів: виникають струм і розділення зарядів. Якщо $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$, дрейф однаковий для всіх, і плазма рухається як ціле. Це знімає більшу частину труднощів розділу.

Нехай, окрім $\mathbf{B}$, є однорідне електричне поле $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$. Шукатимемо рух у вигляді гвинтового руху на фоні дрейфу $\mathbf{v}_d$ із сталою швидкістю. Для швидкості $\mathbf{v}_d$ сила має зникати: $\mathbf{E} + \mathbf{v}_d \times \mathbf{B}/c = 0$. Помножимо векторно на $\mathbf{B}$ і скористаємося $(\mathbf{v}_d \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} = -B^2 \mathbf{v}_{d\perp}$:

$$\boxed{\mathbf{v}_E = c\,\frac{\mathbf{E}\times\mathbf{B}}{B^2}}. \tag{3.2}$$

Швидкість дрейфу *не залежить від заряду, маси та енергії частинки*, тому електрони й іони дрейфують в один бік, струму й розділення зарядів нема. Фізичний зміст: у системі відліку, що рухається зі швидкістю $\mathbf{v}_E$, електричного поля немає (нерелятивістське наближення), і частинка просто гвинтом обертається навколо силової лінії.

Чому саме перпендикулярно $\mathbf{E}$. На одному півоберті частинка рухається вздовж $\mathbf{E}$ й прискорюється — радіус орбіти зростає; на іншому — проти $\mathbf{E}$ і гальмується, радіус зменшується. Різниця радіусів зсуває центр орбіти вбік, перпендикулярно $\mathbf{E}$ (траєкторія — трохоїда, а для частинки, що стартує зі спокою, — циклоїда, рис. 3.2). Іон і електрон обертаються в протилежні боки, але й прискорюються полем $\mathbf{E}$ у протилежні боки, тому зсув однаковий: $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ «зносить плазму цілком», без струму.




Рис. 3.2. Дрейф зарядженої частинки у схрещених електричному та магнітному полях

Узагальнення: на частинку діє довільна стала сила $\mathbf{F} \perp \mathbf{B}$ (гравітація, відцентрова сила, сила від градієнта тиску). Вона викликає дрейф

$$\mathbf{v}_F = \frac{c}{q}\,\frac{\mathbf{F}\times\mathbf{B}}{B^2}, \tag{3.3}$$

який уже *залежить від знака заряду*, і призводить до струмів та розділення зарядів. Для $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ маємо (3.2).

У неоднорідному полі діють ефективні сили. Усереднена за обертом сила, що виштовхує частинку в область слабшого поля, дорівнює $-\mu\nabla B$ (див. нижче; μ — магнітний момент орбіти), а при русі вздовж викривленої силової лінії з радіусом кривизни R_c діє відцентрова сила $mv_\parallel^2\mathbf{R}_c/R_c^2$ (вектор $\mathbf{R}_c$ напрямлений від центра кривизни до частинки). За (3.3) вони породжують *градієнтний* та *відцентровий* дрейфи

$$\mathbf{v}_{\nabla B} = \frac{c\mu}{qB^2}\,\mathbf{B}\times\nabla B, \qquad \mathbf{v}_R = \frac{mcv_\parallel^2}{qB^2}\,\frac{\mathbf{R}_c\times\mathbf{B}}{R_c^2}. \tag{3.4}$$

За порядком величини $v_d \sim cT/(|q|BL) = v_T\,r_L/L \ll v_T$. Умова $r_L \ll L$ є умовою застосовності дрейфового наближення, а знак швидкості залежить від знака заряду.

Градієнтний дрейф: чому він виникає. У ділянці сильнішого поля радіус орбіти менший (рис. 3.3). Орбіта складається з двох «півкіл»: у слабшому полі — більшого радіуса r_1, у сильнішому — меншого r_2. Тому вона не замикається: за оберт центр зсувається на $\approx 2(r_1 - r_2)$ у напрямку, перпендикулярному і до ∇B, і до $\mathbf{B}$. Іони й електрони обертаються в протилежні боки, тому зсуваються *в протилежних напрямках*, і виникає струм $\mathbf{j}_{\nabla B} = n\,(q_i\mathbf{v}_{\nabla B,i} + q_e\mathbf{v}_{\nabla B,e}) \neq 0$.




Рис. 3.3. Градієнтний дрейф: радіус орбіти більший там, де поле слабше. Іон (синя траєкторія) і електрон (червона) зсуваються в протилежні боки поперек ∇B

Дрейф кривизни. Частинка, що рухається вздовж викривленої силової лінії, відчуває відцентрову силу $\mathbf{F}_c$ (рис. 3.4), і згідно з (3.3) дрейфує поперек площини кривизни. Знак швидкості залежить від знака заряду.

Сумарний дрейф у вакуумному полі. У вакуумі ($\nabla\times\mathbf{B} = 0$) модуль поля змінюється на масштабі кривизни. Справді, для поля з круговими силовими лініями у циліндричних координатах (R, θ, z) маємо




Рис. 3.4. Дрейф кривизни: відцентрова сила $\mathbf{F}_c$ спрямована від центра кривизни, дрейф перпендикулярний і до $\mathbf{B}$, і до $\mathbf{F}_c$; іони й електрони дрейфують у протилежні боки

$(\nabla\times\mathbf{B})_z = \frac{1}{R}\partial_R(RB_\theta) = 0$, тобто $B_\theta = C/R$, і $\nabla B = -\frac{C}{R^2}\hat{\mathbf{R}} = -B\frac{\hat{\mathbf{R}}}{R} = -B\frac{\mathbf{R}_c}{R_c^2}$ (тут $R_c = R$, а $\mathbf{R}_c$ напрямлений від центра кривизни до частинки). Тоді $\mathbf{B}\times\nabla B = B(\mathbf{R}_c\times\mathbf{B})/R_c^2$, і $\mathbf{v}_{\nabla B} = \frac{mcv_\perp^2}{2qB^2}\frac{\mathbf{R}_c\times\mathbf{B}}{R_c^2}$ має той самий напрям, що й $\mathbf{v}_R$ з (3.4). Обидва дрейфи додаються:

$$\mathbf{v}_d = \frac{mc}{qB^2}\left(v_\parallel^2 + \frac{v_\perp^2}{2}\right)\frac{\mathbf{R}_c\times\mathbf{B}}{R_c^2}. \tag{3.5}$$

Саме цей вираз визначає дрейф у тороїдальному полі (розд. 9) і в диполі Землі.

Гравітаційний дрейф. Для сили тяжіння $\mathbf{F} = m\mathbf{g}$ з (3.3) одержуємо $\mathbf{v}_g = (mc/qB^2)\,\mathbf{g}\times\mathbf{B}$. Він залежить від знака заряду й маси, а за величиною $v_g = g/\omega_c$, тому в лабораторній плазмі мізерний. В екваторіальній іоносфері (іони O^+, $B\approx 0{,}3$ Гс, $\omega_{ci}\approx 2\times10^2$ с$^{-1}$) $v_g\approx 5$ см/с — цього досить, щоб розвинулась гравітаційна (релей-тейлорівська) нестійкість (розд. 8). У викривленому полі роль $\mathbf{g}$ відіграє відцентрове прискорення $v_\parallel^2/R_c$.

Приклад. Для протона з $T = 10$ кеВ у тороїдальному полі $B = 5\times10^4$ Гс на великому радіусі $R = 6\times10^2$ см середнє значення $v_\parallel^2 + v_\perp^2/2 = 2T/m$, і за (3.5)

$$v_d \approx \frac{2cT}{eBR} \approx 7\times10^4 \text{ см/с}.$$

Це лише 10^{-3} від теплової швидкості ($v_T\sim10^8$ см/с), але в тороїді з малим радіусом $a\sim2\times10^2$ см частинка досягла б стінки менш ніж за 10^{-2} с, якщо б нічого не заважало дрейфу (розд. 9).

Це головна причина, чому чисто тороїдальне поле не утримує плазму. Дрейфи ∇B і кривизни розводять іони вгору, електрони вниз

(рис. 3.5); виникає вертикальне електричне поле $\mathbf{E}$, і дрейф $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ виносить усю плазму *назовні* (у бік більшого R) за час $\sim a/v_E$. Звідси мотивація обертального перетворення: полоїдальне поле (токамак, стеларатор) закорочує розділення зарядів, бо силова лінія переходить від верху до низу (розд. 9).




Рис. 3.5. Дрейф у чисто тороїдальному полі (тор розрізано площиною, що проходить через його вісь). Ларморівські гвинти рухаються вздовж $\mathbf{B}$, а ∇B-дрейф і дрейф кривизни зміщують іон вгору, електрон — вниз. На перерізах: розділення зарядів створює поле $\mathbf{E}$, і дрейф $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ виносить плазму назовні

3.3. Поляризаційний дрейф

Дрейф у сталому електричному полі є особливим: електрони та іони рухаються в одному напрямку. Якщо ж електричне поле змінюється з часом, інерція частинки створює додатковий дрейф. Виведемо його ітерацією. У нульовому наближенні $\mathbf{v}=\mathbf{v}_E=c\,\mathbf{E}\times\mathbf{B}/B^2$, але $\mathbf{v}_E$ тепер залежить від часу, і прискорення $d\mathbf{v}_E/dt$ вимагає сили. У системі, що рухається з $\mathbf{v}_E$, на частинку діє сила інерції $\mathbf{F}=-m\,d\mathbf{v}_E/dt$; підставляючи її в загальне правило (3.3), отримуємо додатковий дрейф $\mathbf{v}_{\text{pol}}=\dfrac{c}{q}\dfrac{\mathbf{F}\times\mathbf{B}}{B^2}=-\dfrac{mc}{qB^2}\dfrac{d\mathbf{v}_E}{dt}\times\mathbf{B}$. Оскільки $d\mathbf{v}_E/dt=c\,(\partial_t\mathbf{E}\times\mathbf{B})/B^2$ і $(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\times\mathbf{B}=-B^2\mathbf{A}_\perp$, маємо $\mathbf{v}_{\text{pol}}=\dfrac{mc^2}{qB^2}\,\partial_t\mathbf{E}_\perp$. Для повільно змінного поля $|\partial_t\mathbf{E}|\ll\omega_c E$ (щоб ітерація збігалась) остаточно

$$\boxed{\mathbf{v}_{\text{pol}}=\frac{mc^2}{qB^2}\frac{\partial\mathbf{E}_\perp}{\partial t}=\frac{q}{|q|}\frac{c}{\omega_c B}\frac{\partial\mathbf{E}_\perp}{\partial t}.}\qquad(3.6)$$

На відміну від $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$-дрейфу, цей дрейф залежить від знака заряду і маси: іони й електрони дрейфують у протилежні боки, тому вини-

кає *поляризаційний струм* $\mathbf{j}_{\text{pol}} = \dfrac{\rho_m c^2}{B^2}\dfrac{\partial \mathbf{E}_\perp}{\partial t}$ (в ньому домінують іони, бо $\rho_m \approx n m_i$). Фізично: іон «запізнюється» за полем, поки набирає швидкість v_E. Поперек $\mathbf{B}$ плазма поводиться як *діелектрик* з проникністю $\varepsilon_\perp = 1 + 4\pi\rho_m c^2/B^2 \gg 1$; звідси швидкість альфвенівських хвиль $v_A = c/\sqrt{\varepsilon_\perp} \approx B/\sqrt{4\pi\rho_m}$ (розд. 6). Отже, поляризаційний дрейф важливий, коли електричне поле змінюється повільно порівняно з гірообертанням ($\omega \ll \omega_c$), але не є строго сталим.




Рис. 3.6. Поляризаційний зсув: іон, що стартує зі спокою в момент вмикання поля $\mathbf{E}$, спершу зміщується вздовж $\mathbf{E}$ на Δx_{pol}, а далі дрейфує зі швидкістю $\mathbf{v}_E$

3.4. Магнітний момент і адіабатичний інваріант

Обертання частинки по колу — це кільцевий струм $I = |q|\omega_c/2\pi$ з площею контуру πr_L^2, тобто магнітний момент (у СГС $\mu = IS/c$)

$$\mu = \frac{|q|\omega_c}{2\pi c}\,\pi r_L^2 = \frac{m v_\perp^2}{2B}. \tag{3.7}$$

Момент орбіти напрямлений *проти* поля для частинок обох знаків (вони обертаються в протилежні боки, але заряди теж протилежні; рис. 3.7). Це джерело діамагнетизму плазми (розд. 9).




Рис. 3.7. Ларморівське обертання іона й електрона в полі **B**: кутові швидкості $\boldsymbol{\Omega} = -q\mathbf{B}/(mc)$ протилежні, а магнітні моменти $\boldsymbol{\mu}$ обох частинок напрямлені проти **B**

Теоретичні відомості Нагадаємо з теоретичної механіки

Для періодичного руху з повільно змінним параметром $\lambda(t)$ (час зміни $\gg$ період руху) величина $J = \oint p\,dq$ (дія) *адіабатично інваріантна*. Приклад: маятник, нитку якого повільно вкорочують; $J \propto E/\omega = \text{const}$, тож енергія росте разом з частотою. Для ларморівського руху $\oint(m\mathbf{v}+q\mathbf{A}/c)\cdot d\mathbf{l}$ дає $2\pi m v_\perp r_L - \pi r_L^2|q|B/c = \pi m v_\perp r_L = (2\pi mc/|q|)\,\mu$, тому $\mu = \text{const}$. Так само $J_\parallel = \oint p_\parallel\,ds$ зберігається для руху між точками відбиття, а магнітний потік Φ через оболонку дрейфу — для азимутального дрейфу: три інваріанти однієї ідеї.

Якщо поле змінюється повільно (за час обороту $2\pi/\omega_c$ воно змінюється мало; в просторі це означає $r_L \ll L$), величина μ *зберігається*. Це легко побачити, помітивши, що потік поля крізь орбіту $\Phi = \pi r_L^2 B = \pi m^2 c^2 v_\perp^2/(q^2 B) \propto \mu$. При збільшенні B виникає вихрове електричне поле, яке прискорює частинку так, щоб потік крізь орбіту залишився сталим (як у надпровідному кільці; рис. 3.8б). Інакше кажучи, μ — *адіабатичний інваріант* (строге обґрунтування — збереження дії $\oint p\,dq$, див. вставку вище): його відносна зміна за час повільної зміни поля мала за параметром $\varepsilon \sim r_L/L \sim \omega_c^{-1}/\tau_B$ (де τ_B — час зміни поля), а для аналітичних (гладких) полів вона навіть *експоненціально* мала, $\Delta\mu/\mu \sim e^{-\text{const}/\varepsilon}$ (Крускал). Інваріантність порушується, коли $r_L \sim L$ (наприклад, у нейтральному шарі поля чи біля нульової точки), а також за поля, що змінюється з частотою, близькою до ω_c (циклотронний резонанс).

Статичне магнітне поле не виконує роботи, тому повна кінетична енергія зберігається. З урахуванням $\mu = \text{const}$

$$\frac{mv_\parallel^2}{2} + \mu B = \text{const} \quad \Rightarrow \quad m\frac{dv_\parallel}{dt} = -\mu\frac{\partial B}{\partial s}, \tag{3.8}$$

де s — координата вздовж силової лінії. У області зростання B поздовжня швидкість зменшується: енергія переходить від поздовжнього руху до поперечного. Результат — сила $-\mu\nabla B$, яка штовхає частинку в бік слабшого поля (рис. 3.8).




Рис. 3.8. Ларморівське кільце в збіжному магнітному полі: (а) сила $\mathbf{F} = -\mu\nabla B$ напрямлена в бік слабшого поля, проти $\mathbf{v}_\parallel$; (б) потік крізь орбіту зберігається, тому в сильнішому полі кільце менше ($r_L^2 B = \text{const}$)

Вивід сили $-\mu\nabla B$. *Градієнт поперек поля.* Нехай $\mathbf{B} = B(x)\hat{\mathbf{z}}$, $B(x) \approx B_0 + x\,\partial_x B$. Сила Лоренца вздовж x: $F_x = (q/c)\,v_y B(x)$. Для положення відносно ведучого центру $x = x_{gc} + r_L\cos\varphi$ (для $q > 0$ швидкість $v_x = v_\perp \sin\varphi$, $v_y = -v_\perp\cos\varphi$) після усереднення по оберту $\langle v_y\rangle = 0$, $\langle\cos^2\varphi\rangle = \frac{1}{2}$, тому

$$\langle F_x\rangle = \frac{q}{c}\,\partial_x B\,\langle v_y\, r_L\cos\varphi\rangle = -\frac{q\,v_\perp r_L}{2c}\,\partial_x B = -\frac{m v_\perp^2}{2B}\,\partial_x B = -\mu\,\partial_x B$$

(підставлено $r_L = mcv_\perp/qB$; для $q < 0$ одночасно змінюються знак q й напрям обертання, результат той самий).

Градієнт уздовж поля. Вісесиметричне поле з $\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$: $\frac{1}{r}\partial_r(rB_r) = -\partial_z B_z \Rightarrow B_r \approx -\frac{r}{2}\,\partial_z B_z$. Поздовжню силу дає азимутальна швидкість $v_\theta = \mp v_\perp$ (для $q \gtrless 0$) на радіусі $r = r_L$: $F_z = -(q/c)\,v_\theta B_r = -\frac{|q|v_\perp r_L}{2c}\,\partial_z B_z = -\mu\,\partial_z B_z$. Разом $\mathbf{F} = -\mu\nabla B$ (збігається з (3.8)).

Діамагнетизм. Ларморівське кільце — це струм, магнітний момент якого напрямлений проти $\mathbf{B}$. Сума моментів кілець дає намагніченість плазми

$$\mathbf{M} = -n\langle\mu\rangle\frac{\mathbf{B}}{B} = -\frac{p_\perp}{B^2}\,\mathbf{B}, \qquad p_\perp = \frac{nm\langle v_\perp^2\rangle}{2},$$

тобто $\chi < 0$: плазма виштовхується з області сильного поля (ідея магнітного утримання Тамма — Сахарова). Застереження: для *однорідної* рівноважної плазми в обмеженому об'ємі макроскопічний струм намагнічення компенсується струмом частинок, що відбиваються від стінки (теорема Бора — ван Левен). Спостережуваний діамагнетизм зумовлений *градієнтом* тиску: струм $\mathbf{j}_M = c\nabla \times \mathbf{M}$ не зникає там, де $p_\perp$ змінюється (розд. 5.8).

3.5. Магнітне дзеркало і конус втрат

Розглянемо магнітне поле, слабше в центрі ($B_{\min}$) та сильніше на кінцях ($B_{\max}$) (рис. 3.10). Нехай у центрі швидкість частинки v утворює з напрямком поля кут θ (*пітч-кут*), $v_\perp = v\sin\theta$. Зі збереження μ та енергії

$$\frac{v_\perp^2}{B} = \text{const}, \qquad v_\parallel^2 + v_\perp^2 = v^2 = \text{const}.$$

Поперечна швидкість росте за законом $v_\perp^2 = v^2 \sin^2\theta\, B/B_{\min}$. Частинка відіб'ється (де $v_\parallel = 0$), якщо $v_\perp^2$ досягне v^2 раніше, ніж частинка досягне області $B_{\max}$, тобто за умови

$$\boxed{\sin^2\theta \geq \frac{B_{\min}}{B_{\max}}}. \tag{3.9}$$

Частинки з малим пітч-кутом ($\sin\theta < \sqrt{B_{\min}/B_{\max}}$) не відбиваються й вилітають з пастки. Область цих кутів у просторі швидкостей називається *конусом втрат*. Для ізотропного розподілу швидкостей частка частинок, що потрапляють в обидва конуси втрат, дорівнює

$$1 - \sqrt{1 - \frac{B_{\min}}{B_{\max}}} \approx \frac{B_{\min}}{2B_{\max}} \quad (B_{\max} \gg B_{\min}),$$

і вона зменшується з ростом пробкового відношення $B_{\max}/B_{\min}$.

Після виходу частинок із конуса в розподілі лишається «порожній» конус: анізотропія стає джерелом кінетичних нестійкостей (розд. 8).

Принципове зауваження: однорідне магнітне поле не «тримає» частинку вздовж силової лінії. Утримання в дзеркалі виникає завдяки неоднорідності поля й збереженню μ. Зіткнення, які розсіюють частинки в конус втрат, і нестійкості призводять до того, що відкриті пастки «протікають» (розд. 9). Природним магнітним дзеркалом є поле Землі (розд. 3.7).




Рис. 3.9. Конус втрат у просторі швидкостей $(v_\parallel, v_\perp)$: частинки в червоних секторах $(\theta < \theta_c)$ залишають пастку




Рис. 3.10. Принцип магнітного дзеркала: у міру зростання B поперечна енергія збільшується за рахунок поздовжньої, і за умови (3.9) частинка відбивається

3.6. Подовжній інваріант

Якщо частинка захоплена між двома точками відбиття s_1 і s_2, вона здійснює періодичні коливання вздовж силової лінії з *частотою відбиття* $\omega_b \sim v_\parallel/L$. Для такого руху існує ще один адіабатичний інваріант — *подовжній*

$$J = \oint m v_\parallel \, ds = 2m \int_{s_1}^{s_2} v_\parallel \, ds = \text{const}, \tag{3.10}$$

який зберігається, якщо поле змінюється за час, значно більший за період відбиття $\tau_b = 2\pi/\omega_b$. Якщо μ пов'язаний з гірацією, то J — з поздовжніми коливаннями. У статичному осесиметричному полі J визначає, які силові лінії (*дрейфова оболонка*) частинка «відвідує» під

час дрейфу: частинка завжди повертається на ту саму оболонку. Інакше кажучи, дрейф навколо осі відбувається по замкненій поверхні сталого J.

Фермі-прискорення. Якщо дзеркала зближуються, довжина L зменшується, і з $J = \oint v_\parallel\, ds \approx 2v_\parallel L = \text{const}$ маємо $v_\parallel \propto 1/L$: частинка прискорюється, поки не потрапить у конус втрат. Це один із механізмів прискорення космічних променів (задача 3.5).

Коли поле змінюється з часом, кожен інваріант зберігається, лише поки частота змін ω мала порівняно з частотою «свого» періодичного руху. Тому першим (уже за $\omega \sim \omega_d$, наприклад під час магнітних бур) порушується третій інваріант — магнітний потік Φ через оболонку дрейфу; за $\omega \gtrsim \omega_b$ порушується J; і лише за $\omega \gtrsim \omega_c$ — найстійкіший інваріант μ.

3.7. Диполь Землі та радіаційні пояси

Поле Землі в першому наближенні — диполь:

$$B = B_0 \left(\frac{R_E}{r}\right)^3 \sqrt{1 + 3\sin^2\lambda},$$

де λ — магнітна широта, $B_0 \approx 0{,}31$ Гс — поле на екваторі біля поверхні. Силова лінія задається рівнянням $r = L R_E \cos^2\lambda$, де параметр L (*оболонка Мак-Ілвайна*) дорівнює відстані до екватора в радіусах Землі. Поле на екваторі силової лінії $B_{\text{eq}} = B_0/L^3$. На силовій лінії воно зростає до полюсів, тому в диполі працює пастка-дзеркало (рис. 3.11).

Рух захоплених частинок складається з трьох рухів з різними часовими масштабами, з якими пов'язано три адіабатичні інваріанти: Ієрархія $\omega_c \gg \omega_b \gg \omega_d$ дозволяє розглядати кожний рух окремо, а отже, визначає глибину адіабатичного наближення. Азимутальний дрейф обумовлений сумою градієнтного й відцентрового дрейфів (3.5); для

Таблиця 3.1. Три рухи захоплених у диполі частинок і відповідні адіабатичні інваріанти.

Рух	**Частота**	**Інваріант**	**Масштаб ($E \sim 1$ МеВ, $L = 4$)**
Гірація	ω_c	μ	$\sim 10^{-4}$ с
Відбиття між полюсами	ω_b	J	$\sim 0{,}3$ с
Азимутальний дрейф	ω_d	потік Φ	$\sim 10^{3}$ с




Рис. 3.11. Захоплена частинка в магнітному диполі: гвинтовий рух навколо силової лінії, відбиття між дзеркальними точками й азимутальний дрейф навколо Землі. Ларморівський радіус і крок гвинта зменшуються до точок відбиття; помаранчевий еліпс — дрейфова оболонка в екваторіальній площині (штрихова частина — за Землею)

електрона з поперечною енергією $W_\perp$ на екваторі $v_d \simeq 3cW_\perp/(eB_{\rm eq}r)$ (в диполі $\nabla B/B = 3/r$); електрони дрейфують на схід, а іони — на захід, що створює кільцевий струм навколо Землі. Ця формула справедлива для частинок із пітч-кутом 90° (відбиваються на екваторі); для інших є множник порядку одиниці (усереднення по баунсу). *Приклад.* Електрон 30 кеВ на $L = 5$ ($B_{\rm eq} \approx 2{,}5\times10^{-3}$ Гс, $r \approx 3\times10^9$ см): $v_d \approx 1\times10^6$ см/с, період обходу Землі $2\pi r/v_d \sim 2\times10^4$ с (кілька годин). Для протона з енергією 1 еВ $v_d \sim 40$ см/с — дрейфу фактично нема.

Пастка не ідеальна. Частинка, що відбивається в точці з широтою λ_m, має на екваторі пітч-кут, що задовольняє

$$\sin^2\alpha_{\rm eq} = \frac{\cos^6\lambda_m}{\sqrt{1+3\sin^2\lambda_m}}.$$

Якщо точка відбиття лежить нижче ~ 100 км над поверхнею, частинка втрачається в щільній атмосфері. Силова лінія $r = LR_E\cos^2\lambda$ перетинає поверхню при $\cos^2\lambda = 1/L$; точка відбиття лежить під поверхнею, якщо $L\cos^2\lambda_m \le 1$, тобто $\cos^2\lambda_m \le 1/L$ (широта точки відбиття вища за широту виходу лінії з атмосфери). Звідси кут конуса втрат

$$\sin^2\alpha_c = \frac{L^{-3}}{\sqrt{4-3/L}}, \qquad \alpha_c \approx 5^\circ\ (L=4).$$

Існування двох поясів (внутрішнього, протонного, і зовнішнього,

електронного), відкритих Дж. Ван Алленом у 1958 р., пов'язано з балансом між захопленням (інжекція під час магнітних бур) і втратами (зіткнення з атмосферою, розсіювання хвилями).

3.8. Як це вимірюють: аналізатор енергій і ЕЦЕ

Гвинтовий рух у магнітному полі дає два прості способи виміряти розподіл частинок.

Аналізатор із гальмівним потенціалом. Сітка під потенціалом φ пропускає лише іони, для яких $\frac{1}{2}Mv_\parallel^2 > Ze\varphi$; колектор за сіткою вимірює струм $I(\varphi) \propto \int_{v_{\min}}^{\infty} v_\parallel f_\parallel \, dv_\parallel$. Для максвеллівського розподілу $I \propto \exp(-Ze\varphi/T_i)$, тож T_i дорівнює оберненому нахилу $\ln I(\varphi)$, а похідна $dI/d\varphi$ відтворює саму $f(v_\parallel)$. Аналізатор вимірює лише швидкості вздовж осі, тому його ставлять уздовж $\mathbf{B}$, щоб відсікти ларморівське обертання.

Електронно-циклотронне випромінювання (ЕЦЕ). Електрон обертається з частотою

$$\boxed{\omega_{ce} = \frac{eB}{m_e c} \approx 1{,}76 \times 10^7 \, B[\text{Гс}] \ \text{с}^{-1}} \tag{3.11}$$

і випромінює на гармоніках $n\omega_{ce}$. У токамаку $B \propto 1/R$, тож кожна частота виходить з певного радіуса: $R = R_0 \, \omega_{ce}(R_0)/\omega$ (для $n = 1$). Якщо плазма оптично товста на другій гармоніці, інтенсивність дорівнює рівноважній (релеївсько-джинсівській) $I_\omega = \omega^2 T_e/(8\pi^3 c^2)$ (для однієї поляризації), тобто вимір I_ω дає $T_e(R)$ без зовнішнього джерела. *Оцінка.* При $B = 5$ Тл $= 5 \times 10^4$ Гс: $\omega_{ce} \approx 8{,}8 \times 10^{11}$ с$^{-1}$, $f_{ce} \approx 140$ ГГц, друга гармоніка — 280 ГГц (мм-діапазон). Межі застосовності: потрібна оптична товщина (високі $n_e T_e$) і відсутність відсічки, $\omega_{pe} < \omega_{ce}$ (пор. розд. 2.8); релятивістський зсув частоти змішує сигнали сусідніх радіусів.

Головне в розділі

- Заряджена частинка в однорідному полі гвинтово рухається: ларморівський радіус r_L і циклотронна частота ω_c залежать від знака заряду лише напрямком обертання.
- Дрейф у схрещених $\mathbf{E}$ і $\mathbf{B}$ не залежить від заряду та маси, а градієнтний дрейф і дрейф кривизни залежать від них і розділяють заряди.
- Магнітний момент μ — адіабатичний інваріант: у повільно змінному полі $v_\perp^2/B = \text{const}$.
- Магнітне дзеркало відбиває частинки з великим пітч-кутом; решта потрапляє в конус втрат, тож відкрита пастка «протікає».

- У диполі Землі діють три інваріанти (μ, J, Φ) з ієрархією частот $\omega_c \gg \omega_b \gg \omega_d$.
- Гальмівний аналізатор дає T_i з нахилу $\ln I(\varphi)$, а ЕЦЕ на частотах $n\omega_{ce}(R)$ ставить у відповідність частоту й радіус і дає $T_e(R)$ (розд. 3.8).

Задачі

3.1. Електрон з енергією 100 еВ рухається перпендикулярно полю $B = 10^4$ Гс. Знайдіть ларморівський радіус і порівняйте його з λ_{De} для $n_e = 10^{12}$ см$^{-3}$, $T_e = 100$ еВ. *Відповідь:* $r_{Le} \approx 3{,}4 \times 10^{-3}$ см $< \lambda_{De} \approx 7{,}4 \times 10^{-3}$ см.

3.2. У схрещених полях $E = 1$ В/см і $B = 10^3$ Гс (в СГС 1 В/см = 1/300 СГС) знайдіть швидкість дрейфу. Чи залежить вона від того, чи рухається електрон, чи протон? *Відповідь:* $v_E = cE/B = 10^5$ см/с (1 км/с), однакова для електрона й протона.

3.3. Електрон з енергією 1 МеВ перебуває на силовій лінії $L = 4$ земного диполя ($B_{\rm eq} \approx 5 \times 10^{-3}$ Гс на екваторі), пітч-кут на екваторі $\alpha_{\rm eq} = 30°$. Оцініть: ларморівський радіус, період обертання навколо силової лінії, час відбиття між дзеркальними точками і період дрейфу навколо Землі. Перевірте ієрархію $\omega_c \gg \omega_b \gg \omega_d$. *Відповідь:* електрон релятивістський ($\gamma \approx 3$, $v \approx 0{,}94c$); $r_L \approx 5$ км, $2\pi/\omega_c \approx 2 \times 10^{-4}$ с, $\tau_b \approx 0{,}4$ с, $\tau_d \approx 15$ хв.

3.4. Плазма з тисками $p_\perp$, $p_\parallel$ перебуває в слабко неоднорідному полі, $\beta \ll 1$ (так що поле близьке до вакуумного). (а) Знайдіть густину струму ∇B- і кривизного дрейфів. (б) Додайте струм намагнічення: густина магнітного моменту $\mathbf{M} = -p_\perp \mathbf{B}/B^2$, $\mathbf{j}_M = c\,\nabla \times \mathbf{M}$. (в) Покажіть, що для ізотропного тиску $p_\perp = p_\parallel = p$ повний поперечний струм дорівнює $\mathbf{j}_\perp = c\,\mathbf{B} \times \nabla p / B^2$ (діамагнітний). *Вказівка:* струм дрейфів сам по собі діамагнітного не дає.

3.5. Протон з енергією 1 кеВ і пітч-кутом 45° (у центрі пастки) захоплено між двома магнітними дзеркалами з пробковим відношенням $R_m = 5$, що наближаються одне до одного зі швидкістю 10 км/с кожне (початкова відстань $L = 10^{10}$ км). Використайте інваріантність $J = \oint v_\parallel\, ds$ і пружне відбиття від рухомої стінки: за який час частинка потрапить у конус втрат і якою буде її енергія? *Відповідь:* $v_\perp$ стала, а вихід настає за $v_\parallel / v_\perp = \cot\theta_c = 2$, тобто коли L зменшиться вдвічі: $t \approx 2{,}5 \times 10^8$ с (≈ 8 років), $\mathcal{E} \approx 2{,}5$ кеВ.

3.6. У магнітній пастці $B_{\min} = 2\times10^4$ Гс, $B_{\max} = 8\times10^4$ Гс. Знайдіть критичний пітч-кут конуса втрат і частку частинок ізотропного розподілу, що потрапляють у конуси втрат. *Відповідь:* $\sin\theta_c = \sqrt{B_{\min}/B_{\max}} = 1/2$, $\theta_c = 30°$; частка $1 - \cos\theta_c \approx 13\,\%$.

3.7. Для іонного двигуна потрібен дрейф $v_E = 1000$ км/с у полі $B = 1$ Тл. Яке електричне поле для цього потрібне? Виразіть відповідь у СГС (де $B = 10^4$ Гс) і у В/см. Чи залежить результат від сорту іонів? *Відповідь:* $E = v_E B/c \approx 33$ СГС $\approx 10^4$ В/см; від сорту іонів не залежить.

3.8. Плазмовий стовп радіуса $a = 10$ см у полі $B = 1$ кГс має параболічний потенціал $\varphi(r) = \varphi_0\, r^2/a^2$ відносно осі, $\varphi_0 = 1$ кВ. Знайдіть кутову швидкість E × B-обертання $\omega = cE_r/(Br)$. Чому стовп обертається як тверде тіло? *Відповідь:* $\omega = 2c\varphi_0/(Ba^2) \approx 2\times10^6$ рад/с.

3.9. Електрон з енергією 1 кеВ у токамаку з $R = 1$ м, $B = 1$ Тл. Оцініть швидкість тороїдального дрейфу $v_d \simeq v^2/(\omega_c R)$ і час, за який електрон без обертального перетворення досяг би стінки на відстані 0,3 м. Як цей результат пояснює необхідність полоїдальної складової поля? *Відповідь:* $v_d \approx 2$ км/с, $t \approx 1{,}5\times10^{-4}$ с.

3.10. У токамаку $R_0 = 1{,}65$ м, $B(R_0) = 5$ Тл. На якому радіусі ЕЦЕ-приймач, налаштований на другу гармоніку 252 ГГц, бачить плазму? Куди зсунеться ця точка, якщо $B(R_0)$ зросте на 10 %? *Відповідь:* $\omega_{ce} = 2\pi\cdot 126$ ГГц відповідає $B \approx 4{,}5$ Тл, $R = R_0\cdot 5/4{,}5 \approx 1{,}83$ м; точка зміщується до $R \approx 2{,}0$ м.

3.11. Струм колектора гальмівного аналізатора спадає в e разів при зростанні потенціалу сітки на 20 В. Знайдіть T_i однозарядних іонів. *Відповідь:* $T_i = 20$ еВ.

3.12. *Комп'ютерне завдання.* Проінтегруйте чисельно рівняння руху частинки в полях **E** і **B** методом Боріса (на кроці $\Delta t \ll \omega_c^{-1}$ половинне прискорення від **E**, поворот у **B**, друге половинне прискорення). Перевірте чисельно: (а) **E** × **B**-дрейф $v_E = cE/B$ для електрона й протона; (б) градієнтний дрейф у полі $B(x) = B_0(1 + x/L)$ і його знак залежно від заряду; (в) збереження $\mu = mv_\perp^2/2B$ у пробкотроні.

? Контрольні питання

1. Які фізичні величини визначають ларморівський радіус і циклотронну частоту? Чому іони й електрони обертаються в протилежні боки?
2. Чому дрейф у схрещених **E** і **B** не залежить від заряду та маси, а градієнтний дрейф залежить?
3. Що таке магнітний момент частинки? Чому він є адіабатичним інваріантом? Коли порушується?
4. Як працює магнітне дзеркало? Що таке конус втрат? Чому зіткнення призводять до «протікання» відкритих пасток?
5. Чому градієнтний дрейф і дрейф кривизни в вакуумному полі додаються? Від чого залежить напрям дрейфу?
6. Які три адіабатичні інваріанти характеризують рух у диполі Землі? Як вони співвідносяться за частотами?
7. Чому за ЕЦЕ можна локалізувати вимір T_e у токамаку? Що обмежує метод?
8. Чому чисто тороїдальне магнітне поле не утримує плазму? Яку роль відіграє полоїдальна складова?

4 Зіткнення, провідність та перенос у плазмі

Досі ми розглядали колективне екранування (розд. 1) та рух окремих частинок у заданих полях (розд. 3), де окремі акти розсіяння були неважливі. Тепер додамо зіткнення. Це дасть три нові явища: опір електричному струму, теплоперенос і дифузію. Важливо відрізняти два рівні опису: *колективність* пояснює реакцію плазми як цілого, а *зіткнення* визначають дисипацію імпульсу та енергії.

4.1. Кулонівські зіткнення


Теоретичні відомості Нагадаємо з молекулярної фізики

У газі частинка швидкості v_T із перерізом зіткнення σ у середовищі концентрації n має час між зіткненнями $\tau = 1/(nv_T\sigma)$ і довжину вільного пробігу $\ell = v_T\tau$. Рух між зіткненнями — випадкове блукання: після $N = t/\tau$ кроків довжиною ℓ маємо $\langle x^2\rangle = N\ell^2 = (\ell^2/\tau)\,t$, тобто дифузію з коефіцієнтом $D \sim \ell^2/\tau \sim v_T^2\tau$ (точніше, $D = \frac{1}{3}\ell v_T$). За тією самою логікою за порядком величини в'язкість $\eta \sim nT\tau$, а теплопровідність $\kappa \sim nT\tau/m$ (з числовим множником порядку одиниці). Далі всі оцінки виду «$D \sim v_T^2/\nu$, $\kappa \sim nv_T^2\tau$» ґрунтуються саме на цих співвідношеннях, де $\nu = 1/\tau$ і $\lambda_{\text{пр}} = \ell = v_T/\nu$.


Хоча колективні взаємодії в плазмі домінують, зіткнення все ж відбуваються, і саме вони визначають опір плазми електричному струму, вирівнювання температур і загасання хвиль. Зіткнення заряджених частинок мають суттєву особливість порівняно зі зіткненнями нейтральних атомів: сила далекодійна, тому повний імпульс частинка втрачає не в одному лобовому зіткненні, а у вигляді *багатьох малих відхилень* від далеких партнерів.

Електрон зі швидкістю v, що пролітає повз іон із прицільною відстанню b, відхиляється (формула Резерфорда) на кут θ, де $\operatorname{tg}(\theta/2) = b_{90}/b$, а

$$b_{90} = \frac{e^2}{m_e v^2} \sim \frac{e^2}{T}$$



нейтральний газ: ламана лінія з різкими зіткненнями



плазма: плавне викривлення далекими прольотами

Рис. 4.1. Шлях частинки в нейтральному газі (різкі зіткнення) і в плазмі (плавне викривлення далекими прольотами). Довжину вільного пробігу ℓ означають як шлях, на якому напрям швидкості повертається на $\sim \pi/2$

(для $v \sim v_{Te}$) — відстань, при якій відхилення порівнянне з прямим кутом. Для $b \gg b_{90}$ відхилення мале, $\theta \approx 2b_{90}/b$. Число проходжень з прицільною відстанню в інтервалі db пропорційне $b\,db$, а внесок у середній квадрат кута — $\theta^2 \propto b^{-2}$, отже сумарний ефект усіх інтервалів пропорційний $\int db/b$: кожна декада прицільних відстаней дає однаковий внесок. Інтегрування йде від b_{90} (при менших b вже велике відхилення) до λ_D (далі іон екранований). Звідси *кулонівський логарифм*

$$\ln\Lambda = \ln\frac{\lambda_D}{b_{90}} \sim \ln N_D \approx 10\text{–}20.$$

Він слабко залежить від параметрів плазми, і для оцінок його вважають сталим.

! *Формула $\ln\Lambda \approx \ln N_D$ має сенс лише при $N_D = n\lambda_D^3 \gg 1$. Для сильнозв'язаної плазми $\ln\Lambda \lesssim 1$, і всі результати цього розділу втрачають точність.*

Значення $\ln\Lambda$ для типових плазм (формула NRL: $\ln\Lambda = 23 - \ln(n^{1/2}T^{-3/2})$ при $T < 10$ еВ, $24 - \ln(n^{1/2}T^{-1})$ при $T > 10$ еВ; n у см$^{-3}$, T в еВ) наведено в табл. 4.1: для дуже різних плазм $\ln\Lambda$ лежить у межах 10–20.

Таблиця 4.1. Кулонівський логарифм для типових плазм.

Плазма	n, см$^{-3}$	T, **еВ**	$\ln\Lambda$
Лабораторний розряд	10^{11}	1	10,3
Іоносфера	10^{5}	0,1	13,8
Токамак (край)	10^{13}	10^{2}	13,6
Сонячна корона	10^{8}	10^{2}	19,4
Токамак (серцевина)	10^{14}	10^{4}	17,1

Оцінимо частоту зіткнень «на пальцях». Одне далеке прольотне зіткнення з прицільною відстанню b повертає швидкість на кут $\theta \approx$

$2b_{90}/b$. Кути від різних зіткнень випадкові, тому додаються *квадрати*; на шляху dx електрон зустрічає $2\pi b\, n\, db\, dx$ розсіювачів, тож

$$\frac{d\langle\theta^2\rangle}{dx} = \int 2\pi b\, n\, db \left(\frac{2b_{90}}{b}\right)^2 = 8\pi n b_{90}^2 \ln\frac{b_{\max}}{b_{\min}} = 8\pi n b_{90}^2 \ln\Lambda.$$

Умова $\langle\theta^2\rangle \sim 1$ визначає довжину пробігу $\ell \sim 1/(8\pi n b_{90}^2 \ln\Lambda)$, звідки

$$\nu = \frac{v}{\ell} \approx \frac{8\pi n e^4 \ln\Lambda}{m^2 v^3}.$$

Звідси одразу видно: (1) *логарифм* з'являється тому, що кожна декада b дає однаковий внесок; (2) далекі зіткнення домінують над близькими в $\ln\Lambda$ разів; (3) $\nu \propto v^{-3}$, тобто $\nu \propto T^{-3/2}$ (звідси ефект Драйсера, див. нижче). Точний кінетичний розрахунок з усередненням за максвеллівським розподілом і іншим означенням v замінює 8π на $4\sqrt{2\pi}/3$ (множник порядку одиниці) і дає частоту електрон-іонних зіткнень (для $Z = 1$)

$$\nu_{ei} = \frac{4\sqrt{2\pi}}{3}\,\frac{n_e e^4 \ln\Lambda}{m_e^{1/2}(T_e)^{3/2}} \approx 2{,}9\times 10^{-6}\, n_e[\text{см}^{-3}]\,\ln\Lambda\, T_e^{-3/2}[\text{еВ}]\ \text{с}^{-1}. \tag{4.1}$$

Залежність $\nu \propto T^{-3/2}$ має просте пояснення: переріз кулонівського розсіяння $\propto v^{-4}$, тому швидкі частинки «не помічають» партнерів. Для іонів із зарядом Ze ($n_i = n_e/Z$) переріз розсіяння пропорційний Z^2, а концентрація розсіювачів — $1/Z$, тому $\nu_{ei} \propto Z$, а провідність приблизно $\propto 1/Z$.

Порівняємо частоту зіткнень із плазмовою. Підстановка (4.1), (2.2) з урахуванням (1.12) дає

$$\boxed{\frac{\nu_{ei}}{\omega_{pe}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}\ln\Lambda\,\Gamma^{3/2} \approx 0{,}09\,\frac{\ln\Lambda}{N_D}}. \tag{4.2}$$

Це важливий, але тонкий результат: умова $N_D \gg 1$ означає слабкий кулонівський зв'язок і велику кількість частинок у дебаївській сфері, але сама по собі ще не визначає, чи є конкретний процес беззіткнювальним. Довжина вільного пробігу $\lambda_{\text{пр}} \sim v_{Te}/\nu_{ei}$ справді набагато більша за λ_D для типових слабкозв'язаних плазм, але порівнювати її треба насамперед із розміром системи L або з іншим характерним масштабом задачі. Наприклад, для $n_e = 10^{12}$ см$^{-3}$, $T_e = 10$ еВ, $\ln\Lambda = 15$ маємо $\nu_{ei} \approx 1{,}4\times 10^6$ с$^{-1}$, $\omega_{pe} \approx 5{,}6\times 10^{10}$ с$^{-1}$, $\nu_{ei}/\omega_{pe} \approx 2{,}4\times 10^{-5}$.

Для електрон-електронних зіткнень $\nu_{ee} \sim \nu_{ei}$, а для іонів $\nu_{ii} \sim (m_e/m_i)^{1/2}\nu_{ee}$ (іони важчі й повільніші). Обмін енергією між електронами та іонами ще повільніший, $\sim (m_e/m_i)\nu_{ei}$. Порівнюючи часи, для

водню маємо $\tau_{ee} : \tau_{ii} : \tau_{ei}^{\varepsilon} \sim 1 : 43 : 1836$. Тому кожен компонент спершу встановлює власний максвеллівський розподіл і лише потім вирівнюється температура між ними — це й пояснює можливість $T_e \neq T_i$. Фізично: за одне зіткнення електрона з іоном передається частка енергії $\sim m/M$, тож для вирівнювання температур потрібно $\sim M/m$ зіткнень. Двотемпературна плазма $T_e \neq T_i$ — звичайний стан. Контрінтуїтивний факт: довжина вільного пробігу $\ell = v_T/\nu \propto T^2/(ne^4 \ln\Lambda)$ *не залежить від маси*, тому $\ell_e = \ell_i$ при $T_e = T_i$.

4.2. Провідність плазми

Урахуємо зіткнення в найпростішому наближенні, ввівши силу тертя об іони. Рівняння руху електрона в полі $\mathbf{E}$

$$m_e \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -e\mathbf{E} - m_e \nu \mathbf{v},$$

де $\nu \equiv \nu_{ei} = 1/\tau_e$. У сталому полі швидкість встановлюється $\mathbf{v}_d = -e\mathbf{E}/(m_e\nu)$, густина струму $\mathbf{j} = -n_e e \mathbf{v}_d = \sigma_0 \mathbf{E}$ з провідністю

$$\boxed{\sigma_0 = \frac{n_e e^2}{m_e \nu} = \frac{n_e e^2 \tau_e}{m_e}}. \tag{4.3}$$

У ν входять електрон-іонні зіткнення. Зіткнення електронів між собою не змінюють їхній сумарний імпульс, тому прямого тертя не створюють (вони лише впливають на форму розподілу, тобто на числовий коефіцієнт). Для гармонічного поля $\mathbf{E} \propto e^{-i\omega t}$ отримуємо $\sigma(\omega) = \sigma_0/(1 - i\omega/\nu)$, а діелектрична проникність $\varepsilon = 1 + 4\pi i\sigma/\omega$ набуває вигляду

$$\varepsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + i\nu)}. \tag{4.4}$$

Дві граничні ситуації: при $\omega \gg \nu$ повертаємося до (2.5), а при $\omega \ll \nu$ плазма поводиться як звичайний провідник ($\varepsilon \approx 4\pi i\sigma_0/\omega$). Уявна частина ε описує поглинання. Середня за період питома потужність джоулевих втрат $q = \frac{1}{2}\operatorname{Re}\sigma\, E_0^2$, $\operatorname{Re}\sigma = \sigma_0/(1+\omega^2/\nu^2)$. Саме так зіткнення в нижній іоносфері поглинають радіохвилі (розд. 2), і саме джоулеві втрати спричиняють $R < 1$ при відбитті від реальної плазми.

Повністю іонізована плазма. Підставимо (4.1) у (4.3): концентрація *скорочується*, і

$$\sigma \propto \frac{T_e^{3/2}}{\ln\Lambda}. \tag{4.5}$$

Точний кінетичний розрахунок (Спітцер) змінює числовий коефіцієнт приблизно вдвічі (для струму вздовж поля $\sigma_\parallel \approx 1{,}96\, n_e e^2/m_e\nu_{ei}$), і для водневої плазми

$$\sigma_\parallel \approx 1{,}7\times 10^{14}\,\frac{T_e^{3/2}[\text{еВ}]}{\ln\Lambda}\ \text{с}^{-1}.$$

У магнітному полі провідність стає анізотропною, але слід розрізняти два випадки. *Повністю іонізована плазма:* у системі відліку плазми (з урахуванням руху іонів) спітцерівський опір поперек поля лише приблизно вдвічі більший, $\eta_\perp \approx 2\eta_\parallel$, тобто магнітне поле *не* пригнічує поперечну провідність на порядки: електрон-іонне тертя зберігає сумарний імпульс, а дрейф $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ однаковий для обох сортів і струму не створює. *Слабко іонізований газ* (іоносфера) або нерухомі іони: струм поперек поля підтримується лише зіткненнями, і педерсенівська провідність пригнічується фактором $1/[1+(\omega_c/\nu)^2]$, так що за $\omega_c \gg \nu$ маємо $\sigma_\perp/\sigma_\parallel \sim (\nu/\omega_c)^2 \ll 1$.

Висновок (4.5) контрінтуїтивний: чим *гарячіша* плазма, тим *краще* вона проводить. Причина в тому, що зі зростанням температури електрони рухаються швидше, але ефективність кулонівського розсіяння спадає ще швидше. Для $T_e = 1$ кеВ і $\ln\Lambda = 15$ маємо $\sigma \approx 3{,}6\times10^{17}$ с$^{-1}$, що вже порівнянно з провідністю міді при кімнатній температурі ($\sim 5\times10^{17}$ с$^{-1}$). Практичний наслідок: питома потужність омічного нагрівання $j^2/\sigma \propto T^{-3/2}$ падає з температурою, і самим лише омічним нагріванням плазму не можна довести до термоядерних температур (потрібне додаткове нагрівання).

У слабко іонізованому газі частоту зіткнень ν визначають зіткнення з нейтральними атомами, $\nu_{en} = n_n\sigma_{en}v_{Te}$, і провідність (4.3) залежить передусім від концентрації електронів n_e, яка (через формулу Саха) швидко зростає з температурою.

Поле Драйсера та «втікаючі» електрони. Оскільки $\nu_{ei} \propto v^{-3}$ ($\sigma \propto v^{-4}$), сила тертя на швидкий електрон $F_{\text{fr}} \sim m_e\nu_{ei}(v)\,v \propto v^{-2}$ *спадає* зі швидкістю. Тому у сталому полі E електрон, який випадково набрав достатньої швидкості, вже не гальмується тертям, а безперервно прискорюється — стає *втікаючим* (runaway). Критичне поле, за якого сила eE зрівнюється з тертям на тепловий електрон ($v \sim v_{Te}$), називають *полем Драйсера*:

$$\boxed{E_D = \frac{4\pi e^3 n\ln\Lambda}{T_e} \approx 2{,}6\times10^{-13}\,\frac{n\ln\Lambda}{T_e[\text{еВ}]}\ \text{В/см}.} \tag{4.6}$$

При $E < E_D$ електрони з $v > v_c = v_{Te}\sqrt{E_D/E}$ все ж втікають, але їхня частка експоненційно мала $\sim \exp(-v_c^2/2v_{Te}^2) = \exp(-E_D/2E)$. Для токамака ($n = 10^{14}$ см$^{-3}$, $T_e = 10$ кеВ): $E_D \approx 4$ В/м, тоді як електричне поле

в розряді $E \sim 0{,}1$ В/м, і втікаючих електронів практично немає. Але під час швидкого зриву струму T_e падає, а E зростає на порядки, виникають пучки електронів з енергіями в десятки МеВ, небезпечні для стінок установки.

4.3. Теплопровідність плазми

Ті самі електрони переносять і тепло. За порядком величини (кінетика газу) $\kappa_e \sim n_e v_{Te} \lambda_{\text{пр}} = n_e v_{Te}^2 \tau_e$, де $\tau_e = 1/\nu_{ei}$. Оскільки $\tau_e \propto T_e^{3/2}/n_e$,

$$\kappa_e \sim \frac{n_e T_e \tau_e}{m_e} \propto T_e^{5/2},$$

і вона, як і провідність, не залежить від концентрації. Порівняння з (4.3) дає масштабне співвідношення $\kappa_e/\sigma \sim T_e/e^2$. Це аналог співвідношення Відемана — Франца за температурною залежністю, але числовий коефіцієнт визначається кінетичною моделлю і не збігається з металевим. Отже, гаряча плазма має дуже високу теплопровідність: при нагріванні від 10 до 100 еВ вона зростає у $10^{5/2} \approx 300$ разів. Теплопровідність іонів приблизно в $\sqrt{m_e/m_i}$ разів менша: $\kappa \propto \tau/m$, а $\tau_i/\tau_e \sim \sqrt{m_i/m_e}$.

Це стосується переносу вздовж поля. У замагніченій плазмі довжина кроку дорівнює не $\lambda_{\text{пр}}$, а r_L, тому $\kappa_\perp \sim n r_L^2 \nu \sim \kappa_\parallel (\nu/\omega_c)^2$ — на багато порядків менше. Поперек поля, до речі, за класичною оцінкою домінують іони (їхній r_L більший), а не електрони. Тому магнітне поле є ефективною *термоізоляцією* поперек силових ліній. Реальні втрати тепла в установках, однак, значно перевищують класичні (див. розд. 9).

4.4. Дифузія в плазмі. Амбіполярна дифузія

Нехай у плазмі є градієнт концентрації. Електрони рухливіші за іони, тому природно було б очікувати, що вони дифундують швидше. Але тоді виникло б розділення зарядів і електричне поле, яке гальмує електрони й прискорює іони: *завдяки квазінейтральності електрони та іони дифундують разом* з однією швидкістю. Таку дифузію називають *амбіполярною*.

Знайдемо коефіцієнт. Для $n_e = n_i = n$ потоки частинок

$$\Gamma_e = -D_e \nabla n - \mu_e n \mathbf{E}, \qquad \Gamma_i = -D_i \nabla n + \mu_i n \mathbf{E},$$

де D_s — коефіцієнти дифузії, $\mu_s > 0$ — рухливості, пов'язані співвідношенням Ейнштейна $D_s = \mu_s T_s/e$. Вимога $\Gamma_e = \Gamma_i \equiv \Gamma$ визначає поле

$$\mathbf{E} = -\frac{D_e - D_i}{\mu_e + \mu_i} \frac{\nabla n}{n},$$

а після підстановки $\Gamma = -D_a \nabla n$ з *амбіполярним коефіцієнтом дифузії*

$$\boxed{D_a = \frac{\mu_e D_i + \mu_i D_e}{\mu_e + \mu_i} = \frac{\mu_e \mu_i (T_e + T_i)}{e(\mu_e + \mu_i)} \approx D_i \left(1 + \frac{T_e}{T_i}\right)}. \tag{4.7}$$

Останнє наближення справедливе при $\mu_e \gg \mu_i$. Отже, дифузію визначають *повільні* частинки (іони), але з поправкою на температуру електронів: електрони «тягнуть» іони за собою, і D_a у $1 + T_e/T_i$ разів більший за D_i.

Поле $\mathbf{E} \approx -(T_e/e)\,\nabla \ln n$ (при $D_e \gg D_i$) означає, що електрони розподілені за Больцманом $n \propto \exp(e\varphi/T_e)$ в потенціалі φ цього поля. Для його створення досить мізерного розділення зарядів: $\delta n/n \sim (\lambda_D/L)^2 \ll 1$ (розд. 1). Амбіполярна дифузія визначає, наприклад, загасання розрядної плазми в посудині після вимкнення розряду. Формула (4.7) відповідає відсутності магнітного поля.

Дифузія поперек магнітного поля. У замагніченій плазмі крок поперек поля дорівнює r_L (кожне зіткнення зсуває ведучий центр на $\sim r_L$), а не довжині вільного пробігу, тому $D_\perp \sim r_L^2 \nu$ (розд. 3), $D_\perp/D_\parallel \sim (\nu/\omega_c)^2$. Запам'ятайте: *у магнітному полі зіткнення допомагають дифузії поперек* $\mathbf{B}$ *($D_\perp \propto \nu$) і заважають уздовж ($D_\parallel \propto 1/\nu$).* У *повністю іонізованій* плазмі електрон-іонні зіткнення зберігають сумарний імпульс, і потоки електронів та іонів поперек поля автоматично рівні: $\nu_{ie} r_{Li}^2 \sim \nu_{ei} r_{Le}^2$ (бо $\nu_{ie} = \nu_{ei}\, m_e/m_i$, а $r_{Li}^2 \sim (m_i/m_e) r_{Le}^2$ за однакових T). Класична поперечна дифузія є *власне амбіполярною*: додаткове електричне поле не потрібне, а коефіцієнт $D_\perp \sim \nu_{ei} r_{Le}^2 \propto n\,T^{-1/2}/B^2$ дуже малий (для $n \approx 10^{14}$ см$^{-3}$, 10 кеВ й 5 Тл $\sim 0{,}1$ см^2/с; для порівняння, бомівська дифузія $D_B = cT/16eB \approx 1{,}3 \times 10^6$ см^2/с більша в $\sim 10^7$ разів, див. розд. 9). У слабко іонізованому газі, де магнітяться лише електрони, повільнішими стають саме вони, і амбіполярна дифузія поперек поля визначається ними: $D_{a\perp} \approx D_{e\perp}(1 + T_i/T_e)$, $D_{e\perp} = D_e/(1 + \omega_{ce}^2/\nu^2)$.

4.5. Як це вимірюють: температура з опору і з ширини ліній

Зіткнення залишають у плазмі два «відбитки», з яких можна прочитати температуру без зонда.

Температура електронів з опору. Оскільки $\sigma \propto T_e^{3/2}$ (4.5), а густина струму j і поле E в омічному розряді вимірюються електрично (за струмом плазми й напругою на обході, розд. 5.12), то

$$\boxed{T_e[\text{еВ}] \approx \left(\frac{\sigma \ln \Lambda}{1{,}7 \times 10^{14}}\right)^{2/3}, \qquad \sigma = \frac{j}{E}.} \tag{4.8}$$

Оцінка. Для $I = 1$ МА, $a = 0{,}5$ м ($j \approx 1{,}3 \times 10^6$ А/м^2) і $E = 0{,}1$ В/м маємо $\sigma \approx 1{,}3 \times 10^7$ См/м $\approx 1{,}2 \times 10^{17}$ с$^{-1}$, і за $\ln\Lambda = 15$ отримуємо $T_e \approx 0{,}5$ кеВ. Метод дає усереднену по перерізу температуру й чутливий до домішок: ефективний заряд $Z_{\text{eff}} > 1$ збільшує опір, тому T_e без поправки виходить заниженою.

Температура іонів з допплерівського розширення. Іон з масою M випромінює на довжині хвилі λ_0; через тепловий рух лінія має максвеллівський профіль із повною шириною на половині висоти

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \sqrt{\frac{8\ln 2\, T_i}{Mc^2}}. \tag{4.9}$$

Оцінка. Для лінії H_α ($\lambda_0 = 656{,}3$ нм) за $T_i = 100$ еВ маємо $\Delta\lambda/\lambda_0 \approx 7{,}7 \times 10^{-4}$, тобто $\Delta\lambda \approx 0{,}5$ нм — легко вимірюється спектрометром. Важчі домішки (C, O) дають вужчі лінії, але ті самі T_i за умови, що іони встигли вирівняти температуру з основними (зіткнення, розд. 4).

Густина з штарківського розширення. Мікрополя заряджених частинок розщеплюють рівні водню, і ширина лінії зростає як $n_e^{2/3}$: для H_β вона сягає ≈ 1 нм за $n_e \sim 10^{16}$ см$^{-3}$, тож метод підходить для щільної холодної плазми (розряди, дуги), а в гарячій термоядерній плазмі штарківська ширина мала на тлі допплерівської.

Обмеження: спектральна лінія несе сигнал із усієї хорди, тому для локальних вимірів потрібне томсонівське розсіяння (розд. 7.11).

Головне в розділі

- Кулонівські зіткнення — накопичення багатьох малих відхилень на далеких відстанях, а не рідкісні лобові удари.
- Вони визначають опір плазми: провідність Спітцера $\sigma \propto T^{3/2}$, від густини вона залежить лише через $\ln\Lambda$.
- Теплопровідність плазми переносять переважно електрони, бо вони легші й швидші за іони.
- Дифузія плазми амбіполярна: електричне поле зв'язує електрони та іони, вирівнюючи їхні потоки.
- Зіткнення дають діагностику: T_e з опору (розд. 4.5), T_i з допплерівської ширини лінії, n_e зі штарківської.

Задачі

4.1. Як змінюється провідність водневої плазми при зростанні температури від 10 до 100 еВ (вважайте $\ln\Lambda$ сталим)? Знайдіть σ при $T_e = 1$ кеВ, $\ln\Lambda = 15$ і порівняйте з провідністю міді. Як змінюється з температурою питома потужність омічного нагрівання при заданій густині струму? *Відповідь:* $\sigma \propto T^{3/2}$: зростання в 31,6 раза; $\sigma(1\text{ кеВ}) \approx 3{,}6\times10^{17}$ с$^{-1}$ (мідь: $\approx 5\times10^{17}$ с$^{-1}$); $j^2/\sigma \propto T^{-3/2}$.

4.2. У скільки разів змінюються електронна теплопровідність і провідність при нагріванні від 10 до 100 еВ? Як змінюється відношення $\kappa_e/\sigma T_e$? *Відповідь:* κ_e зростає в 316 разів, σ в 31,6 раза; $\kappa_e/\sigma \propto T_e$ зростає в 10 разів, а $\kappa_e/(\sigma T_e)$ не змінюється (аналог закону Відемана — Франца).

4.3. Знайдіть поле Драйсера для $n = 10^{14}$ см$^{-3}$, $T_e = 10$ кеВ і для $n = 10^{13}$ см$^{-3}$, $T_e = 1$ кеВ ($\ln\Lambda = 15$). Для $E = 0{,}1$ В/м оцініть критичну швидкість v_c/v_{Te} і частку втікаючих електронів. *Відповідь:* в обох випадках $E_D \approx 3{,}9$ В/м (відношення n/T_e однакове); $v_c/v_{Te} = \sqrt{E_D/E} \approx 6{,}2$, частка $\sim \exp(-E_D/2E) \approx 3\times10^{-9}$.

4.4. Знайдіть D_a/D_i для $T_e = T_i$ та $T_e = 10T_i$. Покажіть, що при $D_e \gg D_i$ амбіполярне поле $\mathbf{E} = -(T_e/e)\nabla\ln n$, тобто електрони розподілені за Больцманом. *Відповідь:* $D_a = 2D_i$ при $T_e = T_i$ і $D_a = 11D_i$ при $T_e = 10T_i$.

4.5. Використовуючи табл. 4.1 і формулу (4.1), оцініть $\ln\Lambda$ та частоту ν_{ei} для трьох плазм: іоносфери ($n \sim 10^6$ см$^{-3}$, $T \sim 0{,}1$ еВ), сонячної корони ($n \sim 10^8$ см$^{-3}$, $T \sim 100$ еВ) і лабораторної плазми ($n \sim 10^{13}$ см$^{-3}$, $T \sim 10$ еВ). Яка з них найбільш зіткненнєва щодо ω_p? *Відповідь:* іоносфера: $\ln\Lambda \approx 12{,}6$, $\nu_{ei} \approx 10^3$ с$^{-1}$, $\nu_{ei}/\omega_{pe} \approx 2\times10^{-5}$; корона: $\ln\Lambda \approx 19$, $\nu_{ei} \approx 6$ с$^{-1}$, $\nu_{ei}/\omega_{pe} \approx 10^{-8}$; лабораторна: $\ln\Lambda \approx 11{,}5$, $\nu_{ei} \approx 10^7$ с$^{-1}$, $\nu_{ei}/\omega_{pe} \approx 6\times10^{-5}$ — найбільш зіткненнєва.

4.6. У токамаку $n = 10^{14}$ см$^{-3}$, $T_e = T_i = 10$ кеВ, $\ln\Lambda \approx 17$, $R = 3$ м. (а) Оцініть $\tau_e \approx 3{,}4\times10^5\, T_e^{3/2}[\text{еВ}]/(n\ln\Lambda)$ с, довжину вільного пробігу $\ell_e = v_{Te}\tau_e$ і порівняйте її з довжиною обходу тора $2\pi R$. (б) За який час вирівнюються T_e та T_i? Оцініть $\tau_{eq} \sim (m_i/2m_e)\,\tau_e$ і порівняйте з часом утримання енергії ~ 1 с. *Відповідь:* $\tau_e \approx 2\times10^{-4}$ с, $\ell_e \approx 8$ км $\gg 2\pi R \approx 19$ м; $\tau_{eq} \sim 0{,}2$ с для водню.

4.7. Порівняйте класичну дифузію $D_\perp \sim r_{Le}^2 \nu_{ei}$ з бомівською $D_B = cT/(16eB)$ для параметрів із задачі 4.6 при $B = 5$ Тл. У скільки разів вони відрізняються і що це означає для утримання? *Відповідь:* $\nu_{ei} \approx 5 \times 10^3$ с$^{-1}$, $r_{Le} \approx 5 \times 10^{-3}$ см, $D_\perp \approx 0{,}1$ см^2/с; $D_B \approx 1{,}3 \times 10^6$ см^2/с, тобто в $\sim 10^7$ разів більший. Якби дифузія була бомівською, утримання в реакторних масштабах було б неможливим; реальний (аномальний) перенос лежить між цими межами.

4.8. У омічному розряді $j = 2 \times 10^6$ А/м^2, $E = 0{,}2$ В/м, $\ln\Lambda = 15$. Оцініть T_e за формулою (4.8). Лінія H_α має ширину $\Delta\lambda = 0{,}8$ нм; оцініть T_i. *Відповідь:* $\sigma = 10^7$ См/м $= 9 \times 10^{16}$ с$^{-1}$, $T_e \approx 0{,}4$ кеВ; $T_i \approx 250$ еВ ($\Delta\lambda/\lambda_0 = 1{,}22 \times 10^{-3}$, $T_i = (\Delta\lambda/\lambda_0)^2 Mc^2/8\ln 2$).

Контрольні питання

1. Чому провідність повністю іонізованої плазми зростає з температурою й не залежить від концентрації?
2. Чому в слабкозв'язаній плазмі ($N_D \gg 1$) $\nu_{ei} \ll \omega_p$, і чому це ще не означає, що довільний процес беззіткнювальний? Яку роль грає кулонівський логарифм?
3. Що таке амбіполярна дифузія? Чому $D_a \approx D_i(1 + T_e/T_i)$ і яка роль квазінейтральності?
4. Що таке поле Драйсера? Чому сила тертя на швидкий електрон спадає зі швидкістю?
5. Чому класична дифузія поперек поля у повністю іонізованій плазмі автоматично амбіполярна?
6. Чому теплопровідність плазми $\propto T^{5/2}$ і не залежить від концентрації? Чому вона різна вздовж і поперек поля?
7. Чому зі зростанням температури плазма стає кращим провідником, а метал — гіршим?
8. Чому зіткнення сприяють дифузії поперек поля, але гальмують дифузію вздовж нього?
9. Як за напругою на обході та струмом оцінити T_e омічної плазми? Чому результат залежить від Z_{eff}?

5 Гідродинамічний та магнітогідродинамічний опис

До цього моменту ми розглядали окремі частинки. Але в багатьох задачах не потрібно знати траєкторію кожної з них: достатньо знати усереднені поля густини, швидкості, тиску та електромагнітного поля.

5.1. Гідродинамічний опис не є синонімом частих зіткнень

Зіткнення полегшують встановлення локальної рівноваги та ізотропного тиску. Проте великомасштабні низькочастотні рухи плазми можуть описуватися рідинними рівняннями і за рідких зіткнень, якщо швидкі кінетичні ступені вільності не визначають основну динаміку. Саме тому в плазмі співіснують два описи: кінетичний, у термінах функцій розподілу, та МГД, у термінах макроскопічних полів.

Для однорідинної МГД типові умови мають вигляд

$$L \gg r_{Li}, \qquad \omega \ll \omega_{ci},$$

але цього недостатньо саме по собі: потрібні також відповідне замикання рівнянь та, для найпростішої ізотропної моделі, достатньо швидка ізотропізація тиску. Якщо ці умови порушуються, треба повертатися до дворідинної або кінетичної теорії.

5.2. Дворідинний опис

Теоретичні відомості Нагадаємо з гідродинаміки

Для звичайної рідини з густиною ρ і швидкістю $\mathbf{v}$ маємо рівняння неперервності $\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$ та рівняння Ейлера

$$\rho\Big(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v}\Big) = -\nabla p + \mathbf{f},$$

де $\mathbf{f}$ — об'ємна сила; в'язкість додає член Нав'є — Стокса $\eta \nabla^2 \mathbf{v}$. Зверніть увагу на *проблему замикання*: рівняння для ρ містить $\mathbf{v}$, рівняння для $\mathbf{v}$ — тиск p, рівняння для p — потік тепла і т. д. Ланцюжок обривають

моделлю стану (наприклад, $p \propto \rho^{\gamma}$). Нижче рівняння для електронної та іонної «рідин» читаються як «Ейлер + сила Лоренца + тертя $\mathbf{R}$».

Найприродніший гідродинамічний крок — не відразу зливати електрони та іони в одну рідину, а описувати їх окремо. Для кожного компонента вводимо концентрацію n_s і середню швидкість $\mathbf{v}_s$. Рівняння неперервності мають вигляд

$$\frac{\partial n_s}{\partial t} + \nabla \cdot (n_s \mathbf{v}_s) = 0.$$

Рівняння руху містять силу Лоренца, градієнт тиску та силу зіткнень:

$$m_s n_s \frac{d\mathbf{v}_s}{dt} = q_s n_s \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v}_s \times \mathbf{B} \right) - \nabla p_s + \mathbf{R}_s.$$

Сума $\sum_s \mathbf{R}_s = 0$: зіткнення передають імпульс між компонентами, але не створюють його. Тут ці рівняння записано за аналогією з гідродинамікою; їхній систематичний вивід як моментів кінетичного рівняння (і звідки береться тензор тиску замість скалярного p_s) наведено в розд. 7.5.

Для квазінейтральної водневої плазми $n_e \simeq n_i = n$ та $m_e \ll m_i$. Важливо побачити, що однорідинна МГД не вводиться незалежно від дворідинної моделі: її основні рівняння можна отримати безпосередньо, додаючи та віднімаючи рівняння для електронів та іонів.

5.3. Від дворідинної моделі до однорідинної МГД

Для однозарядної плазми рівняння руху мають вигляд

$$m_i n_i \frac{D_i \mathbf{v}_i}{Dt} = e n_i \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v}_i \times \mathbf{B} \right) - \nabla p_i + \mathbf{R}_{ie},$$

$$m_e n_e \frac{D_e \mathbf{v}_e}{Dt} = -e n_e \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v}_e \times \mathbf{B} \right) - \nabla p_e + \mathbf{R}_{ei},$$

де $\mathbf{R}_{ei} = -\mathbf{R}_{ie}$ виражає взаємну передачу імпульсу під час зіткнень.

Сума рівнянь: рівняння руху плазми як цілого. Введемо масову густину та масову швидкість плазми:

$$\rho_m = m_i n_i + m_e n_e, \qquad \mathbf{v} = \frac{m_i n_i \mathbf{v}_i + m_e n_e \mathbf{v}_e}{\rho_m}.$$

Для $m_e \ll m_i$ маємо $\rho_m \simeq m_i n_i$ і $\mathbf{v} \simeq \mathbf{v}_i$. Додаючи рівняння руху електронів та іонів, внутрішні сили зіткнень взаємно скорочуються. У квазінейтральній плазмі $n_e \simeq n_i$ скорочується також сумарна електрична сила:

$$e n_i \mathbf{E} - e n_e \mathbf{E} \simeq 0.$$

Магнітні сили, навпаки, не скорочуються, оскільки електрони та іони рухаються з різними швидкостями. Використовуючи

$$\mathbf{j} = en_i\mathbf{v}_i - en_e\mathbf{v}_e,$$

їхня сума набуває вигляду

$$\frac{en_i}{c}\mathbf{v}_i \times \mathbf{B} - \frac{en_e}{c}\mathbf{v}_e \times \mathbf{B} = \frac{1}{c}\mathbf{j} \times \mathbf{B}.$$

Якщо нехтувати внеском відносного руху електронів та іонів у потік механічного імпульсу (для звичайної низькочастотної МГД це мала поправка), дістаємо

$$\boxed{\rho_m \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\nabla(p_i + p_e) + \frac{1}{c}\mathbf{j} \times \mathbf{B}.} \tag{5.1}$$

Позначивши $p = p_i + p_e$, одержуємо рівняння руху плазми як однієї (однорідинної) рідини.

Точно так само, додаючи рівняння неперервності двох компонент, отримуємо рівняння неперервності для єдиної рідини:

$$\boxed{\frac{\partial \rho_m}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_m \mathbf{v}) = 0.} \tag{5.2}$$

Електронне рівняння: закон Ома. Тепер скористаємося рівнянням для електронів. Для квазінейтральної плазми покладемо $n_e \simeq n_i = n$ та, для простоти, $\mathbf{v} \simeq \mathbf{v}_i$. Тоді

$$\mathbf{v}_e = \mathbf{v} - \frac{\mathbf{j}}{en}.$$

Підставимо це у рівняння руху електронів і покладемо $m_e \to 0$ (інерція електронів нехтовна):

$$0 = -en\Big(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{v}_e \times \mathbf{B}}{c}\Big) - \nabla p_e + \mathbf{R}_{ei}, \qquad \mathbf{R}_{ei} = \frac{en}{\sigma}\mathbf{j}.$$

Зіткнення електронів з іонами дають силу тертя $\mathbf{R}_{ei} = en\mathbf{j}/\sigma$ (знак відповідає гальмуванню відносного руху). Підстановка $\mathbf{v}_e = \mathbf{v} - \mathbf{j}/en$ дає $-en\big(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}/c\big) + \mathbf{j} \times \mathbf{B}/c - \nabla p_e + en\mathbf{j}/\sigma = 0$, і після ділення на en:

$$\boxed{\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{v} \times \mathbf{B} = \frac{\mathbf{j}}{\sigma} + \frac{\mathbf{j} \times \mathbf{B}}{enc} - \frac{\nabla p_e}{en}.} \tag{5.3}$$

Тут перший доданок праворуч описує опір зіткненням, другий є *холлівським* доданком, а третій виникає через градієнт електронного

тиску. Холлівський доданок важливий на масштабах порядку іонної інерційної довжини c/ω_{pi}: на менших масштабах іони «відклеюються» від поля, а електрони ще ні (токамак, $n = 10^{14}$ см$^{-3}$: $c/\omega_{pi} \approx 2$–3 см; магнітосфера, $n \sim 1$ см$^{-3}$: ≈ 230 км). Саме ці доданки порушують вмороженість і уможливлюють перез'єднання силових ліній (розд. 5.10). Якщо нехтувати всіма цими поправками, отримуємо закон ідеальної МГД:

$$\boxed{\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{v} \times \mathbf{B} = 0.} \tag{5.4}$$

Таким чином, перехід має чітку фізичну структуру:

сума рівнянь двох компонент
$\Downarrow$
рівняння руху однієї рідини

електронне рівняння
$\Downarrow$
узагальнений закон Ома
$\Downarrow$
ідеальна МГД

Саме тому МГД слід розглядати як довгохвильову низькочастотну границю більш повного дворідинного опису, а не як незалежну систему рівнянь.

5.4. Основне рівняння магнітної гідродинаміки

Перейдемо до макроскопічного опису плазми, розглядаючи її як суцільне провідне середовище з масовою густиною $\rho_m(\mathbf{r}, t)$, гідродинамічною швидкістю $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ та газокінетичним тиском $p(\mathbf{r}, t)$.

Виведемо рівняння руху такого середовища, послідовно розглянувши сили, що діють на його елемент. Ми отримаємо те саме рівняння (5.1), але тепер — з балансу сил на елементі об'єму, що робить наочним зміст кожного доданка.

Сила газокінетичного тиску. Виділимо в плазмі елементарний об'єм $dV = dx\,dy\,dz$ (рис. 5.1). Перепад тиску на протилежних гранях уздовж осі x створює силу

$$df_x = [p(x, y, z) - p(x + dx, y, z)]\,dy\,dz = -\frac{\partial p}{\partial x}\,dV.$$

Сумуючи внески вздовж трьох осей координат, дістаємо повну силу тиску, що діє на елемент об'єму:

$$d\mathbf{f}_p = -\nabla p\, dV.$$




Рис. 5.1. Елемент об'єму в плазмі, на який діють сили газокінетичного тиску

Рівняння руху та сила Лоренца. Маса виділеного елемента дорівнює

$$dm = \rho_m\, dV.$$

Тому за другим законом Ньютона

$$\rho_m\, dV \frac{d\mathbf{v}}{dt} = d\mathbf{f}_p + d\mathbf{f}_{\text{em}}.$$

Тут

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)$$

— субстанціальна похідна, яка враховує як явну зміну поля швидкості з часом, так і його зміну під час руху разом із плазмою.

У квазінейтральній плазмі густина нескомпенсованого заряду мала, тому безпосередньою електричною силою $\rho_q \mathbf{E}$ у макроскопічному рівнянні руху нехтуємо. Магнітна складова сили Лоренца при цьому залишається істотною:

$$d\mathbf{f}_{\text{em}} = \frac{1}{c} \mathbf{j} \times \mathbf{B}\, dV.$$

Отже,

$$\rho_m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\nabla p + \frac{1}{c}\mathbf{j}\times\mathbf{B}.$$

Це рівняння має простий фізичний зміст: рух плазми визначається градієнтом газокінетичного тиску та магнітною силою Лоренца.

Виключення густини струму за законом Ампера. Розглянемо повільні макроскопічні процеси, для яких струмом зміщення в законі Ампера можна знехтувати. Тоді

$$\mathbf{j} = \frac{c}{4\pi}\,\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B}.$$

Це зручно, бо в плазмі струми зазвичай невідомі, а поле — те, що ми задаємо котушками. Підставляючи цей вираз у рівняння руху, отримуємо *основне рівняння магнітної гідродинаміки* (МГД):

$$\boxed{\rho_m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\nabla p + \frac{1}{4\pi}(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B})\times\mathbf{B}}. \tag{5.5}$$

Отже, на відміну від звичайної гідродинаміки, на рух плазми безпосередньо впливає власне магнітне поле — через створювану ним силу Лоренца.

Скориставшись векторною тотожністю $(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B})\times\mathbf{B} = (\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B} - \nabla(B^2/2)$, перепишемо його. (Тотожність випливає з $\nabla(B^2/2) = (\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B} + \mathbf{B}\times(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B})$, або в компонентах: $[(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B})\times\mathbf{B}]_i = \varepsilon_{ijk}\varepsilon_{jlm}\partial_l B_m B_k = B_k\partial_k B_i - B_k\partial_i B_k$.)

$$\rho_m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\nabla\left(p + \frac{B^2}{8\pi}\right) + \frac{1}{4\pi}(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B}. \tag{5.6}$$

Тут два фізично різні доданки. Перший — *магнітний тиск* $B^2/8\pi$, що додається до газового. Другий — *натяг силових ліній*: вздовж викривленої лінії з радіусом кривизни R_c діє сила $B^2/(4\pi R_c)$, напрямлена до центра кривизни, ніби лінії — розтягнуті гумові шнури.

Замикання системи та межі застосовності. Рівняння (5.5) саме по собі не утворює замкненої системи. Для визначення густини, швидкості, тиску та магнітного поля необхідні додаткові рівняння.

Зокрема, до рівняння руху додають:

1. рівняння неперервності

$$\frac{\partial\rho_m}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho_m\mathbf{v}) = 0;$$

2. рівняння стану, наприклад адіабатичне

$$\frac{d}{dt}\left(p\rho_m^{-\gamma}\right) = 0 \quad \text{(тобто } p\rho_m^{-\gamma} = \text{const вздовж руху елемента плазми);}$$

3. закон Ома, який пов'язує $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{v}$ та $\mathbf{j}$. У простій резистивній МГД електричне поле в системі відліку, що рухається разом із плазмою, $\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}/c$, задає омічну складову струму:

$$\mathbf{j} = \sigma\left(\mathbf{E} + \frac{1}{c}\,\mathbf{v} \times \mathbf{B}\right). \tag{5.7}$$

   Це *резистивний* закон Ома для однорідинної МГД; σ тут — скаляр, тобто $\sigma_\parallel$: поперек поля опір повністю іонізованої плазми лише приблизно вдвічі більший ($\eta_\perp \approx 2\eta_\parallel$, Спітцер), а не в $(\omega_c/\nu)^2$ разів. Точніший дворідинний закон Ома (5.3) містить також холлівський доданок $\mathbf{j} \times \mathbf{B}/enc$ і градієнт електронного тиску $-\nabla p_e/en$, а якщо не нехтувати інерцією електронів — ще й $-(m_e/e)\,d\mathbf{v}_e/dt$. У простій резистивній МГД всі ці поправки вважаються малими.
4. рівняння Максвелла, зокрема

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \qquad \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -c\,\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E}.$$

МГД-наближення призначене для великомасштабних ($L \gg r_{Li}$) та повільних ($\omega \ll \omega_{ci}$) процесів, для яких кінетичні ефекти, пов'язані з індивідуальним рухом частинок, не визначають основну динаміку плазми. Пояснення «на пальцях»: «рідина» має сенс, коли частинка за час зміни поля встигає багато разів обернутися ($\omega \ll \omega_{ci}$), а ларморівське коло мале порівняно з масштабом неоднорідності ($L \gg r_{Li}$): тоді частинку «прив'язано» до силової лінії, і поперек $\mathbf{B}$ плазма поводиться як суцільне середовище навіть без зіткнень. Уздовж $\mathbf{B}$ ця прив'язка не працює.

5.5. Альвенівська хвиля

Рівняння МГД показує, що магнітне поле має не лише тиск, а й натяг. Це означає, що викривлення силових ліній може породжувати хвилю: магнітний натяг $B^2/4\pi$ відіграє роль натягу струни, а ρ_m — роль лінійної інерції. Така *альвенівська хвиля* біжить уздовж $\mathbf{B}_0$ зі швидкістю

$$\boxed{v_A = \frac{B_0}{\sqrt{4\pi\rho_m}}} \tag{5.8}$$

(повне виведення з лінеаризованих рівнянь МГД та інші моди — у розд. 6).

Альвенівська швидкість v_A — один із головних масштабів швидкості в МГД: з нею порівнюють швидкість течії плазми, а час L/v_A є характерним часом магнітних процесів на масштабі L. Приклади:

токамак ($B = 5$ Тл, $n = 10^{14}$ см$^{-3}$, D) $v_A \approx 7 \times 10^8$ см/с ($\approx c/40$); сонячний вітер ($B \approx 5$ нТл, $n \approx 5$ см$^{-3}$) $v_A \approx 50$ км/с; корона ($B \sim 10$ Гс, $n \sim 10^9$ см$^{-3}$) $v_A \sim 700$ км/с. Відношення

$$M_A = \frac{v}{v_A}$$

називають числом Альвена. За $M_A \ll 1$ магнітні сили здатні істотно впливати на рух, тоді як за $M_A \gg 1$ інерційний рух домінує над альвенівським відновлювальним механізмом. Це порівняння є локальним і не є самостійним критерієм застосовності МГД.

Альвенівська хвиля — лише одна з хвиль замагніченої плазми. Зовнішнє поле $\mathbf{B}_0$ робить реакцію плазми анізотропною: рух уздовж поля та поперек нього фізично різний. У низькочастотній границі $\omega \ll \omega_{ci}$ це дає МГД-хвилі (альвенівську, швидку й повільну магнітозвукові), а при вищих частотах потрібен тензорний опис холодної замагніченої плазми (моди R, L, O, X, резонанси та відсікання). Обидва випадки систематично розглянуто в розд. 6.

5.6. МГД-рівновага та магнітні поверхні

Розглянемо тепер стаціонарну плазму, в якій $\mathbf{v} = 0$. Рівняння руху перетворюється на умову рівноваги:

$$\nabla p = \frac{1}{c}\mathbf{j} \times \mathbf{B}. \tag{5.9}$$

Це рівняння показує, що в рівновазі градієнт тиску компенсується магнітною силою Лоренца.

Корисно мати ще один еквівалентний опис магнітної сили. Використовуючи закон Ампера та $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, можна записати

$$f_i = \partial_j \sigma_{ij}, \qquad \sigma_{ij} = \frac{1}{4\pi}\left(B_i B_j - \frac{B^2}{2}\delta_{ij}\right). \tag{5.10}$$

У цьому тензорі перший доданок відповідає натягу вздовж поля, а другий — магнітному тиску. Такий запис особливо зручний для задач про сили на плазмові шнури та магнітні поверхні.

Скалярно помножимо (5.9) на $\mathbf{B}$. Оскільки $\mathbf{B} \cdot (\mathbf{j} \times \mathbf{B}) = 0$, маємо

$$\mathbf{B} \cdot \nabla p = 0.$$

Отже, магнітні силові лінії лежать на поверхнях сталого тиску:

$$p = \text{const}.$$

Аналогічно, скалярний добуток (5.9) на $\mathbf{j}$ дає

$$\mathbf{j} \cdot \nabla p = 0,$$

тобто густина струму також лежить у дотичній площині до поверхонь сталого тиску.

У тороїдальних магнітних системах такі поверхні можуть утворювати вкладені одна в одну магнітні поверхні. Їхня геометрія є основою опису рівноваги плазми в токамаках і стелараторах.

З (5.9) можна також знайти поперечну складову густини струму. Векторно помноживши це рівняння на $\mathbf{B}$, дістаємо

$$\mathbf{j}_\perp = \frac{c}{B^2}\,\mathbf{B} \times \nabla p.$$

Це саме діамагнітний струм (5.14), який детальніше розглянуто в розд. 5.8.

Параметр плазми β. Важливим безрозмірним параметром плазми є відношення газокінетичного тиску до магнітного:

$$\boxed{\beta = \frac{p}{B^2/(8\pi)} = \frac{8\pi p}{B^2}.} \tag{5.11}$$

Параметр β показує, наскільки сильно тиск плазми порівняно з магнітним полем впливає на рівновагу. Він *не* є критерієм застосовності МГД: ідеальна МГД справедлива за будь-якого β (за умов $L \gg r_{Li}$, $\omega \ll \omega_{ci}$), тоді як β лише вказує, наскільки сильно плазма деформує поле.

- При $\beta \ll 1$ магнітний тиск значно перевищує газокінетичний, тому плазма відносно слабо впливає на конфігурацію магнітного поля.
- При $\beta \sim 1$ газокінетичний та магнітний тиски порівнянні, тому взаємний вплив плазми та магнітного поля стає істотним.

Таким чином, β характеризує співвідношення двох основних механізмів, що визначають рівновагу плазми — її внутрішнього тиску та магнітного утримання. Для заданого магнітного поля велике значення β відповідає великому тиску плазми, однак досягнення такого стану визначається також умовами магнітного утримання та стійкістю плазми. Для порівняння: токамак $\beta \sim 3\%$, сферичний токамак до $\sim 40\%$, магнітосфера Землі $\beta \ll 1$, сонячна корона $\sim 10^{-3}$–10^{-2}, фотосфера $\gtrsim 1$, сонячний вітер ~ 1.

Тиск p визначається термодинамічним станом плазми; для класичної ідеальної плазми він задається формулою (1.13).




Рис. 5.2. Фізичний зміст параметра β: порівняння газокінетичного та магнітного тисків. Баланс тисків вимагає, щоб β, обчислене за зовнішнім (вакуумним) полем, не перевищувало 1; локально β може бути й більшим (напр., у конфігурації з оберненим полем). Практичну межу задає стійкість: у токамаках $\beta \sim$ кілька відсотків

5.7. Енергія електромагнітного поля та плазми

Теорема Пойнтінга в системі СГС має вигляд

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{E^2+B^2}{8\pi}\right) + \nabla\cdot\left(\frac{c}{4\pi}\mathbf{E}\times\mathbf{B}\right) = -\mathbf{j}\cdot\mathbf{E}. \tag{5.12}$$

Ліва частина описує зміну густини енергії поля та її потік, права — локальну передачу енергії від поля до заряджених частинок. Якщо $\mathbf{j}\cdot\mathbf{E} > 0$, поле віддає плазмі енергію.

У МГД енергетичний баланс пов'язує рух середовища, магнітне поле та нагрів. Для ідеальної МГД (без дисипації) з адіабатичним замиканням повна густина енергії $\mathcal{E} = \rho_m v^2/2 + p/(\gamma-1) + B^2/8\pi$ (кінетична, теплова й магнітна) зберігається:

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial t} + \nabla\cdot\left[\left(\frac{\rho_m v^2}{2} + \frac{\gamma p}{\gamma-1}\right)\mathbf{v} + \frac{c}{4\pi}\,\mathbf{E}\times\mathbf{B}\right] = 0, \qquad \frac{c}{4\pi}\mathbf{E}\times\mathbf{B} = \frac{B^2\mathbf{v} - (\mathbf{v}\cdot\mathbf{B})\mathbf{B}}{4\pi}, \tag{5.13}$$

де останній вираз — потік Пойнтінга в ідеальній МГД ($c\mathbf{E} = -\mathbf{v}\times\mathbf{B}$). З урахуванням скінченної провідності в балансі магнітної й кінетичної енергій з'являється дисипативний член $-j^2/\sigma$ (джоулеве тепло); якщо врахувати й теплову енергію, повна енергія знову зберігається: джоулеве тепло лише переводить магнітну та кінетичну енергії в теплову. Кожен доданок має чітке значення: робота $\mathbf{v}\cdot(\mathbf{j}\times\mathbf{B})/c$ перекачує енергію між рухом і магнітним полем; поле вморожене, тому розтягування силових ліній збільшує $B^2/8\pi$ коштом кінетичної енергії, а обмін між кінетичною й тепловою енергіями відбувається через роботу стиснення $p\,\nabla\cdot\mathbf{v}$ (у рівнянні для теплової енергії) та $-\mathbf{v}\cdot\nabla p$ (у рівнянні для кінетичної); у сумі вони дають потік $\nabla\cdot(p\mathbf{v})$. Це дає й фізичний спосіб перевіряти наближення: якщо відкидання певного члена порушує очікуваний енергетичний баланс, воно не може бути зроблене безумовно.

5.8. Діамагнетизм плазми

Кожна заряджена частинка плазми у магнітному полі має орбітальний магнітний момент (3.7), напрямлений проти поля. Якщо в одиниці об'єму є n_s частинок сорту s, то намагніченість

$$\mathbf{M} = -\sum_s n_s \mu_s \frac{\mathbf{B}}{B} = -\sum_s n_s \frac{T_s}{B}\frac{\mathbf{B}}{B} = -\frac{p}{B^2}\,\mathbf{B},$$

де враховано $\langle m v_\perp^2/2\rangle = T$ (два ступені вільності поперек поля) і $p = \sum_s n_s T_s$. Намагніченість напрямлена проти поля, тобто плазма *діамагнітна*: її магнітна сприйнятливість ($M = \kappa H$, $H \approx B$) від'ємна, $\kappa = -p/B^2 < 0$, тому вона виштовхується з області сильного поля.

Діамагнетизм виявляється через струми. У неоднорідній плазмі (p змінюється в просторі) вони дорівнюють $\mathbf{j} = c\,\nabla \times \mathbf{M}$, що при $B = \text{const}$ дає

$$\mathbf{j}_\perp = \frac{c}{B^2}\,\mathbf{B} \times \nabla p. \tag{5.14}$$

Той самий результат одержується з умови рівноваги $\nabla p = \mathbf{j} \times \mathbf{B}/c$ (див. (5.9)). Щоб побачити наслідок, розглянемо плоский шар, у якому $p = p(x)$ і поле $\mathbf{B} = B(x)\mathbf{e}_z$. Тоді $j_y = -(c/4\pi)\,dB/dx$, і умова рівноваги $dp/dx = j_y B/c$ дає

$$p + \frac{B^2}{8\pi} = \text{const}. \tag{5.15}$$

Всередині плазми поле послаблене, зовні воно сильніше: плазма «виштовхує» поле, а поле стискає плазму. Рівняння (5.15) формулює баланс *газокінетичного* (p) і *магнітного* ($B^2/8\pi$) тисків.[1]

5.9. Вмороженість магнітного поля

З закону Ома (5.7)

$$\mathbf{E} = -\mathbf{v} \times \mathbf{B}/c + c\,\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B}/(4\pi\sigma).$$

Підставляючи в закон індукції $\partial_t \mathbf{B} = -c\,\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E}$ і враховуючи $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, одержуємо *рівняння індукції*

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \boldsymbol{\nabla} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \frac{c^2}{4\pi\sigma}\Delta \mathbf{B}. \tag{5.16}$$

[1] Строго кажучи, у теплово рівноважній класичній системі повна намагніченість дорівнює нулю (теорема Бора — ван Левен): діамагнетизм орбіт компенсується струмами частинок, що ковзають поблизу стінок. Але в неоднорідній плазмі об'ємні струми $c\,\nabla \times \mathbf{M}$ не компенсуються — саме вони й визначають рівновагу.

Перший доданок описує перенесення поля течією, другий — дифузію поля. Їхнє відношення визначає *магнітне число Рейнольдса*

$$R_m \sim \frac{4\pi\sigma L v}{c^2}.$$

Для рідких металів у лабораторії (ртуть, галій) $R_m \sim 10^{-2}$–1; для токамака $R_m \sim 10^8$; для сонячної корони $\sim 10^{12}$. Отже, у космосі вмороженість — майже точний закон, а в лабораторних рідких металах — ні.

Ідеальна провідність ($R_m \gg 1$). Нехай у плазмі існує магнітне поле — створене зовнішніми котушками, струмом самої плазми або успадковане від джерела разом із плазмою. Якщо провідність дуже велика, дифузійним доданком у (5.16) можна знехтувати, і рівняння індукції зводиться до

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}).$$

З нього випливає теорема Альвена: магнітний потік крізь будь-який контур, що рухається разом із плазмою, зберігається. Кажуть, що силові лінії «вморожені» в плазму — плазма не перетинає їх, а поле рухається разом із нею. Саме ця властивість лежить в основі магнітного утримання: рухаючи плазму, ми переносимо разом із нею і поле.

Доведення «на пальцях». Потік Φ крізь контур, що рухається з плазмою, змінюється з двох причин: (а) через $\partial\mathbf{B}/\partial t$ і (б) через те, що бічна поверхня, яку описує контур за час dt, перетинає силові лінії. Другий внесок дорівнює $-\oint(\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l}$. З $\partial_t \mathbf{B} = -c\,\nabla\times\mathbf{E}$ і теореми Стокса

$$\frac{d\Phi}{dt} = -c\oint\Big(\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{v}\times\mathbf{B}\Big)\cdot d\mathbf{l} = 0,$$

бо $\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B}/c = 0$ (ідеальний закон Ома). Наслідок: $d(\mathbf{B}/\rho)/dt = (\mathbf{B}/\rho\cdot\nabla)\mathbf{v}$. Тому при стисненні поперек поля $B/\rho = \text{const}$ ($B^2 \propto \rho^2$, ефективний показник адіабати $\gamma_\perp = 2$); вздовж поля $B = \text{const}$; при ізотропному стисненні $B \propto \rho^{2/3}$ ($\gamma = 4/3$, як у випромінювання).

Скінченна провідність: дифузія поля. У реальній плазмі провідність скінченна, тому другий доданок у (5.16) уже не можна відкинути. Нехай для простоти плазма нерухома ($\mathbf{v} = 0$). Тоді рівняння індукції набирає вигляду рівняння дифузії

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \frac{c^2}{4\pi\sigma}\,\Delta\mathbf{B},$$

тобто наявне неоднорідне поле з часом *розмивається*: струми, що підтримують неоднорідність, загасають через джоулеві втрати. Характерний час цього розмиття на масштабі L

$$\tau_d = \frac{4\pi\sigma L^2}{c^2}.$$

Для лабораторної плазми ($T_e = 1$ кеВ, $L = 1$ м) $\tau_d \approx 50$ с, тому поле треба весь час підтримувати зовнішніми джерелами. Натомість для сонячної корони ($T \sim 100$ еВ, $L \sim 10^{10}$ см) $\tau_d \sim 10^{16}$ с — значно більше за час життя Сонця. Тому там дифузією можна знехтувати й користуватися наближенням вмороженості.

5.10. Перез'єднання силових ліній

В ідеальній МГД силові лінії вморожені в плазму, тож топологія поля не змінюється. Але в тонкому струмовому шарі, де поле різко змінює знак, градієнт B великий, і дифузійний доданок у (5.16) уже не можна відкинути (або стають важливими холлівський доданок та інерція електронів). Там вмороженість порушується, і лінії *перез'єднуються*.

На пальцях. Уявіть дві натягнуті гумки, спрямовані в протилежні боки; плазма тримає їх на місці. Їх зближують, і у вузькій зоні контакту вмороженість «вимикається»: замість двох ліній, що минали одна одну, утворюються дві нові, обернені на кут (рис. 5.3). Нові лінії різко зігнуті, а натяг $B^2/4\pi$ вздовж лінії випрямляє їх, як відпущену тятиву, і викидає плазму вздовж шару зі швидкістю порядку альфвенівської. Магнітна енергія перетворюється на теплову, кінетичну енергію потоків і енергію прискорених частинок.




Рис. 5.3. Перез'єднання: (а) протилежно спрямовані лінії стискають струмовий шар; (б) після перез'єднання виникає X-точка, а плазма викидається вздовж шару

Оцінка швидкості. У моделі Світа — Паркера шар довжиною L і товщиною δ: вхідний потік v_{in} і вихідний $\sim v_A$ зв'язані збереженням

маси, $v_{\text{in}} L \sim v_A \delta$, а товщина визначається дифузією, $\delta \sim \sqrt{(c^2/4\pi\sigma)\, L/v_A}$. Звідси

$$\boxed{\frac{v_{\text{in}}}{v_A} \sim R_m^{-1/2}, \qquad R_m = \frac{4\pi\sigma L v_A}{c^2}.} \tag{5.17}$$

Для сонячної корони $R_m \sim 10^{12}$, тож $v_{\text{in}}/v_A \sim 10^{-6}$ і час перез'єднання $\tau \sim (L/v_A)\sqrt{R_m}$ при $L = 10^{10}$ см, $v_A = 7\times10^7$ см/с сягає $\sim 10^8$ с (роки), тоді як спалахи тривають хвилини. Реальне перез'єднання швидше: шар при великому R_m розпадається на острівці (плазмоїдна нестійкість), а у безсутикових шарах працюють холлівські ефекти (на масштабі c/ω_{pi}, див. (5.3)); швидкість виходить на $v_{\text{in}} \sim 0{,}01$–$0{,}1\, v_A$, незалежно від R_m.

> **!** *Силові лінії не є матеріальними об'єктами. Мова «розриву й зшивання» лише образно описує зміну зв'язності поля: насправді змінюється те, які елементи плазми пов'язані однією лінією.*

Де спостерігається. Сонячні спалахи, суббурі в магнітосфері Землі, пилкоподібні релаксації та розривні моди в токамаках (розд. 8, 9).

Проблема нагріву корони. Корона має $T \sim 10^6$ К, у сотні разів більше за фотосферу ($\sim 6\times10^3$ К), хоча енергія тече від холоднішої поверхні. Потрібне джерело $\sim 10^5$–10^7 ерг/(см^2·с). Єдиної відповіді досі немає, але картина така. Енергію несе рух фотосфери, який скручує й заплітає силові лінії. Є два шляхи її розсіяння: (1) *нанофлеєри* — безліч малих перез'єднань у тонких струмових шарах, на які розпадається заплетене поле (модель Паркера); (2) *хвилі* — альфвенівська турбулентність, яку запускають рухи вузлів поля у фотосфері. Огляд Клімчука [11] обґрунтовує, що нагрів корони імпульсний, а корона заповнена тонкими струмовими шарами, що мають перез'єднуватися; моделювання альфвенівської турбулентності [1] дає температуру $\approx 2{,}5$ МК у петлі активної області, але не відтворює всіх спостережних обмежень. Нині вважають, що обидва механізми пов'язані: турбулентність створює струмові шари, у яких і відбувається перез'єднання.

5.11. Дві мови опису: окремі частинки й суцільне середовище

Ми описали плазму двічі. В розд. 3 вона — набір частинок, кожна з яких крутиться навколо своєї силової лінії. Вище — суцільне провідне середовище з тиском, густиною й швидкістю течії. Чи не суперечать ці картини одна одній?

Здавалося б, суперечать. Візьмемо установку керованого синтезу: $n = 10^{14}$ см$^{-3}$, $T = 10$ кеВ. Тоді $\nu_{ei} \approx 4{,}4\times10^3$ с$^{-1}$ і довжина вільного

пробігу

$$\lambda_{\text{пр}} \sim \frac{v_{Te}}{\nu_{ei}} \approx \frac{4\times 10^{9}\ \text{см/с}}{4{,}4\times 10^{3}\ \text{с}^{-1}} \approx 10\ \text{км},$$

у десять тисяч разів більша за розмір установки (~ 1 м). Зіткнень практично немає, а ми користуємося рівняннями рідини. Але ж рідина, як ми звикли, тримається саме на зіткненнях.

Що насправді дозволяє перейти до середовища. У зіткнювальному газі локальна рівновага підтримується зіткненнями. У замагніченій плазмі поперечний рух додатково обмежений гірацією, тому усереднення за ларморівським обертанням може бути осмисленим навіть за великої довжини вільного пробігу. Але це *не заміна зіткнень* взагалі: уздовж $\mathbf{B}$ частинки вільно переміщуються, а розподіл за швидкостями може залишатися далеким від локальної рівноваги. Саме тому однорідинна МГД має обмеження.

! *Звідси ключове правило. Якщо $L \gg r_{Li}$ та $\omega \ll \omega_{ci}$, макроскопічну динаміку часто можна описувати МГД, але лише за наявності відповідного замикання. Уздовж $\mathbf{B}$, при анізотропному тиску та в явищах, чутливих до розподілу частинок за швидкостями (загасання Ландау, захоплені частинки в торі, конус втрат дзеркала), однорідинної МГД вже недостатньо й потрібна кінетика.*

Словник: що в частинковій мові відповідає величині рідини. Подальші три підрозділи показують, як «наживо» пов'язані ці описи.

Таблиця 5.1. Словник між частинковим і гідродинамічним описом.

Частинки	Середовище	Зв'язок
Дрейф $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ однаковий для всіх частинок	швидкість течії $\mathbf{v}$	$\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B}/c=0$
$\sum_s n_s m_s$	масова густина ρ_m	
$\sum_s n_s T_s$	тиск p	
Гірація й градієнт густини	діамагнітний струм $\mathbf{j}_\perp$	$\mathbf{j}_\perp = c\,\mathbf{B}\times\nabla p/B^2$
Сума рівнянь руху електронів та іонів	рівняння МГД	$\rho_m\, d\mathbf{v}/dt = -\nabla p + \mathbf{j}\times\mathbf{B}/c$

Вмороженість як наслідок дрейфу. Закон Ома ідеальної МГД, $\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B}/c=0$, не є окремим постулатом. Дрейф (3.2) однаковий для електронів і іонів, тож уся плазма поперек поля тече зі швидкістю

$\mathbf{v}_E = c\mathbf{E}\times\mathbf{B}/B^2$. Підставимо $\mathbf{v} = \mathbf{v}_E$: $\mathbf{v}_E\times\mathbf{B}/c = -\mathbf{E}_\perp$, тобто $\mathbf{E}_\perp + \mathbf{v}\times\mathbf{B}/c = 0$. А умова $E_\parallel = 0$ означає, що електрони, які вільно рухаються вздовж ліній, миттєво замикають будь-яке поздовжнє поле. Отже, «лінії рухаються разом з плазмою» означає лише, що частинки прив'язані до ліній, а самі лінії дрейфують зі швидкістю $\mathbf{v}_E$.

Діамагнітний струм «на пальцях». Тут легко помилитися: центри ларморівських кіл не рухаються, а струм є. Звідки він? Нехай $\mathbf{B} = B\mathbf{e}_z$ і концентрація залежить від x. Розглянемо позитивні частинки у вертикальній площині $x = x_0$. З рівнянь руху $x_g = x + v_y/\omega_c$, де x_g — координата центра кола. Тобто частинки, що проходять через площину *вгору* ($v_y > 0$), мають центри *праворуч*, а частинки, що рухаються *вниз*, — ліворуч. Якщо справа концентрація більша, вгору летить більше частинок, ніж вниз, і потоки не компенсуються:

$$\Gamma_y = \int v_y\, n\!\left(x_0 + \frac{v_y}{\omega_c}\right) f_M\, d^3v \simeq \frac{n'}{\omega_c}\langle v_y^2\rangle = \frac{n'\,T}{m\,\omega_c} = \frac{c\,T}{qB}\,n'.$$

Тут f_M — нормований максвеллівський розподіл за швидкостями, $n' = dn/dx$, а нульовий доданок розкладу зникає через симетрію. Густина струму $j_y = q\Gamma_y = c\,T\,n'/B$. Для електронів і напрям обертання, і знак заряду протилежні, тож струми *додаються*: $j_y = c\,p'/B$, де $p = n(T_e + T_i)$. У векторному вигляді $\mathbf{j}_\perp = c\,\mathbf{B}\times\nabla p/B^2$ — рівно (5.14).




Рис. 5.4. Походження діамагнітного струму: центри орбіт нерухомі, але потоки вгору й вниз не компенсуються

Той самий струм ми отримали ще двічі: з намагніченості $M = -p/B$ (розд. 5.8) та з МГД-рівноваги (5.9). Три різних шляхи — частинковий, «магнітний» і рідинний — дали один результат. Саме так ми й впевнюємося, що два описи сумісні.

Як з частинок отримати рівняння руху. Рівняння руху плазми як цілого ми вивели в розд. 5: електронне та іонне рівняння додаються, тертя скорочується ($\mathbf{R}_e + \mathbf{R}_i = 0$: зіткнення зберігають сумарний імпульс), і лишається

$$\rho_m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\nabla p + \rho_q \mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{j} \times \mathbf{B}.$$

Тепер можна пояснити, чому ми раніше відкинули $\rho_q \mathbf{E}$. За Гауссом $\rho_q = \nabla \cdot \mathbf{E}/4\pi \sim E/4\pi L$, тому $\rho_q E \sim E^2/4\pi L$. Натомість $j \times B/c \sim B^2/4\pi L$. Відношення $E^2/B^2 \sim v^2/c^2 \ll 1$ (бо $E \sim vB/c$): електричною силою можна знехтувати для повільних ($v \ll c$) рухів — тієї ж умови, що й для струму зміщення.

Де МГД чесно спрощує. У рівнянні руху простої МГД тиск задається скаляром. Це природне наближення для достатньо частих зіткнень, коли вони встигають ізотропізувати розподіл. У сильно замагніченій беззіткнювальній плазмі збереження першого адіабатичного інваріанта приводить до анізотропії: $p_\perp$ і $p_\parallel$ можуть відрізнятися. Тоді потрібні кінетичний або щонайменше двотисковий опис; проста однорідинна МГД вже не містить усієї фізики. Водночас для довгохвильових мод із майже ізотропним розподілом МГД може залишатися корисним навіть за слабких зіткнень — її застосовність визначається не самим фактом $\lambda_{\text{пр}} > L$, а замиканням, частотами та відношенням характерних масштабів до r_L і λ_D.

Що це змінює для керованого синтезу. Кожен із описів «відповідає» за свою частину проблеми (табл. 5.2).

Таблиця 5.2. Які ефекти й моделі що дають для керованого синтезу.

Ефект	Модель	Наслідок для КТС
Дебаївський шар біля стінки й дивертора	шар Бома (розд. 1.9): $u \geq c_s$, $\varphi_f \approx -3T_e/e$	усе падіння потенціалу зосереджене у шарі завтовшки $\sim \lambda_D$; він визначає потік тепла $\sim nc_s(\ldots)T_e$ на матеріал
Відсікання при $\omega < \omega_p$	$\varepsilon(\omega) = 1 - \omega_p^2/\omega^2$	хвиля з $f_{ce} = \omega_{ce}/(2\pi) \approx 1{,}4 \times 10^{11}$ Гц для $B = 5$ Тл має $n_{\text{кр}} \approx 2{,}5 \times 10^{14} > 10^{14}$, тобто O-мода проходить у плазму (розд. 6) й нагріває її на циклотронному резонансі

Продовження на наступній сторінці

Таблиця 5.2. Які ефекти й моделі що дають для керованого синтезу. (Продовження)

Ефект	Модель	Наслідок для КТС
Провідність Спітцера $\sigma \propto T^{3/2}$	кулонівські зіткнення	омічний нагрів слабшає з температурою, потрібен додатковий нагрів: пучки нейтралів, ВЧ-хвилі й α-частинки
Дрейфи та збереження μ	рух окремої частинки	чисто тороїдальне поле не утримує, потрібна закрутка ліній (токамак, стеларатор); дзеркало має конус втрат
$\beta = 8\pi p/B^2$	МГД-рівновага	потужність синтезу $P_f \propto \beta^2 B^4$ (див. нижче), потрібні сильні надпровідні магніти, а β обмежене стійкістю
Класичний і аномальний перенос	кінетика, турбулентність	класична оцінка дає $\tau \sim 10^3$ с, реально лише секунди; через це установки доводиться робити великими

Два рядки таблиці варто виписати. По-перше, чому «$P_f \propto \beta^2 B^4$». Повна концентрація частинок $2n$, тому $p = 2nT$, і потужність синтезу

$$P_f = \tfrac{1}{4}\, n^2 \langle \sigma v \rangle E_f = \frac{p^2}{16\, T^2}\, \langle \sigma v \rangle E_f .$$

В околі 10–20 кеВ у цьому вузькому інтервалі наведені значення $\langle \sigma v \rangle$ приблизно зростають як T^2. Лише як локальну оцінку в цьому інтервалі можна тому писати $P_f \propto p^2 = (\beta B^2/8\pi)^2 \propto \beta^2 B^4$. Це не є універсальним законом реакції для всіх температур. Подвоєння поля при тому самому β дає у 16 разів більшу потужність, і це головна причина прагнення до сильних полів. Для нашого прикладу $p = 3{,}2 \times 10^6$ дин/см^2 (3,2 бар), магнітний тиск при 5×10^4 Гс дорівнює ≈ 100 бар, тож $\beta \approx 3\,\%$.

По-друге, *класичний* перенос. Поперечну теплопровідність іонів оцінюємо як $\chi_\perp \sim r_{Li}^2 \nu_{ii}$ (крок r_L, частота кроків ν_{ii}). Для $r_{Li} \approx 0{,}3$ см і $\nu_{ii} \approx \nu_{ei}/(40\text{–}60) \approx 10^2$ с$^{-1}$ маємо $\chi_\perp \sim 10$ см^2/с, а час витоку тепла з шнура розміру $L \sim 1$ м $\tau \sim L^2/\chi_\perp \sim 10^3$ с. Тобто по класиці плазма трималась би сотні секунд (десятки хвилин). Насправді τ_E становить секунди — на три порядки менше. Різницю дає *аномальний* перенос, спричинений турбулентністю, і її не можна отримати ні з одно-, ні з дворідинної МГД: потрібен кінетичний (турбулентний) опис. Це оцінка за порядком величини: точні коефіцієнти змінюють результат у 1–10 разів, але не на три порядки.

5.12. Як це вимірюють: магнітні виміри

У рідинній картині плазма — провідне середовище зі струмом і тиском, а магнітне поле є її відгуком: струм створює поле за законом Ампера $\oint \mathbf{B}\cdot d\mathbf{l} = 4\pi I/c$, а тиск послаблює поле всередині за (5.15). Поза плазмою поле можна виміряти звичайною котушкою. Згідно із законом Фарадея, котушка з N витків площі S у полі $B(t)$ дає ЕРС $\varepsilon = -(NS/c)\,dB/dt$; сигнал інтегрують, і $\int \varepsilon\,dt \propto B$. Різні геометрії котушок дають різні величини: струм, енергію, положення шнура.

Пояс Роговського: повний струм. Гнучку котушку з рівномірним намотуванням (n_c витків на одиницю довжини, переріз S) замикають навколо плазмового шнура (рис. 5.5 а). Потік крізь неї $\Phi = n_c S \oint B_\theta\,dl = (4\pi n_c S/c)\,I$ за законом Ампера, тому

$$\boxed{\int \varepsilon\,dt = -\frac{4\pi n_c S}{c^2}\,I}\,. \tag{5.18}$$

Результат не залежить ні від розподілу струму по перерізу, ні від форми контуру. Це робить пояс основним датчиком струму плазми.

Оцінка. Для $n_c = 10$ см$^{-1}$, $S = 1$ см^2 і наростання струму 1 МА за 0,1 с ЕРС дорівнює $4\pi n_c S\,\dot I/c^2 \approx 4\times10^{-3}$ статВ $\approx 1{,}3$ В (1 статВ ≈ 300 В).


Діамагнітна петля: енергія плазми. Петля, що охоплює плазмовий шнур у площині, перпендикулярній до $\mathbf{B}_0$ (там же, де і пояс), вимірює потік поздовжнього поля. З балансу тисків (5.15) при $\beta \ll 1$ поле всередині плазми $B_z \approx B_0 - 4\pi p/B_0$ (рис. 5.5 б), тобто потік зменшується на

$$\boxed{\Delta\Phi = -\frac{4\pi}{B_0}\int p_\perp\,dS}\,. \tag{5.19}$$

Для ізотропної плазми у тороїдальній системі з великим радіусом R повна теплова енергія $W = \frac{3}{2}\int p\,dV \approx \frac{3}{2}(2\pi R)\int p\,dS = \frac{3}{4}RB_0|\Delta\Phi|$.

Оцінка. Для $R = 150$ см, $a = 50$ см, $B_0 = 5\times10^4$ Гс і $p = 3{,}2\times10^6$ дин/см^2 (задача 5.2) маємо $\int p\,dS = p\pi a^2$ і $|\Delta\Phi| = 4\pi p\,\pi a^2/B_0 \approx 6\times10^6$ Мкс (0,06 Вб), тобто лише $\beta/2 \approx 1{,}6\,\%$ повного тороїдального потоку $B_0\pi a^2$. Звідси $W \approx 3{,}5$ МДж.

Магнітні зонди. Невелика котушка біля стінки вимірює локальну похідну $\dot B$. Для збурення $\widetilde B e^{-i\omega t}$ сигнал $|\varepsilon| = (NS/c)\,\omega\widetilde B$ зростає з частотою, тому зонди чутливі до швидких збурень. Приклад: $N = 100$, $S = 1$ см^2, $\widetilde B = 1$ Гс і $f = 10$ кГц дають ≈ 60 мВ. За масивом зондів



(а) (б)

Рис. 5.5. Магнітні виміри: (а) переріз плазмового шнура з поясом Роговського (струм I_p), діамагнітною петлею (потік B_t) і магнітним зондом на стінці; (б) плазма послаблює поле B_z всередині ($\Delta\Phi \propto \int p\,dS$; ефект перебільшено, вертикальну вісь обрізано)

уздовж обходу шнура визначають також його положення й форму (розд. 9.9).

Межі застосовності.

- Усі котушки вимірюють лише *зміни* потоку: інтегратор дрейфує, тому тривалі розряди (хвилини) потребують особливої точності. Крім того, котушка вимірює все, що створює потік: пояс Роговського дає повний струм, включно з вихровими струмами в камері.
- Сигнал діамагнітної петлі становить лише 1–2 % потоку тороїдального поля. Його треба відокремити від зміни B_0 другою, компенсаційною петлею, і точність результату обмежена точністю цього віднімання.
- Петля вимірює $p_\perp$, а не повний тиск; у токамаку на нього накладається парамагнітний внесок полоїдального поля струму, який віднімають за незалежними вимірами I_p.
- Формула (5.19) виведена при $\beta \ll 1$ й у наближенні балансу тисків; для сильно деформованого поля потрібна повна МГД-рівновага.
- Металева камера екранує швидкі збурення: час проникнення поля крізь стінку обмежує смугу частот, тому датчики розташовують усередині камери або враховують стінку.

Отже, магнітні виміри безпосередньо застосовують три результати цього розділу: закон Ампера дає струм, баланс тисків — енергію, а закон Фарадея перетворює змінне поле на електричний сигнал. Це найпростіші діагностики плазми: вони не потребують лазера, не збурюють плазму й працюють на кожній установці.

Головне в розділі

- Рідинний опис оперує усередненими полями n, $\mathbf{v}$, p і не є синонімом частих зіткнень, але потребує замикання.
- Сума рівнянь руху електронів та іонів дає однорідинну МГД; ідеальна МГД визначається рівнянням $\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B}/c=0$.
- Магнітне поле «вморожене» в плазму (вмороженість порушується при $R_m \lesssim 1$ і в тонких струмових шарах, розд. 5.10); параметр $\beta = 8\pi p/B^2$ порівнює газокінетичний і магнітний тиски.
- Діамагнітний струм виникає завдяки градієнту тиску й гірації, хоча центри орбіт нерухомі.
- Альвенівська хвиля з швидкістю $v_A = B/\sqrt{4\pi\rho_m}$ — перша колективна мода замагніченої плазми.
- Магнітні виміри ґрунтуються на законах Ампера й Фарадея та балансі тисків: пояс Роговського дає струм, діамагнітна петля — енергію, зонди — швидкі збурення (розд. 5.12).

Задачі

5.1. Довгим соленоїдом з n витками на одиницю довжини тече струм I. Знайдіть тиск на бічну поверхню соленоїда. *Відповідь:* $p = B^2/8\pi = 2\pi n^2 I^2/c^2$, $B = 4\pi n I/c$.

5.2. Плазма з $n_e = n_i = 10^{14}$ см$^{-3}$, $T_e = T_i = 10$ кеВ. Знайдіть тиск і поле, при якому $\beta = 1$. Яким буде β при $B = 5\times10^4$ Гс? *Відповідь:* $p = 2nT = 3{,}2\times10^6$ дин/см^2, $B(\beta=1) \approx 9\times10^3$ Гс; $\beta \approx 3{,}2\,\%$ при 5×10^4 Гс.

5.3. Оцініть час дифузії магнітного поля для плазми з $T_e = 1$ кеВ, $\ln\Lambda = 15$, $L = 1$ м. Знайдіть магнітне число Рейнольдса при швидкості руху плазми 10^5 см/с. *Відповідь:* $\sigma \approx 3{,}6\times10^{17}$ с$^{-1}$ (порівнянна з міддю), $\tau_d = 4\pi\sigma L^2/c^2 \approx 50$ с, $R_m \approx 5\times10^4$.

5.4. Знайдіть швидкість Альвена для водневої плазми з $n_i = 10^{14}$ см$^{-3}$ у полі $B = 10^4$ Гс і порівняйте її з тепловою швидкістю іонів v_{Ti} при $T_i = 10$ кеВ. *Відповідь:* $v_A \approx 2{,}2\times10^8$ см/с, $v_{Ti} \approx 1{,}0\times10^8$ см/с ($v_{Ti}/v_A \approx 0{,}45$).

5.5. Покажіть, що сила на одиницю об'єму $\mathbf{f} = \mathbf{j}\times\mathbf{B}/c$ записується як $f_i = \partial_j \sigma_{ij}$ з тензором (5.10). Знайдіть магнітний тиск при $B = 5{,}3$ Тл (у барах) і порівняйте з газовим тиском плазми в задачі 5.2. Чому дорівнює β? *Відповідь:* $B^2/8\pi \approx 1{,}1\times10^8$ дин/см^2 $\approx$ 112 бар,

? $\beta \approx 3\,\%$.

? **5.6.** Виведіть швидкість альвенівської хвилі, розглядаючи силову лінію як струну з натягом $B^2/4\pi$. Знайдіть v_A для дейтерієвої плазми $n_i = 10^{14}$ см$^{-3}$, $B = 5\times10^4$ Гс і час, за який хвиля проходить $L = 1$ м. *Відповідь:* $v_A \approx 7{,}7\times10^8$ см/с, $t = L/v_A \approx 1{,}3\times10^{-7}$ с.

? **5.7.** Для дейтерієвої плазми з $n = 10^{14}$ см$^{-3}$, $T = 10$ кеВ, $B = 5\times10^4$ Гс оцініть $\lambda_{\text{пр}} = v_{Te}/\nu_{ei}$, r_{Li}, відношення $D_\perp/D_\parallel$. Поясніть, чому МГД застосовна поперек поля, хоча довжина пробігу набагато більша за розмір установки. *Відповідь:* $\lambda_{\text{пр}} \sim 10^6$ см (10 км), $r_{Li} \approx 0{,}3$ см, для іонів $D_\perp/D_\parallel \sim (\nu_{ii}/\omega_{ci})^2 \sim 10^{-13}$, для електронів $(\nu_{ei}/\omega_{ce})^2 \sim 10^{-17}$. Вздовж поля частинки вільно пролітають $\lambda_{\text{пр}} \gg L$, а поперек поля гірація з $r_L \ll L$ локалізує їх: роль довжини пробігу відіграє r_L.

? **5.8.** Для позитивних частинок у полі $\mathbf{B} = B\mathbf{e}_z$ з концентрацією $n(x)$ покажіть, що центр кола має координату $x_g = x + v_y/\omega_c$. Знайдіть потік Γ_y через площину $x = x_0$ і густину струму j_y. Перевірте збіг із (5.14). *Відповідь:* $\Gamma_y = c\,T\,n'/(qB)$, $j_y = c\,p'/B$.

? **5.9.** Покажіть, що при поперечному стисненні вмороженої силової трубки $B/\rho = \text{const}$ (довжина трубки не змінюється), а при ізотропному стисненні $B \propto \rho^{2/3}$. У скільки разів зросте B хмари, що колапсує в зорю з ростом густини в 10^6 разів? *Відповідь:* у 10^4 разів.

? **5.10.** Сонце обертається з $\Omega \approx 2{,}7\times10^{-6}$ рад/с, сонячний вітер має швидкість 400 км/с. З умови вмороженості знайдіть кут між $\mathbf{B}$ і радіальним напрямом на орбіті Землі ($r = 1{,}5\times10^8$ км): $\tan\psi = \Omega r/v$. *Відповідь:* $\psi \approx 45^\circ$.

? **5.11.** Діамагнітна петля зареєструвала зменшення потоку тороїдального поля $|\Delta\Phi| = 3\times10^6$ Мкс у токамаку з $R = 150$ см, $B_0 = 5\times10^4$ Гс. Знайдіть теплову енергію плазми W, вважаючи тиск ізотропним. Чи можна за цим сигналом визначити окремо n і T? *Відповідь:* $W = \tfrac{3}{4}RB_0|\Delta\Phi| \approx 1{,}7\times10^{13}$ ерг $= 1{,}7$ МДж; ні, петля дає лише $\int p\,dS$, тобто добуток nT.

? **5.12.** Пояс Роговського має $n_c = 20$ см$^{-1}$ і $S = 0{,}5$ см^2. Яким буде інтеграл $\int \varepsilon\,dt$ (в В·с) при $I = 1$ МА? Чи залежить результат від положення шнура всередині пояса? *Відповідь:* $\mu_0 n_c S I$ в одиницях

? CI $= 4\pi\times10^{-7}\cdot 2000\cdot 0{,}5\times10^{-4}\cdot 10^{6}\approx 0{,}13$ В·с; не залежить — лише від повного охопленого струму.

? Контрольні питання

1. Чому плазма діамагнітна? Який зв'язок між діамагнетизмом і рівнянням (5.15)?
2. Що таке магнітний тиск і натяг силових ліній? Як вони входять в рівняння МГД?
3. Що означає вмороженість поля? Від якого параметра залежить, чи вона виконується?
4. Як із закону Ампера й сили Лоренца отримати тензор натягів і розкласти силу на тиск і натяг? Чому магнітна сила ніколи не діє вздовж поля?
5. Чому плазма майже без зіткнень описується рівняннями рідини поперек поля, але не вздовж? Яку роль виконує гірація?
6. Чому вмороженість поля є наслідком дрейфу $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$? Звідки береться діамагнітний струм, якщо центри орбіт нерухомі?
7. Чому джоулеве тепло не порушує збереження повної енергії?
8. Коли МГД непридатна (анізотропія тиску, беззіткнювальна плазма вздовж $\mathbf{B}$)?
9. Чому силові лінії поводяться як натягнуті гумові нитки, що відштовхуються одна від одної?
10. Чому діамагнітна петля вимірює енергію плазми, а пояс Роговського — струм? Які закони лежать в основі кожного з них?

6 МГД-хвилі та хвилі в замагніченій плазмі

Хвиля — це не обов'язково перенесення речовини. У найпростішому розумінні хвиля є поширенням збурення, яке завдяки внутрішнім силам системи передається від однієї її ділянки до іншої.

Для плазми це твердження має особливо багатий зміст. Плазма одночасно має тиск, електричні заряди, струми та магнітне поле. Тому після малого збурення відновлювальну дію можуть створювати зовсім різні фізичні механізми. У найпростішому випадку плазму повертає до рівноваги градієнт тиску; у замагніченій плазмі додатково виникає натяг силових ліній магнітного поля.

Саме тому в плазмі існує не одна «швидкість звуку», а ціла система хвильових мод. У розд. 2 ми вивчали хвилі в незамагніченій холодній плазмі; тепер розглянемо хвилі, в яких істотне магнітне поле: низькочастотні рідинні (МГД) та високочастотні холодні моди.

6.1. Що в плазмі може бути відновлювальною силою?

Корисно почати не з дисперсійного рівняння, а з фізичної картини. Уявімо, що деяку ділянку плазми трохи змістили від положення рівноваги. Щоб виникла хвиля, це зміщення повинно породити силу, яка намагається повернути систему назад.

У звичайному газі такою силою є градієнт тиску. Якщо невеликий об'єм газу стиснути, його тиск зростає і виникає сила, спрямована назовні. Якщо ж цей об'єм розрідити, тиск падає, і сусідні області штовхають його назад.

У плазмі до цього додається магнітне поле. Викривлення силових ліній породжує магнітний натяг, а зміна величини поля — зміну магнітного тиску


$$p_B = \frac{B^2}{8\pi}. \tag{6.1}$$

Тому вже на якісному рівні можна передбачити три важливі типи відновлювальної дії (рис. 6.1):

1. газодинамічний тиск;

2. натяг магнітних силових ліній;
3. зміна магнітного тиску.

Перший механізм дає звукову хвилю, другий — альвенівську, а поєднання тиску плазми та магнітного поля породжує магнітозвукові хвилі.



(а) газовий тиск (б) натяг ліній (в) магнітний тиск

Рис. 6.1. Фізичне походження основних МГД-хвиль: різні відновлювальні сили породжують різні способи коливання плазми.

6.2. Звукова хвиля

Почнемо з найпростішого випадку — плазми без магнітного поля. Якщо плазма перебуває в локальній термодинамічній рівновазі, її можна розглядати як звичайне стисливе середовище. Рівняння неперервності, руху та адіабатичний зв'язок $\delta p = c_s^2 \delta\rho$ після лінеаризації над однорідною рівновагою ($\rho_m = \rho_0 + \delta\rho$) дають

$$\frac{\partial \delta\rho}{\partial t} + \rho_0 \nabla \cdot \delta\mathbf{v} = 0, \qquad \rho_0 \frac{\partial \delta\mathbf{v}}{\partial t} = -\nabla \delta p, \tag{6.2}$$

$$\frac{\partial^2 \delta\rho}{\partial t^2} - c_s^2 \nabla^2 \delta\rho = 0, \qquad c_s^2 = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho_m}\right)_S = \frac{\gamma (p_e + p_i)}{\rho_m}. \tag{6.3}$$

Тут $p_e + p_i$ — повний тиск плазми, γ — показник адіабати (в одновимірному стисканні $\gamma = 3$, у тривимірному ізотропному $\gamma = 5/3$). Отже, звук виникає тому, що локальне стискання породжує зміну тиску, а зміна тиску породжує рух, який передає збурення сусіднім ділянкам.

Для плазми це лише перша сходинка: рідинна швидкість звуку з одним γ описує рівноважну двотемпературну плазму лише приблизно. На малих масштабах і при $T_e \neq T_i$ до руху частинок підключаються електричні поля, і виникає *іонно-звукова* хвиля з іншою дисперсією (розд. 6.8). Важливо, що електрони створюють тиск, а інерцію дають іони.




Рис. 6.2. Звукова хвиля як поширення чергувань стискання та розрідження: частинки коливаються вздовж напрямку поширення, а не «їдуть» разом із хвилею.

6.3. Лінеаризована МГД і загальне дисперсійне рівняння

Розглянемо ідеальну МГД (розд. 5) над рівноважним станом: однорідні ρ_0, p_0 і поле $\mathbf{B}_0 = B_0\hat{\mathbf{z}}$, швидкість $\mathbf{v}_0 = 0$. Лінеаризуємо рівняння неперервності, руху ($\mathbf{j}\times\mathbf{B}/c = (\nabla\times\mathbf{B})\times\mathbf{B}/4\pi$), індукції та адіабатичності, поклавши $\delta p = c_s^2\delta\rho$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial\delta\rho}{\partial t} &= -\rho_0\nabla\cdot\mathbf{v}, \qquad \frac{\partial\delta\mathbf{B}}{\partial t} = \nabla\times(\mathbf{v}\times\mathbf{B}_0), \\ \rho_0\frac{\partial\mathbf{v}}{\partial t} &= -c_s^2\nabla\delta\rho + \frac{1}{4\pi}(\nabla\times\delta\mathbf{B})\times\mathbf{B}_0. \end{aligned} \tag{6.4}$$

Для плоскої хвилі $\propto e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$ індукція дає $\delta\mathbf{B} = [\mathbf{B}_0(\mathbf{k}\cdot\mathbf{v}) - \mathbf{v}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{B}_0)]/\omega$, і після підстановки у рівняння руху (вектор $\mathbf{v}_A = \mathbf{B}_0/\sqrt{4\pi\rho_0}$)

$$\omega^2\mathbf{v} = (c_s^2 + v_A^2)\,\mathbf{k}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{v}) + (\mathbf{k}\cdot\mathbf{v}_A)\Big[(\mathbf{k}\cdot\mathbf{v}_A)\mathbf{v} - \mathbf{v}_A(\mathbf{k}\cdot\mathbf{v}) - \mathbf{k}(\mathbf{v}_A\cdot\mathbf{v})\Big]. \tag{6.5}$$

Це однорідна система для трьох компонент $\mathbf{v}$. Вона розпадається на дві задачі:

- $\mathbf{v}\perp$ площини $(\mathbf{k},\mathbf{B}_0)$: тоді $\mathbf{k}\cdot\mathbf{v}=0$ і $\mathbf{v}_A\cdot\mathbf{v}=0$, і маємо одну моду *альвенівську* $\omega^2 = (\mathbf{k}\cdot\mathbf{v}_A)^2$;
- $\mathbf{v}$ у площині $(\mathbf{k},\mathbf{B}_0)$: система 2×2 з умовою розв'язності

$$\omega^4 - k^2(c_s^2+v_A^2)\,\omega^2 + k^4 c_s^2 v_A^2\cos^2\theta = 0, \tag{6.6}$$

де θ — кут між $\mathbf{k}$ та $\mathbf{B}_0$. Вона дає дві магнітозвукові моди, *швидку* і *повільну*.

Покажемо кроки. Нехай $\mathbf{k} = k(\sin\theta, 0, \cos\theta)$, $\mathbf{v}_A = v_A\hat{\mathbf{z}}$, так що $\mathbf{k}\cdot\mathbf{v}_A = kv_A\cos\theta$. Розпишемо (6.5) за компонентами. *Компонента y*: $(\omega^2 - k^2v_A^2\cos^2\theta)\,v_y = 0$ — альвенівська мода, що відщеплюється. *Компоненти x, z*:

$$\begin{pmatrix} \omega^2 - k^2(v_A^2 + c_s^2\sin^2\theta) & -k^2c_s^2\sin\theta\cos\theta \\ -k^2c_s^2\sin\theta\cos\theta & \omega^2 - k^2c_s^2\cos^2\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_x \\ v_z \end{pmatrix} = 0.$$

Прирівнявши визначник до нуля, маємо $\omega^4 - \omega^2 k^2 (v_A^2 + c_s^2) + k^4 \big[(v_A^2 + c_s^2 \sin^2\theta) c_s^2 \cos^2\theta - c_s^4 \sin^2\theta \cos^2\theta\big] = 0$, де вираз у дужках дорівнює $v_A^2 c_s^2 \cos^2\theta$, тобто (6.6).

Отже, у однорідній ідеальній МГД є *три* хвильові гілки, і всі вони недисперсійні ($\omega \propto k$).

6.4. Альвенівська хвиля

Нехай $\mathbf{k} \parallel \mathbf{B}_0$, тоді $\mathbf{v}_\perp$ і $\delta\mathbf{B}_\perp$ задовольняють

$$\rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}_\perp}{\partial t} = \frac{B_0}{4\pi} \frac{\partial \delta\mathbf{B}_\perp}{\partial z}, \qquad \frac{\partial \delta\mathbf{B}_\perp}{\partial t} = B_0 \frac{\partial \mathbf{v}_\perp}{\partial z} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2 \mathbf{v}_\perp}{\partial t^2} = v_A^2 \frac{\partial^2 \mathbf{v}_\perp}{\partial z^2}, \tag{6.7}$$

$$\boxed{v_A = \frac{B_0}{\sqrt{4\pi\rho_0}}}, \qquad \omega = \pm k_\parallel v_A. \tag{6.8}$$

Це хвиля на «струні»: магнітний натяг $B_0^2/4\pi$ відіграє роль натягу, а масова густина — роль лінійної густини (рис. 6.3). Правий член у першому рівнянні — сила натягу $(\mathbf{B}_0 \cdot \nabla)\delta\mathbf{B}_\perp/4\pi$ з розкладу $\mathbf{j} \times \mathbf{B}/c = -\nabla(B^2/8\pi) + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{B}/4\pi$.




Рис. 6.3. Альвенівська хвиля: поперечне збурення поширюється вздовж магнітних силових ліній завдяки їхньому натягу.

Властивості, які легко перевірити за (6.5):

- хвиля *нестислива*: $\delta\rho = 0$ і $\delta|\mathbf{B}| = 0$ у лінійному наближенні;
- вона поперечна: $\mathbf{v} \perp \mathbf{B}_0$ і $\mathbf{v} \perp \mathbf{k}$; для хвилі, що біжить вздовж $+\mathbf{B}_0$, $\delta\mathbf{v}_\perp = -\delta\mathbf{B}_\perp/\sqrt{4\pi\rho_0}$ (співвідношення Валена); енергія розподілена порівну між кінетичною та магнітною;
- для похилого поширення $\omega = k\, v_A \cos\theta$, тобто фазова швидкість $v_A \cos\theta$ залежить від напрямку, а *групова швидкість* $\partial\omega/\partial\mathbf{k} = v_A \hat{\mathbf{b}}$ спрямована *завжди вздовж* поля. Енергія альвенівської хвилі поширюється лише вздовж силових ліній;
- швидкість визначається магнітним полем і густиною, а не температурою.

Це пояснює, чому збурення, створені, наприклад, спалахом на Сонці, «біжать» уздовж силових ліній у корону й сонячний вітер.

Типові значення альвенівської швидкості для різних плазм наведено в табл. 6.1. Скрізь $v_A \ll c$, але $v_A \gg c_s$ при $\beta \ll 1$.

Таблиця 6.1. Альвенівська швидкість у різних плазмах.

Плазма	B	n, см$^{-3}$	v_A
Токамак (D)	5 Тл	10^{14}	$7{,}7 \times 10^8$ см/с ($\approx c/40$)
Сонячна корона	10 Гс	10^9	$\sim 7 \times 10^7$ см/с (≈ 700 км/с)
Сонячний вітер	5 нТл	5	≈ 50 км/с

6.5. Магнітозвукові хвилі

У реальній замагніченій плазмі магнітний натяг не є єдиною відновлювальною силою. Якщо збурення стискає плазму, воно змінює не лише густину та тиск, а й величину магнітного поля. З рівняння (6.6)

$$v_\pm^2 = \frac{\omega^2}{k^2} = \frac{1}{2}\left[v_A^2 + c_s^2 \pm \sqrt{(v_A^2 + c_s^2)^2 - 4 v_A^2 c_s^2 \cos^2\theta}\right], \tag{6.9}$$

де знак «+» відповідає швидкій моді, а «−» — повільній. Розглянемо граничні випадки.

- $\theta = 90°$ (поширення поперек поля): швидка мода

$$v_{\mathrm{ms}} = \sqrt{c_s^2 + v_A^2}, \tag{6.10}$$

  повільна мода має нульову швидкість. Дві незалежні відновлювальні дії працюють одночасно: тиск плазми дає внесок c_s^2, а магнітний тиск — v_A^2. Плазма й поле стискаються разом (рис. 6.4).
- $\theta = 0°$ (уздовж поля): швидкості v_A і c_s; швидка мода є тією з них, що більша. Магнітозвукова хвиля при цьому вироджується в альвенівську (якщо $v_A > c_s$) чи звукову (якщо $c_s > v_A$).

Фізична різниця між швидкою та повільною модою: у швидкій δp і $\delta B^2/8\pi$ змінюються *у фазі* (сумарний тиск стискається найсильніше), у повільній — *в протифазі*, так що повний тиск $p + B^2/8\pi$ майже не змінюється, а рух відбувається переважно вздовж поля. Обидві моди *стисливі*.

Залежність фазових швидкостей від кута зручно подати на полярній діаграмі (діаграма Фрідріхса, рис. 6.5). Швидка мода майже ізотропна, повільна й альвенівська відсутні поперек поля.




Рис. 6.4. Швидка магнітозвукова хвиля, що поширюється поперек $\mathbf{B}_0$: стискання плазми супроводжується згущенням силових ліній, тому тиск плазми й магнітний тиск діють узгоджено.




Рис. 6.5. Фазові швидкості МГД-хвиль залежно від напрямку поширення відносно $\mathbf{B}_0$ (для $v_A = 1{,}5\,c_s$): швидка, повільна й альвенівська моди.

6.6. Три основні МГД-хвилі

Зведемо результати в одну таблицю.

Де вони трапляються: альвенівські хвилі — у сонячній короні, сонячному вітрі й токамаках (альвенівські власні моди); швидку магнітозвукову хвилю збуджують антенами для іонно-циклотронного нагріву в токамаках. Високочастотні хвилі (вістлери, X- і O-моди, гібридні резонанси) розглянемо в розд. 6.7.

Таблиця 6.2 дає корисну фізичну карту, але її не слід сприймати як остаточну класифікацію всіх плазмових хвиль. Ми розглядали лише МГД-моди — тобто довгохвильові та повільні процеси, для яких рідинний опис є достатнім. У термоядерній плазмі $\beta \sim 1$–3%, тому $v_A \gg c_s$ ($v_A \approx 7{,}7 \times 10^8$ проти $c_s \sim 10^8$ см/с), і швидка мода практично збігається з хвилею, що поширюється зі швидкістю v_A в усіх напрямках.

Таблиця 6.2. Основні хвильові моди в рідинному описі плазми.

Хвиля	Основна відновлювальна сила	Поляризація	Фазова швидкість
Звукова (без $\mathbf{B}_0$)	градієнт тиску	поздовжня	c_s
Альвенівська	магнітний натяг	поперечна, нестислива	$v_A \cos\theta$
Швидка магнітозвукова	тиск плазми + магнітний тиск (у фазі)	стискувальна	v_+
Повільна магнітозвукова	тиск плазми і магнітний тиск (у протифазі)	стискувальна, переважно вздовж $\mathbf{B}_0$	v_-

6.7. Хвилі в холодній замагніченій плазмі

МГД описує лише повільні рухи, $\omega \ll \omega_{ci}$. Для вищих частот (зокрема НВЧ-діапазону) використовують модель *холодної* замагніченої плазми: теплом нехтуємо, а кожен сорт s рухається в полі хвилі та сталому $\mathbf{B}_0$. Нехай $\Omega_s = q_s B_0/m_s c$ — циклотронна частота з урахуванням знака ($\Omega_e = -\omega_{ce}$). Відгук середовища описує тензор діелектричної проникності в стандартних позначеннях Стікса (вісь $z \parallel \mathbf{B}_0$).

Теоретичні відомості Нагадаємо з електродинаміки та оптики

Зі струму $\mathbf{j} = \hat\sigma\mathbf{E}$ і $\mathbf{D} = \hat\varepsilon\mathbf{E}$ (для залежності $e^{-i\omega t}$) $\hat\varepsilon = \hat 1 + 4\pi i\hat\sigma/\omega$. Рівняння Максвелла для плоскої хвилі дають $\mathbf{k}\times(\mathbf{k}\times\mathbf{E}) + (\omega^2/c^2)\hat\varepsilon\mathbf{E} = 0$, або для $\mathbf{N} = \mathbf{k}c/\omega$ (показник заломлення) $\mathbf{N}\times(\mathbf{N}\times\mathbf{E}) + \hat\varepsilon\mathbf{E} = 0$, де використано $\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})$. У незамагніченій плазмі $\hat\varepsilon = \varepsilon\hat 1$, $\varepsilon = 1 - \omega_p^2/\omega^2$ (розд. 2). *Відсікання*: $N \to 0$ (довжина хвилі $\to\infty$, хвиля відбивається); *резонанс*: $N \to \infty$ (довжина хвилі $\to 0$, хвиля поглинається).

Вивід тензора. Для сорту s рівняння руху холодних частинок

$$-i\omega m_s\mathbf{v} = q_s\Big(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{v}\times\mathbf{B}_0}{c}\Big).$$

Покомпонентно, при $\Omega_s = q_sB_0/m_sc$:

$$-i\omega v_x = \frac{q_s}{m_s}E_x + \Omega_s v_y, \qquad -i\omega v_y = \frac{q_s}{m_s}E_y - \Omega_s v_x.$$

Складемо колові комбінації $v_\pm = v_x \pm iv_y$, $E_\pm = E_x \pm iE_y$ — вони розв'язують систему окремо:

$$v_\pm = \frac{iq_s}{m_s}\,\frac{E_\pm}{\omega \mp \Omega_s}, \qquad v_z = \frac{iq_s}{m_s\omega}E_z.$$

Тоді $\mathbf{j} = \sum_s n_s q_s \mathbf{v}_s$, $\sigma_\pm = \sum_s i n_s q_s^2/[m_s(\omega \mp \Omega_s)]$, і $\varepsilon_\pm = 1 + 4\pi i\sigma_\pm/\omega$ дає

$$\varepsilon_\mp = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega(\omega \pm \Omega_s)}, \qquad P = \varepsilon_{zz} = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega^2}.$$

Отже, $R \equiv \varepsilon_-$ і $L \equiv \varepsilon_+$ — відгуки на *колові* складові поля, а резонанс у R ($\omega = -\Omega_e = \omega_{ce}$) чи в L ($\omega = \Omega_i = \omega_{ci}$) виникає, коли поле обертається разом із частинкою. Назви S, D, P: $Sum = (R+L)/2$, $Difference = (R-L)/2$, $Plasma$; недіагональні елементи $\mp iD$ виражають обертання електрона навколо $\mathbf{B}_0$. Результат:

$$\hat{\varepsilon} = \begin{pmatrix} S & -iD & 0 \\ iD & S & 0 \\ 0 & 0 & P \end{pmatrix}, \quad S = \frac{R+L}{2},\ D = \frac{R-L}{2}, \tag{6.11}$$

$$R = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega(\omega + \Omega_s)}, \quad L = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega(\omega - \Omega_s)}, \quad P = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega^2}. \tag{6.12}$$

Хвильове рівняння для $\mathbf{E}$ у змінних $\mathbf{N} = \mathbf{k}c/\omega$ має вигляд $\mathbf{N}\times(\mathbf{N}\times\mathbf{E}) + \hat{\varepsilon}\mathbf{E} = 0$. Зручні два граничних кути.

Поширення вздовж поля ($\theta = 0$). Поперечні хвилі розпадаються на дві кругові поляризації: $N^2 = R$ (права, обертання в той самий бік, що й електрони) і $N^2 = L$ (ліва, у бік іонів); поздовжня хвиля має $P = 0$, тобто $\omega = \omega_p$ (розд. 2.1). *Чому резонанс.* Вектор $\mathbf{E}$ R-хвилі обертається в той самий бік, що й електрони навколо $\mathbf{B}_0$ (напрям відраховують від $\mathbf{B}_0$, а не від $\mathbf{k}$). При $\omega = \omega_{ce}$ електрон «бачить» стале поле й необмежено прискорюється — як гойдалка, яку штовхають у такт (циклотронний резонанс з розд. 3). Для L-хвилі так само з іонами. Особливості дисперсійних кривих (рис. 6.6):

- *резонанси*: $R \to \infty$ при $\omega = \omega_{ce}$ (електронний циклотронний резонанс, ЕЦР) і $L \to \infty$ при $\omega = \omega_{ci}$ (іонний, ІЦР); у резонансі хвиля передає енергію частинкам, що обертаються синхронно з її полем: на цьому ґрунтується нагрівання плазми;
- *відсікання*: $N^2 = 0$ при $\omega_{R,L} = \frac{1}{2}\left[\sqrt{\omega_{ce}^2 + 4\omega_{pe}^2} \pm \omega_{ce}\right]$ (для електронної плазми); нижче $\omega_{R,L}$ хвиля не поширюється;
- *вістлер* (свистяча хвиля): для $\omega_{ci} \ll \omega \ll \omega_{ce}$ та $\omega_{pe}^2 \gg \omega\omega_{ce}$ маємо $R \approx \omega_{pe}^2/\omega\omega_{ce}$, тому

$$\boxed{\omega = \frac{k^2 c^2\, \omega_{ce}}{\omega_{pe}^2}\ \cos\theta} \quad (\text{біля } \theta = 0). \tag{6.13}$$

Дисперсія квадратична: $v_g = 2v_\varphi \propto \sqrt{\omega}$, тож високі частоти біжать швидше за низькі. Саме це створює «падаючий свист», який чують радіоаматори після блискавки, коли імпульс поширюється магнітосферою вздовж силової лінії.




Рис. 6.6. Дисперсія R- і L-хвиль уздовж $\mathbf{B}_0$ в холодній електронній плазмі ($\omega_{ce} = \omega_{pe}$). Нижня гілка R-моди — вістлер, що асимптотично наближається до ω_{ce}.

Поширення поперек поля ($\theta = 90°$). Тут моди розділяються за напрямком $\mathbf{E}$ щодо $\mathbf{B}_0$. Геометрично: в O-моді електрони рухаються вздовж поля й «не відчувають» його; в X-моді рух еліптичний, з'являється складова $E_x \parallel \mathbf{k}$ (хвиля частково поздовжня). Верхній гібридний резонанс $\omega_{UH}^2 = \omega_{pe}^2 + \omega_{ce}^2$ зрозумілий як сума двох відновлювальних сил (поле розділення зарядів і сила Лоренца), як дві пружини; для нижнього гібридного резонансу так само, але з участю іонів.

- *Звичайна (O) мода*, $\mathbf{E} \parallel \mathbf{B}_0$: поле не змушує електрони обертатися, тому $N^2 = P = 1 - \omega_{pe}^2/\omega^2$ (відсікання на $\omega = \omega_{pe}$, як без поля). Цю моду використовують для зондування густини у токамаках.
- *Незвичайна (X) мода*, $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}_0$: поляризація змішана (поздовжня + поперечна), $N^2 = RL/S$. Резонанс $S = 0$ дає *верхній гібридний* резонанс

$$\omega_{UH}^2 = \omega_{pe}^2 + \omega_{ce}^2, \tag{6.14}$$

а при $\omega \sim \sqrt{\omega_{ci}\omega_{ce}}$ — *нижній гібридний*: $\omega_{LH}^{-2} \simeq \omega_{pi}^{-2} + (\omega_{ci}\omega_{ce})^{-1}$. Нижньогібридні хвилі застосовують для керування струмом у токамаках.

Приклад: для $n_e = 10^{14}$ см$^{-3}$, $B = 5 \times 10^4$ Гс маємо $f_{pe} \approx 90$ ГГц, $f_{ce} \approx 140$ ГГц, $f_{UH} \approx 166$ ГГц. Мікрохвильове нагрівання на частоті 140 ГГц здійснюють на ЕЦР: O-мода основної гармоніки поширюється в плазмі, бо $\omega_{pe} < \omega$. Альтернатива — X-мода другої гармоніки ($\omega = 2\omega_{ce}$): вона поглинається сильніше й дозволяє той самий гіротрон використати при вдвічі меншому полі, але її відсікання настає вже при $\omega_{pe}^2 = \omega^2/2$, тобто при вдвічі меншій густині, ніж для O-моди. Оскільки в токамаку $B \propto 1/R$, шар $\omega = \omega_{ce}(R)$ — вузька поверхня на певному радіусі, що дозволяє локалізувати нагрів (задача 6.8). Повну діаграму Клеммова–Малея–Ендрюса (СМА), яка показує, куди хвиля може дійти за заданих n і B, ми опускаємо; її можна знайти в монографії Стікса та в курсі Чена (§4.18).

Як це вимірюють: обертання Фарадея. Лінійно поляризована хвиля, що йде вздовж $\mathbf{B}_0$, є сумою R- і L-хвиль, які мають різні показники заломлення $N_R \neq N_L$. Через набіг різниці фаз вони повертають площину поляризації. Для $\omega \gg \omega_{pe}, \omega_{ce}$ з (6.12) $N_{R,L} \simeq 1 - \dfrac{\omega_{pe}^2}{2\omega^2}\left(1 \pm \dfrac{\omega_{ce}}{\omega}\right)$, тож кут повороту

$$\boxed{\psi = \frac{\omega}{2c}\int (N_R - N_L)\,dl = \frac{e^3\lambda^2}{2\pi m_e^2 c^4}\int n_e B_\parallel\,dl \approx 2{,}6\times 10^{-17}\lambda^2 \int n_e B_\parallel\,dl} \tag{6.15}$$

(СГС: λ і l у см, n_e у см$^{-3}$, $B_\parallel$ у Гс; ψ у радіанах). Оскільки $\psi \propto \int n B_\parallel\,dl$, поєднання з інтерферометром (фаза $\propto \int n\,dl$, розд. 2.8) дає $\int B_\parallel\,dl$, тобто інформацію про поле *всередині* плазми, зокрема про полоїдальне поле й розподіл струму в токамаку. У астрофізиці той самий ефект ($\psi \propto \lambda^2$) дає магнітне поле міжзоряного середовища за пульсарами. Числову оцінку для токамака див. у задачі 6.7. Метод вимагає $\omega \gg \omega_{pe}, \omega_{ce}$; для косих променів до обертання Фарадея додається ефект Коттона–Мутона (двопроменезаломлення при $\mathbf{k} \perp \mathbf{B}_0$).

6.8. Іонно-звукова хвиля

Розглянемо поздовжню низькочастотну хвилю в плазмі без поля, у якій інерція належить іонам, а електрони встигають встановити больцманівський розподіл (повільні, $\omega \ll k v_{Te}$). Лінеаризуємо: електрони $n_{e1}/n_0 = e\varphi/T_e$; холодні іони $-i\omega m_i v = -ik\,e\varphi$, $n_{i1}/n_0 = kv/\omega$; рівняння Пуассона $k^2\varphi = 4\pi e(n_{i1} - n_{e1})$. Звідси $\omega^2 = k^2(T_e/m_i)/(1 + k^2\lambda_{De}^2)$; урахува-

ння тиску іонів і заряду Z дає загальний вигляд

$$\boxed{\omega^2 = \frac{k^2 c_s^2}{1 + k^2 \lambda_{De}^2}}, \qquad c_s^2 = \frac{ZT_e + 3T_i}{m_i}, \tag{6.16}$$

де доданок $3T_i$ враховує тиск іонів (адіабата одновимірного стискання), Z — заряд іона (для водню $Z = 1$), а ізотермічні електрони дають ZT_e. При $T_i \ll T_e$ це та сама швидкість, що в критерії Бома (розд. 1.9), і це не випадковість: іони мають входити в шар зі швидкістю не меншою за c_s, щоб потенціал у шарі спадав монотонно, без осциляцій. При $k\lambda_{De} \ll 1$ маємо $\omega = kc_s$: звук, швидкість якого визначає *електронна* температура ($T_e \gg T_i$) і *іонна* маса; при $k\lambda_{De} \gtrsim 1$ частота виходить на ω_{pi}. Така хвиля існує вже в дворідинному описі, а кінетика (розд. 7.9) визначає лише її *загасання*. Декремент $\gamma/\omega \approx -\sqrt{\pi/8}\left[\sqrt{m_e/m_i} + (T_e/T_i)^{3/2} e^{-T_e/2T_i - 3/2}\right]$ малий лише за $T_e \gg T_i$; при $T_e \sim T_i$ хвиля сильно загасає на іонах, і її не спостерігають.

6.9. Межі застосовності МГД-хвиль

Для того щоб МГД-опис хвиль був виправданим, хвиля повинна бути достатньо повільною та великомасштабною порівняно з мікроскопічними процесами:

- $\omega \ll \omega_{ci}$ (інакше з'являються ІЦР та L-мода);
- $k_\perp r_{Li} \ll 1$ (інакше важливий скінченний ларморівський радіус; при $k_\perp r_{Li} \sim 1$ альвенівська хвиля переходить у кінетичну альвенівську);
- $k\,c/\omega_{pi} \ll 1$, тобто довжина хвилі велика порівняно з іонною інерційною довжиною $d_i = c/\omega_{pi}$ (інакше істотні холівські ефекти: вістлери);
- для безколізійної плазми додатково враховують загасання Ландау повільної моди та анізотропію тиску.

Якщо ж $k_\perp r_L \sim 1$, $\omega \sim \omega_c$ або важливі резонансні частинки, треба повернутися до функції розподілу $f_s(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$. МГД-хвилі є не окремими об'єктами, а граничним випадком кінетичної картини (рис. 6.7): кінетичний опис має відтворити їх у межі $k_\perp r_L \to 0$, $\omega \ll \omega_{ci}$.

Перехід від МГД до кінетики — це перехід *від руху середовища до руху частинок, що утворюють це середовище*. Саме це ми й зробимо в розд. 7.

Головне в розділі

- Хвиля виникає тоді, коли збурення породжує відновлювальну силу та може передаватися від однієї ділянки середовища до іншої.
- У плазмі відновлювальну дію можуть створювати тиск плазми, магнітний натяг та магнітний тиск.




Рис. 6.7. Схематичний зв'язок між кінетичним і МГД-описами хвиль. МГД-хвилі є великомасштабною межею загальної кінетичної картини.

- Лінеаризація ідеальної МГД дає три гілки: альвенівську ($\omega = k v_A \cos\theta$) та швидку й повільну магнітозвукові (6.9). Енергія альвенівської хвилі поширюється вздовж $\mathbf{B}_0$.
- Для $\omega \gtrsim \omega_{ci}$ потрібна модель холодної замагніченої плазми: R-, L-, O-, X-моди, резонанси (ω_{ce}, ω_{ci}, ω_{UH}, ω_{LH}) та відсікання.
- Іонно-звукова хвиля $\omega = k c_s / \sqrt{1 + k^2 \lambda_{De}^2}$ існує за $T_e \gg T_i$; її загасання кінетичне.
- МГД описує лише частину спектра плазмових хвиль. На малих масштабах та поблизу характерних частот руху частинок потрібен кінетичний опис.

Задачі

6.1. Для дейтерієвої плазми токамака ($n_i = 10^{14}$ см$^{-3}$, $B = 5\times10^4$ Гс, $T_e = T_i = 10$ кеВ) знайдіть v_A, c_s (з формули для іонного звуку) і час проходу альвенівської хвилі вздовж малого радіуса $a = 2$ м. Порівняйте v_A з v_{Ti}. *Відповідь:* $v_A \approx 7{,}7 \times 10^8$ см/с (дейтерій), $c_s \approx 1{,}4 \times 10^8$ см/с, $v_{Ti} \sim 10^8$ см/с — $v_A \gg v_{Ti}$; час проходу $a/v_A \approx 2{,}6 \times 10^{-7}$ с.

6.2. Покажіть, що рівняння (6.5) для $\mathbf{k} \perp \mathbf{B}_0$ і $\mathbf{v} \parallel \mathbf{k}$ дає $\omega^2 = k^2(c_s^2 + v_A^2)$. Знайдіть границі швидкостей швидкої й повільної

мод при $\theta \to 0$ для $v_A > c_s$ та $v_A < c_s$. *Відповідь:* при $\theta \to 0$ $v_+ \to \max(v_A, c_s)$, $v_- \to \min(v_A, c_s)$: для $v_A > c_s$ швидка мода переходить в альвенівську, а повільна — у звук; для $v_A < c_s$ — навпаки.

6.3. Вістлерний імпульс від блискавки проходить уздовж силової лінії довжиною $L \approx 10^{10}$ см. Для $f_{ce} = 1$ МГц, $f_{pe} = 5$ МГц знайдіть групову швидкість на частотах $0{,}1\, f_{ce}$ і $0{,}2\, f_{ce}$ і різницю часів приходу. Порівняйте з реальним свистом (секунди). *Відповідь:* $v_g \approx 2c\sqrt{\omega\omega_{ce}}/\omega_{pe} \approx 3{,}8 \times 10^9$ і $5{,}4 \times 10^9$ см/с; час проходу $\approx 2{,}6$ і $1{,}9$ с, $\Delta t \approx 0{,}8$ с.

6.4. Для $n_e = 5{\times}10^{13}$ см$^{-3}$, $B = 3{\times}10^4$ Гс (водень) знайдіть f_{pe}, f_{ce}, f_{UH} і f_{LH}. Чи може X-мода з частотою f_{ce} потрапити в центр плазми? *Відповідь:* $f_{pe} \approx 63$ ГГц, $f_{ce} \approx 84$ ГГц, $f_{UH} \approx 105$ ГГц; $f_{ci} \approx 46$ МГц, $f_{pi} \approx 1{,}5$ ГГц, $f_{LH} \approx 1{,}2$ ГГц. З боку слабкого поля X-мода спершу натрапляє на відсікання $\omega = \omega_R$ і відбивається; запущена з боку сильного поля, вона доходить до резонансу.

6.5. Знайдіть альвенівську швидкість для: іоносфери (O^+, $n \sim 10^5$ см$^{-3}$, $B \sim 0{,}3$ Гс), сонячної корони (H^+, $n \sim 10^8$ см$^{-3}$, $B \sim 1$ Гс) і міжзоряного середовища ($n \sim 1$ см$^{-3}$, $B \sim 3 \times 10^{-6}$ Гс). *Відповідь:* ≈ 520 км/с; ≈ 220 км/с; $\approx 6{,}5$ км/с.

6.6. Врахувавши скінченну провідність ($\omega^2 = k^2 v_A^2 - i\omega k^2 \nu_m$, $\nu_m = c^2/4\pi\sigma$), покажіть, що слабке просторове загасання альвенівської хвилі $\operatorname{Im} k = \omega^2 \nu_m/(2v_A^3)$. Чому така хвиля в короні Сонця дисипує вкрай повільно? *Відповідь:* у короні ($T \sim 100$ еВ) спітцерівська $\nu_m \sim 10^4$ см^2/с; для $\omega \sim 10^{-2}$ с$^{-1}$ і $v_A \sim 7 \times 10^7$ см/с довжина загасання $1/\operatorname{Im} k \sim 10^{24}$ см $\gg R_\odot$. Дисипація можлива лише на дуже малих масштабах (фазове перемішування, турбулентний каскад).

6.7. Оцініть кут фарадеївського обертання площини поляризації електромагнітної хвилі з $\lambda = 0{,}02$ см (200 мкм, $f = 1{,}5$ ТГц) у токамаку ($n = 10^{14}$ см$^{-3}$, полоїдальне поле вздовж хорди $B_\parallel = 0{,}5$ Тл, шлях 1 м). Використайте $\psi = 2{,}6 \times 10^{-13} \lambda^2 \int n B_\parallel\, dl$ (СІ: λ в м, n в м$^{-3}$, B в Тл, dl в м). Перевірте, що $\omega \gg \omega_{pe}, \omega_{ce}$. *Відповідь:* $f_{pe} \approx 90$ ГГц, $f_{ce} \lesssim 140$ ГГц $\ll 1{,}5$ ТГц; $\psi \approx 0{,}53$ рад $\approx 30°$.

6.8. Поле токамака $B(R) = B_0 R_0/R$, $B_0 = 6$ Тл при $R_0 = 3$ м. На якому радіусі поглинається потужність гіротрона 140 ГГц на основній гармоніці електронного циклотронного резонансу ($f_{ce} = 28\, B$[Тл] ГГц)? *Відповідь:* $B = 5$ Тл, $R = B_0 R_0/B = 3{,}6$ м.

6.9. Знайдіть швидкість іонного звуку в водневій плазмі з $T_e = 10$ еВ, $T_i \ll T_e$. При якому $k\lambda_{De}$ частота іонного звуку відрізняється від kc_s на 10 %? *Відповідь:* $c_s \approx 3{,}1 \times 10^6$ см/с; $k\lambda_{De} \approx 0{,}48$.

Контрольні питання

1. Що таке відновлювальна сила? Чому без неї не виникає хвильове поширення збурення?
2. Чим фізично відрізняються звукова та альвенівська хвилі?
3. Чому альвенівська швидкість залежить від B та ρ_m, але не визначається температурою плазми? У якому напрямку поширюється енергія альвенівської хвилі?
4. Яка роль магнітного тиску у магнітозвуковій хвилі? Чим відрізняються швидка й повільна моди?
5. Чому при довільному напрямку поширення виникають дві магнітозвукові моди?
6. Що таке резонанс і відсікання для R- та L-хвиль? Чому вістлер має квадратичну дисперсію?
7. Чому іонний звук існує за $T_e \gg T_i$ і сильно загасає за $T_e \sim T_i$?
8. Що відбувається з МГД-описом, коли довжина хвилі стає порівнянною з мікроскопічними масштабами плазми?
9. Чому обертання Фарадея дає інформацію про магнітне поле всередині плазми?
10. Чому O-мода не відчуває магнітного поля?
11. Чому альвенівська хвиля в короні Сонця дисипує вкрай повільно (задача 6.6)?
12. Чому альвенівська хвиля не змінює густину плазми?

7 Кінетичний опис плазми

Рідинний опис виникає після усереднення руху великої кількості частинок. Але іноді самого середнього значення швидкості недостатньо. Дві плазми можуть мати однакові густину n та середню швидкість $\mathbf{v}$, але різні розподіли частинок за швидкостями, а отже по-різному реагувати на хвилі, зіткнення та нестійкості.

Кінетичний опис зберігає інформацію про те, як частинки розподілені не лише в координатному просторі, а й у просторі швидкостей. Це особливо важливо тоді, коли характер процесу визначається невеликою частиною частинок із певними швидкостями: наприклад, при резонансній взаємодії з хвилею. Рідинні величини в такому разі вже можуть не містити достатньої інформації.

7.1. Функція розподілу та фазовий простір

Для кожного сорту частинок s вводять *функцію розподілу* $f_s(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$. Вона визначена у шестимірному фазовому просторі $(\mathbf{r}, \mathbf{v})$ і часі. Величина

$$f_s(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)\, d^3r\, d^3v$$

є середнім числом частинок виду s, які в момент часу t перебувають у елементі фазового простору $d^3r\, d^3v$.

На відміну від концентрації, функція f_s містить інформацію про розподіл частинок за швидкостями. Концентрація є її нульовим моментом,

$$n_s(\mathbf{r}, t) = \int f_s(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)\, d^3v, \tag{7.1}$$

а середня швидкість визначається першим моментом,

$$n_s \mathbf{v}_s = \int \mathbf{v} f_s\, d^3v. \tag{7.2}$$

Знання тільки n_s та $\mathbf{v}_s$ не відновлює функцію розподілу. У цьому полягає одна з головних відмінностей кінетичного опису від рідинного: кінетична теорія зберігає значно більше інформації про мікроскопічний стан плазми.

7.2. Моменти функції розподілу

Середня швидкість характеризує рух центра розподілу. Для опису хаотичного руху введемо відносну швидкість

$$\mathbf{c} = \mathbf{v} - \mathbf{v}_s.$$

Тоді тензор тиску визначається другим центральним моментом:

$$P_{s,ij} = m_s \int (v_i - v_{s,i})(v_j - v_{s,j}) f_s \, d^3v. \tag{7.3}$$

У загальному випадку P_s є тензором, а не скаляром. Якщо розподіл ізотропний, усі напрямки еквівалентні й

$$P_{s,ij} = p_s \delta_{ij}. \tag{7.4}$$

Скалярний тиск тоді пов'язаний із другим центральним моментом:

$$p_s = \frac{m_s}{3} \int c^2 f_s \, d^3v. \tag{7.5}$$

Для ізотропного розподілу температуру сорту s означимо як $T_s \equiv (m_s/3n_s) \int c^2 f_s \, d^3v$, звідки $p_s = n_s T_s$; фізично — це середня енергія хаотичного руху частинок (T в енергетичних одиницях). У неізотропній плазмі природніше говорити окремо про тиск поперек і вздовж магнітного поля, $p_\perp$ та $p_\parallel$. Саме тому кінетичний опис потрібний там, де анізотропія розподілу є істотною.

Із моментів можна побудувати також густину кінетичної енергії частинок,

$$w_s = \frac{m_s}{2} \int v^2 f_s \, d^3v. \tag{7.6}$$

Після розкладання $\mathbf{v} = \mathbf{v}_s + \mathbf{c}$ вона містить дві частини: енергію впорядкованого руху та енергію хаотичного руху. Саме друга частина пов'язана з температурою і тиском.

7.3. Кінетичне рівняння

Еволюцію функції розподілу визначає кінетичне рівняння. У беззіткнювальній плазмі воно має вигляд рівняння Власова:

$$\frac{\partial f_s}{\partial t} + \mathbf{v}\cdot\nabla f_s + \frac{q_s}{m_s}\left(\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{v}\times\mathbf{B}\right)\cdot\nabla_{\mathbf{v}} f_s = 0. \tag{7.7}$$

Перший доданок описує зміну розподілу з часом, другий — його перенесення в координатному просторі, а третій — зміну швидкостей під дією сили Лоренца.

Рівняння можна записати компактніше через повну похідну вздовж траєкторії частинки:

$$\frac{df_s}{dt} = 0. \tag{7.8}$$

Це не означає, що f_s не змінюється в просторі або в часі. Йдеться про те, що вздовж фазової траєкторії, визначеної рівняннями руху частинки, значення функції розподілу зберігається. Фізично це є законом збереження числа частинок у фазовому просторі.

Теоретичні відомості Нагадаємо з теоретичної механіки

Теорема Ліувілля: для гамільтонової системи фазовий об'єм $d^3r\,d^3p$, що рухається разом з частинками, зберігається; у нерелятивістському випадку $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$, тож те саме справджується для $d^3r\,d^3v$. Звідси випливає вивід рівняння Власова. Частинки не народжуються й не зникають, тому в 6-вимірному фазовому просторі $(\mathbf{r},\mathbf{v})$ виконується рівняння неперервності

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \nabla_{\mathbf{r}}\cdot(\mathbf{v}f) + \nabla_{\mathbf{v}}\cdot\left(\frac{\mathbf{F}}{m}f\right) = 0.$$

Оскільки $\mathbf{r}$ і $\mathbf{v}$ — незалежні змінні, $\nabla_{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{v} = 0$; для сили Лоренца $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B}/c)$ маємо $\nabla_{\mathbf{v}}\cdot\mathbf{F} = 0$ (бо $\nabla_{\mathbf{v}}\cdot(\mathbf{v}\times\mathbf{B}) = 0$, а $\mathbf{E}$ від $\mathbf{v}$ не залежить). Тому $\mathbf{v}$ і $\mathbf{F}$ виносяться з дивергенції, і виходить (7.7), тобто $df/dt = 0$ вздовж траєкторії — теорема Ліувілля.

Якщо зіткнення важливі, рівняння набуває форми

$$\frac{\partial f_s}{\partial t} + \mathbf{v}\cdot\nabla f_s + \frac{q_s}{m_s}\left(\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{v}\times\mathbf{B}\right)\cdot\nabla_{\mathbf{v}} f_s = C_s[f]. \tag{7.9}$$

Оператор $C_s[f]$ описує зміну функції розподілу внаслідок зіткнень. Найпростіша модель — БГК: $C[f] = -\nu(f - f_M)$, де f_M — максвеллівський розподіл; зіткнення «тягнуть» розподіл до максвеллівського з характерним часом $1/\nu$ (ν — характерна частота зіткнень, для електронів порядку $\nu_{ei} + \nu_{ee}$, див. розд. 4). Для слабкозв'язаної плазми кулонівська взаємодія далекодіюча, тому проста модель зіткнення

двох твердих кульок не є адекватною: зіткнення визначається великою кількістю слабких кулонівських відхилень.

Таким чином, рівняння Власова та кінетичне рівняння зіткнювальної плазми відрізняються саме способом урахування взаємодії між частинками. У першому випадку основною є самоузгоджена електромагнітна взаємодія, у другому додається кінетичний ефект зіткнень.

7.4. Максвеллівський розподіл і температура

Найпростішим прикладом функції розподілу є локальний максвеллівський розподіл. Для частинок маси m, концентрації n та температури T він має вигляд

$$f_M(\mathbf{v}) = n\left(\frac{m}{2\pi T}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{m(\mathbf{v}-\mathbf{u})^2}{2T}\right]. \tag{7.10}$$

Тут $\mathbf{u}$ є середньою швидкістю. Розподіл має максимум при $\mathbf{v} = \mathbf{u}$, а його ширина визначається температурою. Чим вища T, тим більша частка частинок має великі теплові швидкості.

Для максвеллівського розподілу

$$\langle c^2 \rangle = \frac{3T}{m}, \tag{7.11}$$

тому характерну теплову швидкість зручно визначити як

$$v_T = \sqrt{\frac{T}{m}}. \tag{7.12}$$

Обережно з означеннями. Розподіл можна записати в трьох формах: одновимірний $F(v_x) \propto e^{-mv_x^2/2T}$, тривимірний $f(\mathbf{v})$ і розподіл за модулем швидкості $4\pi v^2 f(v)$. Відповідно існують три «теплові швидкості»: найімовірніша $\sqrt{2T/m}$ (максимум $4\pi v^2 f$), середня $\sqrt{8T/\pi m}$ і середньоквадратична $\sqrt{3T/m}$ (задача 7.4). Різні підручники називають «тепловою» різні з них (часто $\sqrt{2T/m}$, як у Чена), що дає розбіжності на множник $\sqrt{2}$. У цій книзі $v_T = \sqrt{T/m}$ всюди.

У плазмі електрони та іони не зобов'язані мати однакові температури:

$$T_e \neq T_i.$$

Різні сорти частинок можуть обмінюватися енергією через зіткнення, але цей обмін не обов'язково відбувається настільки швидко, щоб встановити спільну температуру. Тому T_e та T_i слід розглядати як окремі характеристики, якщо це випливає з умов задачі.

У слабо зіткнювальній або беззіткнювальній плазмі розподіл може істотно відхилятися від максвеллівського. Тоді однієї температури вже недостатньо для повного опису кінетичного стану.

7.5. Від кінетики до гідродинаміки

Рідинні рівняння можна отримати з кінетичного рівняння, якщо замінити повну функцію розподілу набором її моментів. Це робить особливо наочним зв'язок між кінетичним, дворідинним та однорідинним описами.

Помножимо рівняння Власова на одиницю та проінтегруємо за швидкостями. За умови достатньо швидкого спадання f_s при $v \to \infty$ інтеграл від похідної за швидкістю перетворюється на поверхневий інтеграл, який зникає. Отримуємо

$$\frac{\partial n_s}{\partial t} + \nabla \cdot (n_s \mathbf{v}_s) = 0. \tag{7.13}$$

Це рівняння неперервності для кожного сорту частинок.

Тепер помножимо кінетичне рівняння на $m_s\mathbf{v}$ та проінтегруємо. Розберемо доданки. Перший дає $m_s \partial_t (n_s \mathbf{v}_s)$. Другий: $\nabla \cdot \int m_s \mathbf{v}\mathbf{v} f \, d^3v$, де з розкладом $\mathbf{v} = \mathbf{v}_s + \mathbf{c}$ ($\mathbf{c}$ — хаотична швидкість, $\int \mathbf{c} f \, d^3v = 0$) маємо $\int \mathbf{v}\mathbf{v} f \, d^3v = n_s \mathbf{v}_s \mathbf{v}_s + \int \mathbf{c}\mathbf{c} f \, d^3v$, тобто $m_s n_s \mathbf{v}_s \mathbf{v}_s + \mathsf{P}_s$. Третій — ключовий: інтегруємо частинами за швидкостями,

$$\int v_i \, \mathbf{a} \cdot \nabla_{\mathbf{v}} f \, d^3v = -\int f \, \frac{\partial (v_i a_j)}{\partial v_j} \, d^3v = -\int f \, a_i \, d^3v = -n_s a_i,$$

де $\mathbf{a} = (q_s/m_s)(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}/c)$; поверхневі члени зникають через спад $f \to 0$ при $|\mathbf{v}| \to \infty$, а $\partial_{v_j} (\mathbf{v} \times \mathbf{B})_j = 0$. Підставивши й скориставшись (7.13), щоб скоротити доданки з $\partial_t n_s$ і $\nabla \cdot (n_s \mathbf{v}_s)$, дістаємо рівняння руху

$$m_s n_s \left(\frac{\partial \mathbf{v}_s}{\partial t} + \mathbf{v}_s \cdot \nabla \mathbf{v}_s \right) = q_s n_s \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v}_s \times \mathbf{B} \right) - \nabla \cdot \mathsf{P}_s + \mathbf{R}_s. \tag{7.14}$$

Тут $\mathbf{R}_s$ описує передачу імпульсу між різними сортами частинок. У беззіткнювальній моделі цей член відсутній.

Рівняння показує важливу річ: електромагнітна сила діє на середній рух, але внутрішня кінетика частинок входить через тензор тиску P_s. Тому просте скалярне рівняння стану $p = p(n, T)$ є вже додатковим припущенням, а не прямим наслідком кінетичного рівняння.

Якщо перейти до наступного моменту, виникає рівняння для потоку енергії. У ньому з'являються моменти вищого порядку. Отже, виникає *ієрархія моментів*:

$$f_s \longrightarrow (n_s, \mathbf{v}_s, \mathsf{P}_s) \longrightarrow \text{потік енергії} \longrightarrow \text{вищі моменти} \longrightarrow \cdots$$

Ієрархія сама по собі не замикається: рівняння для моменту порядку N містить момент порядку $N+1$. Щоб отримати скінченну систему рідинних рівнянь, необхідне *замикання*. Прикладами є припущення про ізотропний тиск, рівняння стану, адіабатичний зв'язок або задану теплопровідність.

Тому ланцюжок переходу між рівнями опису має вигляд

$$\boxed{f_s(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) \longrightarrow (n_s, \mathbf{v}_s, \mathsf{P}_s, \ldots) \longrightarrow \text{дворідинна модель} \longrightarrow \text{МГД.}} \tag{7.15}$$

Кожна стрілка означає не просто зміну позначень, а втрату частини інформації та введення певних припущень.

7.6. Дворідинна картина та її зв'язок із МГД

Для плазми з електронів та іонів кінетичне рівняння записують окремо для кожного сорту, а моменти дають дві системи рідинних рівнянь зі своїми n_s, $\mathbf{v}_s$, P_s (дворідинний опис). Їхнє додавання й віднімання, яке зводить дворідинну модель до однорідинної МГД (рівняння руху центра мас, узагальнений закон Ома, струм $\mathbf{j} = en_e(\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_e)$), виконано в розд. 5; тут важливо лише, що ця різниця швидкостей губиться при переході до однієї середньої швидкості, і тому МГД не може описати ефекти, чутливі до окремого руху електронів та іонів.

7.7. Перший міст між кінетикою та рідинним описом: дисперсія Ленгмюра

Рідинний вивід поправки Бома — Гросса $\omega^2 \simeq \omega_{pe}^2 + 3k^2 v_{Te}^2$ наведено в розд. 2.4; там показник 3 виникає як адіабата одновимірного стиснення. Кінетичний вивід (див. нижче, (7.28)) показує, що ця формула справедлива лише при $\omega/k \gg v_{Te}$, тобто для довгих хвиль, $k\lambda_{De} \ll 1$. Поправка пов'язана з тепловим рухом електронів, а за $k\lambda_{De} \gtrsim 0{,}3$ виникає ще й загасання Ландау, якого рідинна модель не передбачає.

7.8. Лінеаризація кінетичного рівняння та хвильовий відгук

До цього моменту ми розглядали функцію розподілу як спосіб описати стан плазми та її еволюцію в часі. Тепер поставимо інше

питання: *що відбувається з плазмою, якщо її трохи відхилити від рівноваги?*

Це питання є природним продовженням теорії хвиль. У рідинному описі ми вже бачили, що мале відхилення густини, швидкості або магнітного поля може поширюватися в плазмі у вигляді хвилі. У кінетичному описі треба поставити те саме питання безпосередньо для функції розподілу.

Що означає хвиля в кінетичному описі?. Нехай плазма перебуває в простому однорідному рівноважному стані. Для кожного сорту частинок його описує функція розподілу

$$f_s = f_{0s}(\mathbf{v}). \tag{7.16}$$

Ми спеціально розглядаємо однорідний рівноважний стан, тому f_{0s} не залежить від $\mathbf{r}$ та t. Фізично це означає, що в середньому властивості плазми однакові в усіх точках простору та не змінюються з часом.

Тепер уявімо, що цей стан трохи збурили. Наприклад, у деякій області виникла невелика надлишкова густина електронів. Вона створює електричне поле. Це поле змінює рух електронів, а змінений рух електронів змінює густину заряду і, відповідно, саме поле.

Отже, виникає замкнений ланцюг:

$$\text{збурення розподілу} \longrightarrow \text{збурення заряду} \longrightarrow \text{електричне поле} \longrightarrow \text{зміна руху частинок} \longrightarrow \text{нове збурення}.$$

Саме ця *самоузгодженість* є суттю колективної хвилі в плазмі. Поле не просто задане ззовні: воно створюється самими частинками і водночас впливає на їхній рух.

У кінетичному описі тому хвиля є збуренням самої функції розподілу. Запишемо

$$f_s(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) = f_{0s}(\mathbf{v}) + \delta f_s(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t), \qquad |\delta f_s| \ll f_{0s}. \tag{7.17}$$

Тут f_{0s} описує незбурений стан, а δf_s — малу зміну цього стану. На відміну від густини або середньої швидкості, збурення δf_s залежить ще й від швидкості $\mathbf{v}$. Тому воно відповідає не просто зміні кількості частинок, а зміні самої форми розподілу за швидкостями.

Це принципово важливо. Дві ділянки плазми можуть мати однакову густину, але різний розподіл частинок за швидкостями. Кінетична теорія дозволяє розрізнити такі стани, тоді як рідинний опис може їх ототожнювати.

Лінеаризація рівняння Власова. Щоб знайти, як розвивається мале збурення, підставимо (7.17) у рівняння Власова (7.7). Для простоти спочатку розглянемо електростатичні збурення однорідної плазми без зовнішнього магнітного поля. Тоді

$$\frac{\partial f_s}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla f_s + \frac{q_s}{m_s} \mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{v}} f_s = 0. \tag{7.18}$$

У рівноважному стані поле відсутнє, тому

$$\mathbf{E}_0 = 0.$$

Після збурення поле також є малим:

$$\mathbf{E} = \delta\mathbf{E}.$$

Підставимо ці вирази у (7.18). Виникають члени двох типів. Частина є лінійною за малими величинами, а частина містить добуток двох збурень, наприклад

$$\delta\mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{v}} \delta f_s.$$

Оскільки і $\delta\mathbf{E}$, і δf_s малі, їхній добуток є величиною другого порядку мализни. У лінійному наближенні такими членами нехтуємо. Залишається

$$\frac{\partial \delta f_s}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \delta f_s + \frac{q_s}{m_s} \delta\mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{v}} f_{0s} = 0. \tag{7.19}$$

Тепер маємо перше принципово нове для нас рівняння: воно безпосередньо визначає еволюцію малого збурення функції розподілу.

У ньому добре видно фізику процесу. Перші два доданки описують перенесення збурення частинками. Останній доданок показує дію електричного поля: поле змінює швидкості частинок, а отже, перерозподіляє їх у просторі швидкостей.

Таким чином, (7.19) вже містить обидві необхідні складові кінетичної картини: *вільний рух частинок* та *їхню реакцію на збурене поле*.

Але поки що це ще не хвильове рівняння.

Як із цього виникає хвиля?. Щоб побачити хвильову поведінку, треба згадати, що збурення функції розподілу саме створює електричне поле. З функції δf_s отримуємо збурення густини заряду:

$$\delta\rho = \sum_s q_s \int \delta f_s \, d^3v. \tag{7.20}$$

А це поле визначається рівняннями електродинаміки. У найпростішій електростатичній задачі достатньо рівняння Пуассона:

$$\nabla \cdot \delta\mathbf{E} = 4\pi\delta\rho. \tag{7.21}$$

Отже, маємо замкнений ланцюг:

$$\delta f_s \longrightarrow \delta\rho \longrightarrow \delta\mathbf{E} \longrightarrow \delta f_s.$$

Саме тому збурення не можна розглядати як просто задану зміну функції розподілу. Воно повинно бути узгоджене з полем, яке саме це збурення породжує.

Якщо таке самоузгоджене збурення поширюється в просторі та змінюється в часі, ми називаємо його хвилею.

Це важливий момент: у кінетичній теорії хвиля не вводиться окремим хвильовим рівнянням. Вона виникає як *самоузгоджений розв'язок лінеаризованого кінетичного рівняння разом із рівняннями електромагнітного поля.*

Нормальна мода. Тепер скористаємося спеціальною властивістю обраного рівноважного стану. Він однорідний та стаціонарний, тому коефіцієнти лінеаризованих рівнянь не залежать від $\mathbf{r}$ і t. Для такої системи природно розкласти довільне мале збурення на гармонічні складові.

Розглянемо одну таку складову та запишемо

$$\delta f_s(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) = \widetilde{f}_s(\mathbf{v}) \exp\left[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)\right]. \tag{7.22}$$

Тепер ця формула вже не з'являється нізвідки. Ми не стверджуємо, що функція розподілу «зобов'язана» мати такий вигляд. Ми розкладаємо мале збурення на нормальні гармонічні моди, кожна з яких характеризується хвильовим вектором $\mathbf{k}$ та частотою ω.

Для електричного поля записуємо аналогічно

$$\delta\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \widetilde{\mathbf{E}} \exp\left[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)\right].$$

Спільний множник у цих виразах описує просторово-часову структуру хвилі, тоді як $\widetilde{f}_s(\mathbf{v})$ визначає, як ця хвиля змінює розподіл частинок за швидкостями.

Після такої підстановки диференціювання стає простим:

$$\frac{\partial}{\partial t} \longrightarrow -i\omega, \qquad \nabla \longrightarrow i\mathbf{k}.$$

Тому (7.19) перетворюється на

$$-i(\omega - \mathbf{k}\cdot\mathbf{v})\widetilde{f}_s + \frac{q_s}{m_s}\widetilde{\mathbf{E}}\cdot\nabla_{\mathbf{v}} f_{0s} = 0. \tag{7.23}$$

Це рівняння вже значно відрізняється від звичайного рівняння для рідинної швидкості. Воно містить $\mathbf{v}$ як незалежну змінну. Тому різні групи частинок із різними швидкостями мають різний відгук на ту саму хвилю.

Звідки береться резонанс?. Саме тут уперше з'являється характерна для кінетичної теорії фізика.

У (7.23) присутня комбінація

$$\omega - \mathbf{k}\cdot\mathbf{v}. \tag{7.24}$$

Розглянемо для простоти рух уздовж напрямку поширення хвилі. Тоді $\mathbf{k}\cdot\mathbf{v} = k_\parallel v_\parallel$, і особливо важливими стають частинки, для яких

$$v_\parallel \simeq \frac{\omega}{k_\parallel}. \tag{7.25}$$

Права частина є фазовою швидкістю хвилі вздовж її напрямку поширення. Отже, резонансні частинки рухаються приблизно з тією самою швидкістю, з якою рухається фаза хвилі.

Фізично це зрозуміло. Якщо частинка рухається значно повільніше або значно швидше за хвилю, вона швидко проходить крізь різні фази хвилі. Вплив поля на неї при цьому значною мірою взаємно компенсується. Але якщо частинка рухається приблизно разом із фазою, вона може протягом тривалого часу залишатися в області поля одного знака і ефективно обмінюватися з хвилею енергією.

Таким чином, резонанс не є додатковою умовою, яку ми просто постулюємо. Він безпосередньо випливає зі структури кінетичного відгуку (7.23).

Саме цієї інформації не було в простому рідинному описі. Там ми працювали із середньою швидкістю, густиною та тиском. Тут же бачимо, що частинки з різними $v_\parallel$ взаємодіють із хвилею по-різному.

Самоузгодженість і дисперсійне рівняння. До цього моменту ми фактично розглядали відгук частинок на збурене електричне поле. Але поле не є незалежною величиною: воно створюється самою плазмою. Тому треба одночасно виконати рівняння Пуассона.

Для гармонічної моди (7.22) воно має вигляд

$$i\mathbf{k}\cdot\widetilde{\mathbf{E}} = 4\pi\sum_s q_s \int \widetilde{f}_s(\mathbf{v})\, d^3v. \tag{7.26}$$

Отже, маємо дві частини однієї задачі:

1. кінетичне рівняння визначає, як частинки реагують на поле;
2. рівняння Пуассона визначає, яке поле створюють ці частинки.

Потрібно знайти такий розподіл частинок і таке поле, які одночасно задовольняють обидві умови. Саме ця вимога називається *самоузгодженістю*.

Після підстановки кінетичного відгуку в рівняння поля отримуємо умову існування нетривіального розв'язку. У загальному вигляді її записують як дисперсійне рівняння

$$D(\omega, \mathbf{k}) = 0. \tag{7.27}$$

Це рівняння відповідає на два принципові питання.

По-перше, які хвилі взагалі можуть існувати в даній плазмі? Відповідь задається дисперсією $\omega(\mathbf{k})$.

По-друге, що відбувається з амплітудою хвилі під час її поширення? Якщо ω має уявну частину, амплітуда може зростати або спадати з часом.

Отже, дисперсійне рівняння є результатом не просто математичної підстановки. Воно є умовою самоузгодженого існування колективного руху частинок і поля.

Чому кінетичний опис дає нову фізику?. У рідинному описі ми замінюємо повну функцію розподілу її моментами: густиною, середньою швидкістю, тиском тощо. Це дуже корисно, але разом із цим втрачається інформація про те, скільки частинок має ту чи іншу швидкість.

Для багатьох повільних і великомасштабних процесів ця втрата інформації неістотна. Але для хвиль вона може стати принциповою. Як показує (7.23), відгук залежить безпосередньо від $\mathbf{v}$. Тому хвиля може вибірково взаємодіяти з певною частиною розподілу.

У цьому полягає одна з головних переваг кінетичного опису: він дозволяє досліджувати не лише рух середнього потоку, а й обмін енергією між хвилею та частинками з різними швидкостями.

Саме тут природно виникає загасання Ландау. Якщо швидкості резонансних частинок попадають на ділянку розподілу, де кількість частинок із різними швидкостями неоднакова, обмін енергією між хвилею та частинками не компенсується. Для звичайного максвеллівського розподілу це приводить до загасання хвилі.

Таким чином, наступний крок буде вже не введенням нового математичного апарату заради самого апарату. Ми використаємо отриману картину, щоб зрозуміти, *чому хвиля може втрачати енергію навіть у повністю беззіткнювальній плазмі*.

7.9. Загасання Ландау

Одним із найважливіших результатів кінетичної теорії є можливість загасання хвилі навіть у беззіткнювальній плазмі. Покажемо це кількісно для ленгмюрівських хвиль.

Діелектрична проникність беззіткнювальної плазми. Розглянемо одновимірну поздовжню хвилю $\propto e^{i(kx-\omega t)}$ вздовж x і позначимо $F_s(v) = \int f_{0s}\,dv_y\,dv_z$ (так що $\int F_s\,dv = n_s$). Виведення займає чотири кроки.

(1) Для $\mathbf{k} \parallel x$ проінтегруємо (7.23) за v_y, v_z; позначивши $v \equiv v_x$, маємо

$$-i(\omega - kv)\tilde f_s + \frac{q_s}{m_s}\tilde E\,F_s' = 0,$$

де тепер $\tilde f_s(v)$ — збурення, проінтегроване за поперечними швидкостями.

(2) Звідси

$$\tilde f_s = -i\,\frac{q_s}{m_s}\,\frac{\tilde E\,F_s'}{\omega - kv}.$$

(3) Підставляємо в рівняння Пуассона (7.26):

$$ik\tilde E = 4\pi\sum_s q_s\int \tilde f_s\,dv = -4\pi i\,\tilde E\sum_s \frac{q_s^2}{m_s}\int\frac{F_s'}{\omega-kv}\,dv.$$

(4) Скорочуємо $ik\tilde E$ і вводимо $\omega_{ps}^2 = 4\pi n_s q_s^2/m_s$; отримуємо дисперсійне рівняння $\varepsilon(\omega,k)=0$ з

$$\varepsilon(\omega,k) = 1 + \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{k\,n_s}\int\frac{F_s'(v)}{\omega-kv}\,dv. \tag{7.28}$$

Для холодної плазми $F_s = n_s\delta(v)$ маємо $\int F'/(\omega-kv)\,dv = -n_s k/\omega^2$ і $\varepsilon = 1 - \sum\omega_{ps}^2/\omega^2$ — відомий результат (2.5). Якщо ж $\omega \gg kv_{Te}$, інтегруємо по частинах і розкладаємо:

$$\begin{aligned}\int\frac{F'}{\omega-kv}\,dv &= -k\int\frac{F}{(\omega-kv)^2}\,dv \\ &= -\frac{k}{\omega^2}\int F\Big(1+\frac{2kv}{\omega}+\frac{3k^2v^2}{\omega^2}+\dots\Big)dv \\ &\approx -\frac{n_s k}{\omega^2}\Big(1+\frac{3k^2v_{Ts}^2}{\omega^2}\Big),\end{aligned}$$

бо непарний за v член зникає для симетричного F, а $\int v^2F\,dv = n_s v_{Ts}^2$. Множник 3 виникає тут з розкладу $(1-kv/\omega)^{-2}$, а не з показника адіабати; рідинний вивід у розд. 2.4 з $\gamma=3$ для одновимірного стиснення

дає те саме, і це перевірка узгодженості кінетики й гідродинаміки. Звідси $\varepsilon \approx 1 - (\omega_p^2/\omega^2)(1 + 3k^2 v_{Te}^2/\omega^2)$ і $\varepsilon = 0$ дає формулу Бома — Гросса (2.9). Новим є те, що підінтегральний вираз має *полюс* при $v = \omega/k$: саме тут «живуть» резонансні частинки.

Теоретичні відомості Нагадаємо з теорії функцій комплексної змінної

Формула Сохоцького: $\dfrac{1}{x \pm i0} = \mathrm{P}\dfrac{1}{x} \mp i\pi\delta(x)$. Ілюстрація: $\operatorname{Im}\dfrac{1}{x + i\varepsilon} = -\dfrac{\varepsilon}{x^2 + \varepsilon^2} \to -\pi\delta(x)$ при $\varepsilon \to 0^+$ (лоренціан з площею π). Знак «$+i0$» визначає причинність: збурення вмикається при $t = 0$, тому для перетворення Лапласа потрібно $\operatorname{Im}\omega > 0$ — як адіабатичне вмикання $e^{\varepsilon t}$ в теорії збурень квантової механіки.

Як обійти полюс? Л. Ландау (1946 р.) показав, що правильно розв'язувати задачу початкових умов: тоді збурення вмикається в момент $t = 0$, і для збіжності інтеграла треба вважати $\operatorname{Im}\omega > 0$. Результат продовжують аналітично на область $\operatorname{Im}\omega \le 0$, що зводиться до заміни $\omega \to \omega + i0$. За формулою Сохоцького $1/(\omega - kv + i0) = \mathrm{P}\,1/(\omega - kv) - i\pi\delta(\omega - kv)$ маємо $\varepsilon = \varepsilon_r + i\varepsilon_i$ з

$$\varepsilon_i(\omega, k) = -\pi \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{k^2 n_s} F_s'\!\left(\frac{\omega}{k}\right). \tag{7.29}$$

Уявна частина проникності визначається нахилом розподілу *у точці резонансу* $v = v_\varphi = \omega/k$ — вона відсутня в будь-якому рідинному описі.

Декремент. Нехай хвиля слабко загасає: $\omega = \omega_r + i\gamma$, $|\gamma| \ll \omega_r$. Тоді $\varepsilon_r(\omega_r, k) = 0$ (це дає частоту, наприклад Бома — Гросса), а поправка знаходиться з розкладу

$$\varepsilon(\omega_r + i\gamma) \approx \varepsilon_r(\omega_r) + i\gamma\frac{\partial\varepsilon_r}{\partial\omega} + i\varepsilon_i = 0 \quad\Longrightarrow\quad \gamma = -\varepsilon_i \Big/ \frac{\partial\varepsilon_r}{\partial\omega}.$$

Для ленгмюрівської хвилі $\partial\varepsilon_r/\partial\omega \approx 2/\omega_{pe}$, тому

$$\gamma = \frac{\pi\omega_{pe}^3}{2k^2 n_e} F_e'(v_\varphi). \tag{7.30}$$

Знак γ збігається зі знаком $F_e'(v_\varphi)$. Для максвеллівського розподілу $F_e'(v) = -(v/v_{Te}^2)F_e$, тобто $F_e'(v_\varphi) < 0$, і хвиля загасає:

$$\boxed{\frac{\gamma}{\omega_{pe}} = -\sqrt{\frac{\pi}{8}}\,\frac{1}{(k\lambda_{De})^3}\exp\!\left(-\frac{1}{2k^2\lambda_{De}^2} - \frac{3}{2}\right)} \qquad (k\lambda_{De} \ll 1). \tag{7.31}$$

Тут $\lambda_{De} = v_{Te}/\omega_{pe}$ ($v_{Te}^2 = T_e/m_e$), а $-3/2$ в експоненті враховує поправку Бома — Гросса до v_φ. Експоненціальна залежність від $1/k^2\lambda_{De}^2$ показує, що довгі хвилі ($k\lambda_{De} \ll 1$) практично не загасають, бо $v_\varphi \gg v_{Te}$ і в «хвості» розподілу майже немає частинок. Типові числа: $k\lambda_{De} = 0{,}3$ дає $|\gamma|/\omega_{pe} \approx 0{,}02$, а $k\lambda_{De} = 0{,}5$ — $\approx 0{,}15$ (така хвиля живе лише близько одного періоду, і розклад за малим γ втрачає силу).




Рис. 7.1. Загасання Ландау: частинок, трохи повільніших за хвилю, більше, ніж трохи швидших, тому обмін енергією не компенсується, і хвиля віддає енергію розподілу

Фізична картина. Частинки, трохи повільніші за хвилю, прискорюються нею (хвиля «наздоганяє» їх і штовхає), а трохи швидші — гальмуються (вони передають енергію хвилі). Оскільки для спадного розподілу ($F' < 0$) повільних частинок більше, ніж швидких, сумарно енергія переходить від хвилі до частинок (рис. 7.1). Це загасання принципово відрізняється від омічної дисипації: зіткнень немає, а енергія перекачується з поля в кінетичну енергію резонансних частинок. Лінійне загасання Ландау експериментально підтвердили Малмберг і Уортон (1964 р.).

Аналогія серфінгу. Частинки — серфери на хвилі: ті, що трохи повільніші за хвилю, хвиля підхоплює й розганяє; ті, що трохи швидші, самі штовхають хвилю й гальмуються. У системі відліку хвилі частинка з відносною швидкістю $u = v - v_\varphi$ відбивається від «горба» потенціалу, сумарний обмін енергією пропорційний нахилу $F'(v_\varphi)$: для спадного F виграють повільні. *Парадокс.* Рівняння Власова оборотне, а загасання є: енергія не зникає, а переходить у дрібномасштабну

структуру f у просторі швидкостей (фазове перемішування), яку макроскопічні величини вже не бачать.

Нестійкість «пучка на хвості». Якщо розподіл має локальний максимум при $v_b > v_{Te}$ (електронний пучок), то на його висхідній ділянці $F_e'(v_\varphi) > 0$, і за (7.30) $\gamma > 0$ — хвиля *зростає* (обернене загасання Ландау, розд. 8). Нестійкість зникає, коли пучок розпливається або хвиля захоплює резонансні частинки.

Нелінійне захоплення. Лінійна теорія працює, поки амплітуда мала. Резонансні частинки в потенціалі хвилі φ_0 здійснюють коливання з частотою відбиття $\omega_b = \sqrt{ek^2\varphi_0/m_e}$. Коли $\omega_b \gtrsim |\gamma|$, частинки встигають повернути й віддати енергію назад: розподіл у околі v_φ вирівнюється (плато), $F'(v_\varphi) \to 0$, і загасання припиняється (теорію захоплення дав О'Нійл, 1965 р.).

Тому загасання Ландау є важливою межею простого рідинного опису. Скалярні величини n, $\mathbf{v}$ та T не містять достатньої інформації про поведінку розподілу поблизу резонансної швидкості. Потрібна сама функція $f_s(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$ або принаймні модель, яка зберігає відповідну кінетичну інформацію.

7.10. Коли потрібен кінетичний опис?

Вибір між кінетичною та рідинною моделлю визначається не тим, яка модель «правильна», а масштабом явища. Якщо нас цікавлять довгохвильові процеси, для яких розподіл частинок залишається близьким до локальної рівноваги, можна перейти до моментів і замкнути систему рідинними рівняннями.

Кінетичний опис стає необхідним, коли важливими є:

- детальний розподіл частинок за швидкостями;
- резонансна взаємодія частинок із хвилями;
- анізотропія розподілу або тиску;
- нерівноважні хвости функції розподілу;
- процеси, для яких зіткнення занадто рідкі, щоб підтримувати локальну рівновагу.

У магнетизованій плазмі додатково виникає відмінність між рухом уздовж та поперек магнітного поля. Тому навіть тиск може стати анізотропним,

$$p_\perp \neq p_\parallel,$$

і проста однорідинна МГД-модель зі скалярним тиском перестає бути достатньою.

Загальну послідовність переходів між рівнями опису (від f_s до моментів $n_s, \mathbf{v}_s, \mathsf{P}_s$, далі до дворідинної моделі й до МГД) наведено в (7.15).

Чим далі ми рухаємося вправо, тим менше мікроскопічної інформації зберігаємо і тим більше припущень про замикання повинні зробити. Натомість рідинний опис стає значно простішим для довгохвильових макроскопічних процесів.

7.11. Як це вимірюють: томсонівське розсіяння

Функцію розподілу не можна виміряти зондом, не збурюючи плазму, але її можна *прочитати зі спектра розсіяного світла*. Вільний електрон у полі лазерної хвилі коливається й перевипромінює її (томсонівське розсіяння) з перерізом $\sigma_T = \frac{8\pi}{3} r_e^2 = 6{,}65\times10^{-25}$ см^2, де $r_e = e^2/m_e c^2$. Нехай падає хвиля $(\omega_i, \mathbf{k}_i)$, а під кутом θ реєструють хвилю $(\omega_s, \mathbf{k}_s)$. Електрон, що рухається зі швидкістю $\mathbf{v}$, розсіює з допплерівським зсувом $\omega_s - \omega_i = \mathbf{k}\cdot\mathbf{v}$, де $\mathbf{k} = \mathbf{k}_s - \mathbf{k}_i$ і $|\mathbf{k}| = 2k_i \sin(\theta/2) = (4\pi/\lambda_i)\sin(\theta/2)$. Отже, спектр розсіяного світла відображає розподіл електронів за проєкцією швидкості на $\mathbf{k}$, тобто саму $F_e(v)$. Те, що саме ми побачимо, визначає *параметр розсіяння*

$$\alpha = \frac{1}{k\lambda_{De}} = \frac{\lambda_i}{4\pi\lambda_{De}\sin(\theta/2)}. \tag{7.32}$$

Це той самий параметр $k\lambda_{De}$, який керував загасанням Ландау (формула (7.31)): він порівнює масштаб $1/k$, на якому «дивимося» на плазму, з дебаївським радіусом.

Некогерентне розсіяння ($\alpha \ll 1$). Якщо $1/k \ll \lambda_{De}$, електрони розсіюють незалежно, і спектр повторює розподіл. Для максвеллівського $F_e \propto \exp(-v^2/2v_{Te}^2)$ спектр гауссів, а оскільки $\Delta\lambda/\lambda_i = -\Delta\omega/\omega_i$ (для $\omega_i = ck_i$), його стандартне відхилення дорівнює

$$\boxed{\frac{\sigma_\lambda}{\lambda_i} = 2\sin\frac{\theta}{2}\,\frac{v_{Te}}{c} = 2\sin\frac{\theta}{2}\sqrt{\frac{T_e}{m_e c^2}}}, \qquad v_{Te}^2 = \frac{T_e}{m_e}. \tag{7.33}$$

Ширина спектра дає T_e, а повний сигнал, пропорційний n_e — густину (абсолютне калібрування виконують за розсіянням на газі відомої густини).

Оцінка. Для Nd:YAG-лазера ($\lambda_i = 1064$ нм), $\theta = 90^\circ$ і $T_e = 1$ кеВ маємо $v_{Te}/c = 0{,}044$ і $\sigma_\lambda \approx 67$ нм (6 % від λ_i): спектр легко розкласти на кілька спектральних каналів. При $n_e = 10^{14}$ см$^{-3}$ дебаївський радіус $\lambda_{De} = 2{,}4\times10^{-3}$ см, тож $\alpha \approx 5\times10^{-3} \ll 1$. Частка розсіяного світла

$P_s/P_0 \approx n_e r_e^2 L\,\Delta\Omega \approx 10^{14}\cdot 8\times10^{-26}\cdot 1\cdot 10^{-2} \approx 8\times10^{-14}$ (довжина перетину $L = 1$ см, тілесний кут збору $\Delta\Omega = 10^{-2}$ ср). Імпульс 1 Дж містить 5×10^{18} фотонів, тобто розсіюється лише $\sim 4\times10^5$ фотонів, і до детекторів доходить їхня невелика частка.




Рис. 7.2. Спектр томсонівського розсіяння: (а) $\alpha \ll 1$ — гауссів профіль, ширина якого зростає як $\sqrt{T_e}$; (б) $\alpha \gtrsim 1$ — вузька іонна компонента й електронні сателіти на частотах Бома — Гросса

Колективне розсіяння ($\alpha \gtrsim 1$). Коли $1/k \gtrsim \lambda_{De}$, електрони вже не незалежні: кожен оточений дебаївською хмарою, і розсіяння визначається тепловими флуктуаціями густини з хвильовим вектором $\mathbf{k}$ — тобто тими самими хвилями, що розглянуто вище. Спектр (рис. 7.2 б) має дві складові:

- *електронні сателіти* на частотах $\pm\omega_{\text{БГ}}$ — теплові ленгмюрівські хвилі (2.9); їхнє положення $\omega_{\text{БГ}} = \sqrt{\omega_{pe}^2 + 3k^2 v_{Te}^2}$ дає густину без абсолютного калібрування, а ширину задає загасання Ландау (7.31);
- *іонну компоненту* завширшки $\sim k v_{Ti}$. При $T_e \gg T_i$ вона розщеплюється на два іонно-звукові піки $\pm kc_s$ (розд. 6.8), за формою яких знаходять T_i.

Наприклад, для CO_2-лазера ($\lambda_i = 10{,}6$ мкм), $\theta = 5°$, $T_e = 100$ еВ і $n_e = 10^{14}$ см$^{-3}$ маємо $\lambda_{De} \approx 7\times10^{-4}$ см і $\alpha \approx 2{,}6$: розсіяння колективне.

Межі застосовності.

- Формула (7.33) справедлива лише за $\alpha \ll 1$ і максвеллівського розподілу; негаусові «крила» спектра свідчать про нетеплові хвости. Для проміжних $\alpha \sim 1$ спектр знаходять чисельним розрахунком, підгоняючи T_e і T_i одночасно.
- Нерелятивістський вираз працює при $T_e \ll m_e c^2$. Для $T_e \gtrsim$ кількох кеВ спектр стає асиметричним і зсувається в синю область;

поправка має порядок T_e/m_ec^2 (близько 2 % при 10 кеВ), і у термоядерній плазмі її обов'язково враховують.

- Сигнал приблизно на 13 порядків слабший за лазерний пучок, тому потрібні потужні імпульсні лазери, придушення розсіяного світла від стінок і облік фону плазми (гальмівне випромінювання). У колективному режимі малі кути розсіяння ще ускладнюють відокремлення сигналу.
- Вимірювання *локальне*: об'єм визначається перетином пучка та поля зору. Часова роздільність дорівнює тривалості імпульсу (~ 10 нс), але частота повторення невелика (10–100 Гц), тому швидкі процеси потребують багатоімпульсних лазерів.

Отже, томсонівське розсіяння — один із небагатьох методів, що безпосередньо читає $F_e(v)$: за $\alpha \ll 1$ вимірюється форма розподілу, за $\alpha \gtrsim 1$ — діелектричний відгук $\varepsilon(\omega, k)$ з усіма хвильовими модами й загасанням Ландау.

Головне в розділі

- Кінетичний опис оперує функцією розподілу $f_s(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$; з її моментів отримують n, $\mathbf{v}$ і тензор тиску.
- Рівняння Власова описує беззіткнювальну плазму; зіткнення додають інтеграл зіткнень у правій частині.
- Ланцюжок моментів не замикається сам, тому гідродинаміка вимагає додаткових припущень про функцію розподілу.
- Загасання Ландау — беззіткнювальний резонанс хвилі з частинками, швидкість яких близька до v_φ.
- Знак декремента визначається похідною розподілу в резонансній точці: за $F_e'(v_\varphi) > 0$ хвиля росте.
- Томсонівське розсіяння лазерного світла дає T_e і n_e локально: за $\alpha = 1/k\lambda_{De} \ll 1$ ширина спектра $\propto \sqrt{T_e}$, за $\alpha \gtrsim 1$ спектр відображає колективні моди (розд. 7.11).

Задачі

7.1. Для беззіткнювальної плазми покажіть, що інтегрування рівняння Власова за всіма швидкостями приводить до рівняння неперервності

$$\frac{\partial n_s}{\partial t} + \nabla \cdot (n_s \mathbf{v}_s) = 0.$$

Яку властивість функції розподілу потрібно використати, щоб поверхневий інтеграл у просторі швидкостей зник? *Відповідь:* $f \to 0$ при $|\mathbf{v}| \to \infty$ швидше за $1/v^2$; крім того, для сили Лоренца $\nabla_{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{F} = 0$.

7.2. Для максвеллівського розподілу покажіть, що

$$p_s = \frac{m_s}{3}\int c^2 f_s\, d^3v = n_s T_s.$$

Поясніть, чому цей результат потребує ізотропності розподілу. *Відповідь:* для ізотропного f тензор $\mathsf{P}_{ij} = p\,\delta_{ij}$, тож $p = \mathrm{Tr}\,\mathsf{P}/3$; для максвеллівського розподілу $\int c^2 f\, d^3v = 3nT/m$.

7.3. Для ленгмюрівської хвилі в плазмі з $T_e = 10$ еВ, $n_e = 10^{12}$ см$^{-3}$ та довжиною хвилі $\lambda = 2\pi/k = 1$ мм: (а) знайдіть v_φ, відношення v_φ/v_{Te} і декремент γ/ω_{pe} за (7.31). Чи виконується умова слабкого загасання? Поясніть, чому саме частинки з $v \simeq v_\varphi$ відіграють особливу роль. (б) За якої довжини хвилі амплітуда спадає в e разів за ~ 10 періодів? *Відповідь:* (а) $\lambda_{De} \approx 2{,}4\times10^{-3}$ см, $k\lambda_{De} \approx 0{,}15$, $\omega \approx 1{,}03\,\omega_{pe}$, $v_\varphi \approx 9\times10^{8}$ см/с, $v_\varphi/v_{Te} \approx 7$, $\gamma/\omega_{pe} \approx 5\times10^{-9}$ — загасання дуже слабке; (б) $\gamma/\omega \approx 1/(2\pi\cdot 10) \approx 0{,}016$ дає $k\lambda_{De} \approx 0{,}3$, тобто $\lambda \approx 2\pi\lambda_{De}/0{,}3 \approx 0{,}5$ мм.

7.4. Для максвеллівського розподілу обчисліть найімовірнішу швидкість, середню швидкість $\langle v\rangle$ і середньоквадратичну швидкість. *Відповідь:* $\sqrt{2T/m}$, $\sqrt{8T/\pi m}$, $\sqrt{3T/m}$ (у відношенні $1 : 1{,}13 : 1{,}22$).

7.5. У моделі БГК інтеграл зіткнень $-\nu\,\delta f$ додається до рівняння Власова для збурення δf. Знайдіть δf і покажіть, що в знаменниках (7.28) відбувається заміна $\omega \to \omega + i\nu$. Як це поєднує результати розділу про зіткнення й кінетичну теорію? (Проста форма не зберігає число частинок; це наближення слід мати на увазі.) *Відповідь:* $\delta f = -i\,(q/m)\,E\,F'/(\omega - kv + i\nu)$, тобто $\omega \to \omega + i\nu$.

7.6. Із (7.28) для $\omega/k \gg v_{Te}$ розкладіть знаменник за kv/ω і самостійно одержіть закон Бома — Гросса $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2 v_{Te}^2$ ($v_{Te}^2 = T_e/m_e$).

7.7. Для розподілу $F = (n/2)[\delta(v-u) + \delta(v+u)]$ одержіть із (7.28) дисперсійне рівняння двопотокової нестійкості і порівняйте з задачею 8.5. *Відповідь:* $1 = \dfrac{\omega_p^2}{2}\Big[\dfrac{1}{(\omega-ku)^2} + \dfrac{1}{(\omega+ku)^2}\Big]$.

7.8. Оцініть частоту коливань захопленої частинки $\omega_b = \sqrt{ek^2\varphi_0/m}$ для хвилі з $e\varphi_0/T_e = 10^{-3}$ при $k\lambda_{De} = 0{,}3$ і порівняйте з γ. Чи встигне відбутися захоплення? *Відповідь:* $\omega_b \approx 0{,}01\,\omega_{pe}$, $\gamma \approx 0{,}02\,\omega_{pe}$: хвиля

? загасає швидше, ніж починається захоплення.

? **7.9.** Розподіл електронів складається з максвеллівського «тіла» (n_0, v_{Te}) та слабкого пучка ($n_b \ll n_0$, швидкість $v_b \gg v_{Te}$, розкид $\Delta v \ll v_b$). Використовуючи (7.30), оцініть інкремент нестійкості $\gamma \sim \omega_{pe}(n_b/n_0)(v_b/\Delta v)^2$ та поясніть, чому він максимальний при v_φ трохи менше v_b. *Відповідь:* $F_b' \sim n_b/\Delta v^2$ максимальна на висхідному схилі пучка, при $v \approx v_b - \Delta v$.

? **7.10.** Спектр томсонівського розсіяння ($\theta = 90°$, $\lambda_i = 1064$ нм) має гауссів профіль зі стандартним відхиленням $\sigma_\lambda = 20$ нм. Знайдіть T_e і переконайтеся, що розсіяння некогерентне при $n_e = 5 \times 10^{13}$ см$^{-3}$. *Відповідь:* $T_e = m_e c^2 \left[\sigma_\lambda/(2\lambda_i \sin 45°)\right]^2 \approx 90$ еВ, $\lambda_{De} \approx 10^{-3}$ см, $\alpha \approx 0{,}01 \ll 1$.

? **7.11.** Для CO_2-лазера ($\lambda_i = 10{,}6$ мкм) у плазмі з $T_e = 100$ еВ, $n_e = 10^{14}$ см$^{-3}$ знайдіть кут розсіяння, при якому $\alpha = 1$. При яких кутах розсіяння колективне? Чому для $\lambda_i = 1064$ нм колективний режим при тих самих параметрах недосяжний? *Відповідь:* $\sin(\theta/2) = \lambda_i/4\pi\lambda_{De} \approx 0{,}11$, $\theta \approx 13°$; колективне при $\theta \lesssim 13°$. Для 1064 нм потрібно $\sin(\theta/2) \approx 0{,}011$, тобто $\theta \approx 1°$ — відокремити сигнал від пучка практично неможливо.

? Контрольні питання

1. Що таке функція розподілу $f_s(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$ і чим вона відрізняється від концентрації n_s?
2. Як через моменти функції розподілу визначають концентрацію, середню швидкість та тензор тиску?
3. Чому в загальному випадку тиск є тензором, а не скаляром?
4. Який фізичний зміст рівняння Власова?
5. Що змінюється в кінетичному рівнянні, якщо зіткнення не можна нехтувати?
6. Чому кулонівські зіткнення не можна просто моделювати як зіткнення твердих кульок?
7. Що визначає ширину максвеллівського розподілу?
8. Чому в плазмі можуть бути різні температури електронів та іонів?
9. Як із кінетичного рівняння отримується рівняння неперервності?

10. Чому ієрархія моментів не замикається сама?
11. Які припущення можуть використовуватися для замикання рідинної моделі?
12. У чому фізичний зміст формули Бома — Гросса?
13. Чим загасання Ландау відрізняється від омічної дисипації?
14. Чому для опису загасання Ландау недостатньо знати лише n, $\mathbf{v}$ та T?
15. Від чого залежить знак декремента γ у формулі (7.30)? Коли хвиля зростає?
16. Що таке нелінійне захоплення частинок хвилею і чому воно припиняє загасання?
17. За яких обставин кінетичний опис є принципово необхідним?
18. Чому оборотне рівняння Власова описує загасання?
19. Чому довгі ленгмюрівські хвилі майже не загасають, а короткі ($k\lambda_{De} \sim 1$) загасають так сильно, що практично не існують як хвилі?
20. Чому іонний звук спостерігають лише при $T_e \gg T_i$?
21. Чим відрізняється томсонівське розсіяння при $\alpha \ll 1$ та $\alpha \gtrsim 1$ і яку інформацію про плазму дає кожен режим?

8 Загальний принцип нестійкості плазми

8.1. Що означає нестійкість?

До цього моменту ми розглядали рівноважні стани плазми та різні рівняння, якими можна описувати її рух. Але саме по собі знаходження рівноваги ще не означає, що така конфігурація може існувати тривалий час.

Уявімо, що плазма перебуває в деякому стані рівноваги. До неї неминуче вносяться малі збурення: тепловий рух частинок, флуктуації густини, електричного та магнітного полів, похибки зовнішнього поля. Питання стійкості полягає в тому, що відбувається з таким малим відхиленням.

Якщо після відхилення система повертається до початкового стану, рівновага стійка. Якщо збурення залишається приблизно сталим, маємо нейтральну стійкість. Якщо ж навіть дуже мале збурення з часом зростає, рівновага нестійка (рис. 8.1).




Рис. 8.1. Три можливі типи еволюції малого збурення рівноваги.

Іграшковий приклад з механіки: маятник у нижньому положенні має $\omega^2 = g/l > 0$ (коливання), у верхньому — $\omega^2 = -g/l < 0$, тобто $\gamma = \sqrt{g/l}$ (експоненціальне зростання). Тут одразу видно і знак ω^2, і «вільну енергію» (потенціальна енергія в максимумі), і ідея енергетичного принципу (розд. 8.12).

Це визначення важливе тим, що воно не прив'язане до конкретної моделі. Одна й та сама ідея працює для механічної системи, рідини, плазми, електромагнітного поля або кінетичного розподілу частинок.

Розглянемо рівноважний стан X_0 і мале збурення δX. Тоді записуємо

$$X = X_0 + \delta X, \tag{8.1}$$

де припускаємо, що $|\delta X| \ll |X_0|$. Саме ця нерівність дозволяє спочатку розглядати збурення незалежно від його нелінійної взаємодії із самою рівновагою.

8.2. Лінеаризація: як знайти долю малого збурення

Нехай рівняння плазми можна символічно записати як

$$\mathcal{F}(X) = 0. \tag{8.2}$$

Підставимо в нього представлення (8.1). Розкладаючи рівняння за степенями малого збурення, одержуємо

$$\mathcal{F}(X_0) + \left.\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial X}\right|_{X_0} \delta X + \mathcal{O}(\delta X^2) = 0. \tag{8.3}$$

Перший доданок у (8.3) зникає, оскільки X_0 є рівноважним станом. Залишається рівняння першого порядку за збуренням:

$$\mathcal{L}\,\delta X = 0, \tag{8.4}$$

де $\mathcal{L}$ — лінійний оператор, визначений властивостями рівноваги.

Це і є головний технічний крок теорії стійкості. Замість повного нелінійного рівняння ми спочатку питаємо значно простіше:

Що зробить система з нескінченно малим відхиленням від рівноваги?

Якщо воно зростає, рівновага нестійка вже на лінійному рівні.

8.3. Хвиля, що може рости

Для однорідної рівноваги зручно розглядати окрему просторово-часову гармоніку:

$$\delta X \propto \exp[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)]\,. \tag{8.5}$$

Тут $\mathbf{k}$ визначає просторовий масштаб збурення, а ω — його частоту. Важливо, що в загальному випадку ω може бути комплексною:

$$\omega = \omega_r + i\gamma. \tag{8.6}$$

Підставивши (8.6) у (8.5), одержуємо

$$\delta X \propto \exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - i\omega_r t)\,\exp(\gamma t). \tag{8.7}$$

Тому знак γ безпосередньо визначає долю збурення:

$$\begin{aligned} \gamma > 0 &\;\Rightarrow\; \text{зростання},\\ \gamma < 0 &\;\Rightarrow\; \text{загасання},\\ \gamma = 0 &\;\Rightarrow\; \text{нейтральність}. \end{aligned} \tag{8.8}$$

Отже, критерій лінійної нестійкості можна сформулювати дуже коротко: потрібна наявність розв'язку з

$$\operatorname{Im}\omega > 0. \tag{8.9}$$

Часова шкала розвитку нестійкості визначається величиною γ:

$$\tau_{\text{inst}} \sim \frac{1}{\gamma}. \tag{8.10}$$

Таким чином, нестійкість — це не просто твердження, що «плазма поводиться хаотично». На початковій стадії це цілком визначений експоненційний ріст певної моди збурення (рис. 8.2).




Рис. 8.2. Нестійка хвиля: просторова структура моди та її зростання з часом.

8.4. Дисперсійне рівняння

Після підстановки (8.5) лінеаризовані рівняння перетворюються на систему алгебраїчних рівнянь для амплітуд різних величин. Її можна символічно записати у вигляді

$$\mathsf{D}(\omega,\mathbf{k})\,\mathbf{A} = 0, \tag{8.11}$$

де $\mathbf{A}$ містить амплітуди збурених величин, а D — матриця, яка визначається моделлю плазми та вибраною рівновагою.

Нетривіальний розв'язок (8.11) існує лише тоді, коли

$$\det \mathsf{D}(\omega, \mathbf{k}) = 0. \tag{8.12}$$

Це дисперсійне рівняння. Воно є одним із центральних інструментів теорії плазмових нестійкостей.

Для кожного $\mathbf{k}$ воно визначає можливі значення ω. Якщо серед них є корінь, що задовольняє умову (8.9), відповідна мода нестійка.

Тут виникає важливий зв'язок із попередніми розділами. У теорії хвиль ми вже шукали дисперсійні співвідношення. Але тепер нас цікавить не лише залежність дійсної частоти від хвильового числа. Насамперед треба з'ясувати, чи має частота уявну частину і що означає її знак (рис. 8.3).




Рис. 8.3. Дисперсійне співвідношення як спосіб визначення спектра плазмових мод та їхньої стійкості.

8.5. Звідки береться енергія нестійкості?

Формальна умова (8.9) говорить, *що* відбувається, але не пояснює, *чому* збурення росте. Фізично нестійкість означає, що система має джерело вільної енергії, яку збурення може перетворювати на енергію руху, електричних або магнітних полів.

У плазмі такою вільною енергією можуть бути:

- градієнти густини та температури;
- запас енергії магнітного поля;
- енергія електричного струму;

- анізотропія розподілу швидкостей;
- енергія пучка заряджених частинок;
- неоднорідність магнітної конфігурації.

Тому нестійкість не «виникає з нічого». Вона є механізмом перетворення енергії нерівноважного стану на зростаюче збурення (рис. 8.4).




Рис. 8.4. Фізичне походження плазмової нестійкості: збурення отримує енергію з нерівноважного стану плазми.

Саме тому стійкість не можна визначити лише за величиною зовнішнього магнітного поля. Сильне поле може змінювати траєкторії частинок, але якщо в системі залишається доступне джерело вільної енергії, можуть існувати нестійкі моди.

8.6. Рівновага та стійкість у магнітному полі

Для магнітного утримання особливо важливо розрізняти два питання:

1. чи може існувати рівновага сил;
2. чи є ця рівновага стійкою до малих збурень.

У простому однорідинному МГД-описі рівновага плазми задовольняє умову

$$-\nabla p + \frac{1}{c}[\mathbf{j} \times \mathbf{B}] = 0. \tag{8.13}$$

Рівняння (8.13) лише говорить, що сила градієнта тиску компенсується магнітною силою. Воно ще нічого не говорить про те, що стан буде зберігатися після малого зміщення.

Щоб зрозуміти це фізично, розглянемо магнітну силу. Її зручно розкласти на дві частини:

$$\frac{1}{c}[\mathbf{j} \times \mathbf{B}] = -\nabla \frac{B^2}{8\pi} + \frac{1}{4\pi}(\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{B}. \tag{8.14}$$

Перша частина поводиться як градієнт магнітного тиску

$$p_B = \frac{B^2}{8\pi}, \tag{8.15}$$

а друга пов'язана з натягом викривлених силових ліній.

Отже, магнітне поле не просто «тисне» на плазму. Його силові лінії можуть діяти подібно до натягнутих еластичних ниток, намагаючись зменшити свою кривину (рис. 8.5).




Рис. 8.5. Дві складові магнітної сили: магнітний тиск і натяг силових ліній.

Ця картина стане особливо важливою в розд. 9, де розглядатимуться конкретні конфігурації магнітного утримання.

8.7. Перетяжка як найпростіший приклад нестійкості

Уявімо плазмовий струм, який створює власне магнітне поле. Якщо плазмовий канал має невелику локальну перетяжку, магнітна сила може зробити цю перетяжку ще сильнішою: поле струму $B_\theta = 2I/(cr)$ у вузькому місці більше, тиск $B_\theta^2/8\pi$ теж, і перетяжка стискається далі (позитивний зворотний зв'язок).

Це принципово відрізняється від звичайної стійкої системи. Для стійкої рівноваги початкове зміщення породжує силу, яка повертає систему назад. Для нестійкої — виникає сила в напрямку самого зміщення.

Кількісний розбір перетяжок ($m = 0$), викривлень ($m = 1$) і стабілізації поздовжнім полем B_z з числовими оцінками часу росту наведено в розд. 9.6 (рис. 9.3). Тут для нас важливий лише загальний висновок: нестійкість — це рівновага, у якій збурення змінює сили так, що підсилює саме себе.

8.8. Лінійна та нелінійна стадії

Поки виконується умова малості збурення в (8.1), можна користуватися лінеаризованим рівнянням (8.4). Тоді кожна мода розвивається незалежно від інших, а її амплітуда для нестійкого випадку зростає як

$$|\delta X(t)| \sim |\delta X(0)| e^{\gamma t}. \tag{8.16}$$

Але експоненційне зростання не може тривати нескінченно. Рано чи пізно збурення стає порівнянним із величинами рівноважного стану, і члени вищих порядків, якими ми нехтували при лінеаризації, стають важливими.

Починається нелінійна стадія. На ній можливі насичення нестійкості, перерозподіл енергії між модами, утворення структур, турбулентність або руйнування початкової конфігурації (рис. 8.6).




Рис. 8.6. Типова еволюція нестійкості від малого збурення до нелінійної стадії.

Це розрізнення буде важливим далі: лінійна теорія визначає, *чи* є рівновага нестійкою і які моди ростуть найшвидше, але не завжди визначає кінцевий стан системи.

8.9. Нестійкість Релея — Тейлора та жолобкова нестійкість

Найпростіша й найпоширеніша гідродинамічна нестійкість виникає, коли важча рідина розташована над легшою в полі тяжіння $\mathbf{g}$

(рис. 8.7). Для двох нестисливих рідин з густинами $\rho_2 > \rho_1$ та плоскою границею, збуренням $\delta\xi \propto e^{i(kx-\omega t)}$ лінеаризація дає

$$\omega^2 = -A\,g\,k, \qquad A = \frac{\rho_2 - \rho_1}{\rho_2 + \rho_1}, \qquad \gamma = \sqrt{A\,g\,k}. \tag{8.17}$$

Тут A — *число Атвуда*. Результат легко зрозуміти з енергетичного аргументу. Нехай границя зміщена на $\xi(x) = \xi_0 \cos kx$. Важча рідина опускається, тому на одиницю площі потенціальна енергія змінюється на $\delta U = -\frac{1}{4}(\rho_2 - \rho_1) g \xi_0^2$. Течія нестисливої рідини потенціальна й загасає як $e^{-k|z|}$ від границі, тому кінетична енергія (на одиницю площі) з обох боків $K = \frac{1}{4}(\rho_1 + \rho_2)\dot{\xi}_0^2/k$: ефективна маса $\propto (\rho_1 + \rho_2)/k$. З рівняння руху $(\rho_1+\rho_2)\ddot{\xi}_0/k = (\rho_2-\rho_1) g \xi_0$ маємо $\ddot{\xi}_0 = Agk\,\xi_0$, тобто (8.17). Усі k нестійкі, причому короткі хвилі ростуть швидше. Вільна енергія — потенціальна енергія важчої рідини в полі тяжіння: «язики» важкої рідини падають, «бульбашки» легкої спливають.




Рис. 8.7. Нестійкість Релея — Тейлора: важча рідина над легшою; границя з малим збуренням розвивається в «язики» та «бульбашки».


У плазмі «гравітацію» створюють *ефективні сили*, які діють на частинки в неоднорідному й викривленому магнітному полі: відцентрова сила $mv_\parallel^2/R_c$ та сила градієнтного дрейфу (розд. 3). Для гарячої плазми з $v_\parallel^2 \sim v_\perp^2/2 \sim T/m$ ефективне прискорення $g_{\text{eff}} \sim 2T/(m_i R_c)$. Нестійкі збурення з $k_\parallel = 0$ (вони не згинають силові лінії, а обмінюють місцями магнітні трубки) називають *жолобковими* (*interchange*, flute); для них

$$\gamma^2 \sim \frac{g_{\text{eff}}}{L_p} \sim \frac{2c_s^2}{R_c L_p}, \qquad L_p = \left|\frac{d\ln p}{dr}\right|^{-1}, \tag{8.18}$$

а критерій нестійкості: $\nabla p \cdot \kappa > 0$, де κ — кривина силової лінії (вектор спрямований до центра кривизни). Іншими словами, плазма нестійка в області «поганої» кривини: центр кривини силових ліній лежить з боку плазми, $\nabla p \cdot \kappa > 0$ (зовнішній бік тора, просте дзеркало). Кривина «хороша», якщо центр кривини лежить з боку вакууму (внутрішній бік тора, конфігурації min-B, наприклад котушки Іоффе): поле тоді стабілізує (рис. 8.8). Ефективна «гравітація» g_{eff} — це відцентрова сила частинок, що біжать уздовж лінії (разом із ∇B-дрейфом);

у поганій кривині вона спрямована від плазми до вакууму, тобто «важка» плазма стоїть над «легким» вакуумом, як у нестійкості Релея — Тейлора.

Механізм через розділення зарядів (жолобкова нестійкість). У плазмі немає гравітації, але є дрейф кривини/∇B (розд. 3): він спрямований у протилежні боки для іонів та електронів, тому на «язиках» збурення накопичуються заряди протилежних знаків. Виникає електричне поле δE_y, і дрейф $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ виносить язик *далі* в бік поганої кривини — збурення зростає.



погана кривина: $\nabla p\cdot\kappa > 0$ **хороша кривина:** $\nabla p\cdot\kappa < 0$

Рис. 8.8. Погана (ліворуч) і хороша (праворуч) кривина силових ліній. κ — вектор кривини, спрямований до центра кривини; ∇p — напрям зростання тиску; g_{eff} — ефективна сила (відцентрова).

Для оцінки візьмемо зовнішню область токамака: $c_s \approx 10^8$ см/с, $R_c = 6\times10^2$ см, $L_p \sim 50$ см. Тоді $\gamma \sim \sqrt{2\cdot10^{16}/(3\cdot10^4)} \approx 8\times10^5$ с$^{-1}$, час росту ~ 1 мкс, що на 5–6 порядків менше за час утримання ($\sim 0{,}1$–1 с). Тому реальні установки мусять бути влаштовані так, щоб жолобкові моди були стабілізовані: сумарною «хорошою» кривиною (пастки з мінімумом B, токамак з широм), магнітним широм і т. п.

8.10. Двопотокова нестійкість та нестійкість пучка

Інший клас нестійкостей живиться вільною енергією *розподілу частинок за швидкостями*. Нехай холодний електронний пучок густини $n_b \ll n_0$ та швидкості v_b проходить крізь холодну плазму (n_0, нерухомий іонний фон). Для поздовжніх хвиль $\varepsilon(\omega,k)=0$. Дисперсійне рівняння можна вивести двома шляхами. (а) Холодна гідродинаміка двох потоків (неперервність + рух + Пуассон, як для ленгмюрівської хвилі в розд. 2): для кожного потоку j лінеаризована швидкість $\delta v_j \propto \widetilde{E}/(\omega - kv_j)$, збурення густини $\delta n_j = n_j k\,\delta v_j/(\omega-kv_j) \propto \widetilde{E}/(\omega-kv_j)^2$, а рівняння Пуассона дає $1 = \sum_j \omega_{pj}^2/(\omega-kv_j)^2$, де $v_j=0$ для фонової плазми та $v_j = v_b$ для пучка. (б) З кінетичної ε розд. 7.9 (формула (7.28)) підстановкою $F = n_0\delta(v) + n_b\delta(v-v_b)$ (ω_p — плазмова частота фонової

плазми, ω_b — пучка). Результат:

$$1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} - \frac{\omega_b^2}{(\omega - k v_b)^2} = 0, \qquad \omega_b^2 = \omega_p^2 \frac{n_b}{n_0}. \tag{8.19}$$

Найсильніша взаємодія — при резонансі $k v_b \approx \omega_p$: покладемо $\omega = \omega_p + \delta$, $|\delta| \ll \omega_p$. Тоді $1 - \omega_p^2/\omega^2 \approx 2\delta/\omega_p$, а $(\omega - k v_b)^2 \approx \delta^2$, тому $2\delta/\omega_p \approx \omega_b^2/\delta^2$, тобто $\delta^3 = \omega_p \omega_b^2/2$. Три корені $\delta = (\omega_p \omega_b^2/2)^{1/3} e^{2\pi i j/3}$ включають один із додатною уявною частиною ($j = 1$: $\operatorname{Im} e^{2\pi i/3} = \sqrt{3}/2$, звідси множник $\sqrt{3}/2$ і кубічний корінь):

$$\gamma = \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{n_b}{2 n_0} \right)^{1/3} \omega_p. \tag{8.20}$$

Навіть для $n_b/n_0 = 10^{-3}$ інкремент $\gamma \approx 0{,}07\,\omega_p$, тобто хвиля зростає в e разів за ~ 2 періоди плазмових коливань. Фізично: повільна хвиля пучка ($\omega < k v_b$) має *від'ємну енергію* — її збудження *зменшує* кінетичну енергію пучка сильніше, ніж додає енергії коливань. Зв'язок такої хвилі з ленгмюрівською хвилею плазми (додатна енергія) дозволяє обом наростати одночасно: енергія коливань береться зі сповільнення пучка, а повна енергія системи «пучок + хвиля» зберігається.

Для теплового пучка резонанс стає кінетичним: ріст зумовлений частинками з $v \simeq v_\varphi$ на висхідній ділянці розподілу $F_0'(v_\varphi) > 0$ (рис. 8.9); це *обернене загасання Ландау* (формула (7.30)). Нестійкість насичується, коли пучок розмивається й утворюється плато. Приклад — радіосплески III типу від електронних пучків у короні Сонця. Інший приклад — *аномальний опір* плазми. Коли електронний дрейф відносно іонів перевищує тепловий, виникає нестійкість Бунемана з $\gamma \sim (m_e/2m_i)^{1/3}\omega_{pe}$. Електрони тоді віддають імпульс не іонам через зіткнення, а хвилям, які потім передають його іонам. Ефективна частота «зіткнень» $\nu_{\text{eff}} \sim \gamma$ (або $\sim \omega_{pi}$) набагато перевищує кулонівську, тому $\eta_{\text{an}} \gg \eta_{\text{Spitzer}}$ (розд. 4).

8.11. Нестійкості анізотропної плазми

У замагніченій беззіткнювальній плазмі збереження μ (розд. 3) приводить до анізотропії тиску $p_\perp \neq p_\parallel$ (наприклад, при стисканні поля $p_\perp$ зростає). Анізотропія — ще одне джерело вільної енергії. Дві головні нестійкості:

- *шлангова* (firehose): якщо $p_\parallel - p_\perp > B^2/4\pi$, тобто $\beta_\parallel - \beta_\perp > 2$, відцентрова сила частинок, що біжать уздовж викривленої лінії, перевищує натяг лінії. Оцінка: на одиницю об'єму відцентрова сила частинок $\sim n m v_\parallel^2/R_c \sim p_\parallel/R_c$, діамагнітна реакція $\sim p_\perp/R_c$ їй протидіє, а натяг лінії дає $B^2/(4\pi R_c)$; звідси поріг $p_\parallel - p_\perp > B^2/4\pi$. Дисперсія




Рис. 8.9. Нестійкість «пучка на хвості»: хвиля з фазовою швидкістю на висхідній ділянці розподілу отримує енергію від частинок, і $\gamma > 0$.

альвенівської хвилі змінюється на $\omega^2 = k_\parallel^2 \left[B^2/4\pi + p_\perp - p_\parallel\right]/\rho_m$ і за зміни знака дужки стає від'ємною: лінія «б'ється», як шланг під тиском води;

- *дзеркальна*: якщо $\beta_\perp(T_\perp/T_\parallel - 1) > 1$, виникають локальні «дзеркальні пастки», в яких частинки захоплюються й поле зменшується там, де тиск більший. Механізм: частинки з великим $v_\perp$ (при $\mu = \text{const}$) виштовхуються силою $-\mu\nabla B$ з області сильного поля в слабке й підсилюють провал поля.

Саме ці пороги обмежують анізотропію в сонячному вітрі та магнітосфері планет.

8.12. Енергетичний принцип

Лінеаризоване рівняння ідеальної МГД для зміщення плазми $\boldsymbol{\xi}$ має вигляд $\rho_m\,\partial^2\boldsymbol{\xi}/\partial t^2 = \mathbf{F}(\boldsymbol{\xi})$ — аналог рівняння $m\ddot{x} = -U'(x)$ у механіці. Для консервативної системи оператор $\mathbf{F}$ самоспряжений (ермітів, як гамільтоніан у квантовій механіці), тому ω^2 дійсне, і для нормальної моди

$$\omega^2 = \frac{\delta W}{K}, \qquad K = \frac{1}{2}\int \rho_m |\boldsymbol{\xi}|^2 dV,$$

де K — «кінетична норма», а δW — зміна потенціальної енергії (формула (8.21) нижче). Стійкість означає, що рівновага лежить у мінімумі потенціальної енергії для *будь-якого* зміщення (як маятник у нижній точці; перевернутий маятник — нестійкий). Нестійкість ($\omega^2 < 0$) означає наявність зміщення, яке *знижує* потенціальну енергію. Тому

рівновага стійка тоді й лише тоді, коли для всіх допустимих зміщень

$$\delta W = -\frac{1}{2}\int \boldsymbol{\xi}^* \cdot \mathbf{F}(\boldsymbol{\xi})\, dV > 0. \tag{8.21}$$

Для ідеальної МГД δW допускає зручне розкладання (з $\mathbf{Q} = \nabla \times (\boldsymbol{\xi} \times \mathbf{B})$, κ — кривина лінії):

$$\begin{aligned}\delta W = \frac{1}{2}\int \Big[& \underbrace{\frac{|\mathbf{Q}_\perp|^2}{4\pi}}_{\text{згин ліній}} + \underbrace{\frac{B^2}{4\pi}\left|\nabla\cdot\boldsymbol{\xi}_\perp + 2\boldsymbol{\xi}_\perp\cdot\kappa\right|^2}_{\text{стиск поля}} + \underbrace{\gamma p\,|\nabla\cdot\boldsymbol{\xi}|^2}_{\text{стиск плазми}} \\ & - \underbrace{2(\boldsymbol{\xi}_\perp\cdot\nabla p)(\kappa\cdot\boldsymbol{\xi}_\perp^*)}_{\text{тиск}\times\text{кривина}} - \underbrace{\frac{j_\parallel}{c}(\boldsymbol{\xi}_\perp^*\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{Q}_\perp}_{\text{струм}}\Big] dV.\end{aligned} \tag{8.22}$$

Перші три доданки додатні й стабілізують; знак двох останніх залежить від зміщення — вони є *рушіями* нестійкостей: градієнт тиску в області поганої кривини (жолобкова/балонна нестійкість) і поздовжній струм (кінк-нестійкість; критерій Крускала — Шафранова, розд. 9). Тому стійкість конфігурації визначається мінімумом δW за всіма допустимими зміщеннями, а для доведення нестійкості досить одного пробного зміщення з $\delta W < 0$.

8.13. Дрейфові хвилі та аномальний перенос

Навіть якщо жолобкові й кінк-моди стабілізовані, плазма з градієнтом густини $L_n = |d\ln n/dx|^{-1}$ лишається нестійкою до *дрейфових хвиль*. Нехай електрони вздовж $\mathbf{B}$ встигають встановити больцманівський розподіл: $\delta n/n_0 = e\varphi/T_e$. Збурення густини переноситься дрейфом $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ у неоднорідному фоні: $\partial_t \delta n + v_{Ex}\, dn_0/dx = 0$, з $v_{Ex} = cE_y/B = -ick_y\varphi/B$ (бо $E_y = -ik_y\varphi$). Густина спадає вздовж x: $dn_0/dx = -n_0/L_n$. Алгебра: $-i\omega\,\delta n = -v_{Ex} n_0'$, а з $\delta n = n_0 e\varphi/T_e$ маємо $-i\omega\, n_0 e\varphi/T_e = -(ick_y\varphi/B)\, n_0/L_n$, звідки

$$\omega = \omega_* = k_y v_*, \qquad v_* = \frac{cT_e}{eBL_n} \tag{8.23}$$

(діамагнітна швидкість; для $T_e = 10$ кеВ, $B = 5\times10^4$ Гс, $L_n = 50$ см $v_* \approx 4\times10^5$ см/с). Хвиля поширюється в напрямку електронного дрейфу й сама по собі нейтрально стійка; малі дисипативні ефекти (зіткнення, резонанс Ландау на електронах) зсувають фазу між δn та φ й роблять її нестійкою. Розвиток турбулентності дрейфових хвиль створює випадкові поля $\widetilde{\mathbf{E}}\times\mathbf{B}$, які переносять частинки й тепло поперек поля набагато ефективніше за зіткнення. Оцінка за Бомом: $D_B = cT_e/16eB \approx 10^6$ см^2/с, а для турбулентності зі сталим масштабом $\rho_s = c_s/\omega_{ci}$ (гіро-Бомівська модель) $D \sim (\rho_s/a)D_B \sim 2\times10^3$ см^2/с ($\rho_s \approx$

0,2 см, $a \approx 1$ м). Це на два порядки більше за класичну оцінку $\chi_\perp \sim 10$ см^2/с з розд. 5, і саме цей аномальний перенос визначає реальний час утримання $\tau_E \sim a^2/D \sim$ секунди.

8.14. Від загального принципу до конкретних нестійкостей

Отже, аналіз плазмової нестійкості має загальну послідовність:

1. задається рівноважний стан;
2. до нього додається мале збурення;
3. рівняння лінеаризуються;
4. шукаються моди у вигляді (8.5);
5. з отриманого дисперсійного рівняння (8.12) визначається $\omega(\mathbf{k})$;
6. знак $\operatorname{Im}\omega$ визначає стійкість моди;
7. для нестійких мод визначається швидкість їхнього росту за (8.10).

Фізично ж треба поставити ще одне питання: *звідки ця мода бере енергію?* Саме відповідь на нього відрізняє різні класи нестійкостей (табл. 8.1).

Таблиця 8.1. Основні класи плазмових нестійкостей.

Нестійкість	**Джерело енергії**	**Умова**	**Швидкість росту**
Релея — Тейлора, жолобкова	градієнт тиску в поганій кривині	$\nabla p \cdot \kappa > 0$	$\sqrt{g_{\text{eff}}/L_p}$
Двопотокова, пучок — плазма	кінетична енергія пучка	$kv_b \approx \omega_p$	$\sim (n_b/n_0)^{1/3}\omega_p$
«Пучок на хвості»	висхідна ділянка $F_0' > 0$	$F_0'(v_\varphi) > 0$	кінетична, за (7.30)
Шланг / дзеркальна	анізотропія $p_\perp \neq p_\parallel$	$\beta_\parallel - \beta_\perp > 2$ / $\beta_\perp(T_\perp/T_\parallel - 1) > 1$	$\sim \omega_{ci}$
Кінк, перетяжка	струм у плазмі	$q < 1$ та ін.	$\sim v_A/a$
Дрейфова	градієнт густини	будь-яка за дисипації	$\lesssim \omega_*$

У магнітному утриманні такими джерелами можуть бути струми, градієнти тиску, кривина та неоднорідність магнітного поля (розд. 9). У кінетичній плазмі додатково виникають анізотропія розподілу швидкостей, пучки частинок і резонансна взаємодія хвиль із частинками. Тому наступний крок — розглянути конкретні конфігурації магнітного утримання й з'ясувати, які збурення вони допускають і які фізичні механізми їх підсилюють.

8.15. Як це вимірюють: котушки Мірнова і м'який рентген

Нестійка мода — це біжуче збурення $\delta B \propto \exp[i(m\theta - \omega t)]$, тож її видно двома способами.

Котушки Мірнова. Невеликі котушки (N витків, площа S) вздовж стінки реєструють δB через закон індукції:

$$\mathcal{E} = -\frac{NS}{c}\frac{d\,\delta B}{dt}, \qquad |\mathcal{E}| = \frac{NS}{c}\,\omega\,\delta B \tag{8.24}$$

(СГС, $\mathcal{E}$ у статвольтах). Фазовий зсув між сусідніми котушками, рознесеними на кут $\Delta\theta$, дорівнює $m\Delta\theta$, тож набір котушок дає полоїдальне число m (аналогічно — тороїдальне n), а частота — швидкість обертання моди. *Оцінка.* Для $N = 100$, $S = 1$ см^2, $f = 10$ кГц, $\delta B = 10$ Гс: $|\mathcal{E}| \approx 2{,}1 \times 10^{-3}$ ст.В $\approx 0{,}6$ В — легко вимірюється.

М'який рентген. Гальмівне випромінювання плазми з емісійністю $\varepsilon \propto n_e^2 Z_{\rm eff} T_e^{1/2}$ (у вузькому спектральному вікні залежність від T_e ще крутіша) реєструють лінійкою діодів уздовж хорд. Сигнал є інтегралом по хорді, а оскільки ε різко зростає з T_e, він чутливий до внутрішніх областей. Пилкоподібні коливання (періодичні перебудови осердя токамака) показують різкий спад сигналу в центрі й стрибок на периферії; радіус інверсії позначає поверхню $q = 1$, а томографічна реконструкція за багатьма хордами відновлює двовимірну структуру острова.

Межі застосовності. Котушки бачать лише збурення *на стінці*: поле моди, локалізованої на резонансній поверхні r_s, спадає назовні приблизно як $(r_s/b)^{m+1}$, тож моди з високим m у глибині плазми до стінки майже не доходять, а внутрішню структуру моди треба відновлювати за моделлю. М'який рентген дає хордові інтеграли, тож потрібне обернення (Абеля або томографія), а внесок домішок ($Z_{\rm eff}$) і T_e дозволяє розділити лише порівняння сигналів за двома різними фільтрами.

Головне в розділі

- Нестійкість — експоненційне зростання малого збурення, $\mathrm{Im}\,\omega > 0$; її знаходять із дисперсійного рівняння.
- Кожна нестійкість має джерело вільної енергії: градієнт тиску, пучок, анізотропію розподілу, струм.
- Лінійна теорія визначає, чи рівновага нестійка, але не кінцевий стан: на нелінійній стадії зростання насичується.
- Нестійкості Релея — Тейлора, двопотокова, шлангова, кінк та інші — приклади одного й того самого загального принципу (табл. 8.1).
- Енергетичний принцип зводить стійкість до знака зміни потенціаль-

ної енергії; дрейфові хвилі пов'язані з аномальним переносом.

- Котушки Мірнова за законом індукції дають $\delta B(t)$, фазові зсуви між ними — числа m, n; м'який рентген на хордах показує внутрішні моди й пилкоподібні коливання (розд. 8.15).

Задачі

8.1. Для границі двох рідин з густинами $\rho_2 = 2\rho_1$ у полі $g = 10^3$ см/с^2 знайдіть інкремент Релея — Тейлора (8.17) для $\lambda = 1$ см та 10 см. Яка мода ростиме швидше? Поверхневий натяг σ_s змінює дисперсію на $\omega^2 = -Agk + \sigma_s k^3/(\rho_1+\rho_2)$, де $A = (\rho_2-\rho_1)/(\rho_2+\rho_1)$ — число Атвуда. Знайдіть критичне хвильове число $k_c = \sqrt{(\rho_2-\rho_1)g/\sigma_s}$ і поясніть, чому моди з малою λ стабілізуються. Яку роль у плазмі відіграє «поверхневий натяг»? *Відповідь:* $A = 1/3$; $\gamma(1\text{ см}) \approx 46$ с$^{-1}$, $\gamma(10\text{ см}) \approx 14{,}5$ с$^{-1}$; швидше росте коротша хвиля (без поверхневого натягу). Умова $\omega^2 = 0$ дає k_c; при $k > k_c$ натяг переважає, $\omega^2 > 0$. У плазмі роль натягу відіграє натяг силових ліній (збурення з $k_\parallel \neq 0$, шир) і скінченний ларморівський радіус.

8.2. Електронний пучок з $n_b = 10^9$ см$^{-3}$ проходить крізь плазму з $n_0 = 10^{12}$ см$^{-3}$. Знайдіть ω_p, γ за (8.20), оптимальну довжину хвилі при $v_b = 10^9$ см/с та число плазмових періодів за час росту в e^{10} разів. *Відповідь:* $\omega_p \approx 5{,}6\times10^{10}$ с$^{-1}$; $\gamma \approx 0{,}069\,\omega_p \approx 3{,}9\times10^9$ с$^{-1}$; $\lambda = 2\pi v_b/\omega_p \approx 1{,}1$ мм; $t = 10/\gamma \approx 2{,}6$ нс, тобто ≈ 23 плазмові періоди.

8.3. У сонячному вітрі $B = 5\times10^{-5}$ Гс, $n = 5$ см$^{-3}$, $T_\parallel = 2\times10^5$ К, $T_\perp = 10^5$ К. Перевірте критерій шлангової нестійкості $\beta_\parallel - \beta_\perp > 2$. *Відповідь:* $\beta_\parallel \approx 1{,}4$, $\beta_\perp \approx 0{,}7$, різниця $\approx 0{,}7 < 2$ — плазма стійка.

8.4. Для малого збурення, що має вигляд $\delta X \propto \exp[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)]$, знайдіть час зростання збурення, якщо $\omega = \omega_r + i\gamma$ і $\gamma = 2\times10^5$ с$^{-1}$. Що зміниться, якщо $\gamma < 0$? *Відповідь:* $t_{\text{зр}} = 1/\gamma = 5$ мкс (амплітуда зростає в e разів); при $\gamma < 0$ збурення загасає.

8.5. Два однакові зустрічні електронні потоки $\pm v_0$ з плазмовою частотою ω_p кожного задовольняють $1 = \omega_p^2/(\omega - kv_0)^2 + \omega_p^2/(\omega + kv_0)^2$. Покажіть, що $\omega^2 = k^2v_0^2 + \omega_p^2 - \omega_p\sqrt{4k^2v_0^2 + \omega_p^2}$, що нестійкість існує при $kv_0 < \sqrt{2}\,\omega_p$, а максимальний інкремент $\gamma_{\max} = \omega_p/2$ досягається при $kv_0 = (\sqrt{3}/2)\,\omega_p$. Проілюструйте графічно: побудуйте праву частину як функцію ω і пряму 1. *Відповідь:* межа нестій-

кості $\omega^2 = 0$ дає $k^2 v_0^2 = 2\omega_p^2$; мінімум ω^2 за k^2 досягається при $\sqrt{4k^2 v_0^2 + \omega_p^2} = 2\omega_p$, де $\omega^2 = -\omega_p^2/4$.

8.6. Для математичного маятника довжини l у перевернутому положенні задайте пробне зміщення θ і знайдіть зміну потенціальної енергії $\delta W(\theta)$. Як за знаком δW визначити стійкість положень $\theta = 0$ і $\theta = \pi$? Чому для доведення нестійкості достатньо знайти одне пробне зміщення з $\delta W < 0$? *Відповідь:* $\delta W = mgl(1 - \cos\theta) \approx mgl\,\theta^2/2 > 0$ біля $\theta = 0$ (стійке); для $\theta = \pi + \vartheta$ $\delta W \approx -mgl\,\vartheta^2/2 < 0$ (нестійке). Оскільки $\omega^2_{\min} = \min(\delta W/K)$, одне зміщення з $\delta W < 0$ уже гарантує $\omega^2 < 0$.

8.7. Котушка Мірнова має $N = 100$ витків площею $S = 1$ см^2. Яку ЕРС вона дає за (8.24) для моди з $f = 10$ кГц і $\delta B = 10$ Гс? Дві котушки на одному тороїдальному перерізі, рознесені на $\Delta\theta = 30°$, показують фазовий зсув 90°. Яке m? *Відповідь:* $|\mathcal{E}| \approx 2{,}1 \times 10^{-3}$ ст.В $\approx 0{,}6$ В; $m\Delta\theta = 90° \Rightarrow m = 3$.

Контрольні питання

1. Що фізично означає стійкість, нейтральність і нестійкість рівноваги?
2. Чому при дослідженні нестійкості спочатку можна розглядати лише лінійні за збуренням члени?
3. Який фізичний зміст дійсної та уявної частин частоти ω?
4. Чому умова $\operatorname{Im}\omega > 0$ означає зростання збурення?
5. Чим відрізняються лінійна та нелінійна стадії розвитку нестійкості?
6. Чому виконання рівняння рівноваги ще не гарантує стійкості плазмової конфігурації?
7. Які дві фізичні ролі магнітного поля видно з (8.14)?
8. Звідки плазмова нестійкість може отримувати вільну енергію?
9. Чому із зовнішнього боку тора кривина «погана», а з внутрішнього — «хороша»? Що таке жолобкова мода?
10. Чому пучок у плазмі нестійкий? Яким буде інкремент для слабкого холодного пучка?
11. У чому суть енергетичного принципу? Які доданки в δW стабілізують, а які дестабілізують?

12. Що таке дрейфова хвиля і чому вона призводить до аномального переносу?
13. Що в плазмі відіграє роль прискорення вільного падіння g в аналогії з нестійкістю Релея — Тейлора?
14. Чим бомівська дифузія відрізняється від класичної за залежністю від B?
15. Як за сигналами котушок Мірнова визначити число m і чому вони не бачать мод із великим m в глибині плазми?

9 Магнітне утримання плазми

Щоб отримати термоядерні реакції, плазму потрібно нагріти до високої температури й водночас не дати їй торкнутися стінок. Магнітне поле розв'язує цю задачу для заряджених частинок лише частково: воно сильно обмежує рух поперек поля, але саме по собі не перешкоджає руху вздовж силової лінії. Тому геометрія магнітного поля принципово важлива.

9.1. Проблема утримання

Для реакції синтезу $\mathrm{D}+\mathrm{T}\to{}^4\mathrm{He}+n$ дейтерієво-тритієву плазму треба нагріти до температури $T\sim 10$–20 кеВ ($\sim 10^8$ К) і утримувати достатньо довго. Критерій Лоусона (розд. 10) вимагає $n\tau_E \gtrsim 10^{14}$–10^{15} см$^{-3}$ с (оцінка за порядком величини), де τ_E — час утримання енергії. Жодна матеріальна стінка такої температури не витримає, а контакт зі стінкою охолодив би плазму. Тому плазму треба утримувати без стінок. Є два підходи: інерційний (надвисока густина й надкороткий час, $\tau\sim 10^{-10}$ с) і магнітний ($n\sim 10^{14}$ см$^{-3}$, $\tau\sim 1$ с), який розглядається нижче.

Магнітне утримання ґрунтується на двох фактах, з якими ми вже зустрічалися: заряджені частинки прив'язані до силових ліній (розд. 3), а плазма має діамагнітні властивості, тому магнітне поле для неї — «подушка». Ідею запропонували А. Д. Сахаров та І. Є. Тамм у 1950 р.

9.2. Відкриті пастки: магнітне дзеркало

Принцип дзеркала (умова відбиття (3.9), конус втрат, рис. 3.10) розглянуто в розд. 3.5. Тут нагадаємо лише головний висновок для утримання: однорідне поле не тримає частинку вздовж лінії, а неоднорідність разом зі збереженням μ утримує лише ту частину розподілу, що лежить поза конусом втрат. Нагріті частинки розсіюються кулонівськими зіткненнями в конус втрат за час $\tau_{\mathrm{loss}}\sim \nu_{ii}^{-1}\ln(B_{\max}/B_{\min})$

(розд. 4; темп втрат задають іони, бо швидші електрони утримує амбіполярний потенціал), тому відкриті пастки «протікають» значно швидше, ніж закриті; для довгоживучої плазми їх потрібно доповнювати іншими засобами (амбіполярні потенціали, тандемні пробки). Крім того, дзеркальні конфігурації з «поганою» кривиною (центр кривини силових ліній лежить з боку плазми) схильні до жолобкових нестійкостей (розд. 8.9); конфігурації min-B, у яких кривина «добра» (центр кривини з боку вакууму), від них вільні.


9.3. Пінч-ефект

Плазму можна створити електричним розрядом. Далі виникає задача утримати плазмовий шнур від розпливання, спричиненого газокінетичним тиском. Одним із засобів є *пінч-ефект* (від англ. *pinch* — стискання) — властивість струмового каналу зменшувати свій перетин під дією магнітного поля, створеного власним струмом. Фізичну причину зрозуміти легко: паралельні струми притягуються (сила Ампера на одиницю довжини $dF/dl = 2I_1I_2/c^2d$), і нитки струму в шнурі стискаються до осі.

Пінч-ефект описав Беннет 1934 р. стосовно потоків швидких заряджених частинок у газорозрядній плазмі, а назву «пінч-ефект» 1937 р. запропонував Тонкс, який вивчав дуговий розряд. Розрізняють два типи (рис. 9.1):

1. z-пінч: струм тече вздовж шнура й взаємодіє з власним азимутальним полем;
2. θ-пінч: швидко зростаюче поздовжнє поле індукує в плазмі азимутальні (кільцеві) струми, що взаємодіють з цим полем і стискають шнур.

Розглянемо рівновагу обох конфігурацій, а потім їхню стійкість.



(а) z-пінч (б) θ-пінч

Рис. 9.1. Зліва — z-пінч, справа — θ-пінч

9.4. Рівновага z-пінча. Співвідношення Беннета

Розглянемо нескінченний циліндричний шнур радіуса R із поздовжнім струмом I (рис. 9.2). Теорема про циркуляцію на колі радіуса r дає азимутальне поле

$$2\pi r B_\theta = \frac{4\pi}{c} I(r) \quad \Rightarrow \quad B_\theta(r) = \frac{2I(r)}{cr}, \qquad I(r) = \int_0^r 2\pi r' j\, dr',$$

а умова рівноваги (5.9) у радіальній проекції $dp/dr = -jB_\theta/c$, оскільки $\mathbf{j}\times\mathbf{B}$ напрямлено до осі. Виразивши $j = \dfrac{c}{4\pi r}\dfrac{d(rB_\theta)}{dr}$, знаходимо

$$\frac{d}{dr}\left(p + \frac{B_\theta^2}{8\pi}\right) = -\frac{B_\theta^2}{4\pi r}. \tag{9.1}$$

Права частина — це натяг азимутальних силових ліній («обручевий натяг»), який додатково стискає шнур. Тому сума газового та магнітного тисків $p + B_\theta^2/8\pi$ *не* стала: вона спадає до периферії.




Рис. 9.2. До виведення умови рівноваги z-пінча. Контур Γ показано штриховою лінією

Окремий випадок: однорідний струм. Нехай $j = \text{const} = I/\pi R^2$, тоді $B_\theta = 2\pi jr/c$ і (9.1) інтегрується: з урахуванням $p(R) = 0$

$$p(r) = \frac{\pi j^2}{c^2}\left(R^2 - r^2\right) = \frac{B_\theta^2(R) - B_\theta^2(r)}{4\pi}.$$

Бачимо, що саме для $j = \text{const}$ виконується $p + B_\theta^2/4\pi = \text{const}$ (а не $B_\theta^2/8\pi$: різницю дає обручевий натяг). Якщо концентрація всіх частинок n стала, $p = nT$, то профіль температури

$$T(r) = \frac{\pi}{nc^2}\left(\frac{I}{\pi R^2}\right)^2 (R^2 - r^2).$$

Зокрема на осі $N_1 T(0) = I^2/c^2$, де $N_1 = \pi R^2 n$ — погонна густина частинок.

Загальне співвідношення Беннета. Результат можна одержати без припущень про профіль. Помножимо $dp/dr = -jB_\theta/c$ на r^2 й проінтегруємо від 0 до R. Ліва частина дає (інтегрування частинами, $p(R)=0$) $-2\int_0^R pr\,dr$, а у правій, використавши $j = \dfrac{c}{4\pi r}\dfrac{d(rB_\theta)}{dr}$, маємо

$$-\frac{1}{c}\int_0^R r^2 jB_\theta\,dr = -\frac{1}{8\pi}\int_0^R \frac{d\,(rB_\theta)^2}{dr}\,dr = -\frac{[RB_\theta(R)]^2}{8\pi} = -\frac{I^2}{2\pi c^2}.$$

Звідси $\int_0^R 2\pi p\,r\,dr = I^2/2c^2$, або

$$\boxed{N_1\overline{T} = \frac{I^2}{2c^2}}. \tag{9.2}$$

Тут N_1 — повне число частинок (електронів і іонів) на одиницю довжини шнура, $\overline{T}$ — усереднена за кількістю частинок температура. Це *співвідношення Беннета*. Воно показує, що для утримання шнура із заданими N_1 і $\overline{T}$ *потрібен цілком певний струм*, незалежно від радіуса й розподілу струму. У випадку $n=\text{const}$, $j=\text{const}$ маємо $\overline{T} = T(0)/2$, і (9.2) збігається з отриманим вище. Наприклад, шнур з концентрацією електронів й іонів по 10^{16} см$^{-3}$ при радіусі 1 см, нагрітий в середньому до 1 кеВ, потребує струму $I \approx 1{,}4\times10^5$ А (аналогічна задача 9.3).

9.5. Рівновага θ-пінча

У θ-пінчі (рис. 9.1, справа) плазму оточує одновиткова котушка, через яку розряджають конденсаторну батарею. Поздовжнє поле B_z за мікросекунди зростає до десятків кілогаусів. Вихрове електричне поле E_θ наводить у поверхневому шарі плазми кільцевий струм j_θ. Його напрям такий, що власне поле струму зменшує зовнішнє поле всередині шнура: плазма поводиться як діамагнетик (розд. 5.8). Сила $\mathbf{j}\times\mathbf{B}/c$ напрямлена до осі, і поле працює як *магнітний поршень*, що стискає шнур.

У рівновазі радіальна проекція (5.9) має вигляд $dp/dr = j_\theta B_z/c$. Підставивши $j_\theta = -\dfrac{c}{4\pi}\dfrac{dB_z}{dr}$, одержуємо

$$\frac{d}{dr}\left(p + \frac{B_z^2}{8\pi}\right) = 0 \quad\Rightarrow\quad p(r) + \frac{B_z^2(r)}{8\pi} = \frac{B_0^2}{8\pi}, \tag{9.3}$$

де B_0 — поле між плазмою та котушкою, де $p=0$. Це просто баланс тисків (5.15). Порівняно з z-пінчем (9.1) у правій частині немає обручевого натягу: силові лінії поля B_z прямі. Тому сума газового та магнітного тисків стала по перерізу.

З (9.3) випливає, що $\beta = 8\pi p/B_0^2 = 1 - B_z^2/B_0^2 \leqslant 1$. Межа $\beta = 1$ досягається, коли поле повністю витіснене з осі. На відміну від токамака, де β становить кілька відсотків (розд. 9.9), у θ-пінчах одержують $\beta \approx 0{,}7$–$0{,}9$. Отже, θ-пінч використовує магнітне поле найефективніше. Максимальний тиск задає лише поле котушки. Наприклад, при $B_0 = 50$ кГс маємо $p_{\max} = B_0^2/8\pi \approx 10^8$ дин/см$^2 \approx 100$ атм. При $T_e = T_i = 1$ кеВ це відповідає $n = p/2T \approx 3 \times 10^{16}$ см$^{-3}$.

Нагрівання. Плазма нагрівається у два етапи. Спочатку швидкий фронт поля (час наростання $\lesssim 1$ мкс) збуджує стискну ударну хвилю. Вона за один прохід нагріває іони до сотень електронвольт. Далі поле зростає повільніше, і відбувається адіабатичне стискання вмороженої плазми. Саме на такій установці, *Scylla* (Лос-Аламос, 1958 р.), уперше надійно зареєстрували термоядерні нейтрони з лабораторної плазми.

Стійкість і втрати. Силові лінії прямі, а поле на межі плазми монотонно зростає назовні. Тому лінійний θ-пінч стійкий щодо перетяжок і викривлень, які руйнують z-пінч (розд. 9.6). Проте вздовж поля ніщо не утримує частинки, і плазма вільно витікає через торці. Час утримання визначається часом прольоту іона на половину довжини, $\tau \sim L/2v_{Ti}$. Для дейтерієвої плазми з $T = 1$ кеВ ($v_{Ti} \approx 2 \times 10^7$ см/с) при $L = 1$ м маємо $\tau \approx 2$ мкс і $n\tau \sim 10^{11}$ см$^{-3}$ с. Це на три порядки менше за критерій Лоусона (10.3). Закрити торці, згорнувши шнур у тор, теж не вдалося. Як і для будь-якого чисто тороїдального поля (розд. 9.7), тороїдальний θ-пінч (*Scyllac*, 1970-ті) не має рівноваги без додаткових гвинтових полів. Його нащадок — *конфігурація з оберненим полем* (FRC). У ній на початку розряду всередині шнура вморожують зворотне поле, і силові лінії замикаються самі на себе в плазмі.


9.6. Нестійкості пінча

Рівновага ще не гарантує існування. Плазма — об'єкт, у якому розвиваються різні нестійкості, що порушують її однорідність і форму та обмежують час життя. Для термоядерного синтезу, де плазму потрібно утримувати довго, це критично.

Перетяжки ($m = 0$). Нехай випадково на шнурі виникло звуження (рис. 9.3). Струм I сталий, тому густина струму $j = I/\pi R^2$ в перетяжці зростає, а разом із нею зростає поле на поверхні $B_\theta(R) = 2I/cR$. Тиск цього поля $B_\theta^2/8\pi = I^2/2\pi c^2 R^2 \propto R^{-2}$ збільшується, а сила Ампера на одиницю об'єму $F_A = jB_\theta/c = 2I^2/(\pi c^2 R^3)$ ще швидше. Тиск плазми в перетяжці майже не підвищується (плазма витискається вздовж осі). Тому нескомпенсована сила стискання зростає, звуження поглиблюється — розвивається нестійкість. Для лабораторного шнура ($n \sim 10^{16}$ см$^{-3}$, $R \sim 1$ см) характерний час росту $\sim R/v_{A\theta} \sim 10^{-8}$ с, де

$v_{A\theta} = B_\theta/\sqrt{4\pi\rho_m}$. Для прикладу Беннета ($B_\theta \approx 2{,}8\times10^4$ Гс, $n_i = 10^{16}$ см$^{-3}$, дейтерій) $v_{A\theta} \approx 4\times10^7$ см/с, $R/v_{A\theta} \approx 2{,}5\times10^{-8}$ с.

Викривлення ($m = 1$). Якщо шнур випадково прогнувся, то з увігнутого (внутрішнього) боку вигину кільцеві силові лінії B_θ згущуються, а з опуклого розріджуються. Магнітний тиск $B^2/8\pi$ з увігнутого боку більший, він штовхає шнур ще далі в бік опуклості, і вигин наростає: що сильніше прогин, то більша різниця тисків, тобто нестійкість.



(а) перетяжки, $m = 0$ (б) викривлення, $m = 1$

Рис. 9.3. Нестійкості z-пінча: перетяжки та викривлення шнура

Стабілізація поздовжнім полем. Щоб боротися з перетяжками, в плазму «вморожують» поздовжнє магнітне поле B_z. У ідеально провідній плазмі магнітний потік через поперечний переріз зберігається: $\pi R^2 B_z = \text{const}$, тому при звуженні шнура $B_z \propto R^{-2}$, а відповідний тиск $B_z^2/8\pi \propto R^{-4}$ зростає *швидше* за тиск азимутального поля ($\propto R^{-2}$). Вимагатимемо рівноваги на поверхні $p + B_z^2/8\pi = B_\theta^2(R)/8\pi$ й порівняємо зміни при малому стисканні δR (тиск p не змінюється):

$$\delta\frac{B_z^2}{8\pi} = -4\,\frac{B_z^2}{8\pi}\frac{\delta R}{R}, \qquad \delta\frac{B_\theta^2}{8\pi} = -2\,\frac{B_\theta^2}{8\pi}\frac{\delta R}{R}.$$

Внутрішній тиск при стисканні зростає більше за зовнішній, якщо $4B_z^2 > 2B_\theta^2$, тобто $B_z^2 > B_\theta^2/2$. Тоді виникає повертаюча сила — перетяжки стійкі. (Це оцінка в спрощеній моделі, але вона правильно передає суть: чим більше поздовжнє поле, тим стійкіший шнур; у цій моделі тиск плазми вважається незмінним, а B_z — «вмороженим» у шнур і стисненим разом із ним.)

Проти викривлення потрібна ще сильніша стабілізація. Умова Крускала — Шафранова для шнура довжиною L й радіусом a вимагає

$$q = \frac{2\pi a}{L}\,\frac{B_z}{B_\theta} > 1.$$

Тобто силові лінії мають зробити більше одного оберту навколо осі на довжині шнура. У стабілізованому пінчі B_z значно перевищує B_θ,

а рівновага визначається не лише струмом, і ми поступово переходимо до сучасних систем. Крім перетяжок і викривлень існують інші нестійкості (перестановочні, балонні, розривні моди — останні пов'язані з перез'єднанням, розд. 5.10), які визначають межі параметрів реальних установок.

9.7. Тороїдальні системи: токамак і стеларатор

Відкриті пастки (дзеркала, лінійні пінчі) втрачають частинки через торці. Інший спосіб — замкнути силові лінії в тор. Однак чисто тороїдальне поле $B_\varphi \propto 1/R$ неоднорідне, тому виникають градієнтний і відцентровий дрейфи (3.4) з вертикальною швидкістю

$$v_d \approx \frac{2c\,T}{|q|BR},$$

протилежною для іонів і електронів. Для $T = 10$ кеВ, $B = 5\times10^4$ Гс, $R = 6\times10^2$ см маємо $v_d \approx 7\times10^4$ см/с, тобто за секунду частинка дрейфувала б на сотні метрів. Дрейф розділяє заряди, виникає вертикальне електричне поле, і дрейф у схрещених полях (3.2) виносить уже *обидва* сорти частинок назовні на стінку. Отже, чисто тороїдальне поле не утримує.

Вихід — закрутити силові лінії, додавши до тороїдального поля полоїдальну складову B_θ. Тоді лінії гвинтоподібно намотуються на вкладені магнітні поверхні, і частинка, рухаючись уздовж лінії, по черзі опиняється вгорі й внизу тора: вертикальні дрейфи усереднюються, а заряди закорочуються вздовж лінії. Закрученість характеризують *запасом стійкості* $q = rB_\varphi/(RB_\theta)$ — локальним співвідношенням тороїдального та полоїдального полів. Фізично q показує, скільки разів силова лінія обходить тор вздовж (тороїдально) за один оберт навколо осі шнура (полоїдально); назва «запас стійкості» — це запас до порогу $q = 1$. Для шнура довжиною $L = 2\pi R$ маємо $q = 2\pi aB_z/(LB_\theta) = aB_\varphi/(RB_\theta)$ — той самий q в обох означеннях. Важливий також *шир* $s = (r/q)\,dq/dr$: на сусідніх магнітних поверхнях лінії мають різний крок гвинта, тому збурення, витягнуте вздовж лінії на одній поверхні, на сусідній «розрізається»; шир стабілізує. У простій циліндричній моделі критерій Крускала — Шафранова для основної $m = 1$-моди приводить до умови порядку $q(a) > 1$. Для реального токамака умови МГД-стійкості складніші й визначаються профілями струму, тиску та геометрією магнітних поверхонь.

Закрутку створюють двома способами (рис. 9.4). У *токамаку* (скорочення від рос. *тороидальная камера с магнитными катушками*) тороїдальне поле створюють зовнішні котушки, а полоїдальне — струм, що тече самою плазмою (індукований трансформатором). То-

камак розвинули в СРСР з ідей Тамма й Сахарова; результати установки Т-3 (1968 р., під керівництвом Л. А. Арцимовича) стали поворотним пунктом, після якого токамаки почали будувати в усьому світі. У *стелараторі* (Спітцер, 1951 р.) закрутку створюють зовнішні гвинтові котушки, а струму в плазмі немає, що дозволяє працювати в стаціонарному режимі, але вимагає складної тривимірної геометрії котушок. Найбільший токамак, що будується, — ITER ($R \approx 6{,}2$ м, $a \approx 2$ м, $B \approx 5{,}3$ Тл, $I = 15$ МА); саме такі параметри ми використовуватимемо в оцінках нижче.




Рис. 9.4. Принцип тороїдального магнітного утримання: силові лінії замкнені й закручені, лежать на вкладених магнітних поверхнях

9.8. Захоплені частинки й неокласичний перенос

У токамаку $B_\varphi \propto 1/R$: поле сильніше на внутрішній стороні тора ($B_{\max}$) і слабше на зовнішній ($B_{\min}$). Отже, тор містить магнітне дзеркало (розд. 3.5), розтягнуте по периметру. Умова відбиття $\sin^2\theta \geq B_{\min}/B_{\max} = (1-\varepsilon)/(1+\varepsilon)$, де $\varepsilon = r/R$ — обернене аспектне відношення, означає (кути беруться на зовнішній стороні, де $B = B_{\min}$) $\sin^2\theta \geq \dfrac{1-\varepsilon}{1+\varepsilon} \Rightarrow \cos^2\theta \leq \dfrac{2\varepsilon}{1+\varepsilon} \Rightarrow v_\parallel/v \lesssim \sqrt{2\varepsilon}$: такі частинки *захоплені* на зовнішній стороні й не оббігають поперечний переріз повністю. Їхня частка $f_t \approx \sqrt{2\varepsilon}$: для ізотропного розподілу частка частинок у конусі $|\cos\theta| < x$ дорівнює x. Для $\varepsilon = 0{,}3$ маємо $\sqrt{0{,}6} \approx 0{,}77 \sim 0{,}8$ — це велика частка, а не мала поправка (точніше, $f_t \approx \sqrt{2\varepsilon/(1+\varepsilon)} \approx 0{,}68$). Інші частинки *пролітні*.

У проєкції на полоїдальну площину траєкторія захопленої частинки має форму банана (рис. 9.5). Оцінимо її ширину: поздовжня швидкість захопленої частинки $v_\parallel \sim \sqrt{\varepsilon}\,v$; час півоберту по банану $\tau_b \sim qR/v_\parallel \sim qR/(\sqrt{\varepsilon}\,v)$ (множник q тому, що довжина силової лінії




Рис. 9.5. Полоїдальний переріз токамака: пролітна частинка оббігає магнітну поверхню, а захоплена описує «бананову» орбіту навколо екваторіальної площини на зовнішній стороні

за один полоїдальний оберт дорівнює $2\pi qR$); тороїдальний дрейф $v_d \sim v\,r_L/R$. Отже, $\Delta_b \sim v_d \tau_b \sim q\,r_L/\sqrt{\varepsilon}$: радіальна ширина за порядком величини

$$\Delta_b \sim \frac{q\,r_L}{\sqrt{\varepsilon}}, \tag{9.4}$$

де q — запас стійкості, r_L — ларморівський радіус у повному полі. Це кратно більше за r_L (для $q = 2$, $\varepsilon = 0{,}3$ у ~ 4 рази). Кулонівські зіткнення зсувають частинку на Δ_b вбік; щоб вона покинула банан, достатньо розсіяти її по куту на $\Delta\theta \sim \sqrt{\varepsilon}$. Кут розсіюється *дифузійно*, $(\Delta\theta)^2 \sim \nu t$, тож щоб змінити його на $\sqrt{\varepsilon}$, потрібен час $t \sim \varepsilon/\nu$, тобто ефективна частота розсіяння $\nu_{\text{eff}} \sim \nu/\varepsilon$ (вона більша за ν, бо для виходу з банана досить малого кутового зсуву). Оцінимо дифузію (крок Δ_b, частота кроків ν_{eff}, частка частинок f_t):

$$D_{\text{neo}} \sim f_t\,\Delta_b^2\,\nu_{\text{eff}} \sim q^2\,\varepsilon^{-3/2}\,r_L^2\nu. \tag{9.5}$$

Порівняно з класичною дифузією $D_\perp \sim r_L^2\nu$ перенос збільшується в $q^2\varepsilon^{-3/2}$ разів, тобто в $\sim$ 20–50 разів у типових токамаках. Це *неокласичний* перенос (режим бананів, поки $\nu\,qR/(\varepsilon^{3/2}v_T) < 1$). Він є результатом тороїдальної геометрії, не залежить від турбулентності, але все одно нижчий за спостережуваний у електронному каналі — різницю (див. розд. 8.13) дає аномальний перенос.

Захоплені частинки мають ще один наслідок: у плазмі з градієнтом тиску виникає *бутстреп-струм* $j_{\text{bs}} \sim -\sqrt{\varepsilon}\,(c/B_\theta)\,dp/dr$, який створюється самою плазмою без трансформатора й дозволяє токамаку працювати в стаціонарному режимі.

Звідки він береться. Захоплені частинки на бананах рухаються в протилежних напрямках уздовж внутрішньої та зовнішньої «ні-

жок» банана. Якщо є градієнт густини, на даному радіусі банани, що приходять із внутрішнього боку, густіші за ті, що з зовнішнього, і виникає нескомпенсований струм (аналог діамагнітного струму намагнічування, але від бананів). Через тертя він передається пролітним частинкам, звідки й оцінка вище. Практично: у стаціонарних сценаріях ITER і в проєктах DEMO розраховують на частку бутстреп-струму $\sim 50\%$ і більше (в індуктивному базовому сценарії ITER — лише ~ 15–20%), що наближає токамак до стаціонарної роботи без індукції.

9.9. Рівновага тора: зсув Шафранова та межа за тиском

Плазмовий тор, як і надувний обруч, прагне розширитися: газовий тиск і «обручева» сила струму витискають кільце назовні. Для рівноваги потрібне вертикальне поле B_v, а самі магнітні поверхні зсуваються вбік зовнішньої стінки відносно центра камери — *зсув Шафранова* $\Delta \sim (a^2/R)(\beta_p + l_i/2)$, де $\beta_p = 8\pi\langle p\rangle/B_\theta^2$ — полоїдальна бета, l_i — внутрішня індуктивність. Чим більший тиск плазми, тим більший зсув; при $\beta_p \sim R/a$ рівновага взагалі зникає.

Є й жорсткіші межі, що пов'язані зі стійкістю (розд. 8). Поздовжній струм обмежений кінк-нестійкістю: $q(a) > 1$, а практично $q(a) \gtrsim 2$–3. Тиск обмежений балонними й кінк-модами; для них емпірично встановлено *межу Тройона*

$$\beta_{\max}[\%] = \beta_N \frac{I[\text{МА}]}{a[\text{м}]\, B[\text{Тл}]}, \qquad \beta_N \approx 2{,}8, \tag{9.6}$$

тобто $\beta \sim$ кілька відсотків. Для $I = 15$ МА, $a = 2$ м, $B = 5$ Тл маємо $\beta_{\max} \approx 4\%$. Оскільки $P_f \propto \beta^2 B^4$ (розд. 5), саме межа Тройона й максимальне поле надпровідних магнітів визначають розмір електростанції. Окрім того, густина обмежена *межею Грінвальда* $n_G[10^{20}\,\text{м}^{-3}] = I[\text{МА}]/(\pi a^2[\text{м}^2]) \approx 1{,}2$ для цих параметрів ($\approx 1{,}2\times10^{14}$ см$^{-3}$) — не випадково саме такі густини ми розглядали у попередніх розділах.

> **!** *Бета порівнює тиски, але сама по собі не характеризує стійкість: утримання з малим β може бути нестійким (наприклад, при $q(a) < 1$), а межа Тройона — емпіричне, а не точне співвідношення.*

9.10. Як це вимірюють: магнітна реконструкція рівноваги

Форму й положення плазмового шнура не можна побачити всередині, але їх можна відновити із зовнішніх магнітних вимірів. Пояс Роговського дає повний струм I, петлі потоку й зонди B_θ вздовж

стінки (розд. 5.12) дають полоїдальне поле на контурі. Поза плазмою поле безвихрове, тож за значеннями на контурі розв'язують рівняння Града — Шафранова й знаходять магнітні поверхні, положення осі й зсув Шафранова Δ. Зворотно, виміряний Δ задає комбінацію

$$\boxed{\beta_p + \frac{l_i}{2} \sim \frac{R}{a^2}\,\Delta,} \tag{9.7}$$

а разом з діамагнітним вимірюванням енергії (розд. 5.12) розділяє внесок тиску β_p і внутрішньої індуктивності l_i (профілю струму). *Оцінка.* Для $a = 0{,}5$ м, $R = 1{,}5$ м, $\Delta = 10$ см: $\beta_p + l_i/2 \approx 0{,}6$.

Межі застосовності. Зовнішні виміри однозначно задають лише зовнішні поверхні; внутрішній профіль струму $q(r)$ потрібно знаходити з додаткових даних (поляриметрія, розд. 6.7, або штарківське розщеплення ліній інжектованого пучка), а у реальному часі реконструкцію виконують спрощеними моделями.

Головне в розділі

- Магнітне поле обмежує рух поперек силових ліній, а вздовж них — ні, тому геометрія поля принципово важлива.
- Відкриті пастки (магнітне дзеркало) мають конус втрат; замкнені конфігурації вимагають закрутки силових ліній.
- Рівновага z-пінча встановлюється балансом газокінетичного тиску, магнітного тиску й натягу азимутальних силових ліній (обручевий натяг); такий пінч нестійкий до перетяжок і викривлень.
- У θ-пінчі силові лінії прямі, тож $p + B_z^2/8\pi = \text{const}$, β близьке до одиниці, а конфігурація МГД-стійка; головна вада — швидке витікання плазми через торці.
- Токамак і стеларатор утримують плазму завдяки гвинтовому полю; захоплені частинки призводять до неокласичного переносу.
- Тиск плазми обмежений рівновагою та стійкістю (зсув Шафранова, межа за β).
- Положення й форму шнура, зсув Шафранова та комбінацію $\beta_p + l_i/2$ відновлюють із зовнішніх магнітних вимірів (розд. 9.10).

Задачі

9.1. Для $\varepsilon = a/R = 0{,}3$ ($a = 2$ м), $q = 2$ знайдіть частку захоплених частинок f_t і ширину банана для іона дейтерію ($T = 10$ кеВ, $B = 5{\times}10^4$ Гс). Порівняйте з a і оцініть $D_{\text{neo}}/D_{\text{cl}}$. *Відповідь:* $f_t \approx \sqrt{2\varepsilon} \approx 0{,}77$; $r_L \approx 0{,}3$ см, $\Delta_b \sim qr_L/\sqrt{\varepsilon} \approx 1$ см $\ll a = 200$ см; $D_{\text{neo}}/D_{\text{cl}} \sim q^2\varepsilon^{-3/2} \approx 24$.

9.2. Знайдіть межу Тройона й межу Грінвальда для $I = 2$ МА, $a = 0{,}5$ м, $B = 2$ Тл. Яким буде тиск плазми при досягненні цієї межі β? *Відповідь:* $\beta_{\max} \approx 2{,}8 \cdot 2/(0{,}5 \cdot 2) \approx 5{,}6\%$; $n_G \approx 2{,}5 \times 10^{20}$ м$^{-3}$ $= 2{,}5 \times 10^{14}$ см$^{-3}$; $p = \beta B^2/8\pi \approx 9 \times 10^5$ дин/см$^2 \approx 0{,}9$ атм.

9.3. За співвідношенням Беннета знайдіть струм, потрібний для утримання шнура радіуса $R = 0{,}5$ см дейтерієвої плазми з концентрацією електронів та іонів по 5×10^{17} см$^{-3}$ і середньою температурою 200 еВ. Яке при цьому поле B_θ на поверхні шнура? Оцініть час наростання перетяжки ($m = 0$). *Відповідь:* $N_1 = 2n\pi R^2 \approx 7{,}9 \times 10^{17}$ см$^{-1}$, $I \approx 2{,}2 \times 10^5$ А, $B_\theta = 2I/cR \approx 9 \times 10^4$ Гс; $\tau \sim R/v_A \sim 2 \times 10^{-8}$ с.

9.4. У θ-пінчі поле котушки $B_0 = 40$ кГс, а поле на осі шнура $B_z(0) = 20$ кГс. Знайдіть β на осі, тиск плазми й концентрацію дейтерієвої плазми при $T_e = T_i = 1$ кеВ. Оцініть час витікання через торці для шнура довжиною $L = 3$ м і порівняйте $n\tau$ з критерієм Лоусона (10.3). *Відповідь:* $\beta = 1 - B_z^2(0)/B_0^2 = 0{,}75$; $p = (B_0^2 - B_z^2)/8\pi \approx 4{,}8{\times}10^7$ дин/см$^2 \approx 47$ атм; $n = p/2T \approx 1{,}5{\times}10^{16}$ см$^{-3}$; $v_{Ti} \approx 2{,}2 \times 10^7$ см/с, $\tau \sim L/2v_{Ti} \approx 7$ мкс; $n\tau \approx 10^{11}$ см$^{-3}$ с, на три порядки менше за потрібне.

9.5. Оцініть запас стійкості $q(a) = aB_\varphi/(RB_\theta)$ для $a = 0{,}5$ м, $R = 1{,}5$ м, $B_\varphi = 2$ Тл, $I = 1$ МА, де $B_\theta = 2I/(ca)$ у СГС (0,4 Тл). Чи виконується умова Крускала–Шафранова $q(a) > 1$? *Відповідь:* $q \approx 1{,}7$.

9.6. Для пробкового відношення $R_m = B_{\max}/B_{\min} = 5$ знайдіть частку частинок ізотропного розподілу, що потрапляють у конус втрат. Як вона зміниться при $R_m = 10$? *Відповідь:* $1 - \sqrt{1 - 1/R_m} \approx 0{,}11$ і $\approx 0{,}05$.

9.7. У токамаку з $a = 0{,}5$ м, $R = 1{,}5$ м, $B_\theta = 0{,}4$ Тл середня концентрація $n_e = n_i = 5 \times 10^{13}$ см$^{-3}$, $T_e = T_i = 1$ кеВ. Знайдіть $\beta_p = 8\pi\langle p\rangle/B_\theta^2$ і зсув Шафранова Δ за (9.7) при $l_i = 1$. *Відповідь:* $\langle p\rangle = 2nT \approx 1{,}6 \times 10^5$ дин/см^2, $\beta_p \approx 0{,}25$; $\Delta \approx (a^2/R)(\beta_p + l_i/2) \approx 12$ см.

? Контрольні питання

1. Як працює магнітне дзеркало? Що таке конус втрат?
2. Чому z-пінч утримується? Чому в загальному випадку $p + B^2/8\pi \neq$ const?
3. Що виражає співвідношення Беннета? Що з нього випливає для струму?
4. Чому в θ-пінчі $p + B_z^2/8\pi =$ const, а в z-пінчі ні? Чому лінійний θ-пінч стійкий, але не придатний для реактора?
5. Чому чисто тороїдальне поле не утримує плазму? Як це виправляють у токамаку та стелараторі?
6. Які частинки в токамаку називають захопленими? Яку форму має їхня орбіта і чому неокласичний перенос перевищує класичний?
7. Які обмеження за струмом, тиском і густиною існують у токамаку?
8. Що таке запас стійкості q і навіщо потрібна умова $q(a) > 1$?
9. Чому виникає бутстреп-струм?
10. Чому тор прагне розширитися і як його утримують?

10 Керований термоядерний синтез

Основний практичний інтерес фізики плазми пов'язаний із проблемою *керованого термоядерного синтезу* (КТС). Для достатньо інтенсивних реакцій синтезу речовину треба нагріти до ~ 10–20 кілоелектронвольт (понад сто мільйонів кельвінів), а за таких температур вона є плазмою.

10.1. Реакції та паливо

Найлегше здійснюється реакція дейтерію з тритієм

$$\mathrm{D} + \mathrm{T} \to {}^4\mathrm{He}\,(3{,}5\ \text{МеВ}) + n\,(14{,}1\ \text{МеВ}),$$

з повним виходом $E_f = 17{,}6$ МеВ. Швидкість реакцій характеризує величина $\langle \sigma v \rangle$ (усереднена за максвеллівським розподілом): для D–T вона дорівнює приблизно $1{,}4 \times 10^{-17}$, $1{,}1 \times 10^{-16}$, $4{,}3 \times 10^{-16}$, $6{,}7 \times 10^{-16}$ см^3/с при $T = 5$, 10, 20, 30 кеВ. Дейтерій міститься в морській воді (приблизно один атом на 6400 атомів водню; загальна маса в океанах $\sim 4 \times 10^{13}$ т, що за порядком величини відповідає 10^{20} кВт·рік, тоді як споживана людством потужність становить $\sim 10^{10}$ кВт). Тритій радіоактивний (період піврозпаду ≈ 12 років) і в природі практично відсутній, тому його треба виробляти в самому реакторі: нейтрони реакції опромінюють літієвий шар («бланкет»), $n + {}^6\mathrm{Li} \to \mathrm{T} + {}^4\mathrm{He}$. Реакція D–D потребує значно вищих температур (~ 50 кеВ).

10.2. Чому потрібна саме така температура: бар'єр і тунелювання

Два ядра мають злитися на відстані $r \sim 4$ фм (радіус дії ядерних сил), але вони відштовхуються кулонівською силою. Висота кулонівського бар'єра для D–T $U_C = Z_1 Z_2 e^2 / r \approx 1{,}44$ МеВ·фм/4 фм $\approx 0{,}4$ МеВ, тобто в ~ 40 разів більше за 10 кеВ. Класично злиття можливе лише для частинок із далекого максвеллівського «хвоста» $e^{-E/T} \sim e^{-40}$ — замало. Реакції ідуть завдяки *квантовому тунелюванню*.

Теоретичні відомості Нагадаємо з квантової механіки

У квазікласичному (ВКБ) наближенні ймовірність проходження крізь бар'єр дорівнює $\exp\!\left(-\frac{2}{\hbar}\int_{r_1}^{r_2}|p|\,dr\right)$, де $|p|=\sqrt{2m_r(U(r)-E)}$ під бар'єром. Для кулонівського бар'єра $U=Z_1Z_2e^2/r$ інтеграл від точки зупинки $r_2=Z_1Z_2e^2/E$ до ядерного радіуса (при $E\ll U_C$ нижня межа несуттєва) обчислюється точно й дає $\sqrt{E_G/E}$.

Ймовірність проходження бар'єра (формула Гамова)

$$P_{\text{tun}}\approx\exp\!\left(-\sqrt{\frac{E_G}{E}}\right),\qquad E_G=2m_rc^2\,(\pi\alpha Z_1Z_2)^2,\tag{10.1}$$

де m_r — наведена маса, $\alpha=e^2/\hbar c$. Для D–T $m_rc^2=1{,}12$ ГеВ, $E_G\approx 1{,}18$ МеВ. Перерізи реакції тому швидко зростають з енергією, $\sigma(E)=S(E)\,E^{-1}e^{-\sqrt{E_G/E}}$, де $S(E)$ повільно змінюється (а для D–T має резонанс при ~ 64 кеВ, що додатково підсилює реакцію).

Швидкість реакції $\langle\sigma v\rangle$ визначається добутком двох протилежних факторів (рис. 10.1): максвеллівського хвоста $e^{-E/T}$ (спадає) і імовірності тунелювання (зростає). Добуток має максимум — *пік Гамова* — при

$$E_0=\left(\frac{E_G\,T^2}{4}\right)^{1/3}\approx 31\text{ кеВ при }T=10\text{ кеВ}.\tag{10.2}$$

Максимум знаходимо з умови $\frac{d}{dE}\!\left(-\frac{E}{T}-\sqrt{\frac{E_G}{E}}\right)=0$, тобто $\frac{1}{T}=\frac{1}{2}\sqrt{E_G}\,E^{-3/2}$, звідки $E_0=(E_GT^2/4)^{1/3}$. У максимумі $E_0/T=(E_G/4T)^{1/3}$, а $\sqrt{E_G/E_0}=2(E_G/4T)^{1/3}$, тож показник дорівнює $-3(E_G/4T)^{1/3}$. Фізично: реагують не типові частинки, а хвіст Максвелла — компроміс між бар'єром і числом частинок. Отже, реакції відбуваються переважно за участі частинок з енергіями втричі вищими за T, а швидкість реакції

$$\langle\sigma v\rangle\propto T^{-2/3}\exp\!\left[-3\!\left(\frac{E_G}{4T}\right)^{1/3}\right]\;\Rightarrow\;\langle\sigma v\rangle\propto T^{2\text{–}3}\text{ при }T\sim 10\text{ кеВ}.$$

Саме тому швидкість реакції *різко* (степенево, як T^2–T^3) зростає з температурою в області кількох кеВ і сильно спадає при $T\ll 10$ кеВ. Крім того, $E_G\propto(Z_1Z_2)^2m_r$, тому для ядер із більшими зарядами бар'єр вищий і потрібні ще вищі температури. Для D–D $E_G\approx 1{,}0$ МеВ, але в цієї реакції немає резонансу, а її S-фактор на два порядки менший, тому вона потребує $T\sim 50$ кеВ.

Залежність $\langle\sigma v\rangle(T)$ для основних реакцій показано на рис. 10.2 (параметризація Боша — Гейла). Крива D–T лежить на кілька порядків вище за інші в області $T\lesssim 100$ кеВ і має широкий максимум




Рис. 10.1. Пік Гамова для реакції D–T: добуток спадного максвеллівського хвоста та зростаючої ймовірності тунелювання дає максимум біля $E_0 \approx 31$ кеВ при $T = 10$ кеВ

поблизу 60–100 кеВ; саме тому для першого реактора обрано D–T і температури 10–20 кеВ: там $\langle\sigma v\rangle$ уже достатньо велике, а втрати ще помірні.

10.3. Баланс потужностей і критерій Лоусона

Нехай $n_D = n_T = n/2$, $n_e = n$, $T_e = T_i = T$. Потужність синтезу в одиниці об'єму $P_f = n_D n_T \langle\sigma v\rangle E_f = \tfrac{1}{4} n^2 \langle\sigma v\rangle E_f$. Нейтрони залишають плазму, а заряджені α-частинки ($E_\alpha = 3{,}5$ МеВ) передають їй свою енергію: $P_\alpha = \tfrac{1}{4} n^2 \langle\sigma v\rangle E_\alpha$. Тепловий запас плазми $W = 3nT$ (по $\tfrac{3}{2}T$ на електрон і на іон), а втрати характеризуються часом утримання енергії τ_E: $P_L = W/\tau_E$. Умова *запалювання* (самопідтримна реакція) $P_\alpha \geq P_L$ дає

$$\boxed{n\tau_E \geq \frac{12\,T}{\langle\sigma v\rangle E_\alpha}}. \tag{10.3}$$

З наведених значень $\langle\sigma v\rangle$ маємо $n\tau_E \gtrsim 3\times10^{14}$ см$^{-3}$с при 10 кеВ. Оскільки $n\tau_E \propto T/\langle\sigma v\rangle$, мінімум потрібного $n\tau_E$ відповідає не максимуму $\langle\sigma v\rangle$, а максимуму $\langle\sigma v\rangle/T$: він лежить при $T \approx 20$–30 кеВ і дорівнює $\approx 1{,}5\times10^{14}$ см$^{-3}$с. Помноживши на T, одержуємо *потрійний добуток* $nT\tau_E \gtrsim 3\times10^{15}$ кеВ $\cdot$ с $\cdot$ см$^{-3}$; він пропорційний $T^2/\langle\sigma v\rangle$ і має мінімум поблизу 14–15 кеВ. Саме потрійний добуток прийнято вважати мірою




Рис. 10.2. Швидкість реакції $\langle\sigma v\rangle$ для D–T, D–^{3}He та D–D залежно від температури (логарифмічні осі, параметризація Боша — Гейла). Пунктиром позначено робочий інтервал 10–20 кеВ

досягнення, бо при заданому магнітному полі обмежений тиск плазми nT (розд. 9.9). Це *критерій Лоусона* в сучасному формулюванні (оригінал 1957 р. стосувався беззбитковості при заданому ККД, тому числові множники різняться). Для D–D, за оцінками, потрібне на два порядки більше: $n\tau \sim 10^{16}$ см$^{-3}$с.

10.4. Втрати

У розрахунку τ_E не було враховано випромінювання. Основні радіаційні втрати — *гальмівне* (при кулонівських зіткненнях електронів з іонами) і *циклотронне* (магнітогальмівне, від руху електронів по ларморівських колах). Потужність гальмівного випромінювання $P_{br} \approx 1{,}7\times10^{-32}\, n_e\sqrt{T_e}\sum Z^2 n_i$ Вт/см^3 (T_e в еВ, n в см$^{-3}$) зростає як Z^2, тому домішки важких елементів небезпечні. Для $n = 10^{14}$ см$^{-3}$, 10 кеВ маємо $P_f \approx 0{,}80$, $P_\alpha \approx 0{,}16$, $P_{br} \approx 0{,}017$ Вт/см^3, тобто гальмівне випромінювання становить близько 10 % від α-нагрівання. Враховуючи його, нижня межа температури запалювання D–T становить кілька кеВ, але практично працюють при 10–20 кеВ. Циклотронне випромінювання $\propto B^2 nT$, проте воно в основному реабсорбується плазмою та відбивається стінками.

Отже, критерій Лоусона — лише базовий орієнтир, а не гарантія

працездатності реактора: він не враховує всіх видів випромінювання, нестійкостей, транспорту й технологічних втрат. Для порівняння установок зручніше користуватися потрійним добутком $nT\tau_E$ і коефіцієнтом підсилення плазми Q (див. нижче).

10.5. Дві стратегії: магнітне й інерційне утримання

Умову (10.3) можна виконати за добутком $n\tau$ двома способами. У *магнітному утриманні* (розд. 9) $n \sim 10^{14}$ см$^{-3}$ і $\tau_E \sim 1$ с. У *інерційному* стисканні мішені лазерним або іншим випромінюванням густина досягає 10^{25}–10^{26} см$^{-3}$, а реакція встигає відбутися за $\sim 10^{-10}$ с, поки речовина не розлетілася.

10.6. Від реакції до розетки

Критерій Лоусона відповідає на питання, чи *самопідтримується* реакція. Але мета — електрика. Простежмо, куди дівається енергія.

Куди дівається 17,6 МеВ. Реакція має два продукти: α-частинку та нейтрон. Початковий сумарний імпульс (у системі центра мас) нульовий, тому за збереженням імпульсу $p_\alpha = p_n$. Кінетична енергія $p^2/2m$ обернено пропорційна масі, отже

$$\frac{E_\alpha}{E_n} = \frac{m_n}{m_\alpha} \approx \frac{1}{4} \quad \Rightarrow \quad E_\alpha = \frac{17{,}6}{5} \approx 3{,}5 \text{ МеВ}, \qquad E_n \approx 14{,}1 \text{ МеВ}.$$

Тобто 20% енергії несе α-частинка, 80% — нейтрон. Їхні долі різні, бо різні маси: за однакового за модулем імпульсу легша частинка має більшу кінетичну енергію.

α-частинка заряджена, тому прив'язана до силових ліній. Її швидкість $v_\alpha = \sqrt{2E_\alpha/m_\alpha} \approx 1{,}3 \times 10^9$ см/с, і в полі 5 Тл ларморівський радіус $r_{L\alpha} = m_\alpha c v_\alpha / (2eB) \approx 5$ см, тобто приблизно на порядок менший за характерний розмір плазми близько метра. Це означає, що α-частинка є замагніченою, хоча сама по собі мала орбіта ще не гарантує утримання в усій конфігурації. У добре замкненому магнітному полі вона може залишатися в плазмі достатньо довго, щоб віддати їй значну частину енергії: спершу електронам (її швидкість менша за теплову швидкість електронів, але більша за іонну), потім іонам. Це і є P_α в умові запалювання (10.3).

Гальмування α-частинок характеризує критична енергія

$$E_{\text{crit}} \approx 14{,}8\, T_e A_\alpha \Big(\sum_j \frac{n_j Z_j^2}{n_e A_j} \Big)^{2/3} \approx 33\, T_e \approx 330 \text{ кеВ} \quad (T_e = 10 \text{ кеВ}).$$

Оскільки $E_\alpha = 3{,}5$ МеВ $\gg E_{\text{crit}}$, α-частинка спочатку віддає енергію переважно електронам: її швидкість $1{,}3 \times 10^9$ см/с менша за $v_{Te} \approx 4 \times 10^9$ см/с, але набагато більша за v_{Ti}, тож застосовне динамічне тертя з розд. 4 — приклад того, що теорія зіткнень працює для реактора.

Нейтрон не має заряду, магнітне поле на нього не діє. Його вільний пробіг у плазмі $\sim 1/(n\sigma) \sim 10^{10}$ см (порядку 10^5 км) незрівнянно більший за розмір установки, тож нейтрон безперешкодно вилітає й потрапляє у *бланкет* — шар завтовшки близько метра навколо плазми.




Рис. 10.3. Потоки енергії в термоядерній електростанції

Бланкет: тепло і тритій. У бланкеті нейтрон гальмується в зіткненнях, і його енергія переходить у тепло. Крім того, він виконує другу, не менш важливу роботу: наробляє тритій для палива:

$$n + {}^6\text{Li} \to \text{T} + {}^4\text{He} + 4{,}8\ \text{МеВ}, \qquad n + {}^7\text{Li} \to \text{T} + {}^4\text{He} + n' - 2{,}5\ \text{МеВ}.$$

Перша реакція екзотермічна (додає тепла, тому енергія, що виділилася в бланкеті, у $M \approx 1{,}1$–$1{,}3$ рази більша за 14,1 МеВ), друга, навпаки, поглинає енергію, проте повертає нейтрон. На один акт синтезу вигоряє один атом тритію й народжується один нейтрон, тож без втрат у кращому разі вийшов би рівно один новий атом. Втрати неминучі, тому додають *розмножувач нейтронів* (берилій, свинець: $n + {}^9\text{Be} \to 2n + 2\,{}^4\text{He}$) і вимагають *коефіцієнт відтворення тритію* більший за одиницю. Тепло з бланкета забирає теплоносій (вода, гелій, рідкий метал), далі звичайний цикл: пара, турбіна, генератор, з термічним ККД $\eta_{\text{th}} \sim 30$–40%.

Коефіцієнт підсилення Q**.** У сталому режимі втрати плазми покриваються α-нагрівом і зовнішнім нагрівом: $P_\alpha + P_{\text{aux}} = P_{\text{loss}}$. Означимо

$$Q = \frac{P_f}{P_{\text{aux}}}.$$

Оскільки $P_\alpha = P_f/5$, частка нагріву за рахунок α-частинок $P_\alpha/(P_\alpha+P_{\text{aux}}) = Q/(Q+5)$. При $Q = 1$ вона дорівнює 1/6 (*беззбитковість* плазми: синтез дає стільки ж, скільки ми вкладаємо); при $Q = 5$ — половина; при $Q = 10$ — 2/3; при $Q \to \infty$ — одиниця: це і є *запалювання*, зовнішній нагрів не потрібен. Для порівняння: токамаки досягли Q порядку одиниці (JET 1997: $Q \approx 0{,}67$; JT-60U: еквівалентне $Q \approx 1{,}25$, екстрапольоване з D–D; JET 2023: рекорд енергії 69 МДж, але $Q < 1$). Лазерна установка NIF (грудень 2022) отримала підсилення мішені $G \approx 1{,}5$ (3,15 МДж термоядерної енергії на 2,05 МДж лазерного випромінювання, доставленого до мішені), проте лазери спожили з мережі порядку 300 МДж. Отже, «Q» у різних контекстах означає різне. Промислова електростанція потребує $Q \gg 10$ (див. нижче). Важливіше за конкретні числа — зв'язок Q з енергетичним балансом.

Але Q — характеристика *плазми*, а не електростанції. Оцінимо, який Q потрібен для чистого вироблення електроенергії. Усе тепло (від нейтронів, α-частинок і зовнішнього нагріву) зрештою потрапляє на стінки й дивертор, тож $P_{\text{th}} = MP_n + P_\alpha + P_{\text{aux}}$, де $P_n = 0{,}8P_f$. Електричну потужність $\eta_{\text{th}}P_{\text{th}}$ треба порівняти з тією, що йде на нагрів, $P_{\text{aux}}/\eta_{\text{aux}}$:

$$\eta_{\text{th}}\Big[(0{,}8M + 0{,}2)\,Q + 1\Big] \geq \frac{1}{\eta_{\text{aux}}}.$$

При $M = 1{,}2$, $\eta_{\text{th}} = 0{,}35$ та $\eta_{\text{aux}} = 0{,}4$ (ККД систем нагріву) це дає $Q \gtrsim 5$ навіть у ідеальному випадку. Реально треба ще живити магніти, кріогеніку, насоси, тому проєкти електростанцій розраховують на Q порядку десятків.

10.7. Що ще треба вирішити

- *Вихлоп.* Гелій «попіл» накопичується й розбавляє паливо, його потрібно виводити. Для цього силові лінії на краю відводять у *дивертор*, де потік тепла сягає порядку 10 МВт/м^2, тож без випромінювання домішками пластини не витримали б.
- *Матеріали.* Нейтрони 14 МеВ зміщують атоми конструкції (десятки зміщень на атом за рік) і роблять її радіоактивною. Усе, що поряд із плазмою, мусить витримувати це роками.
- *Паливний цикл.* Вигоряє лише невелика частка тритію, що подається, решту потрібно уловлювати й повертати. Тритій радіоактивний (період піврозпаду ≈ 12 років).

Чому ця складність виправдана. Енергія на одиницю маси палива D–T 17,6 МеВ/5 $u \approx 3{,}4 \times 10^{14}$ Дж/кг, приблизно в 10^7 разів більше за вугілля. Електростанція потужністю 1 ГВт (ел.) за $\eta_{\text{th}} \sim 0{,}4$ має $P_{\text{th}} \approx 2{,}5$ ГВт, тобто (за $M = 1{,}2$) $P_f \approx P_{\text{th}}/(0{,}8M + 0{,}2) \approx 2{,}2$ ГВт, і спалює $\approx 0{,}55$ кг D + T на добу, тоді як вугільній потрібно близько 8–9 тисяч тонн.

10.8. Інерційний шлях

Тут енергію «добувають» вибухом мікромішені, яку стискає лазерне випромінювання. Для оцінки успіху використовують *коефіцієнт підсилення мішені* G — відношення енергії термоядерного виходу до енергії, доставленої до мішені. Але це не те саме, що енергетичний баланс усієї установки: лазери, нагрів, магніти, кріогеніка та інші системи також споживають енергію. Тому слід розрізняти Q плазми, підсилення мішені та інженерний енергетичний баланс.

> **!** *$Q > 1$ або $G > 1$ ще не означає, що установка виробляє електроенергію: потрібна оцінка повного інженерного балансу (задача 10.3).*

Мішень нагрівають *прямо* (лазерні пучки б'ють по оболонці) або *непрямо* (лазер гріє стінки порожнини-хольраума, а рентгенівське випромінювання стискає оболонку). Стиснення має ракетний характер: абляція зовнішнього шару штовхає решту всередину. Після стиснення центральна *гаряча пляма* (hot spot) запалюється, а навколо неї лишається холодне щільне паливо, у якому горіння поширюється. Аналог критерію Лоусона для ІТС — $\rho R \gtrsim 0{,}3$ г/см^2: пробіг α-частинок має бути меншим за розмір плями, а час розльоту R/c_s — більшим за час горіння, тобто роль добутку $n\tau$ відіграє $\rho R/c_s$.

Головна складність у цьому підході — гідродинамічна нестійкість Релея — Тейлора (розд. 8.9). Вона діє двічі: на етапі прискорення, коли легка гаряча плазма абляції штовхає важку оболонку, і на етапі гальмування, коли гаряча пляма зупиняє оболонку, що збігається. В обох випадках у системі оболонки ефективна гравітація спрямована від важкої речовини до легкої, тобто конфігурація нестійка. Нерівності поверхні зростають як $e^{\gamma t}$, $\gamma = \sqrt{Agk}$, де A — число Атвуда, а g — прискорення (гальмування) оболонки. Нестійкість перемішує холодну оболонку з гарячою плямою й руйнує симетрію стискання, тому симетрія опромінення й гладкість мішені мають критичне значення. У магнітному утриманні нестійкості й перенос розглянуто в розд. 8 та 9.

10.9. Як це вимірюють: нейтронна діагностика

Нейтрон D–T-реакції не відчуває магнітного поля й майже не взаємодіє з плазмою, тож вилітає з установки та несе інформацію про те, що відбулося всередині. Кожен акт синтезу дає один нейтрон, тому швидкість реакції вимірюють підрахунком нейтронів поза камерою (калібровані лічильники, активаційні фольги):

$$\frac{dN_n}{dt} = \int n_D n_T \langle \sigma v \rangle \, dV, \qquad P_f = \frac{dN_n}{dt} \cdot 17{,}6 \text{ МеВ}. \tag{10.4}$$

Отже, термоядерна потужність і $Q = P_f/P_{\text{aux}}$ визначаються прямо з нейтронного потоку. *Оцінка.* Потужності $P_f = 10$ МВт відповідає $dN_n/dt \approx 3{,}5 \times 10^{18}$ нейтронів/с.

Енергетичний спектр дає температуру іонів. Нейтрон народжується в системі центра мас, що рухається з тепловою швидкістю іонів, тож лінія 14 МеВ допплерівськи розширюється:

$$\Delta E_{\text{FWHM}} \approx 82{,}5 \sqrt{T_i[\text{кеВ}]} \text{ кеВ}.$$

При $T_i = 10$ кеВ ширина ≈ 260 кеВ (порівняйте з розд. 4.5).

Межі застосовності. Нейтронні лічильники потребують абсолютного калібрування з урахуванням розсіяння в конструкціях, а в чисто дейтерієвій плазмі сигнал дають лише D–D-нейтрони (2,45 МеВ), на кілька порядків слабші. Допплерівську ширину на практиці ускладнюють розсіяні нейтрони й немаксвеллівські добавки до розподілу іонів (пучки, швидкі хвости), тому цей метод дає лише оцінку T_i.

Головне в розділі

- Найлегша реакція — D–T; для неї потрібна температура $T \sim 10$–20 кеВ.
- Пік Гамова виникає як добуток спадного максвеллівського хвоста та зростаючої ймовірності тунелювання крізь кулонівський бар'єр.
- Критерій Лоусона зв'язує густину, температуру та час утримання, $n\tau_E \gtrsim 10^{14}$–10^{15} см$^{-3}$с.
- Випромінювальні втрати (гальмівні й циклотронні) задають нижню межу температури запалювання.
- Є два шляхи: магнітне утримання (великий час, мала густина) та інерційне (мала тривалість, надвелика густина).
- Нейтрони D–T-синтезу залишають плазму: їхній потік дає P_f і Q, а допплерівська ширина лінії — T_i (розд. 10.9).

Задачі

10.1. Для дейтерій-тритієвої плазми ($n_D = n_T$, $n_e = 10^{14}$ см$^{-3}$, $T = 10$ кеВ, $\langle\sigma v\rangle = 1{,}1 \times 10^{-16}$ см^3/с) знайдіть P_f, P_α, P_{br} (у Вт/см^3) та мінімальний час утримання τ_E для запалювання без урахування випромінювання. Знайдіть $n\tau_E$ при 20 кеВ ($\langle\sigma v\rangle = 4{,}3 \times 10^{-16}$ см^3/с). *Відповідь:* $P_f \approx 0{,}80$, $P_\alpha \approx 0{,}16$, $P_{br} \approx 0{,}017$ Вт/см^3; $\tau_E \approx 3$ с ($n\tau_E \approx 3 \times 10^{14}$ см$^{-3}$с); при 20 кеВ $n\tau_E \approx 1{,}6 \times 10^{14}$.

10.2. Знайдіть швидкість і ларморівський радіус α-частинки з енергією 3,5 МеВ у полі 5,3 Тл. Покажіть, що частка нагріву плазми α-частинками дорівнює $Q/(Q+5)$, і обчисліть її для $Q = 10$. *Відповідь:* $v_\alpha \approx 1{,}3 \times 10^9$ см/с, $r_{L\alpha} \approx 5{,}1$ см; частка $Q/(Q+5)$, при $Q = 10$ це 2/3.

10.3. Виведіть умову чистого вироблення електроенергії

$$\eta_{\text{th}}[(0{,}8M + 0{,}2)Q + 1] \geq 1/\eta_{\text{aux}}$$

і знайдіть мінімальне Q при $M = 1{,}2$, $\eta_{\text{th}} = 0{,}35$, $\eta_{\text{aux}} = 0{,}4$. Як зміниться результат, якщо додатково 20% електрики йде на власні потреби (магніти, кріогеніка)? *Відповідь:* $Q_{\min} \approx 5{,}3$; з урахуванням власних потреб умова стає $0{,}8\,\eta_{\text{th}}[(0{,}8M + 0{,}2)Q + 1] \geq 1/\eta_{\text{aux}}$, звідки $Q_{\min} \approx 6{,}8$.

10.4. Для інерційного синтезу задано $\rho R = 0{,}3$ г/см^2 при $\rho = 300$ г/см^3. Знайдіть радіус гарячої плями та оцініть час інерційного утримання $\tau \sim R/c_s$ при $T = 10$ кеВ ($c_s \approx \sqrt{2T/\bar{m}_i}$, $\bar{m}_i = 2{,}5\,m_p$). *Відповідь:* $R = 10$ мкм, $c_s \sim 9 \times 10^7$ см/с, $\tau \sim 10$ пс.

10.5. Порівняйте реакції D–T і D–^{3}He: енерговиділення, частку енергії в заряджених продуктах, типову оптимальну температуру (рис. 10.2). У чому перевага й недолік безнейтронного синтезу? *Відповідь:* D–T дає 17,6 МеВ, із них лише 20% у заряджених продуктах; D + ^{3}He → ^{4}He (3,6 МеВ) + p (14,7 МеВ) дає 18,3 МеВ, усе в заряджених частинках. Оптимальна температура для D–^{3}He значно вища (~ 50–100 кеВ проти 10–20 кеВ), а $\langle\sigma v\rangle$ там приблизно на порядок менше за D–T при 10–20 кеВ. Перевага: мало нейтронів (лише від побічних D–D-реакцій), отже менша активація конструкцій і можливість прямого перетворення енергії заряджених продуктів в електрику. Недоліки: потрібні вищі T і $nT\tau_E$, гальмівне випромінювання ($Z = 2$) відносно більше, а ^{3}He на Землі майже немає.

10.6. Яка енергія виділяється на 1 кг суміші D + T? Скільки палива на добу споживає термоядерна електростанція з електричною потужністю 1 ГВт ($\eta = 0{,}4$) і скільки вугілля (теплотворність 29 МДж/кг, $\eta = 0{,}35$) потрібно звичайній? *Відповідь:* $3{,}4 \times 10^{14}$ Дж/кг; якщо все тепло $P_{\text{th}} = 2{,}5$ ГВт дає синтез, — $\approx 0{,}64$ кг/добу (з урахуванням тепла бланкета, $M = 1{,}2$, — $\approx 0{,}55$ кг/добу) проти $\approx 8{,}5$ тис. т вугілля на добу.

10.7. Скільки D–T-нейтронів за секунду випромінює плазма з термоядерною потужністю $P_f = 500$ МВт? Яка допплерівська ширина лінії при $T_i = 15$ кеВ? *Відповідь:* $dN_n/dt = P_f/(17{,}6\ \text{МеВ}) \approx 1{,}8{\times}10^{20}\ \text{с}^{-1}$; $\Delta E \approx 82{,}5\sqrt{15} \approx 320$ кеВ.

Контрольні питання

1. Виведіть умову запалювання D–T-плазми. Чому існує оптимальна температура? Які втрати вона не враховує?
2. У чому відмінність між магнітним та інерційним утриманням з погляду добутку $n\tau$?
3. Як розподіляється енергія реакції D–T між α-частинкою й нейтроном і чому? Чим плазмовий Q відрізняється від інженерного?
4. Чому реакція D–D потребує вищих температур, ніж D–T, хоча дейтерій дешевший?
5. Чим відрізняється Q для NIF від Q для ITER?

11 Низькотемпературна плазма та газовий розряд

Більшість плазм, з якими людина має справу щодня, зовсім не гарячі: це полум'я дуги зварювального апарата, світіння люмінесцентної лампи, плазма в реакторі, що витравлює транзистори на кремнієвій пластині. Це *низькотемпературна плазма*: електрони мають $T_e \sim 1$–10 еВ, а іони та нейтральний газ лишаються майже холодними, $T_i \approx T_g \sim 0{,}03$–$0{,}1$ еВ. Ступінь іонізації (1.1) малий, 10^{-6}–10^{-2}, густина $n_e \sim 10^{8}$–10^{12} см$^{-3}$. Така плазма *нерівноважна*: формула Саха (1.2) до неї не застосовна, бо електрони нагріває зовнішнє поле, а енергію вони віддають нейтральному газу повільно (у пружному зіткненні електрон передає атому лише частку $\sim 2m/M \sim 10^{-4}$ своєї енергії). Плазма живе доти, доки поле підтримує іонізацію, яка компенсує втрати заряджених частинок на стінки. Цей баланс і є предметом фізики *газового розряду*.

У розділі ми побачимо, як виникає розряд (пробій Таунсенда і закон Пашена), як влаштовані тліючий розряд і дуга, що визначає температуру електронів і густину плазми (глобальна модель), і як працюють сучасні високочастотні джерела плазми для мікроелектроніки. Детальний виклад є в [14, 16, 6].

11.1. Елементарні процеси: іонізація і її швидкість

Основний процес, що підтримує розряд, — *іонізація електронним ударом* $e + A \to A^{+} + 2e$. Вона можлива, лише якщо енергія електрона ε перевищує потенціал іонізації ε_{iz} (13,6 еВ для H, 15,8 еВ для Ar, 24,6 еВ для He). Класична оцінка Томсона (електрон передає атомному електрону енергію $\Delta\varepsilon$ у кулонівському зіткненні, а іонізація відбувається при $\Delta\varepsilon > \varepsilon_{iz}$) дає переріз

$$\sigma_{iz}(\varepsilon) = \frac{\pi e^4}{\varepsilon}\left(\frac{1}{\varepsilon_{iz}} - \frac{1}{\varepsilon}\right), \qquad \varepsilon > \varepsilon_{iz}. \tag{11.1}$$

Переріз лінійно зростає від порога, досягає максимуму $\sigma_{\max} = \pi e^4/(4\varepsilon_{iz}^2)$ при $\varepsilon = 2\varepsilon_{iz}$ (для Ar $\approx 3\times10^{-16}$ см^2, тобто порядку газокінетичного) і далі спадає як $1/\varepsilon$. Поряд з іонізацією відбуваються збудження атомів

(саме воно дає світіння розряду), пружні зіткнення, а в електронегативних газах (O_2, SF_6, CF_4) — ще й прилипання $e + AB \to A + B^-$.

Кількість іонізацій в одиниці об'єму за одиницю часу дорівнює $n_e n_g k_{iz}$, де n_g — густина газу, а *константа швидкості* $k_{iz} = \langle \sigma_{iz} v \rangle$ усереднена за розподілом електронів. Для максвеллівських електронів з $T_e \ll \varepsilon_{iz}$ іонізують лише електрони з хвоста розподілу. Якщо поблизу порога $\sigma_{iz} \approx C(\varepsilon - \varepsilon_{iz})$, то (задача 11.1)

$$\boxed{k_{iz}(T_e) = C \bar{v}_e \, (\varepsilon_{iz} + 2T_e)\, e^{-\varepsilon_{iz}/T_e}, \qquad \bar{v}_e = \sqrt{\frac{8T_e}{\pi m}}.} \tag{11.2}$$

Головне в (11.2) — арреніусівський множник $e^{-\varepsilon_{iz}/T_e}$. Для аргону добре працює апроксимація $k_{iz} \approx 2{,}3\times10^{-8}\, T_e^{0{,}59} e^{-17{,}4/T_e}$ см^3/с (T_e в еВ) [14]: при $T_e = 2$ еВ $k_{iz} \approx 2\times10^{-11}$, а при $T_e = 4$ еВ уже $\approx 4\times10^{-10}$ см^3/с. Подвоєння температури збільшує швидкість іонізації в двадцять разів. Через таку різку залежність T_e у розряді ледь змінюється (див. розд. 11.5): невелика зміна T_e компенсує зміну втрат у кілька разів.

Оцінка. Втрати енергії електрона в пружних зіткненнях малі ($2m/M$ за зіткнення), тому основний «стік» енергії електронів — непружні процеси. На одну іонізацію в аргоні при $T_e \sim 3$ еВ припадає кілька збуджень, і повна енергія, яку витрачає електронний газ на створення однієї пари електрон–іон, становить $\varepsilon_c \approx 50$–60 еВ, у кілька разів більше за ε_{iz}. Більша частина цієї енергії виходить з плазми у вигляді випромінювання.

11.2. Пробій газу: механізм Таунсенда і закон Пашена

Нехай між плоскими електродами на відстані d прикладено напругу V, поле $E = V/d$. Випадковий вільний електрон (від космічного випромінювання чи фотоефекту) прискорюється до анода і іонізує газ. Число іонізацій на одиницю довжини шляху — *перший коефіцієнт Таунсенда* α. Оцінимо його. Між зіткненнями електрон проходить у середньому $\lambda = 1/(n_g\sigma) \propto 1/p$ і набирає енергію $eE\lambda$. Імовірність пройти без зіткнення відстань $\varepsilon_{iz}/(eE)$, потрібну для набору енергії іонізації, дорівнює $\exp[-\varepsilon_{iz}/(eE\lambda)]$; зіткнень на одиницю довжини $1/\lambda$. Отже,

$$\alpha = Ap \exp\!\left(-\frac{Bp}{E}\right), \qquad A = \frac{1}{\lambda p}, \quad B = \frac{\varepsilon_{iz} A}{e}, \tag{11.3}$$

де A і B — сталі газу (на практиці їх беруть з експерименту: для повітря $A \approx 15$ см$^{-1}$Торр$^{-1}$, $B \approx 365$ В/(см·Торр); для аргону $A \approx 12$, $B \approx 180$). Важливо, що α/p залежить лише від E/p — енергії, набраної на довжині пробігу.

Один електрон, що вилетів з катода, дає на аноді лавину $e^{\alpha d}$ електронів; утворені $e^{\alpha d}-1$ іонів повертаються на катод і вибивають з нього $\gamma(e^{\alpha d}-1)$ нових електронів, де $\gamma \sim 10^{-2}$–10^{-1} — *коефіцієнт вторинної емісії* (другий коефіцієнт Таунсенда). Якщо кожен вихідний електрон відтворює хоча б одного наступника, розряд стає *самостійним* і не потребує зовнішнього іонізатора:

$$\gamma\left(e^{\alpha d}-1\right)=1 \quad\Longleftrightarrow\quad \alpha d=\ln\!\left(1+\frac{1}{\gamma}\right). \tag{11.4}$$

Підставивши (11.3) з $E=V/d$, отримуємо напругу пробою — *закон Пашена*:

$$\boxed{V_b=\frac{B\,pd}{\ln(A\,pd)-\ln\ln(1+1/\gamma)}}. \tag{11.5}$$

Напруга пробою залежить не від p і d окремо, а лише від добутку pd (закон подібності). Крива Пашена (рис. 11.1) має мінімум при $(pd)_{\min}=e\ln(1+1/\gamma)/A$, де $V_{\min}=B\,(pd)_{\min}$ (задача 11.2); для повітря $V_{\min}\approx 300$ В при $pd\approx 0{,}8$ Торр$\cdot$см. Праворуч від мінімуму електрон зазнає багато зіткнень, але за одне зіткнення набирає замало енергії, тому потрібне сильне поле. Ліворуч від мінімуму зіткнень замало, щоб розвинулася лавина: електрон долітає до анода, майже нікого не іонізувавши. Звідси практичні наслідки: повітряний проміжок 1 см при атмосферному тиску ($pd=760$ Торр$\cdot$см) пробивається при ≈ 30 кВ; вакуумні вимикачі і високовольтні вводи працюють на лівій гілці, а пробій усередині тонкої трубки при низькому тиску може піти «довгим шляхом» уздовж трубки, а не коротким поперек.

Механізм Таунсенда описує пробій, поки лавина не спотворює зовнішнього поля. При $pd \gtrsim 200$ Торр$\cdot$см (довгі іскри, блискавка) просторовий заряд головки лавини сам створює поле, порівнянне з прикладеним. Тоді розряд поширюється як *стример* — тонкий іонізаційний фронт, що рухається зі швидкістю 10^7–10^8 см/с і підживлюється фотоіонізацією перед головкою, а катод і коефіцієнт γ ролі вже не грають.

11.3. Тліючий розряд і дуга

Після пробою при обмеженому струмі (зовнішній резистор) встановлюється *тліючий розряд*. Його найпомітніша риса — шарувата будова (рис. 11.2). Біля катода лежить *катодне падіння*: шар завтовшки в кілька довжин пробігу, на якому спадає майже вся напруга, $V_c\sim 100$–400 В (порядку $V_{\min}$ кривої Пашена). У ньому іони прискорюються до катода, вибивають вторинні електрони, і ті розмножуються лавиною, як у механізмі Таунсенда. Прискорені електрони виходять




Рис. 11.1. Криві Пашена (11.5) для повітря ($A = 15$, $B = 365$) і аргону ($A = 12$, $B = 180$) при $\gamma = 0{,}01$. Точками позначено мінімуми $V_{\min} = eB\ln(1 + 1/\gamma)/A$.

із шару в *негативне світіння* — область майже без поля, де вони втрачають енергію на збудження та іонізацію. Далі, у *фарадеєвому темному просторі*, швидких електронів уже немає, а поле ще мале. Решту проміжку до анода заповнює *позитивний стовп* — однорідна квазінейтральна плазма зі слабким поздовжнім полем $E \sim 1$–10 В/см.

Позитивний стовп: температура з балансу частинок. Позитивний стовп — найпростіший приклад самоузгодженої плазми. Заряджені частинки дифундують до стінок трубки радіуса R амбіполярно (розд. 4.4) і там рекомбінують; втрати компенсує іонізація в об'ємі. Рівняння неперервності для густини, $D_a\nabla^2 n + n_g k_{iz} n = 0$, з умовою $n(R) \approx 0$ має розв'язок $n(r) = n_0 J_0(2{,}405\, r/R)$ і дає *умову Шоттки*

$$n_g k_{iz}(T_e) = D_a \left(\frac{2{,}405}{R}\right)^2, \qquad D_a \approx \frac{T_e}{M\nu_{in}}. \tag{11.6}$$

Тут $D_a \approx D_i(1 + T_e/T_i) \approx T_e/(M\nu_{in})$ з (4.7), а $\nu_{in} \propto n_g$ — частота зіткнень іонів з атомами. Оскільки $n_g \propto p$, умова (11.6) пов'язує T_e лише з параметром подібності pR: *густина плазми з неї випадає зовсім.* Температуру електронів задає геометрія і тиск, а струм розряду (через баланс енергії) визначає лише густину. Зі зменшенням pR дифузійні втрати зростають, і T_e зростає, щоб іонізація встигала їх компенсувати. Цю ж логіку ми повторимо в глобальній моделі (розд. 11.5).




Рис. 11.2. Будова тліючого розряду в трубці (зверху) і розподіл потенціалу $\varphi(x)$ (знизу): 1 — астонів темний простір, 2 — катодне світіння, 3 — катодний (круксів) темний простір, 4 — негативне світіння, 5 — фарадеїв темний простір, 6 — позитивний стовп, 7 — анодне світіння. Майже вся напруга спадає в катодному шарі (1–3).

Вольт-амперна характеристика і дуга. Зі зростанням струму розряд проходить кілька режимів. При малих струмах ($\lesssim 10^{-6}$ А) горить *темний таунсендівський* розряд. Далі напруга стрибком падає до значення *нормального* тліючого розряду. У ньому катодне падіння і густина струму на катоді сталі ($j/p^2 = \text{const}$), а зростання струму лише збільшує вкриту світінням площу катода. Коли світіння вкриває весь катод, настає *аномальний* тліючий розряд: щоб збільшити струм, треба підвищувати V_c. При струмах $\gtrsim 1$ А іонне бомбардування розігріває катод до термоемісії (або на ньому утворюються мікроскопічні катодні плями з автоемісією), і розряд переходить у *дугу*. Катодне падіння в дузі лише ~ 10 В, бо електрони емітує сам гарячий катод, а не вибивають іони. Напруга на дузі падає зі зростанням струму, тобто дуга має *спадну* характеристику, тому без баластного опору вона нестійка. Дуга атмосферного тиску (зварювання, плазмотрони, вимикачі) близька до локальної термодинамічної рівноваги: $T_e \approx T_i \approx T_g \sim 1$ еВ, бо часті зіткнення вирівнюють температури, і до неї вже можна застосувати формулу Саха.

11.4. Приелектродний шар у розряді

Будь-яка розрядна плазма відділена від стінок і електродів шаром позитивного просторового заряду. Його структуру для малого перепаду потенціалу ми вже розглянули (розд. 1.9): іони входять у шар зі швидкістю Бома $u_B = \sqrt{T_e/M}$ (1.16), а густина на межі шару внаслідок прискорення в передшарі становить $n_s \approx e^{-1/2} n_0 \approx 0{,}6\, n_0$. Отже, потік іонів на поверхню

$$\Gamma_i \approx 0{,}6\, n_0 u_B \tag{11.7}$$

не залежить від потенціалу поверхні: його задає плазма, а не стінка. Ця обставина лежить в основі всієї технології плазмової обробки.

На ізольовану стінку іони падають з енергією $e|\Delta\varphi_f| + T_e/2$, де $\Delta\varphi_f$ — плаваючий потенціал (1.17); для аргону це $\approx 5{,}2\,T_e$, тобто ~ 15 еВ. Щоб отримати іони з енергією в сотні електронвольт, на електрод подають великий від'ємний потенціал $-V_0$, $eV_0 \gg T_e$. Тоді електрони в шарі практично відсутні, і шар містить лише іони, що прискорюються. Нехай $\Phi(x) > 0$ — спад потенціалу від межі шару ($x = 0$) вглиб, $J = en_i v_i$ — стала густина іонного струму, $v_i = \sqrt{2e\Phi/M}$ (початковою швидкістю u_B нехтуємо). Рівняння Пуассона

$$\frac{d^2\Phi}{dx^2} = 4\pi e n_i = \frac{4\pi J}{\sqrt{2e\Phi/M}}$$

після множення на $d\Phi/dx$ і інтегрування з $\Phi = \Phi' = 0$ при $x = 0$ дає $\Phi^{3/4} \propto x$, а умова $\Phi(s) = V_0$ на електроді — *закон Чайлда — Ленгмюра*:

$$\boxed{J = \frac{1}{9\pi}\sqrt{\frac{2e}{M}}\,\frac{V_0^{3/2}}{s^2}.} \tag{11.8}$$

Той самий закон «трьох других» обмежує струм електронів у вакуумному діоді (з заміною $M \to m$). У плазмі струм J задано наперед потоком Бома, $J = e\,n_s u_B$, тож (11.8) визначає не струм, а *товщину шару*:

$$s = \frac{\sqrt{2}}{3}\,r_D\left(\frac{2eV_0}{T_e}\right)^{3/4}, \tag{11.9}$$

де r_D — дебаївський радіус (1.7) при густині n_s. Шар під високою напругою в десятки разів товщий за дебаївський: при $T_e = 3$ еВ, $n_s = 10^{10}$ см$^{-3}$ і $V_0 = 300$ В маємо $r_D \approx 0{,}13$ мм і $s \approx 3$ мм (задача 11.3).

Енергія іонів на поверхні. Якщо шар беззіткненнєвий ($\lambda_i \gg s$), кожен іон приходить на електрод з енергією eV_0, а розподіл за енергіями вузький. Кут розходження визначає відношення поперечної теплової швидкості до набраної в шарі: $\theta \approx \sqrt{T_i/(2eV_0)} \sim 1°$. Саме цей майже нормальний пучок іонів робить можливим анізотропне травлення (розд. 11.7). Якщо ж $\lambda_i < s$ (тиск $\gtrsim 100$ мТорр), іони перезаряджаються в шарі, і їхній енергетичний спектр розмивається в бік малих енергій, а кутовий розширюється.

11.5. Глобальна модель розряду

Як для заданого джерела (газ, тиск, розміри, потужність) оцінити T_e і n_0, не розв'язуючи рівнянь переносу? *Глобальна модель* усереднює плазму за об'ємом V і записує два балансові співвідношення.

Баланс частинок. Іонізація в об'ємі компенсує потік Бома на поверхню площею A:

$$n_g k_{iz} n_0 V = n_0 u_B A_{\text{eff}},$$

де ефективна площа $A_{\text{eff}} = hA$ враховує, що густина біля стінки менша, ніж у центрі (при низькому тиску $h \sim 0{,}3$–$0{,}5$, з ростом тиску h спадає як $\lambda_i^{1/2}$). Густина n_0 скорочується, і ми отримуємо рівняння лише для T_e:

$$\boxed{\frac{k_{iz}(T_e)}{u_B(T_e)} = \frac{1}{n_g d_{\text{eff}}}, \qquad d_{\text{eff}} = \frac{V}{A_{\text{eff}}}.} \tag{11.10}$$

Це той самий висновок, що й для позитивного стовпа: *температуру електронів задає баланс частинок, вона залежить тільки від $n_g d_{\text{eff}}$ і не залежить від потужності.* Через арреніусівську залежність $k_{iz}(T_e)$ розв'язок лежить у вузькій смузі $T_e \approx 2$–5 еВ майже для всіх джерел: малі розряди при низькому тиску мають вищу T_e, великі при високому — нижчу.

Баланс енергії. Кожна пара електрон–іон, що покидає плазму, забирає енергію

$$\mathcal{E}_T = \varepsilon_c + 2T_e + \varepsilon_i, \tag{11.11}$$

де ε_c — енергія, витрачена в зіткненнях на створення пари (розд. 11.1), $2T_e$ — середня кінетична енергія електрона, що долає потенціальний бар'єр шару (потік через бар'єр збагачений швидкими частинками), а $\varepsilon_i \approx e\Delta\varphi + T_e/2$ — енергія, яку іон набирає в передшарі й шарі. Поглинена плазмою потужність P_{abs} виходить з неї разом з потоком частинок: $P_{\text{abs}} = e\, n_0 u_B A_{\text{eff}}\, \mathcal{E}_T$ (тут $\mathcal{E}_T$ у вольтах). Звідси

$$\boxed{n_0 = \frac{P_{\text{abs}}}{e\, u_B A_{\text{eff}}\, \mathcal{E}_T}.} \tag{11.12}$$

Густина пропорційна потужності, а T_e від неї не залежить — розподіл ролей, підтверджений вимірюваннями в багатьох джерелах.

Оцінка. Аргон, $p = 10$ мТорр ($n_g \approx 3{,}2 \times 10^{14}$ см$^{-3}$ при кімнатній температурі), $d_{\text{eff}} = 10$ см. Тоді $n_g d_{\text{eff}} \approx 3{,}2 \times 10^{15}$ см$^{-2}$, і розв'язок (11.10) дає $T_e \approx 2{,}8$ еВ ($u_B \approx 2{,}6 \times 10^5$ см/с). При $\varepsilon_c \approx 60$ еВ і $\varepsilon_i \approx 5{,}2\, T_e$ маємо $\mathcal{E}_T \approx 80$ еВ, і потужність 500 Вт на $A_{\text{eff}} = 10^3$ см^2 підтримує $n_0 \approx 1{,}5 \times 10^{11}$ см$^{-3}$ (задача 11.4). Це типові параметри індуктивного джерела.

11.6. Високочастотні джерела плазми

Розряд постійного струму має два недоліки: електроди контактують з плазмою (і розпорошуються), а на діелектричних поверхнях (пластина з оксидом) накопичується заряд. Тому в технології

використовують високочастотні (ВЧ) розряди. Стандартна частота 13,56 МГц лежить між іонною і електронною плазмовими частотами: $\omega_{pi} < \omega \ll \omega_{pe}$. Електрони миттєво відстежують поле, а іони реагують лише на усереднений за періодом потенціал шару. Основні типи джерел показано на рис. 11.3, їхні параметри порівняно в табл. 11.1.




Рис. 11.3. Схеми ВЧ-джерел плазми: (а) ємнісне (ЄЗП), енергію передають коливні шари біля електродів; (б) індуктивне (ІЗП), вихрове поле котушки проникає в плазму на глибину скін-шару δ; (в) ЕЦР/геліконне, мікрохвилі або геліконна хвиля поглинаються в магнітному полі. В (б) окреме ВЧ-зміщення підкладки керує енергією іонів незалежно від густини.

Ємнісний розряд. У *ємнісно-зв'язаній плазмі* (ЄЗП) ВЧ-напругу подають на один з двох плоских електродів через розділювальний конденсатор. Плазма має потенціал, вищий за потенціал обох електродів, тож біля кожного утворюється шар, товщина якого коливається з частотою поля. Електрони нагріваються омічно (зіткнення в об'ємі) і *стохастично*: вони відбиваються від рухомої межі шару, як м'ячик від ракетки, і набирають енергію. Оскільки електрони значно рухливіші за іони, сумарний струм на електрод за період може дорівнювати нулю лише за умови, що конденсатор зарядиться і на електроді виникне від'ємне *автозміщення*. Якщо площі електродів різні, більший спад напруги припадає на шар біля меншого електрода: $V_1/V_2 \approx (A_2/A_1)^q$, ідеалізована модель дає $q = 4$, а на практиці $q \approx 1$–2. Тому пластину кладуть на менший (ВЧ) електрод, а більшим є заземлені стінки камери. Головна вада ЄЗП: однією напругою визначаються і густина плазми ($n \sim 10^9$–10^{10} см$^{-3}$), і енергія іонів (сотні еВ), тож незалежно керувати ними неможливо. Частковий вихід дають двочастотні ЄЗП (десятки МГц для густини, ~ 2 МГц для енергії іонів).

Індуктивний розряд. У *індуктивно-зв'язаній плазмі* (ІЗП) ВЧ-струм тече в котушці над діелектричним вікном. Змінне магнітне поле ко-

тушки наводить у плазмі вихрове електричне поле E_θ, яке нагріває електрони, як вторинну обмотку трансформатора. Поле проникає в плазму лише на глибину скін-шару: у беззіткненнєвому випадку з провідності (4.3) при $\nu \ll \omega$ $\delta = c/\omega_{pe}$, для $n = 10^{11}$ см$^{-3}$ $\delta \approx 1{,}7$ см. Тут немає високовольтних шарів біля котушки, тож густина вища (10^{11}–10^{12} см$^{-3}$ при 1–50 мТорр), а енергією іонів керує окреме ВЧ-зміщення столика з пластиною. При малій потужності ІЗП працює в ємнісному режимі (E-режим) через напругу на котушці і зі зростанням потужності стрибком переходить в індуктивний (H-режим) з густиною на порядок вищою.

ЕЦР- і геліконні джерела. У магнітному полі B мікрохвилі поглинаються резонансно, де $\omega = \omega_{ce}$ (розд. 6.7). Для стандартної частоти 2,45 ГГц резонансне поле $B = 875$ Гс. Звичайна хвиля не проходить у плазму з густиною, вищою за критичну $n_c = m\omega^2/(4\pi e^2) \approx 7{,}4 \times 10^{10}$ см$^{-3}$, а права поляризована хвиля, введена з боку сильного поля ($\omega < \omega_{ce}$), поширюється як свистова хвиля (6.13) і не має обмеження за густиною, доки не дійде до резонансу. Так *ЕЦР-джерело* дає $n \sim 10^{11}$–10^{12} см$^{-3}$ при тиску лише 0,1–1 мТорр.

Геліконне джерело використовує ту саму свистову гілку на ВЧ-частотах ($\omega_{ci} \ll \omega \ll \omega_{ce}$) в обмеженому циліндрі. При $\omega_{pe}^2 \gg \omega\omega_{ce}$ закон дисперсії свистової хвилі, що поширюється під кутом θ до поля, $c^2k^2/\omega^2 \approx \omega_{pe}^2/(\omega\omega_{ce}\cos\theta)$, з $k\cos\theta = k_z$ набуває вигляду

$$k k_z = \frac{\omega\,\omega_{pe}^2}{\omega_{ce}c^2} = \frac{4\pi n e\,\omega}{Bc} \quad\Longrightarrow\quad n = \frac{B k k_z c}{4\pi e \omega}. \tag{11.13}$$

При фіксованій антені (задані k_z і поперечне $k_\perp \approx 3{,}83/a$) густина плазми, в якій хвиля резонансно «вписується» у трубку радіуса a, пропорційна полю B. Геліконні джерела дають рекордні для ВЧ-розрядів густини $\sim 10^{13}$ см$^{-3}$ (задача 11.6).

11.7. Плазмова обробка матеріалів

Мікросхему з мільярдами транзисторів неможливо виготовити без плазми: близько третини технологічних кроків є плазмовими. Плазма постачає на поверхню два «інструменти»: потік *хімічно активних радикалів* (атоми F, Cl, O, утворені дисоціацією молекул електронним ударом) і *спрямований потік іонів* з енергією, яку задає шар.

Травлення. Атоми фтору травлять кремній і самі по собі ($\mathrm{Si} + 4\mathrm{F} \to \mathrm{SiF_4}\uparrow$), але *ізотропно*: маска підтравлюється збоку так само, як вглиб. Іони аргону з енергією ~ 500 еВ розпорошують кремній, але повільно. Разом вони дають швидкість травлення, у кілька (до десяти) разів більшу за суму окремих швидкостей: іонне бомбардування руйнує

Таблиця 11.1. Типові параметри технологічних джерел плазми (аргон).

Джерело	p, мТорр	n, см$^{-3}$	T_e, еВ	Енергія іонів
Тліючий (пост. струм)	10^2–10^4	10^9–10^{11}	1–5	до V_c
ЄЗП (13,56 МГц)	10–10^3	10^9–10^{10}	1–5	10^2–10^3 еВ, зв'язана з n
ІЗП	1–50	10^{11}–10^{12}	2–5	окреме зміщення
ЕЦР (2,45 ГГц)	0,1–10	10^{11}–10^{12}	2–7	окреме зміщення
Геліконне	1–10	10^{12}–10^{13}	3–6	окреме зміщення

поверхневий шар і прискорює утворення та десорбцію летких продуктів. Цей *іонно-стимульований* синергізм діє лише там, куди падають іони, тобто на дно канавки, а не на її стінки, бо пучок майже нормальний (кут $\sim 1°$, розд. 11.4). Стінки часто ще й захищає полімерна плівка з фторвуглецевих радикалів (CF_x), яку іони здирають лише з дна. Так виходять *анізотропні* канавки з відношенням глибини до ширини понад 50:1.

Осадження. У плазмохімічному осадженні з газової фази (PECVD) енергію для дисоціації прекурсора (SiH_4, NH_3) дають гарячі електрони, а не нагрів підкладки. Тому плівки аморфного кремнію чи нітриду кремнію ростуть при $\sim 300\,°C$ замість $\gtrsim 700\,°C$ у термічному процесі, і це сумісно з алюмінієвими контактами та скляними підкладками сонячних батарей і дисплеїв.

Розпорошення. У *магнетроні* над катодом-мішенню створюють арочне магнітне поле $B \sim 300$ Гс. Електрони ($\rho_e \sim 0{,}1$ мм) замагнічені й дрейфують у схрещених полях (3.2) по замкненій доріжці над мішенню, тому довго іонізують газ. Іони з ларморівським радіусом у кілька сантиметрів практично не відчувають поля і бомбардують мішень. Так можна підтримувати густий розряд при тиску ~ 1 мТорр, а розпорошені атоми долітають до підкладки без зіткнень.

Розряди атмосферного тиску. Діелектричний бар'єрний розряд (ДБР) між електродами, вкритими діелектриком, складається з багатьох наносекундних мікророзрядів: діелектрик заряджається й гасить кожен з них раніше, ніж той перейде в дугу. Газ лишається холодним, а електрони мають кілька еВ. На цьому ґрунтуються промислові озонатори, обробка полімерів, плазмова медицина. Люмінесцентні та газорозрядні лампи — позитивний стовп, у якому до 60 % потужності перетворюється на резонансне випромінювання (лінія Hg 254 нм).

11.8. Як це вимірюють: оптична емісія і ВЧ-зонди

Оптична емісійна спектроскопія (ОЕС) найпростіша: розряд світиться сам, і досить спектрометра біля вікна камери. Інтенсивність лінії, збудженої прямим електронним ударом з основного стану, $I_X \propto n_e n_X k_X^{\mathrm{exc}}(T_e)$, але і n_e, і k^{exc} невідомі. Метод *актинометрії* обходить цю проблему: до газу додають кілька відсотків інертного газу («актинометра», зазвичай Ar) відомої концентрації і вибирають пару ліній із близькими порогами збудження, наприклад F 703,7 нм (14,5 еВ) і Ar 750,4 нм (13,5 еВ). Тоді відношення констант збудження майже не залежить від T_e, і

$$\frac{n_{\mathrm{F}}}{n_{\mathrm{Ar}}} = C_{\mathrm{F,Ar}}\,\frac{I_{\mathrm{F}}}{I_{\mathrm{Ar}}}, \tag{11.14}$$

де C — стала калібрування. На практиці зміну інтенсивності ліній продуктів реакції (наприклад, CO або SiF) використовують для визначення моменту, коли травлення доходить до нижнього шару (контроль закінчення процесу). Відношення інтенсивностей ліній з *різними* порогами, навпаки, чутливе до хвоста розподілу і дає оцінку T_e.

Зонд Ленгмюра у ВЧ-плазмі. Класична вольт-амперна характеристика зонда (рис. 1.10) передбачає сталий потенціал плазми. У ВЧ-розряді потенціал плазми коливається з амплітудою $\tilde{V}$ від кількох до сотень вольт. Через експоненту в електронній гілці усереднений струм зміщується і розмивається: зонд показує завищену T_e і занижений плаваючий потенціал. *ВЧ-компенсований* зонд вирішує це двома способами: послідовно з зондом вмикають резонансні дроселі, налаштовані на 13,56 МГц і другу гармоніку, а через ємність до зонда під'єднують допоміжний електрод великої площі. Тоді зонд «плаває» разом з потенціалом плазми, і ВЧ-напруга на його шарі стає малою, $e\tilde{V}_{\mathrm{sh}} \lesssim T_e/2$. З компенсованої характеристики знаходять не лише T_e і n_e, а й саму функцію розподілу за енергіями за *методом Дрювестейна*:

$$g_e(\varepsilon) = \frac{2m}{e^2 S}\sqrt{\frac{2eV}{m}}\,\frac{d^2 I_e}{dV^2}, \qquad \varepsilon = eV, \tag{11.15}$$

де V — гальмівний потенціал зонда відносно плазми, S — площа зонда, $g_e(\varepsilon)\,d\varepsilon$ — число електронів в одиниці об'єму з енергією в інтервалі $d\varepsilon$. Формула випливає з того, що струм на зонд при гальмівному потенціалі V несуть лише електрони з енергією, більшою за eV, і справедлива для будь-якого ізотропного розподілу. Такі вимірювання показали, що в ЄЗП низького тиску розподіл часто *двотемпературний*: холодні електрони в центрі ($\sim 0{,}5$ еВ) і гарячі (~ 3 еВ), нагріті коливними шарами. Для абсолютного значення n_e незалежно від зонда використовують мікрохвильову інтерферометрію або резонансний зонд-«шпильку», власна частота якого зсувається на ω_{pe}.

Межі застосовності. Актинометрія вимагає, щоб обидва верхні рівні збуджувалися прямим електронним ударом з основного стану (а не дисоціативним збудженням молекул чи каскадом з вищих рівнів) і розпадалися радіаційно, без гасіння зіткненнями. При тисках $\gtrsim 1$ Торр і в молекулярних газах ці умови порушуються, і стала C стає залежною від режиму. Зонд вносить у плазму збурення і забруднюється плівками в хімічно активних розрядах; друга похідна у (11.15) підсилює шум, тож хвіст розподілу при $\varepsilon \gtrsim 15$ еВ визначається з великою похибкою. У магнітному полі (ЕЦР, магнетрон) струм електронів на зонд обмежено поперечною рухливістю, і формула Дрювестейна незастосовна.

Головне в розділі

- Низькотемпературна плазма нерівноважна: $T_e \sim 1$–10 еВ, $T_i \approx T_g$; її підтримує зовнішнє поле, а іонізація компенсує втрати на стінки.
- Константа іонізації $k_{iz} \propto e^{-\varepsilon_{iz}/T_e}$ (11.2) різко залежить від T_e, тому T_e у розрядах лежить у вузькій смузі 2–5 еВ.
- Пробій: лавина $\alpha = Ap\,e^{-Bp/E}$ плюс вторинна емісія, $\gamma(e^{\alpha d} - 1) = 1$; напруга пробою залежить лише від pd (закон Пашена (11.5)) і має мінімум ~ 200–300 В.
- Тліючий розряд: майже вся напруга спадає в катодному шарі; позитивний стовп підтримується балансом іонізації та амбіполярної дифузії (умова Шотткі (11.6)). Дуга має катодне падіння ~ 10 В і спадну характеристику.
- Потік іонів на поверхню $\approx 0{,}6\,n_0 u_B$ задає плазма; товщину високовольтного шару дає закон Чайлда — Ленгмюра (11.8), $s \sim r_D (eV_0/T_e)^{3/4}$.
- Глобальна модель: T_e визначає баланс частинок, $k_{iz}/u_B = 1/(n_g d_{\text{eff}})$, незалежно від потужності; густина $n_0 = P_{\text{abs}}/(e u_B A_{\text{eff}} \mathcal{E}_T)$ пропорційна потужності.
- ЄЗП зв'язує густину й енергію іонів; ІЗП, ЕЦР і геліконні джерела дають густішу плазму й окреме керування енергією іонів через зміщення підкладки.
- Анізотропне травлення ґрунтується на синергії радикалів і майже нормального потоку іонів із шару.
- Діагностика: актинометрія для відносних концентрацій радикалів, ВЧ-компенсований зонд і метод Дрювестейна для функції розподілу електронів.

Задачі

11.1. Нехай переріз іонізації поблизу порога $\sigma_{iz} = C(\varepsilon - \varepsilon_{iz})$ при $\varepsilon > \varepsilon_{iz}$. Усередніть $\sigma_{iz} v$ за максвеллівським розподілом і отримайте (11.2). У скільки разів зросте k_{iz} аргону ($\varepsilon_{iz} = 15{,}8$ еВ) при зростанні T_e від 2 до 3 еВ? *Відповідь:* $k_{iz} = C\bar{v}_e(\varepsilon_{iz} + 2T_e)e^{-\varepsilon_{iz}/T_e}$; зростання приблизно в ≈ 6 разів (за апроксимацією з розд. 11.1 — у $\approx 6{,}5$ раза).

11.2. Знайдіть положення і величину мінімуму кривої Пашена (11.5). Обчисліть їх для повітря ($A = 15$ см$^{-1}$Торр$^{-1}$, $B = 365$ В/(см$\cdot$Торр), $\gamma = 0{,}01$). Якою буде напруга пробою проміжку $d = 1$ мм при атмосферному тиску? *Відповідь:* $(pd)_{\min} = e\ln(1 + 1/\gamma)/A \approx 0{,}84$ Торр$\cdot$см, $V_{\min} = B(pd)_{\min} \approx 305$ В; при $pd = 76$ Торр$\cdot$см $V_b \approx 4{,}6$ кВ.

11.3. Виведіть (11.9) з (11.8) і умови $J = en_s u_B$. Знайдіть товщину шару біля електрода під напругою $V_0 = 300$ В в аргоновій плазмі з $T_e = 3$ еВ, $n_s = 10^{10}$ см$^{-3}$ і час прольоту іона через шар. Порівняйте його з періодом поля 13,56 МГц. *Відповідь:* $r_D \approx 0{,}13$ мм, $s \approx 3{,}2$ мм; кінцева швидкість іона $\approx 3{,}8 \times 10^6$ см/с, час прольоту $3s/v \approx 0{,}25$ мкс, тобто $\approx 3{,}4$ періоду поля.

11.4. Аргонова плазма при $p = 10$ мТорр, $d_{\text{eff}} = 10$ см, $T_g = 300$ К. Користуючись апроксимацією $k_{iz} \approx 2{,}3\times10^{-8} T_e^{0{,}59} e^{-17{,}4/T_e}$ см^3/с, знайдіть T_e з (11.10). Яку густину підтримує поглинена потужність 500 Вт при $A_{\text{eff}} = 10^3$ см^2 і $\mathcal{E}_T = 80$ еВ? Як зміняться T_e і n_0, якщо потужність подвоїти, а тиск зменшити вдвічі? *Відповідь:* $T_e \approx 2{,}8$ еВ, $n_0 \approx 1{,}5 \times 10^{11}$ см$^{-3}$; від потужності T_e не залежить, а зменшення тиску вдвічі підвищує її до $\approx 3{,}3$ еВ; густина зросте менш ніж удвічі, бо зростають u_B і $\mathcal{E}_T$ (A_{eff} вважаємо сталою).

11.5. Знайдіть резонансне магнітне поле ЕЦР-джерела з частотою 2,45 ГГц і критичну густину для звичайної хвилі цієї частоти. Чому мікрохвилі вводять з боку сильного поля? *Відповідь:* $B = 2\pi f mc/e \approx 875$ Гс; $n_c \approx 7{,}4 \times 10^{10}$ см$^{-3}$; при $\omega < \omega_{ce}$ права хвиля є свистовою і не має відсічки за густиною.

11.6. Геліконне джерело: трубка радіуса $a = 2{,}5$ см, $f = 13{,}56$ МГц, антена задає $\lambda_z = 20$ см, $B = 500$ Гс. Оцініть густину плазми з (11.13), взявши $k_\perp = 3{,}83/a$. *Відповідь:* $k_\perp \approx 1{,}5$ см$^{-1}$, $k_z \approx 0{,}31$ см$^{-1}$, $k \approx 1{,}6$ см$^{-1}$; $n \approx 1{,}4 \times 10^{13}$ см$^{-3}$.

11.7. У магнетроні $B = 300$ Гс, енергія електронів ~ 3 еВ, іонів аргону — до ~ 10 еВ. Порівняйте ларморівські радіуси електронів та іонів із товщиною розрядної області ~ 1 см. *Відповідь:* $\rho_e \approx 0{,}15$ мм (замагнічені), $\rho_i \approx 7$ см (незамагнічені).

Контрольні питання

1. Чому формула Саха незастосовна до плазми тліючого розряду, але застосовна до дуги атмосферного тиску?
2. Поясніть фізично, чому крива Пашена має мінімум.
3. Чому в глобальній моделі температура електронів не залежить від потужності, а густина пропорційна їй?
4. Чому потік іонів на поверхню не залежить від прикладеної до неї напруги, а товщина шару залежить?
5. Звідки береться автозміщення в ємнісному розряді і чому пластину кладуть на менший електрод?
6. У чому перевага індуктивного джерела над ємнісним для травлення?
7. Чому для актинометрії вибирають лінії з близькими порогами збудження?

12 Основні масштаби, режими та межі моделей

Після розгляду основних фізичних явищ корисно зібрати в одному місці методичну ідею, яка проходить через усю фізику плазми: *модель визначається не назвою середовища, а співвідношенням характерних масштабів*. Одна й та сама плазма може потребувати різного опису залежно від просторового масштабу, характерного часу та швидкості процесу.

Нехай L — просторовий масштаб задачі, а $\tau \sim 1/\omega$ — характерний час її розвитку. Насамперед порівнюють

$$\frac{\lambda_D}{L}, \qquad \frac{r_L}{L}, \qquad \frac{\omega}{\omega_p}, \qquad \frac{\omega}{\omega_c}, \qquad \frac{\nu}{\omega_c}.$$

Ці відношення не є незалежним набором «характеристик плазми». Кожне з них відповідає на конкретне фізичне питання: чи можна вважати плазму квазінейтральною, чи замагнічені частинки, чи встигають електрони відновлювати квазінейтральність, чи встигають частинки здійснювати гірообертання та чи руйнують зіткнення замагніченість.

12.1. Просторові та часові масштаби

Для токамака ($n = 10^{14}$ см$^{-3}$, $T = 10$ кеВ, $B = 5 \times 10^4$ Гс, $L \approx 1$ м) ієрархію довжин і частот показано на рис. 12.1; далі кожна умова вибору моделі — це порівняння двох точок на цій шкалі.

Умова

$$\lambda_D \ll L$$

означає, що дебаївське екранування відбувається на значно меншому масштабі, ніж досліджувана задача. Тому на масштабі L можна, як правило, покладати $n_e \simeq Z n_i$ і користуватися квазінейтральним описом. Якщо ж $L \sim \lambda_D$, електростатичне поле та розділення зарядів стають частиною самої задачі.

Аналогічно,




Рис. 12.1. Ієрархія масштабів у токамаку на логарифмічній осі: довжини (зверху) і частоти (знизу). Червоним позначено масштаби задачі (L, $\lambda_{\text{пр}}$, ν_{ei}), синім — магнітні масштаби. Для ω_{LH} використано точну формулу з урахуванням ω_{pi}

$$r_L \ll L$$

є просторовою умовою: на одній ларморівській орбіті поле та його градієнти майже однорідні, тому орбіту можна замінити ведучим центром. Вона відрізняється від часової умови $\omega \ll \omega_c$ (за час зміни плазми частинка багато разів обертається навколо силової лінії); обидві потрібні для дрейфового наближення (розд. 3). Якщо $r_L \sim L$, гірація вже не є малим швидким масштабом, який можна відокремити від основного руху.

Порівняння характерної частоти процесу з плазмовою частотою має інший зміст. Умова $\omega \ll \omega_p$ означає, що електрони швидко реагують на спробу порушити квазінейтральність, тоді як при $\omega \gtrsim \omega_p$ їхня інерція стає суттєвою.

Умова $\omega \ll \omega_c$ означає, що гірація є швидким рухом порівняно з еволюцією макроскопічного збурення. Саме тому у повільній МГД-динаміці окремий гірооберт можна не відстежувати.

Нарешті, відношення ν/ω_c характеризує конкуренцію зіткнень та магнітного обертання. При $\nu \ll \omega_c$ частинка встигає здійснити багато гірообертів між зіткненнями і є сильно замагніченою; при $\nu \gg \omega_c$ зіткнення руйнують гірообертання ще до завершення циклу.

12.2. Зіткнювальний та беззіткнювальний режими

Для зіткнювального та беззіткнювального режимів одного порівняння частот недостатньо. Вводимо середню довжину вільного пробігу

$$\lambda_{\text{пр}} \sim \frac{v_{\text{th}}}{\nu}$$

та число Кнудсена

$$Kn = \frac{\lambda_{\text{пр}}}{L}. \tag{12.1}$$

Якщо $Kn \ll 1$, частинка багато разів стикається на масштабі L і локальний гідродинамічний опис може бути виправданим. Якщо $Kn \gtrsim 1$, структура функції розподілу за швидкостями стає істотною, і кінетичні ефекти вже не можна автоматично відкидати.

Ключова оцінка для токамака ($n = 10^{14}$ см$^{-3}$, $T = 10$ кеВ): $\nu_{ei} \approx 5 \times 10^3$ с$^{-1}$, $v_{Te} \approx 4 \times 10^9$ см/с, тому $\lambda_{\text{пр}} = v_{Te}/\nu_{ei} \approx 10^6$ см ≈ 10 км, тоді як $L \approx 1$ м. Отже, $Kn \sim 10^4$: плазма «беззіткнювальна», проте МГД працює. Парадокс знімається так: поперек поля роль довжини вільного пробігу відіграє $r_{Li} \ll L$ (магнітне поле «склеює» частинки поперек $\mathbf{B}$), а вздовж поля ні — тому саме поздовжній перенос потребує кінетики.

Водночас беззіткнювальність завжди треба розуміти відносно конкретного процесу. Умова

$$\nu \ll \omega$$

означає, що зіткнення слабкі саме для явища з характерною частотою ω. Повільний процес може бути зіткнювальним у тій самій плазмі, для якої швидкі коливання є беззіткнювальними.

Отже, твердження «плазма беззіткнювальна» без зазначення масштабу часу є неповним.

12.3. Як за масштабами вибирають модель

Корисно розглядати наведені вище співвідношення не окремо, а як послідовність запитань.

Таблицю 12.1 не слід читати як набір взаємовиключних категорій. Реальна плазма може одночасно задовольняти кілька нерівностей. Саме їхня сукупність визначає, які члени рівнянь можна відкинути, а які залишити.

Це особливо важливо для МГД. Наприклад, $R_m \gg 1$ саме по собі не означає повної ідеальної МГД: воно лише пригнічує резистивний член. Щоб отримати

$$\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{v} \times \mathbf{B} \simeq 0,$$

треба також перевірити малість холлівського, електроннотискового та інерційного членів узагальненого закону Ома.

Таблиця 12.1. Характерні умови вибору моделі плазми.

Умова	Фізичний наслідок	Типовий опис
$\lambda_D \ll L$	квазінейтральність, $n_e \simeq Z n_i$	можна вводити єдину рідину (потрібне ще замикання)
$r_L \ll L$	замагніченість	дрейфовий / МГД (разом з $\omega \ll \omega_{ci}$)
$Kn \ll 1$	багато зіткнень на масштабі L	гідродинамічний
$Kn \gtrsim 1$	важлива структура $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$	кінетичний
$\nu \ll \omega$	зіткнення слабкі для даного процесу	беззіткнювальний режим
$R_m \gg 1$	резистивна дифузія поля повільна	ідеалізована МГД
$\beta \ll 1$	магнітний тиск домінує	магнітно-керований режим
$\beta \gtrsim 1$	плазма істотно деформує поле	МГД з повним балансом тиску плазми й поля

Таким чином, «МГД-опис» — це не властивість плазми взагалі, а наближення, справедливість якого треба обґрунтувати для конкретного процесу.

12.4. Типова ієрархія масштабів у магнітному утриманні

Розглянемо типову установку магнітного утримання: $n = 10^{14}$ см$^{-3}$, $T = 10$ кеВ, $B = 5 \times 10^4$ Гс, дейтерієва плазма. Для неї характерна ієрархія

$$\underbrace{n^{-1/3}}_{2\times10^{-5}\text{ см}} \ll \underbrace{\lambda_{De}}_{7\times10^{-3}\text{ см}} \sim \underbrace{r_{Le}}_{5\times10^{-3}\text{ см}} \ll \underbrace{r_{Li}}_{0{,}3\text{ см}} \ll \underbrace{L}_{\sim10^{2}\text{ см}} .$$

Ця послідовність дає набагато більше фізичної інформації, ніж кожне число окремо. На найменшому масштабі видно дискретність частинок; далі виникають дебаївське екранування та електронна гірація; ще більшим є іонний ларморівський радіус; і лише на масштабі всієї установки з'являється макроскопічний рух плазми.

Частотна ієрархія для тієї самої оцінки має вигляд

$$\omega_{pe} \approx 6 \times 10^{11}\ \text{с}^{-1}, \qquad \omega_{ce} \approx 9 \times 10^{11}\ \text{с}^{-1},$$
$$\omega_{ci} \approx 2 \times 10^{8}\ \text{с}^{-1}, \qquad \nu_{ei} \approx 5 \times 10^{3}\ \text{с}^{-1}.$$

Отже, зіткнення значно рідші за електронний та іонний циклотронний рух. Плазма сильно замагнічена і для багатьох швидких процесів практично беззіткнювальна.

Але з цієї ж ієрархії випливає важливе обмеження: «беззіткнювальна» не означає «завжди кінетична». На достатньо великих масштабах і повільних часах багато мікроскопічних ступенів свободи усереднюються, і виникає ефективний рідинний опис.

12.5. Від кінетики до МГД

На масштабах, що значно перевищують іонний ларморівський радіус, і для повільних рухів, коли $\omega \ll \omega_{ci}$, доцільний магнітогідродинамічний опис: плазма розглядається як провідне суцільне середовище (вивід — розд. 7.5 і 5).

Для швидких процесів і малих масштабів потрібен кінетичний опис: функція розподілу

$$f_s = f_s(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$$

залежить від координат і швидкостей. Для беззіткнювальної плазми вона задовольняє рівняння Власова

$$\frac{\partial f_s}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \frac{\partial f_s}{\partial \mathbf{r}} + \frac{q_s}{m_s}\left(\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{v} \times \mathbf{B}\right) \cdot \frac{\partial f_s}{\partial \mathbf{v}} = 0. \tag{12.2}$$

Рівняння (12.2) доповнюється рівняннями Максвелла з джерелами

$$\rho = \sum_s q_s \int f_s \, d^3v, \qquad \mathbf{j} = \sum_s q_s \int \mathbf{v} f_s \, d^3v.$$

Саме з кінетичного опису природно випливають ефекти, які не містяться в найпростішій МГД: загасання Ландау, кінетичні плазмові хвилі, резонансна взаємодія хвиль із частинками та багато видів нестійкостей.

Водночас кінетичний опис не «кращий» за МГД у всіх ситуаціях. Він містить значно більше інформації, ніж потрібно для повільної макроскопічної динаміки. Завдання теорії — не використовувати найскладнішу модель, а відкинути лише ті ступені свободи, які справді є несуттєвими на вибраному масштабі.

12.6. Безрозмірні параметри МГД

Для магнітогідродинаміки додатково важливі безрозмірні параметри

$$\beta = \frac{8\pi p}{B^2}, \qquad R_m \sim \frac{4\pi\sigma L v}{c^2}, \qquad M_A = \frac{v}{v_A}, \qquad v_A = \frac{B}{\sqrt{4\pi\rho_m}}. \tag{12.3}$$

Параметр β порівнює плазмовий тиск із магнітним. При $\beta \ll 1$ магнітне поле домінує над газодинамічним тиском, тоді як при $\beta \gtrsim 1$ тиск плазми стає істотним у силовому балансі. Сама величина β не визначає застосовності МГД (вона працює і за малих β), а лише показує, наскільки плазма впливає на поле.

Магнітне число Рейнольдса R_m порівнює характерний час руху плазми з часом дифузії магнітного поля. Велике R_m означає, що резистивна дифузія поля повільна порівняно з рухом плазми.

Число Альвена M_A порівнює швидкість руху плазми з альвенівською швидкістю. Воно показує, наскільки важливі магнітні напруження для динаміки порівняно з інерцією потоку.

Ці параметри не задають одну-єдину «категорію плазми». Вони описують різні сторони одного й того самого режиму.

12.7. Межі простих моделей

Наведені вище критерії дозволяють визначити режим, але не скасовують обмежень самих моделей.

У цьому курсі ми лише позначили, але не розвинули повністю дрейфово-кінетичну теорію, нелінійну теорію хвиль та сильну турбулентність. Повний опис хвиль у замагніченій плазмі потребує розв'язання тензорного дисперсійного рівняння, а детальний опис нестійкостей — лінеаризації кінетичних або МГД-рівнянь для конкретної рівноваги.

Особливо важливо, що реальний перенос у магнітно утримуваній плазмі може бути значно сильнішим за класичний колізійний перенос. Турбулентність породжує *аномальний перенос*, який може визначати реальний час утримання енергії. Тому навіть дуже мала частота зіткнень не гарантує ідеального утримання. Оцінка: для токамака бомівська дифузія $D_B = cT/16eB \approx 1{,}3 \times 10^6$ см^2/с ($\approx 10^2$ м^2/с), тоді як класична $D_\perp \sim \nu_{ei} r_{Le}^2 \sim 0{,}1$ см^2/с: розрив у $\sim 10^7$ разів. Турбулентні флуктуації $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ перемішують плазму з кроком порядку розміру вихору, а не r_L (розд. 9).

Сильнозв'язана та квантова плазма потребує окремих методів. Отже, опис, побудований у цій книзі, треба розуміти як систему моделей із чітко визначеними межами застосовності, а не як універсальне рівняння для будь-якої плазми.

12.8. Основні масштаби та формули

У таблиці зведено основні величини посібника. Наведені практичні формули відповідають системі СГС; T задано в еВ, n — у см$^{-3}$, B — у Гс, f — у МГц; A і Z — масове число та заряд іона.

> **!** *Практичні формули в таблиці записано в СГС із числовими множниками для вказаних одиниць (T в еВ, n в см$^{-3}$, B в Гс); вони не переносяться на СІ без перерахунку. Температуру всюди виражено в енергетичних одиницях (еВ).*

Таблиця 12.2. Основні масштаби та формули фізики плазми в системі СГС.

Величина	Формула	Практична форма
Дебаївська довжина	$\lambda_{De} = \sqrt{T_e/4\pi n_e e^2}$	$7{,}43\times10^{2}\sqrt{T_e/n_e}$ см
Число частинок у сфері	$N_D = \frac{4\pi}{3} n_e \lambda_{De}^3$	$N_D \approx 0{,}094\,\Gamma^{-3/2}$
Параметр зв'язку	$\Gamma = e^2 n^{1/3}/T$	
Плазмова частота	$\omega_{pe} = \sqrt{4\pi n_e e^2/m_e}$	$5{,}64\times10^{4}\sqrt{n_e}$ с$^{-1}$
Теплова швидкість	$v_{Te} = \sqrt{T_e/m_e}$	$4{,}19\times10^{7}\sqrt{T_e}$ см/с
Циклотронна частота	$\omega_c = \lvert q\rvert B/mc$	$\omega_{ce} = 1{,}76\times10^{7}B$, $\omega_{ci} = 9{,}58\times10^{3}(Z/A)B$
Ларморівський радіус	$r_L = mcv_\perp/\lvert q\rvert B$	$r_{Le} = 2{,}38\sqrt{T_e}/B$ см, $r_{Li} = 1{,}02\times10^{2}\sqrt{AT_i}/(ZB)$ см
Частота зіткнень e–i	формула (4.1)	$2{,}9\times10^{-6}\, n \ln\Lambda\, T_e^{-3/2}$ с$^{-1}$
Провідність (Спітцер), вздовж **B**	$\sigma_\parallel \propto T_e^{3/2}/\ln\Lambda$	$1{,}7\times10^{14}\, T_e^{3/2}/\ln\Lambda$ с$^{-1}$ (поперек $\sigma_\perp \approx \sigma_\parallel/2$)
Критична концентрація	$n_{\text{кр}} = m_e\omega^2/4\pi e^2$	$1{,}24\times10^{4} f^2$ см$^{-3}$
Магнітний тиск	$B^2/8\pi$	$3{,}98\times 10^{6}\,(B/10^{4})^2$ дин/см^2
Параметр β	$\beta = 8\pi p/B^2$	
Альвенівська швидкість	$v_A = B/\sqrt{4\pi\rho_m}$	$2{,}18\times10^{11}B/\sqrt{n_i}$ см/с (водень)
Час дифузії поля	$\tau_d = 4\pi\sigma L^2/c^2$	
Довжина Томаса — Фермі	$\lambda_{TF} = \sqrt{E_F/6\pi n e^2}$	$0{,}5\sqrt{a_B n^{-1/3}}$
Амбіполярна дифузія	$D_a \approx D_i(1 + T_e/T_i)$	
Швидкість іонного звуку	$c_s = \sqrt{(ZT_e + 3T_i)/m_i}$	$9{,}79\times10^{5}\sqrt{ZT_e/A}$ см/с ($T_i \ll T_e$)

Продовження на наступній сторінці

Таблиця 12.2. Основні масштаби та формули фізики плазми в системі СГС. (Продовження)

Величина	Формула	Практична форма
Дрейф $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$	$v_E = cE/B$	$10^8\,E[\text{В/см}]/B[\text{Гс}]$ см/с
Дифузія Бома	$D_B = cT_e/16eB$	$6{,}25\times10^6\,T_e/B$ см^2/с
Верхній / нижній гібридні частоти	$\omega_{UH}^2 = \omega_{pe}^2+\omega_{ce}^2$; $\omega_{LH}^2 \simeq \omega_{ci}\omega_{ce}$ (лише при $\omega_{pe}\gg\omega_{ce}$)	$f_{UH} = \sqrt{f_{pe}^2+f_{ce}^2}$
Поле Драйсера	$E_D = 4\pi e^3 n\ln\Lambda/T_e$	$2{,}6\times10^{-13}\,n\ln\Lambda/T_e$ В/см
Критерій запалювання (D–T)	$n\tau_E \geq 12T/\langle\sigma v\rangle E_\alpha$	$\gtrsim 1{,}5\times10^{14}$ см$^{-3}$с (мінімум, $T\sim25$ кеВ)
Гальмівне випромінювання	$P_{br}\propto n_e\sqrt{T_e}\sum Z^2 n_i$	$1{,}7\times10^{-32} n_e\sqrt{T_e}\sum Z^2 n_i$ Вт/см^3

Таблиця 12.2 призначена не для заміни виведень, а для швидкої оцінки порядків величин. При виборі моделі спочатку визначають характерні масштаби задачі, а вже потім звертаються до відповідних формул.

12.9. Що вимірюють на якому масштабі

Кожен параметр плазми «видно» лише методом, чий власний масштаб (довжина хвилі, ларморівський радіус, розмір котушки) сумірний із вимірюваною величиною. Таблиця 12.3 зводить методи, розібрані в попередніх розділах.

Метод треба вибирати за тими самими критеріями, що й модель: наприклад, томсонівське розсіяння з $\alpha \ll 1$ дає тепловий спектр, а з $\alpha \gtrsim 1$ — колективні ефекти.

Головне в розділі

- Модель плазми визначається не назвою середовища, а співвідношенням характерних масштабів задачі.
- Порівнюють λ_D/L, r_L/L, число Кнудсена Kn, частоти ν/ω, магнітне число Рейнольдса R_m та β.
- Зіткнювальний режим допускає гідродинамічний опис, беззіткнювальний — потребує кінетики.
- Простіші моделі мають межі застосовності; їх треба перевіряти оцінкою масштабів до розв'язання задачі.
- Параметри плазми вимірюють методами, чий масштаб відповідає вимірюваній величині (табл. 12.3).

Таблиця 12.3. Масштаб, величина й метод діагностики.

Величина	Метод	Де розглянуто
n_e (інтегральна, по хорді)	інтерферометрія, $\omega \gg \omega_p$	розд. 2.8
n_e (локальна, профіль)	рефлектометрія, $\omega = \omega_p$	розд. 2.8
T_e, n_e (локально)	томсонівське розсіяння, $\alpha = 1/k\lambda_D$	розд. 7.11
T_e (середня)	опір за Спітцером	розд. 4.5
$T_e(r)$	ЕЦЕ, $\omega = \ell\omega_{ce}$	розд. 3.8
T_i	допплерівське розширення ліній, нейтрони	розд. 4.5, 10.9
I, енергія плазми	пояс Роговського, діамагнітна петля	розд. 5.12
положення, Δ, $\beta_p + l_i/2$	магнітна реконструкція	розд. 9.10
моди m, n, δB	котушки Мірнова, м'який рентген	розд. 8.15
$q(r)$, B	обертання Фарадея	розд. 6.7
P_f, Q	потік нейтронів	розд. 10.9

Задачі

? **12.1.** Оцініть λ_{De}, середню відстань $a = n^{-1/3}$ та N_D для чотирьох об'єктів з табл. 1.1: іоносфера ($n = 10^5$ см$^{-3}$, 0,1 еВ), сонячна корона (10^8 см$^{-3}$, 100 еВ), токамак (10^{14} см$^{-3}$, 10 кеВ), ядро Сонця (10^{26} см$^{-3}$, 1 кеВ). Для якого з них колективний опис найменш обґрунтований? *Відповідь:* іоносфера: $\lambda_D \approx 0{,}7$ см, $a \approx 2\times10^{-2}$ см, $N_D \approx 2\times10^5$; корона: 0,7 см, 2×10^{-3} см, 2×10^8; токамак: 7×10^{-3} см, 2×10^{-5} см, 2×10^8; ядро Сонця: $\lambda_D \approx 2\times10^{-9}$ см $\sim a$, $N_D \approx 5$ — колективний опис найменш обґрунтований.

? **12.2.** Для дейтерієвої плазми $n = 10^{14}$ см$^{-3}$, $T = 10$ кеВ у полі $B = 5\times10^4$ Гс знайдіть $n^{-1/3}$, λ_{De}, r_{Le}, r_{Li} і розташуйте їх за зростанням. Яка з обох довжин (r_{Le} чи λ_{De}) більша? *Відповідь:* $n^{-1/3} \approx 2\times10^{-5}$ см $<$ $r_{Le} \approx 4{,}8\times10^{-3}$ см $<$ $\lambda_{De} \approx 7{,}4\times10^{-3}$ см $<$ $r_{Li} \approx 0{,}29$ см; λ_{De} трохи більша за r_{Le}.

? **12.3.** Для $n_e = 10^{12}$ см$^{-3}$, $T_e = 10$ еВ, $\ln\Lambda = 15$ знайдіть частоту зіткнень ν_{ei}, відношення ν_{ei}/ω_{pe} та довжину вільного пробігу $\lambda_{\text{пр}} =$

? v_{Te}/ν_{ei}. Порівняйте $\lambda_{\text{пр}}$ з λ_{De}. *Відповідь:* $\nu_{ei} \approx 1{,}4 \times 10^6$ с$^{-1}$, $\nu_{ei}/\omega_{pe} \approx 2{,}5 \times 10^{-5}$, $\lambda_{\text{пр}} \approx 1$ м; $\lambda_{\text{пр}}/\lambda_{De} \approx 4 \times 10^4$.

? **12.4.** Користуючись табл. 12.2, оцініть λ_D та ω_{pe} для плазми газового розряду з $n_e = 10^{10}$ см$^{-3}$ і $T_e = 3$ еВ. Порівняйте отримані масштаби з типовим часом і просторовим масштабом макроскопічного процесу. *Відповідь:* $\lambda_D \approx 1{,}3 \times 10^{-2}$ см, $\omega_{pe} \approx 5{,}6 \times 10^9$ с$^{-1}$ ($f \approx 0{,}9$ ГГц); обидва масштаби набагато менші за сантиметрові розміри й мікро-/мілісекундні часи розряду, тому плазма квазінейтральна.

? **12.5.** Оцініть час утримання $\tau \sim a^2/D$ для токамака з $a = 1$ м і $B = 5$ Тл, $T = 10$ кеВ, якщо діє (а) класична дифузія $D_\perp \sim 0{,}1$ см^2/с, (б) бомівська $D_B = cT/(16eB)$. Який із двох результатів узгоджується з експериментом ($\tau_E \sim 1$ с) і що це означає для вибору моделі? *Відповідь:* (а) $\sim 10^5$ с, (б) $\sim 10^{-2}$ с.

? **12.6.** За якої густини плазма з $T = 1$ кеВ перестає бути ідеальною ($\Gamma \sim 1$) і за якої стає виродженою ($T \sim E_F$)? Порівняйте з ядром Сонця (задача 12.1). *Відповідь:* $\Gamma \sim 1$ при $n \sim 3 \times 10^{29}$ см$^{-3}$, $T \sim E_F$ при $n \sim 10^{26}$ см$^{-3}$.

? **12.7.** Для плазми з $n = 10^{14}$ см$^{-3}$, $T_i = 10$ кеВ та характерним розміром $L = 1$ м задано $\lambda_{\text{пр}} = 10^6$ см і $r_{Li} = 0{,}3$ см. Оцініть $Kn = \lambda_{\text{пр}}/L$ та r_{Li}/L. Який із двох параметрів показує, що звичайна ізотропна МГД-модель має обмеження? Яке уточнення опису слід розглядати? *Відповідь:* $Kn \approx 10^4$, $r_{Li}/L \approx 3 \times 10^{-3}$; обмеження показує Kn: поздовжній перенос беззіткнювальний, тиск анізотропний — потрібні модель CGL, дрейфово- чи гірокінетичний опис поздовжнього переносу.

? Контрольні питання

1. Що таке квазінейтральність? Якою нерівністю визначається можливість нехтувати розділенням зарядів на масштабі L?
2. Чому порівняння масштабів часто важливіше за числове значення окремої величини?
3. Що фізично означають умови $\lambda_D \ll L$ та $r_L \ll L$?
4. Чому умова $\nu \ll \omega$ повинна формулюватися відносно конкретного процесу?

5. Чим принципово відрізняються МГД- та кінетичний описи? За яких умов кінетичний опис стає необхідним?
6. Чому виконання $R_m \gg 1$ саме по собі не гарантує повної ідеальної МГД?
7. Як пов'язані між собою число Кнудсена Kn, довжина вільного пробігу та характерний розмір задачі?
8. Чому плазма може бути майже беззіткнювальною для швидких процесів і водночас поводитися як суцільне середовище на великих просторових і часових масштабах?
9. Які явища не описуються найпростішою ізотропною МГД-моделлю?
10. Яку інформацію дає типова ієрархія $n^{-1/3} \ll \lambda_D \sim r_{Le} \ll r_{Li} \ll L$?
11. Чому для МГД важлива саме ω_{ci}, а не ω_{ce}?
12. Чому в токамаку перенос поперек поля аномальний, а не класичний, і що це означає для вибору моделі?

Підсумки

- *Плазма й її масштаби (розд. 1).* Іонізація сама по собі ще не робить газ плазмою в колективному сенсі. Потрібно, щоб на дебаївській довжині λ_D містилося багато частинок ($N_D \gg 1$); тоді на масштабах $L \gg \lambda_D$ плазма квазінейтральна. Просторовий масштаб колективної відповіді — λ_D, часовий — ω_p^{-1}, і для електронів $\lambda_{De} = v_{Te}/\omega_{pe}$. Біля поглинальної стінки утворюється шар із критерієм Бома $u \geq c_s$ і плаваючим потенціалом $\approx -3{,}3\, T_e/e$ (для водню); на цьому ґрунтується зонд Ленгмюра.
- *Колективні коливання й хвилі (розд. 2).* Частотно-залежна проникність $\varepsilon = 1 - \omega_p^2/\omega^2$ означає відсікання й відбиття хвиль з $\omega < \omega_p$; зіткнення дають поглинання. Тепловий рух перетворює плазмові коливання на хвилі Бома — Гросса $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2 v_{Te}^2$.
- *Рух частинки в полях (розд. 3).* У магнітному полі рух розпадається на швидку гірацію (масштаби r_L, ω_c^{-1}) і повільні дрейфи. Дрейф $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ не залежить від заряду; градієнтний і відцентровий дрейфи залежать від знака заряду й створюють струми та розділення зарядів. Магнітний момент $\mu = mv_\perp^2/2B$ і подовжній інваріант J є адіабатичними інваріантами; вони пояснюють магнітне дзеркало, конус втрат і радіаційні пояси Землі.
- *Зіткнення (розд. 4).* Кулонівська частота $\nu_{ei} \propto nT^{-3/2}$ мала порівняно з ω_p у слабкозв'язаній плазмі, але саме вона визначає опір (провідність Спітцера зростає з температурою), теплоперенос і дифузію. Сила тертя на швидкий електрон спадає зі швидкістю, тому існує поле Драйсера й втікаючі електрони. Поперек магнітного поля дифузія зменшується як B^{-2}.
- *Рідинний опис і МГД (розд. 5).* Сума рівнянь руху електронів та іонів дає рівняння МГД $\rho_m\, d\mathbf{v}/dt = -\nabla p + \mathbf{j}\times\mathbf{B}/c$; закон Ома пов'язує $\mathbf{E}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{B}$. Сила, з якою поле діє на плазму, є магнітним тиском $B^2/8\pi$ *поперек* поля та натягом $B^2/4\pi$ *вздовж* ліній (а не ізотропним тиском). Магнітне поле вморожене в плазму за $R_m \gg 1$, але самої вмороженості для утримання недостатньо. Параметр $\beta = 8\pi p/B^2$ показує, наскільки плазма деформує поле. Діамагнітний струм однаковий у частинковому, рідинному описах і через намагніченість $M = -p/B$.
- *МГД-хвилі й хвилі в замагніченій плазмі (розд. 6).* Лінеаризація

МГД дає три моди: альвенівську $\omega = k v_A \cos\theta$ (натяг ліній, енергія вздовж **B**) та швидку й повільну магнітозвукову. Для $\omega \gtrsim \omega_{ci}$ потрібна холодна замагнічена модель: R-, L-, O-, X-моди, вістлер, гібридні резонанси, ЕЦР і ІЦР. Іонний звук існує за $T_e \gg T_i$.

- *Кінетика (розд. 7).* Рідинний опис — моменти функції розподілу; ієрархія моментів не замикається сама. Лінеаризоване рівняння Власова дає $\varepsilon(\omega, k)$ з полюсом при $v = \omega/k$ і беззіткнювальне загасання Ландау $\gamma \approx -\sqrt{\pi/8}\,\omega_{pe}(k\lambda_{De})^{-3}\exp\!\left[-1/(2k^2\lambda_{De}^2) - 3/2\right]$; додатний нахил $F_0'(v_\varphi) > 0$ (наприклад, пучок) натомість дає нестійкість.
- *Нестійкості (розд. 8).* Нестійкість — зростання збурення з $\operatorname{Im}\omega > 0$; її джерелом є вільна енергія (градієнт тиску в поганій кривині — жолобкова/Релея — Тейлора; пучки; анізотропія; струм; градієнт густини — дрейфові хвилі). За енергетичним принципом МГД-рівновага стійка, якщо $\delta W > 0$ для всіх допустимих зміщень $\boldsymbol{\xi}$.
- *Магнітне утримання (розд. 9).* Дзеркала протікають через конус втрат; z-пінч утримується власним струмом (співвідношення Беннета), але нестійкий. Чисто тороїдальне поле не утримує через дрейф, тому поле закручують (токамак, стеларатор). Захоплені частинки (банани) дають неокласичний перенос, а межі Тройона й Грінвальда обмежують β й густину.
- *Термоядерний синтез (розд. 10).* Реакції йдуть завдяки тунелюванню; швидкість визначається піком Гамова ($E_0 \approx 31$ кеВ при $T = 10$ кеВ). Критерій Лоусона вимагає $nT\tau_E \gtrsim 3 \times 10^{15}$ кеВ·с·см$^{-3}$. Для D–T 20% енергії несуть α-частинки (лишаються в плазмі), 80% — нейтрони (у бланкеті дають тепло й тритій). Плазмовий Q не дорівнює інженерному: електростанції потрібні значно більші Q, ніж просте $Q > 1$.
- *Низькотемпературна плазма та газовий розряд (розд. 11).* Розряд підтримує себе, коли іонізація компенсує втрати: пробій за Таунсендом дає закон Пашена $V_b(pd)$ з мінімумом, а в стаціонарі баланс частинок фіксує T_e (кілька еВ) незалежно від густини, тоді як баланс енергії задає густину $n \propto P_{\text{abs}}$. Біля стінок утворюється шар Бома — Чайлда — Ленгмюра, який прискорює іони до поверхні; на цьому ґрунтується плазмове травлення. ЄЗП, ІЗП, ЕЦР і геліконні джерела розрізняються механізмом передачі енергії електронам.
- *Вибір моделі (розд. 12).* Реальну плазму описує сукупність умов (N_D, λ_D/L, r_L/L, ν/ω, R_m, β, ω/ω_{ci}): кожна задає, які члени рівнянь можна відкинути. Межі простих моделей важливі не менше за самі формули: вони показують, коли потрібно переходити від частинкової картини до МГД, а від МГД — до кінетичної теорії.

Додатки

A. Таблиця позначень

Нижче зібрано позначення, що вживаються в розд. 1 і 2, у порядку їхнього введення. Усі формули подано в системі СГС (гаусовій), як у розд. 1; температури T (у тому числі T_e, T_i) записано в енергетичних одиницях, $k_\mathrm{B} = 1$, а числові значення дають в електронвольтах: $1\ \text{еВ} \approx 1{,}16 \times 10^4$ К. Одиниці СГС потенціалу й поля відповідають 300 В і 300 В/см. Стовпець «Де» вказує параграф або формулу, де величину введено; символи, що мають кілька значень залежно від контексту, перелічено в кінці додатка.

Загальні сталі та позначення

Символ	Значення	Одиниця (СГС)	Де
e	елементарний заряд	$4{,}80 \times 10^{-10}$ СГСЕ	§ 1.5
m_e, m_i, m_a, m	маса електрона, іона, атома; m — маса частинки (у формулі Саха — електрона)	г	§ 1.2
k_B	стала Больцмана (далі $k_\mathrm{B} = 1$)	ерг/К	§ 1.1
$\hbar$, $h = 2\pi\hbar$	стала Планка	ерг·с	(1.2)
c	швидкість світла	см/с	(3.1)
Z	кратність іонізації: заряд іона Ze	—	(1.4)
n, n_e, n_i, n_n	концентрація (загальна), електронів, іонів, нейтральних частинок	см^{-3}	(1.1)
T, T_e, T_i, T_s	температура (в енергетичних одиницях): загальна, електронів, іонів, сорту s	еВ	§ 1.3

Іонізація (формула Саха)

Символ	Значення	Одиниця (СГС)	Де
α	ступінь іонізації $n_i/(n_i+n_n)$	—	(1.1)
I	енергія іонізації атома (для водню 13,6 еВ)	еВ	(1.2)
g, g_e, g_i, g_a	статистичні ваги	—	§ 1.2
μ	хімічний потенціал	еВ	§ 1.2
λ_T, λ_{Te}	теплова довжина хвилі де Бройля $h/\sqrt{2\pi mT}$ (для електрона — λ_{Te})	см	§ 1.2
n_q	квантова концентрація $\lambda_{Te}^{-3} = (mT/2\pi\hbar^2)^{3/2}$	см$^{-3}$	§ 1.2
$\Delta E/E$	частка енергії, яку електрон передає іону при пружному зіткненні	—	§ 1.3

Квазінейтральність і дебаївське екранування

Символ	Значення	Одиниця (СГС)	Де
ρ	густина заряду $\sum_s q_s n_s$	СГСЕ/см^3	(1.4)
$\mathbf{E}$, E	напруженість електричного поля	СГС (поле)	§ 1.4
δn	локальне відхилення концентрації від середньої	см$^{-3}$	§ 1.4
L	розмір плазми (характерний масштаб неоднорідності)	см	(1.8)
φ	електростатичний потенціал; $\varphi_0 = \varphi(0)$ — потенціал поверхні	СГС (потенціал)	§ 1.5
q, q_s	пробний заряд; заряд частинки сорту s	СГСЕ	§ 1.5
n_{s0}	незбурена концентрація сорту s	см$^{-3}$	§ 1.5
λ_D, λ_{De}, λ_{Di}	дебаївська довжина (повна, електронна, іонна); $\lambda_D = \lambda_{De}/\sqrt{2}$ при $T_e = T_i$	см	(1.5), (1.7)
$\delta(\mathbf{r})$	дельта-функція (точковий заряд)	см$^{-3}$	(1.5)

Символ	Значення	Одиниця (СГС)	Де
σ	поверхнева густина заряду площини	СГСЕ/см^2	§ 1.8
x, y	відстань від площини; $y = e\varphi/T$	см; —	§ 1.8

Колективність і зв'язаність

Символ	Значення	Одиниця (СГС)	Де
N_D	число електронів у дебаївській сфері $\frac{4\pi}{3} n_e \lambda_{De}^3$	—	(1.9)
a	середня відстань між частинками $n^{-1/3}$	см	§ 1.6
U_C, U_T	енергія кулонівської взаємодії e^2/a та теплова енергія T	еВ	§ 1.7
Γ	параметр зв'язку $e^2/(aT)$	—	(1.11)
p	тиск ідеального газу $\sum_s n_s T_s$	дин/см^2	§ 1.7

Шар біля стінки та зонд Ленгмюра

Символ	Значення	Одиниця (СГС)	Де
c_s	іонно-звукова швидкість $\sqrt{T_e/m_i}$	см/с	(1.15)
u, u_0	швидкість іонів у шарі; їхня швидкість на вході в шар (критерій Бома $u_0 \geq c_s$)	см/с	(1.16)
n_0, n_{sh}	концентрація в незбуреній плазмі; на межі шару ($n_{\mathrm{sh}} \approx 0{,}6\, n_0$)	см$^{-3}$	§ 1.9
χ	безрозмірний потенціал $-e\varphi/T_e$	—	§ 1.9
j_i, j_e	потік іонів, електронів на стінку	см$^{-2}\cdot$с$^{-1}$	§ 1.9
$\bar{v}_e$, v_{Te}, v_{Ti}	середня швидкість електрона $\sqrt{8T_e/\pi m_e}$; теплові швидкості електронів і іонів	см/с	§ 1.9
φ_f	плаваючий потенціал відносно плазми, $\varphi_f = V_f - V_p < 0$	СГС (потенціал)	(1.17)

Символ	Значення	Одиниця (СГС)	Де
V, V_f, V_p	потенціал зонда відносно опорного електрода; плаваючий потенціал; потенціал плазми	В	§ 1.9
I	струм на зонд (не плутати з енергією іонізації I)	мА	§ 1.9
I_{is}, I_{es}, I_e	струми іонного та електронного насичення; електронний струм	мА	§ 1.9
S, r_p	площа зонда; його характерний розмір	см^2; см	§ 1.9
V_1, V_2, I_{e1}, I_{e2}	потенціали й електронні струми двох електродів подвійного зонда	В; мА	(1.18)
λ_{fp}	довжина вільного пробігу (відстань між зіткненнями)	см	§ 1.9
$\mathbf{B}$, B	індукція магнітного поля	Гс	(3.1)
$v_\perp$	складова швидкості поперек $\mathbf{B}$	см/с	(3.1)
r_{Le}	ларморівський радіус електрона $m_e c v_\perp / eB$ (розд. 3)	см	(3.1)

Екранування у виродженому газі

Символ	Значення	Одиниця (СГС)	Де
E_F	енергія Фермі	еВ	(1.20)
λ_{TF}	довжина Томаса — Фермі	см	(1.20)
λ	довжина екранування в загальному випадку $[4\pi e^2 \partial n/\partial \mu]^{-1/2}$	см	(1.19)
a_B	борівський радіус $\hbar^2/me^2 = 0{,}53 \times 10^{-8}$ см	см	(1.20)

Хвилі в плазмі (розд. 2)

Символ	Значення	Одиниця (СГС)	Де
ω_{pe}, ω_p	електронна плазмова частота $\sqrt{4\pi n_e e^2/m_e}$; далі $\omega_p \equiv \omega_{pe}$	с^{-1}	(2.2)
ε	діелектрична проникність $1 - \omega_p^2/\omega^2$	—	(2.5)
N	показник заломлення $\sqrt{\varepsilon}$ (літеру n зарезервовано для концентрації)	—	§ 2.2
v_φ, v_g	фазова ω/k та групова $d\omega/dk$ швидкості	см/с	§ 2.2
$n_{\text{кр}}$	критична концентрація $m_e\omega^2/4\pi e^2$, при якій $\omega = \omega_p$	см^{-3}	(2.11)
ν	ефективна частота зіткнень електрона (ν_{ei})	с^{-1}	(2.10)
δ	товщина скін-шару, глибина проникнення $1/\kappa$	см	§ 2.2

Символи з кількома значеннями. У розд. 1 деякі літери означають різні величини; значення визначається контекстом та індексами.

- I — енергія іонізації (§ 1.2) і струм на зонд (§ 1.9);
- Г — параметр зв'язку (1.11) ; потоки частинок на стінку позначено j_i, j_e;
- n_s — концентрація сорту s (§ 1.5); концентрацію на межі шару позначено n_{sh};
- a — середня відстань між частинками (розмір зонда позначено r_p);
- ρ — густина заряду; ларморівський радіус позначено r_L (r_{Le} для електрона), а не ρ;
- u — швидкість іонів у шарі; допоміжна змінна $u = r\varphi$ у § 1.5 вживається лише в одному виведенні;
- λ без індексу — довжина екранування в загальному випадку (1.19), λ_D — дебаївська;
- E — напруженість електричного поля, E_F — енергія Фермі;
- N — показник заломлення (розд. 2); у розд. 1 N_D — число частинок у дебаївській сфері, а n — завжди концентрація;
- δ — товщина скін-шару (розд. 2) і дельта-функція $\delta(\mathbf{r})$.

Б. Словник термінів

Нижче зібрано терміни фізики плазми, які вживаються в розд. 1 і 2 і не є звичними із загальної фізики. Кожен термін коротко пояснено й вказано місце, де його означено докладно; нових означень тут нема. Терміни розташовано за абеткою.

- **Адіабатичне стискання** — стискання, настільки швидке, що за період коливання електрон не встигає вилетіти з області стискання, $kv_{Te} \ll \omega$ (§ 2.4).
- **Бома — Гросса співвідношення** — закон дисперсії ленгмюрівських хвиль із тепловою поправкою, $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2 v_{Te}^2$ (§ 2.4).
- **Вироджений газ** — газ, у якому температура нижча за енергію Фермі, $T \lesssim E_F$, і розподіл частинок визначає квантова статистика (§ 1.10).
- **Гідродинамічний опис** — опис електронів як суцільного середовища з густиною, швидкістю й тиском, без стеження за окремими частинками (§ 2.4).
- **Дебаївська довжина** λ_D — відстань, на якій екрановане поле заряду спадає в e разів; масштаб екранування (§ 1.5). Дорівнює відстані, яку електрон із тепловою швидкістю проходить за час ω_{pe}^{-1} (§ 2.1).
- **Дебаївська сфера** — область радіуса λ_{De} навколо частинки; число частинок у ній N_D вимірює колективність (§ 1.6).
- **Дебаївське екранування** — перебудова плазми навколо заряду, внаслідок якої його поле експоненціально спадає на відстанях $\gtrsim \lambda_D$ (§ 1.5).
- **Діелектрична проникність плазми** ε — коефіцієнт у зв'язку $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$; для холодної плазми $\varepsilon = 1 - \omega_p^2/\omega^2$ (§ 2.2).
- **Дрижання плазми** — слабкі випадкові коливання густини заряду на власних частотах у плазмі, залишеній саму по собі; їх збуджує тепловий рух частинок (§ 2.4). Це образ, а не стандартний термін; строго — теплові флуктуації.
- **Загасання Ландау** — передача енергії хвилі електронам із швидкістю, близькою до фазової, без зіткнень (§ 2.4; докладно — розд. 7.9).
- **Закон дисперсії** — зв'язок частоти хвилі з хвильовим числом, $\omega(k)$ (§ 2.3).
- **Збурення** — будь-що, що виводить плазму з рівноваги: зовнішнє (антена, пучок, хвиля) або власне (тепловий рух частинок) (§ 2.1).
- **Ідеальна плазма (слабкозв'язана)** — плазма з $\Gamma \ll 1$ (еквівалентно $N_D \gg 1$), де кулонівська енергія сусідів мала порівняно з тепловою (§ 1.7). Не означає відсутності колективних ефектів.
- **Квазінейтральність** — рівність сумарних зарядів електронів та іонів на масштабах $\gg \lambda_D$; локальні відхилення можливі (§ 1.4).

- **Колективність** — властивість плазми, коли поле створюють і відчувають одночасно багато частинок; умова $N_D \gg 1$ (§ 1.6).
- **Критична концентрація** $n_{\text{кр}}$ — концентрація, при якій плазмова частота дорівнює частоті хвилі, $\omega = \omega_p$ (§ 2.6).
- **Ленгмюрівські хвилі** — поздовжні електростатичні хвилі в плазмі; у теплій плазмі їхня частота залежить від k (§ 2.4).
- **Нейтральні частинки (атоми й молекули)** — незаряджені компоненти частково іонізованого газу, концентрація n_n (§ 1.1).
- **Параметр зв'язку** Γ — відношення кулонівської енергії сусідніх частинок до теплової, $\Gamma = e^2/(aT)$ (§ 1.7).
- **Плазмова частота** ω_p — частота власних коливань електронів відносно іонів; задає час відновлення квазінейтральності (§ 2.1).
- **Плазмові коливання** — коливання електронного компонента відносно нерухомих іонів на частоті ω_p (§ 2.1).
- **Поздовжня хвиля** — хвиля, у якій $\mathbf{E} \parallel \mathbf{k}$; у холодній плазмі $\varepsilon = 0$ (§ 2.4).
- **Поперечна хвиля** — електромагнітна хвиля, у якій $\mathbf{E} \perp \mathbf{k}$; в плазмі $\omega^2 = \omega_p^2 + c^2k^2$ (§ 2.3).
- **Пробний заряд** — малий заряд, внесений у плазму, щоб дослідити її відгук; будь-яка частинка плазми для решти є пробною (§ 1.5).
- **Рівновага Саха** — рівновага між іонізацією та рекомбінацією, що задає ступінь іонізації залежно від T і n (§ 1.2).
- **Сильнозв'язана плазма** — плазма з $\Gamma \gtrsim 1$, ближча до рідини, ніж до газу (§ 1.7).
- **Скін-шар** — поверхневий шар, у який електромагнітне поле проникає на глибину δ (§ 2.2, § 2.5).
- **Шар (біля стінки, зонда)** — область завтовшки $\sim \lambda_D$, де квазінейтральність порушена (§ 1.8, § 1.9).
- **Частота відсікання** — частота, нижче якої хвиля в плазмі не поширюється; для електромагнітних хвиль це ω_p (§ 2.3).
- **Частота зіткнень** ν — ефективна частота, з якою електрон втрачає імпульс унаслідок зіткнень (§ 2.5).
- **Шуба** — образна назва дебаївської хмари заряду протилежного знака навколо частинки (§ 1.5). Не стандартний термін.

Література

1. *Ballegooijen A. A. van*, *Asgari-Targhi M.*, *Voss A.* The heating of solar coronal loops by Alfvén wave turbulence // The Astrophysical Journal. — 2017. — Т. 849. — С. 46. — DOI: 10.3847/1538-4357/aa9118.
2. *Bellan P. M.* Fundamentals of Plasma Physics. — Cambridge : Cambridge University Press, 2006. — ISBN 978-0-521-82116-2. — DOI: 10.1017/CBO9780511807183.
3. *Bittencourt J. A.* Fundamentals of Plasma Physics. — 3-е вид. — New York : Springer, 2004. — ISBN 978-0-387-20975-3.
4. *Boyd T. J. M.*, *Sanderson J. J.* The Physics of Plasmas. — Cambridge : Cambridge University Press, 2003. — ISBN 978-0-521-45912-9.
5. *Chen F. F.* Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion. — 3-е вид. — Cham : Springer, 2016. — ISBN 978-3-319-22308-7. — DOI: 10.1007/978-3-319-22309-4.
6. *Chen F. F.*, *Chang J. P.* Lecture Notes on Principles of Plasma Processing. — New York : Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2003. — ISBN 978-0-306-47497-2.
7. *Freidberg J. P.* Plasma Physics and Fusion Energy. — Cambridge : Cambridge University Press, 2007. — ISBN 978-0-521-85107-7. — DOI: 10.1017/CBO9780511755705.
8. *Goldston R. J.*, *Rutherford P. H.* Introduction to Plasma Physics. — Bristol : Institute of Physics Publishing, 1995. — ISBN 978-0-7503-0183-1.
9. *Gurnett D. A.*, *Bhattacharjee A.* Introduction to Plasma Physics: With Space, Laboratory and Astrophysical Applications. — 2-е вид. — Cambridge : Cambridge University Press, 2017. — ISBN 978-1-107-02737-4. — DOI: 10.1017/9781139226059.
10. *Hazeltine R. D.*, *Waelbroeck F. L.* The Framework of Plasma Physics. — Boulder : Westview Press, 2004. — ISBN 978-0-7382-0047-7.
11. *Klimchuk J. A.* Key aspects of coronal heating // Philosophical Transactions of the Royal Society A. — 2015. — Т. 373, № 2042. — С. 20140256. — DOI: 10.1098/rsta.2014.0256.

12. *Krall N. A.*, *Trivelpiece A. W.* Principles of Plasma Physics. — New York : McGraw-Hill, 1973. — ISBN 978-0-070-35346-6.
13. *Kulsrud R. M.* Plasma Physics for Astrophysics. — Princeton : Princeton University Press, 2005. — ISBN 978-0-691-12073-7.
14. *Lieberman M. A.*, *Lichtenberg A. J.* Principles of Plasma Discharges and Materials Processing. — 2-е вид. — Hoboken, NJ : Wiley, 2005. — ISBN 978-0-471-72001-0. — DOI: 10.1002/0471724254.
15. *Nicholson D. R.* Introduction to Plasma Theory. — New York : Wiley, 1983. — ISBN 978-0-471-09045-8.
16. *Raizer Y. P.* Gas Discharge Physics. — Berlin : Springer, 1991. — ISBN 978-3-540-19462-0.
17. *Stix T. H.* Waves in Plasmas. — New York : American Institute of Physics, 1992. — ISBN 978-0-88318-859-0.
18. *Анісімов І. О.* Основи фізики плазми. — Київ : ВПЦ "Київський університет", 2008. — ISBN 978-966-439-030-5.
19. *Загородній А. Г.*, *Засенко В. І.* Вступ до кінетичної теорії плазми. — Київ : Академперіодика, 2006. — ISBN 966-360-043-1.
20. *Ситенко О. Г.*, *Мальнєв В. М.* Основи теорії плазми. — Київ : Наукова думка, 1996. — ISBN 5-12-003664-9.

Пономаренко Сергій Миколайович

Елементи фізики плазми

Комп'ютерне верстання в системі LaTeX 2ε С. М. Пономаренко

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ДК № 5354 від 25.05.2017 р.
просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056