

1. ¿Cuál es la principal razón por la que los signos vitales deben valorarse en conjunto?

- A) Porque todos utilizan el mismo instrumento de medición
- B) Porque cada uno aporta información distinta sobre el estado del paciente
- C) Porque la presión arterial reemplaza a los demás signos vitales
- D) Porque únicamente se alteran durante una enfermedad grave

(Cada B)

2. ¿Qué signo vital mide el número de latidos cardíacos por minuto?

- A) Presión arterial
- B) Saturación de oxígeno
- C) Temperatura corporal
- D) Frecuencia cardíaca

(Frecuencia D)

3. ¿Cuál es el rango normal de frecuencia respiratoria en un adulto en reposo?

- A) 8 a 10 rpm
- B) 12 a 20 rpm
- C) 22 a 30 rpm
- D) 30 a 40 rpm

(12 B)

4. ¿Qué valor de saturación de oxígeno se considera normal en un adulto sano?

- A) 70 a 80 %
- B) 80 a 89 %
- C) 95 a 100 %
- D) Mayor de 110 %

(95 C)

5. La presión arterial está determinada principalmente por el gasto cardíaco y:

- A) La temperatura corporal
- B) La frecuencia respiratoria
- C) La resistencia vascular periférica
- D) La saturación de oxígeno

(Resistencia C)

6. Un paciente presenta FC de 120 lpm, FR de 26 rpm y PA de 85/50 mmHg. ¿Cuál es la mejor interpretación?

- A) El organismo intenta compensar una alteración circulatoria
- B) Todos los signos vitales se encuentran dentro de parámetros normales
- C) Existe una disminución de la actividad cardiovascular
- D) No existe relación entre los datos obtenidos

(Organismo A)

7. ¿Qué ocurre generalmente con la frecuencia cardíaca cuando la temperatura corporal aumenta de forma importante?

- A) Disminuye
- B) Se detiene temporalmente
- C) Tiende a aumentar
- D) Permanece siempre igual

(Tiende C)

8. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede modificar simultáneamente varios signos vitales?

- A) Leer un libro
- B) Dormir una siesta

- C) Realizar ejercicio físico
 - D) Cortarse las uñas
- (Realizar C)

9. ¿Qué debe hacerse antes de medir la presión arterial para obtener un resultado más confiable?

- A) Pedir al paciente que hable durante la medición
 - B) Permitir que el paciente repose unos minutos
 - C) Solicitar que realice actividad física
 - D) Tomar la medición inmediatamente después de correr
- (Permitir B)

10. Según la presentación, ¿cuál es una función importante del personal de enfermería durante la valoración de signos vitales?

- A) Registrar únicamente la presión arterial
 - B) Esperar la valoración médica antes de observar al paciente
 - C) Detectar oportunamente cambios en el estado fisiológico del paciente
 - D) Medir solamente los signos vitales alterados
- (Detectar C)