



AÑO 2024



**HOSPITAL UNIVERSITARIO
VIRGEN DE LAS NIEVES**

SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

MAPA MICROBIOLÓGICO

INTRODUCCIÓN

La monitorización de las resistencias bacterianas es un elemento fundamental en cualquier programa de uso adecuado de antimicrobianos, ya que permite detectar perfiles de resistencia emergentes, detectar áreas donde sean necesarias intervenciones en control de la infección o estrategias de contención de resistencias y por último, elaborar guías de tratamiento empírico en función de la ecología microbiana local.

La vigilancia es un factor crítico para contener el problema de la resistencia y requiere un seguimiento a lo largo del tiempo tanto de la magnitud como de las tendencias de las resistencias, así como de otros factores que pueden estar influyendo en estas circunstancias (relacionados con el consumo de antimicrobianos o relacionados con las prácticas de control de la transmisión). En esta línea el servicio de Microbiología elabora anualmente el Mapa Microbiológico (Informe acumulado de sensibilidad).

En el presente documento se incluyen los datos de sensibilidad correspondientes a los microorganismos aislados en muestras clínicas de pacientes ingresados en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN) durante el año 2024. Hemos excluido los aislamientos procedentes de estudios de vigilancia epidemiológica y ambientales.

Hemos seguido las recomendaciones del documento Preparación de informes acumulados de sensibilidad a los antimicrobianos, 2014 de la SEIMC y del artículo: Recomendaciones del Comité Español del Antibiógrama (COESANT) para la realización de los Informes de Sensibilidad Antibiótica Acumulada, marzo 2022.

Las categorías S e I, Sensibles y Sensibles cuando se incrementa la exposición, han sido agrupadas para calcular los datos de sensibilidad, en los años anteriores se recomendaba agrupar las categorías R e I, si se comparan los datos obtenidos con los de años anteriores al año 2021 pueden encontrarse discrepancias debido a este cambio de criterio.

Los porcentajes de sensibilidad han sido calculados a partir de los informes emitidos por este servicio archivados en el SIL (Modulab). Hemos contabilizado solo el primer aislado de cada paciente y tipo de muestra obtenido en un periodo de 30 días, si posteriormente se repitiese el aislado se contabilizaría.

Cuando el número de aislados es menor de 30 los hemos agrupados por género o grupo. Se informan resultados de algunos grupos con tan solo 10 aislamientos, aunque carecen de valor estadístico.

Se aportan los porcentajes de sensibilidad del conjunto del HUVN, de los hospitales: general, materno-infantil y neurotraumatología. Presentamos los datos de sensibilidad de aislamientos procedentes de Atención Primaria. Se presentan informes de algunos servicios que tienen pactado con dirección un seguimiento por el grupo PROA. En tablas independientes figuran la sensibilidad de los aislados de pacientes pediátricos y de adultos. También se informan de las sensibilidades por algunos tipos de muestra (hemocultivo, exudado, orinas, etc).

Los antibióticos Ceftazidima-avibactam, Ceftozolano-tazobactam y Cefiderocol se han incluido en las tablas de sensibilidad de Gram negativos. Ceftarolina y cetobiprole en las de Gram positivos. Mantenemos la tabla de antibióticos poco ensayados debido a que muchas especies se prueban solo en algunos casos. También, mostramos una tabla con

los principales mecanismos de resistencia detectados y porcentajes de *Pseudomonas aeruginosa* multi- (MDR), extremadamente- (XDR) y pan- (PDR) resistentes

La sensibilidad de las bacterias a los antimicrobianos puede variar en un lapso de tiempo como consecuencia de su continua adaptación al medio. Las bacterias tienen mecanismos de resistencia a los antimicrobianos, estos en muchos casos son adquiridos lo que hace que el patrón de resistencias cambie como respuesta al uso continuado de antibióticos en ganadería, veterinaria y clínica. Con objeto de conocer cómo evoluciona la sensibilidad a los diferentes antibióticos en los microorganismos más relevantes mostramos un conjunto de gráficas con los porcentajes de sensibilidad en el periodo 2019-2024.

Han colaborado en la elaboración de este informe Juan Antonio Reguera Márquez, Fernando Cobo Martínez, Lina Martín Hita, José Gutiérrez Fernández, José María Navarro Mari.

INDICE

Aislamientos HUVN bacilos Gram Negativos	5
Aislamientos HUVN bacterias Gram positivas	6
Aislamientos HUVN bacterias crecimiento dificultoso y anaerobias.....	7
Aislamientos HUVN sensibilidad antibióticos poco ensayados	8
Aislamientos HUVN. Mecanismos de resistencia	9
Aislamientos hospital general bacilos Gram negativos	10
Aislamientos hospital General bacterias Gram positivas, crecimiento dificultoso y anaerobias.....	11
Aislamientos hospital neurotraumatología bacilos Gram negativos.....	12
Aislamientos hospital neurotraumatología bacterias Gram positivas crecimiento dificultoso y anaerobias.....	13
Aislamientos hospital materno-infantil bacilos Gram negativos	14
Aislamientos hospital materno-infantil bacterias Gram positivas y crecimiento dificultoso	15
Aislamientos de pacientes pediátricos HUVN bacilos Gram negativos, bacterias Gram positivas y de crecimiento dificultoso	16
Aislamientos pacientes adultos bacilos Gram negativos	17
Aislamientos pacientes adultos bacterias Gram positivas.....	18
Aislamientos extrahospitalarios bacilos Gram negativos	20
Aislamientos extrahospitalarios bacterias Gram positivas, crecimiento dificultoso y anaerobias ...	21
Aislamientos HUVN de hemocultivos bacilos Gram negativos	22
Aislamientos HUVN de hemocultivos bacterias Gram positivas, crecimiento dificultoso y anaerobias.....	23
Aislamientos HUVN de exudados bacilos Gram negativos	24
Aislamientos HUVN de exudados bacterias Gram positivas, crecimiento dificultoso y anaerobias	25
Aislamientos HUVN de muestras respiratorias bacilos Gram negativos, positivas y de crecimiento dificultoso.....	26
Aislamientos HUVN de orina bacilos Gram negativos y bacterias Gram positivas.....	27
Aislamientos S Hematología bacilos Gram negativos y bacterias Gram positivas	28
Mecanismos de resistencia S. Hematología.....	29
Aislamientos S. Medicina Interna bacilos Gram negativos y bacterias Gram positivas.....	30
Mecanismos de resistencia S. Medicina Interna	31
Aislamientos S. Neumología bacilos Gram negativos, bacterias Gram positivas y crecimiento dificultoso.....	32
Mecanismos de resistencia S. Neumología.....	33
Aislamientos S. Neurología	34
Mecanismos de resistencia S. Neurología.....	35
Aislamientos S. Oncología.....	36
Mecanismos de resistencia S. Oncología.....	37
Aislamientos S. Cuidados Críticos hospital general	38

Mecanismos de resistencia S. Cuidados Críticos hospital general	39
Aislamientos S. Cuidados Críticos Neurotraumatología	40
Mecanismos de resistencia S. Cuidados Críticos Neurotraumatología.....	41
Aislamientos bacilos Gram negativos servicio Traumatología.....	42
Servicio Traumatología mecanismos de resistencia.....	43
Aislamientos S. Urología	44
Mecanismos de resistencia S. Urología	45
Gráfico 1. Evolución de la sensibilidad a los antibióticos de <i>Escherichia coli</i>	46
Gráfico 2. Evolución de la sensibilidad a los antibióticos de <i>Klebsiella pneumoniae</i>	47
Gráfico 3. Evolución de la sensibilidad a los antibióticos de <i>K. oxytoca</i> y <i>K. aerogenes</i>	48
Gráfico 4. Evolución de la sensibilidad a los antibióticos de <i>Enterobacter cloacae</i>	49
Gráfico 5. Evolución de la sensibilidad a los antibióticos de <i>P. mirabilis</i> y <i>M. morganii</i>	50
Gráfico 6. Evolución de la sensibilidad a los antibióticos <i>P. aeruginosa</i>	51
Gráfico 7. Evolución de la sensibilidad a los antibióticos <i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	52
Gráfico 8. Evolución sensibilidad a los antibióticos <i>Staphylococcus aureus</i> y <i>S. aureus</i> meticilin resistentes	53
Gráfico 9. Evolución de la sensibilidad a los antibióticos <i>Staphylococcus epidermidis</i> y <i>S. hominis</i>	54
Gráfico 10. Evolución de la sensibilidad a los antibióticos <i>Enterococcus faecalis</i> y <i>E. faecium</i>	55

Aislamientos HUVN bacilos Gram Negativos



Junta de Andalucía
Comunidad de Salud y Prevención
SERVICIO ASISTENCIAL DE EPIDEMIOLOGÍA

Informe de Sensibilidades en porcentajes

Aislamientos de Hospital Virgen de las Nieves

Año 2024



SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

Bacilos Gram negativos Enterobacterias

AMC: amoxicilina/clavulánico
AMK: amikacina
AMP: ampicilina
AMS: ampicilina/sulbactam
AZM: aztreonam
AZT: aztreonam
BLEE: b-lactamasa espectro ampliado
CAZ: ceftazidima
CC: clindamicina
CBP: cefepime
CFD: cefiderocol
CFX: cefuroxima
CFZ: ceftazidima
CIP: ciprofloxacina
CLA: clartromicina
CM: cloranfenicol
COL: colistina
CTX: cefotaxima
CTR: ceftriaxona
CX: cefoxitina
CXM: cefixima
CIA: ceftazidima/avibactam
C/T: ceftiozanol/tazobactam
DAP: daploxacina
ERM: eritromicina
FEP: cefepime
FOX: cefoxitina
GM: gentamicina
G600: gentamicina 600
IMP: imipenem
LEV: levofloxacina
LNZ: linezolid
MOX: moxifloxacina
MER: meropenem
MTZ: metronidazol
NF: nitrofurantoina
NOR: norfloxacina
OFL: ofloxacina
PEN: penicilina
PIT: piperacilina/tazobactam
RIF: rifampicina
S1000: estreptomicina 1000
SXT: cotrimoxazol
TEI: telicoplanina
TET: tetraciclina
TIG: tigeciclina
TOB: tobramicina
VAN: vancomicina

Microorganismos	Probados	AMP	AMC	PIT	CTX	CAZ	C/A	C/T	FEP	BLEE	IMP	MER	AZM	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	TIG	SXT
<i>Citrobacter</i>	70	74	99		94	99			100	0	100	100	94	99	100	99	99	100		94
<i>Citrobacter freundii</i>	80	4	80		65	70			92	1	94	99	75	82	80	95	89	94		82
<i>Citrobacter koseri</i>	33	89	97		93	94			93	4	100	100	91	96	97	97	96	97	100	94
<i>E. coli</i>	4695	42	63	95	87	89			88	12	100	100	87	72	71	87	83	97		71
<i>E. coli BLEE</i>	537	1	38	90	1	17			7	100	100	100	5	19	12	68	50	89		39
<i>En. cloacae</i>	178	3	74		62	67			81	0	99	99	64	91	90	93	90	98		87
<i>En. hormaechei</i>	138	2	74		63	70	96	77	86	0	96	98	72	89	89	93	91	95	100	86
<i>Enterobacter</i>	42	22	83		74	74	92	88	90	0	90	92	76	88	88	100	93	98	100	93
<i>K. aerogenes</i>	116	2	77		65	67			93	1	98	100	72	94	96	97	98	99		99
<i>K. oxytoca</i>	191	89	93		94	96			95	6	99	100	90	91	90	95	93	97		89
<i>K. pneumoniae</i>	1280	69	83		82	82			83	15	98	98	81	79	78	89	84	98		79
<i>K. pneumoniae BLEE</i>	184	27	60		3	7			7	100	96	98	6	28	14	52	38	97		19
<i>Klebsiella</i>	10	90	90		100	90			100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	90	100
<i>Moreanella</i>	113	3	97		77	83			98	0	99	100	79	63	66	86	83	100		67
<i>Proteus</i>	26	78	100		96	100			100	0	95	100	100	91	77	92	95	100		81
<i>Proteus mirabilis</i>	471	59	83	99	95	98			97	2			100	80	67	73	70	87		67
<i>Providencia</i>	24	5	96		65	83			95	0	95	100	95	27	25		14	83		96
<i>Salmonella</i>	109	58	77	99	98	99			98	1	100	100	98	70					100	79
<i>Serratia</i>	12	58	100		100	100			100	0	100	100	92	100	100	100	75	75		100
<i>Serratia marcescens</i>	138	5	93		74	80			97	0	100	100	80	88	88	95	3	4		96
<i>Yersinia</i>	14	0	100		100	100			100	0	100	100	77	100	43	100	100	100	100	100

Entre 85-100% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 75-84% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 0-74% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Bacilos Gram Negativos NO Enterobacterias

Microorganismos	Probados	AMS	PIT	CAZ	FEP	C/A	C/T	CFD	IMP	MER	AZM	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	COL	SXT
<i>Achromobacter</i>	28		96							96								70
<i>Acinetobacter</i>	23								100	100		95	94	94	100	96	94	75
<i>Aeromonas</i>	91			92	93				93		91	92	81					92
<i>Pseudomonas</i>	32		94	88	90				93	97	69	87	88		97	97	97	0
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	869		88	88	88	95	97		82	92	90	78	80		91	93	95	0
<i>Stenotrophomonas</i>	120							100				86						97

Se han seleccionado los primeros aislados de cada tipo de muestra de un paciente

Se presentan datos de especies, generos o grupos con al menos 10 aislados

Se han descartado los aislamientos repetidos de un mismo paciente y tipo de muestra un periodo de 30 días

Se presentan datos de antibióticos si fueron probados en al menos el 50% de los aislados

Cuando el número de cepas es <30 el porcentaje obtenido tiene escaso valor estadístico

Han sido agrupados microorganismos sensibles y sensibles, cuando incrementa la exposición, según recomendaciones de EUCAST

Aislamientos HUVN bacterias Gram positivas



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias
SERVICIO DE ANÁLISIS DE SALUD

Informe de Sensibilidades en porcentajes

Aislamientos de Hospital Virgen de las Nieves

Año 2024

SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA



AMC: amoxicilina/clavulánico
AMK: amikacina
AMP: ampicilina
AMS: ampicilina/sulbactam
AZM: aztreonam
AZT: azitromicina
BLEE: beta-lactamasa espectro ampliado
CAZ: ceftazidima
CC: clindamicina
CBP: ceftiofurolo
CFD: cefiderocol
CFX: cefuroxima
CFZ: cefazolina
CIP: ciprofloxacina
CLA: claritromicina
CMC: cloranfenicol
COL: colistina
CTX: cefotaxima
CTR: ceftarolina
CX: cloxacilina
CXM: cefixima
C/A: ceftazidima/avibactam
C/T: ceftiofurolo/tazobactam
DAP: daptomicina
ERM: eritromicina
FEP: cefepima
FOS: fosfomicina
FOX: cefoxitina
GM: gentamicina
G600: gentamicina 600
IMP: imipenem
LEV: levofloxacina
LNZ: linezolid
MOX: moxifloxacina
MER: meropenem
MTZ: metronidazol
NF: nitrofurantoina
NOR: norfloxacina
OFL: ofloxacina
PEN: penicilina
PIT: piperacilina/tazobactam
RIP: rifampicina
S1000: estreptomicina 1000
SXT: cotrimoxazol
TEI: tetraciclina
TIG: tigeciclina
TOB: tobramicina
VAN: vancomicina

Bacterias Gram positivas

Microorganismos	Probados	PEN	CX	AMP	AMC	CTX	CBP	CTR	IMP	GM	S1000	ERM	CC	LNZ	LEV	CIP	TET	VAN	TEI	DAP	FOS	SXT	NF
<i>Aerococcus</i>	41			95											83								86
<i>Cornebacterium</i>	22	73								84		27	92		55	100							92
<i>E. faecalis</i>	1100			100				99		70			98	73	97		100	100	100				84
<i>E. faecium</i>	341			10						30			87	13			99	100	98				91
<i>Enterococcus</i>	21			90				84		95			95		100		48	100	100				
<i>S. aureus</i>	1139	23	89	23	89	89		100	89	92		61	66	100	89	89	94	100	100	100	99	100	
<i>S. aureus Meticilina Resistente</i>	125	0	0	0	0	0		99	0	80		43	64	100	36	37	82	99	98	99	96	98	
<i>S. aureus Meticilina Sensible</i>	1014	26	100	26	100	100		100	100	94		63	67	100	95	95	95	100	100	100	99	100	
<i>S. epidermidis</i>	271	0	23	7	23	23		100	23	42		22	45	83	39	42	81	100		100	88	65	
<i>S. haemolyticus</i>	26	0	8	4	8	8		36	8	15		4	27	100	12	12	100	100		100	68	19	
<i>S. hominis</i>	86	2	41	9	39	39		98	39	59		22	48	93	52	54	88	100		100	52	92	
<i>S. lugdunensis</i>	46	45	84	45	84	84		100	84	91		73	78	98	91	93	95	100		100		100	
<i>S. saprophyticus</i>	119	1	96	83	96	95		95	95	98		50	87	99	99	98	86	99	99	99	1	97	100
<i>Staphylococcus</i>	43	62	23	59	62			63		85		66	80	100	69	74	93	100	96	95	24	100	
<i>Streptococcus</i>	30	100										50	77		94		76						
<i>Streptococcus agalactiae</i>	202	100		100								57		100	97		14	100					
<i>Streptococcus er aminosus</i>	163	100		98		100						60	64		99		75						
<i>Streptococcus er bovis</i>	52	100		100											87								
<i>Streptococcus er mitis</i>	25	92		100		100							84		86								
<i>Streptococcus er sanguinis</i>	16	87		73		94							86		100								
<i>Streptococcus pyogenes</i>	270	100										90	92										
<i>Turicella</i>	24	96								100		54	100					100					

Entre 85-100% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 75-84% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 0-74% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Se presentan datos de antibióticos si fueron probados en al menos el 50% de los aislados

Cuando el número de cepas es inferior a 30 el porcentaje obtenido tiene escaso valor estadístico

Han sido agrupados microorganismos sensibles y sensibles, cuando se incrementa la exposición, según recomendaciones de EUCAST

Se han seleccionado los primeros aislados de cada tipo de muestra de un paciente

Se han descartado los aislamientos repetidos de un mismo paciente y tipo de muestra en un periodo de 30 días

Se presentan datos de especies, generos o grupos con al menos 10 aislados

Aislamientos HUVN bacterias crecimiento dificultoso y anaerobias

Informe de Sensibilidades en porcentajes

Aislamientos de Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Año 2024

AMC: amoxicilina/clavulanico
AMP: ampicilina
AZM: aztreonam
AZT: azitromicina
BLEE: b-lactamasa espectro ampliado
CAZ: ceftazidima
CC: clindamicina
CFX: cefuroxima
CFZ: ceftazolin
CIP: ciprofloxacina
CLA: clantromicina
CM: cloranfenicol
COL: colistina
CTX: cefotaxima,
CX: cloxacilina
CXM: cefixima
DAP: daplofomicina
ERM: eritromicina
FEP: cefepima
FOS: fosfomicina
FOX: cefoxitina
GM: gentamicina
G600: gentamicina 600
IMP: imipenem
LEV: levofloxacina
LNZ: linezolid
MOX: moxifloxacina
MER: meropenem
MTZ: metronidazol
NF: nitrofurantoina
NOR: norfloxacina
OFL: ofloxacina
PEN: penicilina,
PIT: piperacilina/tazobactam
RIF: rifampicina
S1000: estreptomina 1000
SXT: cotrimoxazol
TEI: telicoplanina,
TET: tetraciclina
TIG: tigeciclina
TOB: tobramicina
VAN: vancomicina

Bacterias de crecimiento dificultoso

Microorganismos	Probados	PEN	AMP	AMC	CTX	MER	ERM	AZI	CC	LNZ	LEV	CIP	MOX	VAN
<i>Haemophilus influenzae</i>	413	82			100	100		33				95		
<i>Moraxella catarrhalis</i>	79		100		100			73	75			99		
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	67	96			100									
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	128	95			100	100		65		78	98		99	

Bacterias anaerobias

Microorganism	Probados	PEN	PZT	MER	CC	MTZ	VAN
<i>Bacteroides fragilis</i> sp	40	9	69	90	70	92	
<i>BGN Anaerobio</i>	20	41	79	75	45	85	
<i>BGP anaerobio</i>	18	94	100	100	47	53	91
<i>CGP anaerobio</i>	14	100	92	100	79	83	100
<i>Cutibacterium acnes</i>	47	93	100	100	89	7	100

Entre 85-100% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 75-84% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 0-74% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Se presentan datos de antibióticos si fueron probados en al menos el 50% de los aislados

Cuando el número de cepas es inferior a 30 el porcentaje obtenido tiene escaso valor estadístico

Han sido agrupados microorganismos sensibles y sensibles, cuando se incrementa la exposición, según recomendaciones de EUCAST

Se han seleccionado los primeros aislados de cada tipo de muestra de un paciente

Se han descartado los aislamientos repetidos de un mismo paciente y tipo de muestra en un periodo de 30 días

Se presentan datos de especies, generos o grupos con al menos 10 aislados

Aislamientos HUVN sensibilidad antibióticos poco ensayados



Informe de Sensibilidades en porcentajes

Aislamientos de Hospital Universitario Virgen de las Nieves



Año 2024

SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

Microorganismos	Probados	Ceftazidima /avibactam
<i>Acinetobacter</i>	3	100
<i>Acinetobacter baumannii</i>	2	50
<i>Aeromonas</i>	6	83
<i>Brevundimonas</i>	1	100
<i>Chryseobacterium</i>	2	50
<i>Citrobacter</i>	5	100
<i>Citrobacter freundii</i>	15	87
<i>Citrobacter koseri</i>	8	100
<i>E. coli</i>	404	99
<i>E. coli BLEE</i>	60	100
<i>En. cloacae</i>	20	95
<i>En. hormaechei</i>	83	96
<i>Enterobacter</i>	25	92
<i>Hafnia</i>	1	100
<i>K. aerogenes</i>	29	100
<i>K. oxytoca</i>	24	100
<i>K. pneumoniae</i>	185	94
<i>K. pneumoniae BLEE</i>	42	100
<i>Klebsiella</i>	6	100
<i>Morganella</i>	19	100
<i>Proteus</i>	2	100
<i>Proteus mirabilis</i>	43	100
<i>Providencia</i>	4	100
<i>Pseudomonas</i>	12	92
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	575	95
<i>Salmonella</i>	5	100
<i>Serratia</i>	1	100
<i>Serratia marcescens</i>	50	100

Microorganismos	Probados	Ceftolozano/tazobactam
<i>Acinetobacter</i>	3	100
<i>Acinetobacter baumannii</i>	2	100
<i>Aeromonas</i>	2	100
<i>Brevundimonas</i>	1	100
<i>Chryseobacterium</i>	2	100
<i>Citrobacter</i>	5	100
<i>Citrobacter freundii</i>	14	79
<i>Citrobacter koseri</i>	7	100
<i>E. coli</i>	412	99
<i>E. coli BLEE</i>	62	98
<i>En. cloacae</i>	17	59
<i>En. hormaechei</i>	83	77
<i>Enterobacter</i>	24	88
<i>Hafnia</i>	1	100
<i>K. aerogenes</i>	29	76
<i>K. oxytoca</i>	23	100
<i>K. pneumoniae</i>	155	87
<i>K. pneumoniae BLEE</i>	35	63
<i>Klebsiella</i>	6	100
<i>Morganella</i>	19	95
<i>Proteus</i>	2	100
<i>Proteus mirabilis</i>	38	100
<i>Providencia</i>	4	100
<i>Pseudomonas</i>	13	77
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	622	97
<i>Salmonella</i>	5	100
<i>Serratia</i>	1	100
<i>Serratia marcescens</i>	50	98

Microorganismos	Probados	Cefiderocol
<i>Acinetobacter</i>	3	100
<i>Acinetobacter baumannii</i>	1	100
<i>Citrobacter freundii</i>	8	88
<i>E. coli</i>	5	80
<i>E. coli BLEE</i>	3	100
<i>En. cloacae</i>	4	50
<i>En. hormaechei</i>	5	60
<i>Enterobacter</i>	3	33
<i>K. aerogenes</i>	1	100
<i>K. pneumoniae</i>	37	70
<i>K. pneumoniae BLEE</i>	14	93
<i>Pseudomonas</i>	4	100
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	33	94
<i>Stenotrophomonas</i>	63	100

Microorganismos	Probados	Ceftarolina
<i>E. faecalis</i>	4	100
<i>Enterococcus</i>	1	100
<i>S. aureus</i>	988	100
<i>S. aureus Meticilina Resistente</i>	108	99
<i>S. aureus Meticilina Sensible</i>	880	100
<i>S. epidermidis</i>	171	100
<i>S. haemolyticus</i>	14	36
<i>S. hominis</i>	54	98
<i>S. luedunensis</i>	32	100
<i>S. saprophyticus</i>	52	100
<i>Staphylococcus</i>	16	100
<i>Streptococcus agalactiae</i>	1	100
<i>Streptococcus pyogenes</i>	1	100

Microorganismos	Probados	Ceftobiprole
<i>S. aureus</i>	95	99
<i>S. aureus Meticilina Resistente</i>	15	93
<i>S. aureus Meticilina Sensible</i>	80	100
<i>S. epidermidis</i>	3	33

Cuando el número de cepas es inferior a 30 el porcentaje obtenido tiene escaso valor estadístico

Aislamientos HUVN. Mecanismos de resistencia



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Mecanismos de resistencia

Año 2024



SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

Aislamientos de Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Especie	BLEE Nº %	OXA Nº %	KPC Nº %	VIM Nº %	IMP Nº %	NDM Nº %	MDR Nº %	XDR Nº %	PDR Nº %	SARM Nº %
<i>Aeromonas caviae</i>				2 (2,85)						
<i>Aeromonas hydrophila</i>				1 (11,11)						
<i>Candida albicans</i>							1 0			
<i>Citrobacter freundii</i>		7 (8,53)	5 (6,09)	6 (7,31)		2 (2,43)				
<i>Enterobacter asburiae</i>				3 (42,85)						
<i>Enterobacter cloacae</i>		2 (1,25)	1 (0,62)	2 (1,25)	1 (0,62)					
<i>Enterobacter hormaechei</i>		4 (2,89)		3 (2,17)						
<i>Enterobacter kobei</i>			1 (8,33)							
<i>Enterobacter sp.</i>				1 (20)						
<i>Escherichia coli</i>	538 (11,45)	1 (0,02)	1 (0,02)			2 (0,04)				
<i>Klebsiella oxytoca</i>	11 (5,75)									
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	184 (14,36)	60 (4,68)	1 (0,07)			17 (1,32)	1 0	1 0		
<i>Proteus mirabilis producto</i>	8 (100)									
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>				6 (0,68)	8 (0,91)		69 (8,44)	34 (4,16)	0 (0)	
<i>Staphylococcus aureus</i>										126 (11)

Aislamientos hospital general bacilos Gram negativos

Bacilos Gram negativos Enterobacterias

AMC: amoxicilina/clavulánico
AMK: amikacina
AMP: ampicilina
AMS: ampicilina/sulbactam
AZM: aztreonam
AZT: aztreonam
BLEE: beta-lactamasa espectro ampliado
CAZ: ceftazidima
CC: clindamicina
CBP: ceftobiprole
CFD: ceftiofurolo
CFK: cefturoxima
CFZ: ceftazolin
CIP: ciprofloxacina
CLA: clindamicina
CM: cloranfenicol
COL: colistina
CTX: cefotaxima
CTR: ceftarolina
CX: cloxacilina
CXM: cefixima
CIA: ceftazidima/avibactam
C/T: ceftiofurolo/tazobactam
DAP: daplofina
ERM: eritromicina
FEP: cefepima
FOS: fosfomicina
FOX: ceftiofurolo
GM: gentamicina
G500: gentamicina 500
IMP: imipenem
LEV: levofloxacina
LNZ: linezolid
MOX: moxifloxacina
MER: meropenem
MTZ: metronidazol
NF: nitrofurantoina
NOR: norfloxacina
OFL: ofloxacina
PEN: penicilina
PIT: piperacilina/tazobactam
RIF: rifampicina
S1000: estreptomicina 1000
SXT: cotrimoxazol
TEL: telapranina
TET: tetraciclina
TIG: tigeciclina
TOB: tobramicina
VAN: vancomicina

Microorganismos	Probados	AMP	AMC	PIT	CTX	CAZ	C/A	C/T	FEP	BLEE	IMP	MER	AZM	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	TIG	SXT
<i>Citrobacter</i>	34	71	97	88	97				100	0	100	100	88	97	100	97	100	100		94
<i>Citrobacter freundii</i>	50	4	77	60	62				87	2	91	98	66	80	80	96	89	92		84
<i>Citrobacter koseri</i>	17	92	100	100	100				100	0	100	100	100	100	100	100	100	100		94
<i>E. coli</i>	2301	39	61	95	85	86			85	14	100	100	84	68	67	87	82	97		69
<i>E. coli BLEE</i>	314	0	35	90	1	18			6	100	100	100	6	16	9	71	53	89		34
<i>En. cloacae</i>	102	2	67	59	63				77	0	98	98	61	86	86	93	89	98		81
<i>En. hormaechei</i>	81	3	67	59	62	95	69		85	0	95	96	66	82	82	94	89	94	100	83
<i>Enterobacter</i>	32	20	88	78	75	90	85		94	0	94	94	72	90	91	100	97	97	100	91
<i>K. aerogenes</i>	62	4	76	63	66				88	0	96	100	70	90	93	98	98	100		98
<i>K. oxytoca</i>	103	88	91	90	93				91	11	99	100	83	92	91	93	91	96		87
<i>K. pneumoniae</i>	677	63	79	74	76				77	19	96	96	75	72	72	84	79	98		73
<i>K. pneumoniae BLEE</i>	123	22	57	3	7				7	100	97	99	6	26	13	48	35	97		14
<i>Morganella</i>	61	3	95	71	79				98	0	100	100	80	61	62	90	80	100		64
<i>Proteus</i>	14	83	100	100	100				100	0	91	100	100	100	86	86	100	100		79
<i>Proteus mirabilis</i>	245	57	81	99	94	98			96	4		100	94	78	65	70	70	90		66
<i>Providencia</i>	13	0	100	75	92				100	0	91	100		18	15		9	85		92
<i>Salmonella</i>	56	52	70	98	98	98			98	0	100	100	98	61					100	71
<i>Serratia marcescens</i>	76	4	92	83	86				97	0	100	100	83	88	88	96	1	3		92

Entre 85-100% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 75-84% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 0-74% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Bacilos Gram Negativos NO Enterobacterias

Microorganismos	Probados	AMS	PIT	CAZ	FEP	C/A	C/T	CFD	IMP	MER	AZM	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	COL	SXT
<i>Achromobacter</i>	21	100							100									80
<i>Acinetobacter</i>	11								100		100			100	100	100		90
<i>Aeromonas</i>	31			77	84				85		81	83	68		25			84
<i>Pseudomonas</i>	19		95	89	89				94	94		83	84		94	95		94
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	516		90	91	89	97	99		81	92	91	79	81		91	93		94
<i>Stenotrophomonas</i>	83							100				86						95

Se han seleccionado los primeros aislados de cada tipo de muestra de un paciente

Se presentan datos de especies, generos o grupos con al menos 10 aislados

Se han descartado los aislamientos repetidos de un mismo paciente y tipo de muestra un periodo de 30 días

Se presentan datos de antibióticos si fueron probados en al menos el 50% de los aislados

Cuando el número de cepas es <30 el porcentaje obtenido tiene escaso valor estadístico

Han sido agrupados microorganismos sensibles y sensibles, cuando incrementa la exposición, según recomendaciones de EUCAST

Aislamientos hospital General bacterias Gram positivas, crecimiento dificultoso y anaerobias

Informe de Sensibilidades en porcentajes

Aislamientos de HOSPITAL GENERAL

Bacterias Gram positivas

Año 2024

SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

AMC: amoxicilina/clavulanato
AMK: amikacina
AMP: ampicilina
AMS: ampicilina/sulbactam
AZM: aztreonam
AZT: azitromicina
BLEE: b-lactamasa espectro ampliado
CAZ: ceftazidima
CC: clindamicina
CBP: cefotaxima/prole
CFD: cefiderocol
CFX: cefuroxima
CFZ: ceftazidima
CIP: ciprofloxacina
CLA: clartromicina
CLM: cloranfenicol
COL: colistina
CTX: cefotaxima
CTR: ceftriaxona
CX: cefaclor
CXM: cefixima
CIA: ceftazidima/avibactam
C/T: ceftiozono/tazobactam
DAP: daplofina
ERM: eritromicina
FEP: cefepima
FOS: fosfomicina
FOX: cefoxitina
GM: gentamicina
G60: gentamicina 600
IMP: imipenem
LEV: levofloxacina
LNZ: linezolid
MOX: moxifloxacina
MER: meropenem
MTZ: metronidazol
NFT: nitrofurantoina
NOR: norfloxacina
OFL: ofloxacina
PEN: penicilina
PIT: piperacilina/tazobactam
RIF: rifampicina
S1000: estreptomicina 1000
SXT: cotrimoxazol
TEL: telapirina
TET: tetraciclina
TIG: tigeciclina
TOB: tobramicina
VAN: vancomicina

Microorganismos	Probados	PEN	CX	AMP	AMC	CTX	CBP	CTR	IMP	GM	S1000	ERM	CC	LNZ	LEV	CIP	TET	VAN	TEI	DAP	FOS	SXT
<i>Aerococcus</i>	23		100												78							
<i>E. faecalis</i>	626		100					99		66			99	67	96		100	100	100			
<i>E. faecium</i>	289		7							27			85	12			99	100	98			
<i>Enterococcus</i>	19		95					88		100			100		100		53	100	100			
<i>S. aureus</i>	587	26	90	26	89	89	100	89	93			60	65	100	87	87	93	100	99	99	98	100
<i>S. aureus</i> Meticilina Resistente	61	0	0	0	0	0		98	0	81		43	61	100	29	29	79	98	97	98	97	98
<i>S. aureus</i> Meticilina Sensible	526	29	100	29	100	100	100	100	95			62	66	100	94	94	95	100	100	100	99	100
<i>S. epidermidis</i>	135	0	18	5	18	18	100	18	36			21	41	76	34	36	79	100		100	90	67
<i>S. haemolyticus</i>	17	0	12	6	12	12		45	12	24		6	35	100	18	18	100	100		100	56	29
<i>S. hominis</i>	50	0	40	6	40	40	100	40	54			20	50	94	48	51	85	100		100	53	90
<i>S. lueddemansii</i>	20	42	89	42	89	89	100	89	84			80	85	95	85	89	100	100	100			100
<i>S. saprophyticus</i>	83	1	96	82	96	95		95	99			53		99	99	97	88	99	98	99	1	98
<i>Staphylococcus</i>	19	8	53	19	44	47		50	88			56	78	100	56	61	94	100	100	95	33	100
<i>Streptococcus</i>	23	100										46	76		92		85					
<i>Streptococcus agalactiae</i>	89	100		100								47		99	94		8	100				
<i>Streptococcus gr anginosus</i>	94	100		98	100							68	67		98		77					
<i>Streptococcus gr bovis</i>	23	100		100										92	89		20					
<i>Streptococcus gr mitis</i>	13	92			100								77									
<i>Streptococcus gr sanguinis</i>	16	87		73		94							86		100							
<i>Streptococcus pyogenes</i>	59	100										75	77	98	91		65					

Bacterias de crecimiento dificultoso

Microorganismos	Probados	PEN	AMP	AMC	CTX	MER	ERM	AZI	CC	LNZ	LEV	CIP	MOX	VAN
<i>Haemophilus influenzae</i>	157	84			100	100		31				93		
<i>Moraxella catarrhalis</i>	44		100		100		79	81			98			
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	54	95			100									
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	58	97			100	100	68		79	98		98		

Entre 85-100% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición
Entre 75-84% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición
Entre 0-74% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Se han seleccionado los primeros aislados de cada tipo de muestra de un paciente
Se han descartado los aislamientos repetidos de un mismo paciente y tipo de muestra en un periodo de 30 días

Bacterias anaerobias

Microorganismo	Probados	PEN	PZT	MER	CC	MTZ	VAN
<i>Bacteroides fragilis</i> gr	23	13	68	86	65	95	
<i>BGN anaerobio</i>	15	36	71	64	50	87	
<i>BGP anaerobio</i>	11	91		100	50	70	

Se presentan datos de especies, generos o grupos con al menos 10 aislados
Se presentan datos de antibióticos si fueron probados en al menos el 50% de los aislados
Cuando el numero de cepas es inferior a 30 el porcentaje obtenido tiene escaso valor estadístico

Aislamientos hospital neurotraumatología bacilos Gram negativos



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias
SERVICIO ANÁLISIS DE BPA

Informe de Sensibilidades en porcentajes

Aislamientos de HOSPITAL NEUROTRAUMATOLOGÍA

Año 2024



SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

Bacilos Gram negativos Enterobacterias

AMC: amoxicilina/clavulánico
AMK: amikacina
AMP: ampicilina
AMS: ampicilina/sulbactam
AZM: aztreonam
AZT: aztreonam
BLEE: b-lactamasa espectro ampliado
CAZ: ceftazidima
CC: clindamicina
CBP: cefepime
CFD: ceftiofurolo
CFX: ceftiofurolo
CFZ: ceftazidima
CIP: ciprofloxacina
CLA: clartromicina
CM: cloranfenicol
COL: colistina
CTX: cefotaxima
CTR: ceftriaxona
CX: cloxacilina
CXM: ceftiofurolo
C/A: ceftazidima/avibactam
C/T: ceftiofurolo/tazobactam
DAP: daplofomicina
ERM: eritromicina
FEP: cefepime
FOS: fosfomicina
FOX: cefotaxima
GM: gentamicina
G600: gentamicina 600
IMP: imipenem
LEV: levofloxacina
LNZ: linezolid
MOX: moxifloxacina
MER: meropenem
MTZ: metronidazol
NFR: rifabutin
NOR: norfloxacina
OFL: ofloxacina
PEN: penicilina
PIT: piperacilina/tazobactam
RIF: rifampicina
S1000: estreptomicina 1000
SXT: cotrimoxazol
TEL: telicoplanina
TET: tetraciclina
TIG: tigeciclina
TOB: tobramicina
VAN: vancomicina

Microorganismos	Probados	AMP	AMC	PIT	CTX	CAZ	C/A	C/T	FEP	BLEE	IMP	MER	AZM	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	TIG	SXT
<i>E. coli</i>	334	36	58	95	86	89			87	14	100	100	88	72	70	84	79	97		74
<i>E. coli BLEE</i>	45	0	28	93	0	23			6	100	100	100	0	18	7	58	30	91		51
<i>En. cloacae</i>	19	6	89		74	78			88	0	100	100	77	88	83	84	81	95		89
<i>En. hormaechei</i>	35	0	89		71	89	100	89	89	0	97	100	86	97	97	97	100	100	100	97
<i>K. aerogenes</i>	29	0	67		48	52			96	4	100	100	68	96	96	97	100	100		100
<i>K. oxytoca</i>	19	89	95		95	100			100	5	100	100	94	84	84	95	89	100	100	79
<i>K. pneumoniae</i>	136	80	86		88	88			86	12	97	98	85	77	78	89	83	99		79
<i>K. pneumoniae BLEE</i>	15	14	50		0	0			0	100	77	86	0	8	0	33	8	100		0
<i>Moreanella</i>	18	0	100		89	100			100	0	94	100	87	65	71	83	88	100		72
<i>Proteus mirabilis</i>	56	59	85	96	100	100			100	0		100	98	92	80	68	61	82		64
<i>Serratia marcescens</i>	26	15	96		65	73			96	0	100	100	77	85	84	92	4	4		100

Entre 85-100% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 75-84% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 0-74% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Bacilos Gram Negativos NO Enterobacterias

Microorganismos	Probados	AMS	PIT	CAZ	FEP	C/A	C/T	CFD	IMP	MER	AZM	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	COL	SXT
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	146		75	75	75	84	86		76	84	81	73	77		88	90	96	0
<i>Stenotrophomonas</i>	14											90						100

Se han seleccionado los primeros aislados de cada tipo de muestra de un paciente

Se presentan datos de especies, generos o grupos con al menos 10 aislados

Se han descartado los aislamientos repetidos de un mismo paciente y tipo de muestra un periodo de 30 días

Se presentan datos de antibióticos si fueron probados en al menos el 50% de los aislados

Cuando el número de cepas es <30 el porcentaje obtenido tiene escaso valor estadístico

Han sido agrupados microorganismos sensibles y sensibles, cuando incrementa la exposición, según recomendaciones de EUCAST

Aislamientos hospital neurotraumatología bacterias Gram positivas crecimiento dificultoso y anaerobias



Informe de Sensibilidades en porcentajes

Aislamientos de HOSPITAL NEUROTRAUMATOLOGÍA

Bacterias Gram positivas

Año 2024

SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

AMC: amoxicilina/clavulánico
AMK: amikacina
AMP: ampicilina
AMS: ampicilina/sulbactam
AZM: aztreonam
AZT: azitromicina
BLEE: b-lactamasa espectro ampliado
CAZ: ceftazidima
CC: clindamicina
CBP: ceftriaxona
CFD: cefiderocol
CFX: cefuroxima
CFZ: ceftazidima
CIP: ciprofloxacina
CLA: clartromicina
CM: cloranfenicol
COL: colistina
CTX: cefotaxima
CTR: ceftriaxona
CX: cefoxitina
CKM: ceftriaxona
CIA: ceftazidima/avibactam
C/T: ceftiozono/tazobactam
DAP: daplofomicina
ERM: eritromicina
FEP: cefepima
FOS: fosfomicina
FOX: cefoxitina
GM: gentamicina
G600: gentamicina 600
IMP: imipenem
LEV: levofloxacina
LNZ: linezolid
MOX: moxifloxacina
MER: meropenem
MTZ: metronidazol
NF: nitrofurantoina
NOR: norfloxacina
OFL: ofloxacina
PEN: penicilina
PIT: piperacilina/tazobactam
RIF: rifampicina
S1000: estreptomicina 1000
SXT: cotrimoxazol
TEI: telcicaplanina
TET: tetraciclina
TIG: tigeciclina
TOB: tobramicina
VAN: vancomicina

Microorganismos	Probados	PEN	CX	AMP	AMC	CTX	CBP	CTR	IMP	GM S1000	ERM	CC	LNZ	LEV	CIP	TET	VAN	TEI	DAP	FOS	SXT
<i>E. faecalis</i>	110		100					100		76			96	81	99		100	99	100		
<i>E. faecium</i>	16		25							31			81	9			100	100	100		
<i>S. aureus</i>	161	26	88	26	88	88	100	88	89		64	69	100	92	91	96	100	100	100	98	100
<i>S. aureus</i> Meticilina Resistente	19	0	0	0	0	0	100	0	84		42	58	100	53	47	84	100	100	100	95	100
<i>S. aureus</i> Meticilina Sensible	142	30	100	30	100	100	100	100	90		67	71	100	97	97	98	100	100	100	99	100
<i>S. epidermidis</i>	107	0	26	10	26	25	100	25	47		23	53	88	41	46	85	100		99	85	61
<i>S. hominis</i>	22	8	50	23	50	50	93	50	68		36	45	86	64	64	95	100		100	50	100
<i>S. lugdunensis</i>	11	60	90	60	90	90		90	90		90	90	100	100	100	100	100		100		
<i>Staphylococcus</i>	18		71	35	71	71	100	71	82		76	82	100	78	78	100	100		94	18	100
<i>Streptococcus agalactiae</i>	10	100									90		100								
<i>Streptococcus pyogenes</i>	45	100		96		100					39	56		100		69					
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	12	100									90		100	100							

Bacterias de crecimiento dificultoso

Microorganismos	Probados	PEN	AMP	AMC	CTX	MER	ERM	AZI	CC	LNZ	LEV	CIP	MOX	VAN
<i>Haemophilus influenzae</i>	15	80			100	100						86		

Entre 85-100% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición
Entre 75-84% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición
Entre 0-74% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Se han seleccionado los primeros aislados de cada tipo de muestra de un paciente

Se han descartado los aislamientos repetidos de un mismo paciente y tipo de muestra en un periodo de 30 días

Bacterias anaerobias

Microorganismo	Probados	PEN	PZT	MER	CC	MTZ	VAN
<i>Clostridium acnes</i>	42	93	100	100	88	7	100

Se presentan datos de especies, generos o grupos con al menos 10 aislados

Se presentan datos de antibióticos si fueron probados en al menos el 50% de los aislados

Cuando el número de cepas es inferior a 30 el porcentaje obtenido tiene escaso valor estadístico

Han sido agrupados microorganismos sensibles y sensibles, cuando se incrementa la exposición, según recomendaciones de EUCAST

Aislamientos hospital materno-infantil bacilos Gram negativos

AMC: amoxicilina/clavulánico
AMK: amikacina
AMP: ampicilina
AMS: ampicilina/sulbactam
AZM: aztreonam
AZT: azitromicina
BLEE: b-lactamasa espectro ampliado
CAZ: ceftazidima
CC: clindamicina
CBP: cefotaxima
CFD: cefiderocol
CFX: cefuroxima
CFZ: ceftazolidina
CIP: ciprofloxacina
CLA: clantromicina
CM: cloranfenicol
COL: colistina
CTX: cefotaxima
CTR: ceftriaxona
CX: cloxacilina
CXM: cefixima
C/A: ceftazolidima/avibactam
C/T: cefotaxima/tazobactam
DAP: daploxacina
ERM: eritromicina
FEP: cefepima
FOS: fosfomicina
FOX: cefoxitina
GM: gentamicina
G600: gentamicina 600
IMP: imipenem
LEV: levofloxacina
LNZ: linezolid
MOX: moxifloxacina
MER: meropenem
MTZ: metronidazol
NFR: nitrofurantoina
NOR: norfloxacina
OFL: ofloxacina
PEN: penicilina
PIT: piperacilina/tazobactam
RIF: rifampicina
S1000: estreptomicina 1000
SXT: cotrimoxazol
TEI: telcicoplanina
TET: tetraciclina
TIG: tigeciclina
TOB: tobramicina
VAN: vancomicina

Bacilos Gram negativos Enterobacterias

Microorganismos	Probados	AMP	AMC	PIT	CTX	CAZ	C/A	C/T	FEP	BLEE	IMP	MER	AZM	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	TIG	SXT
<i>E. coli</i>	336	48	69	95	95	96			96	5	100	100	95	87	86	89	84	99		76
<i>E. coli BLEE</i>	15	0	42	93	0	33			25	100	100	100		27	21	73	36	93		47
<i>En. hormaechei</i>	10	0	60		60						100			100		60		80		60
<i>K. oxytoca</i>	21	100	100		100	100			100	0	100	100	100	94	95	100	100	100	100	90
<i>K. pneumoniae</i>	58	73	82		92	86			92	11	100	100	89	92	89	97	98	100		95
<i>Morganella</i>	10	10	100		80	70			100	0	100			70	80	90	90	100		70
<i>Proteus mirabilis</i>	32	69	89	100	100	100			100	0		100	95	85	77	91	77	94		72
<i>Salmonella</i>	21	67	81	100	95	100			95	5	100	100	95	71					100	90
<i>Serratia marcescens</i>	16	0	94		62	75			100	0	100	100	75	100	100	94	0	0		100

Entre 85-100% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 75-84% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 0-74% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Bacilos Gram Negativos NO Enterobacterias

Microorganismos	Probados	AMS	PIT	CAZ	FEP	C/A	C/T	CFD	IMP	MER	AZM	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	COL	SXT
<i>Aeromonas</i>	23			100	96				95	91	100	90						96
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	83		94	93	96	100	100		92	100	94	81	84		96	99	98	0
<i>Stenotrophomonas</i>	14										80							100

Se han seleccionado los primeros aislados de cada tipo de muestra de un paciente

Se presentan datos de especies, generos o grupos con al menos 10 aislados

Se han descartado los aislamientos repetidos de un mismo paciente y tipo de muestra un periodo de 30 días

Se presentan datos de antibióticos si fueron probados en al menos el 50% de los aislados

Cuando el número de cepas es <30 el porcentaje obtenido tiene escaso valor estadístico

Han sido agrupados microorganismos sensibles y sensibles, cuando incrementa la exposición, según recomendaciones de EUCAST

Aislamientos hospital materno-infantil bacterias Gram positivas y crecimiento dificultoso



Informe de Sensibilidades en porcentajes

Aislamientos de HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Bacterias Gram positivas

Año 2024

SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

AMC: amoxicilina/clavulanico
AMK: amikacina
AMP: ampicilina
AMS: ampicilina/sulbactam
AZM: aztreonam
AZT: azitromicina
BLEE: beta-lactamasa espectro ampliado
CAZ: ceftazidima
CC: clindamicina
CBP: ceftriaxona
CFD: cefidrol
CFX: cefuroxima
CFZ: ceftazidima
CIP: ciprofloxacina
CLA: claritromicina
CM: cloranfenicol
COL: colistina
CTX: cefotaxima
CTR: ceftazidima
CX: cloxacilina
CXM: cefixima
CIA: ceftazidima/avibactam
C/T: ceftiozono/cefotaxima
DAP: daplofina
ERM: eritromicina
FEP: cefepima
FOS: fosfomicina
FOX: cefoxitina
GM: gentamicina
G600: gentamicina 600
IMP: imipenem
LEV: levofloxacina
LNZ: linezolid
MOX: moxifloxacina
MER: meropenem
MTZ: metronidazol
NF: nitrofurantoina
NOR: norfloxacina
OFL: ofloxacina
PEN: penicilina
PIT: piperacilina/tazobactam
RIF: rifampicina
S1000: estreptomicina 1000
SXT: cotrimoxazol
TEI: telicoplanina
TET: tetraciclina
TIG: tigeciclina
TOB: tobramicina
VAN: vancomicina

Microorganismos	Probados	PEN	CX	AMP	AMC	CTX	CBP	CTR	IMP	GM S1000	ERM	CC	LNZ	LEV	CIP	TET	VAN	TEI	DAP	FOS	SXT
<i>E. faecalis</i>	76		100					100		87			100	98	100		100	100	100		
<i>S. aureus</i>	238	16	92	16	93	93	100	93	90		62	63	100	93	93	93	100	100	100	99	99
<i>S. aureus Meticilina Resistente</i>	18	0	0	0	0	0	100	0	53		53	59	100	47	59	88	100	100	100	94	94
<i>S. aureus Meticilina Sensible</i>	220	17	100	17	100	100	100	100	93		62	64	100	96	96	94	100	100	100	99	100
<i>S. epidermidis</i>	22	0	36	9	36	36	100	36	50		18	36	100	55	55	73	100	82	100	86	59
<i>S. lueddemansii</i>	12	42	75	42	75	75	100	75	100		50	58	100	92	92	92	100		100		
<i>Streptococcus agalactiae</i>	17	100	100								59		100	100		7	100				
<i>Streptococcus gr. anginosus</i>	20	100	100			100					60	65		100		80					
<i>Streptococcus pyogenes</i>	167	100									94	95									
<i>Thricella</i>	21	95							100		57	100					100				

Bacterias de crecimiento dificultoso

Microorganismos	Probados	PEN	AMP	AMC	CTX	MER	ERM	AZI	CC	LNZ	LEV	CIP	MOX	VAN
<i>Haemophilus influenzae</i>	169	81			100	100		37				99		
<i>Moraxella catarrhalis</i>	21		100		100		67	81			100			
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	47	89			100	100	57		74	97		100	96	

Entre 85-100% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 75-84% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 0-74% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Se han seleccionado los primeros aislados de cada tipo de muestra de un paciente

Se han descartado los aislamientos repetidos de un mismo paciente y tipo de muestra en un periodo de 30 días

Se presentan datos de especies, generos o grupos con al menos 10 aislados

Se presentan datos de antibióticos si fueron probados en al menos el 50% de los aislados

Cuando el numero de cepas es inferior a 30 el porcentaje obtenido tiene escaso valor estadístico

Han sido agrupados microorganismos sensibles y sensibles, cuando se incrementa la exposición, según recomendaciones de EUCAST

Aislamientos de pacientes pediátricos HUVN bacilos Gram negativos, bacterias Gram positivas y de crecimiento dificultoso



Informe de Sensibilidades en porcentajes

Aislamientos de Pacientes Pediátricos

Año 2024



Bacterias Gram negativas

Microorganismos	Probados	AMP	AMC	PIT	CFX	CTX	CAZ	C/A	C/T	FEP	AZM	BLEE	IMP	MER	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	COL	TIG	SXT
<i>Aeromonas</i>	34	0			75		100			97	94	0	97		100	83					100	94
<i>Campylobacter</i>	70														15							
<i>E. coli</i>	314	46	67	95	90	95	95			94	93	5	100	100	85	86	88	83	97	97		74
<i>E. coli BLEE</i>	15	0	33	86	0	0	13			13	0	100	100	100	27	15	67	47	87	100		47
<i>En. hormaechei</i>	10			60			60						100		100		60		80			60
<i>K. oxytoca</i>	16		100	100	93	100	100			100	100	0	100	100	100	100	100	100	100			88
<i>K. pneumoniae</i>	46		71	76	79	91	82			90	89	13	100	100	90	87	93	98	98	96		93
<i>Proteus mirabilis</i>	37	81	88	100	100	100	100			100	95	0		100	93	86	86	72	78	0		81
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	86			97		0	94	100	100	98	93	0	94	100	85	90		94	98	97		0
<i>Salmonella</i>	33	70	79	100		97	100			97	97	3	100	100	73						100	94
<i>Serratia marcescens</i>	13		0	92	0	54	69			100	77	0	100	100	100	100	92	0	0			100
<i>Stenotrophomonas</i>	16														82							100

Bacterias Gram positivas

Microorganismos	Probados	PEN	CX	AMP	AMC	CTX	CBP	CTR	IMP	GM	S1000	ERM	CC	LNZ	LEV	CIP	TET	VAN	TEI	DAP	FOS	SXT	NF
<i>E. faecalis</i>	55			100					100	88				100	100	100		100	100	100			87
<i>S. aureus</i>	192	15	93	15	94	94		100	94	91		66	68	99	94	94	95	100	100	99	99	99	
<i>S. aureus Meticilina Resistente</i>	13	0	0	0	0	0		100	0	58		75	67	100	42	58	92	100	100	100	100	92	
<i>S. aureus Meticilina Sensible</i>	179	16	100	16	100	100		100	100	94		65	68	99	97	96	95	100	100	99	99	100	
<i>S. epidermidis</i>	19	0	26	16	26	26			26	47		16	32	100	53	53	79	100	80	100	84	58	
<i>Streptococcus gr anginosus</i>	18	100		100		100							61		100		86						
<i>Streptococcus pyogenes</i>	179	100										98	98										
<i>Turicella</i>	21	95								100			57	100				100					

Bacterias de crecimiento dificultoso

Microorganismos	Probados	PEN	AMP	AMC	CTX	MER	ERM	AZI	CC	LNZ	LEV	CIP	MOX	VA
<i>Haemophilus influenzae</i>	169		82		100	100		36			100			
<i>Moraxella catarrhalis</i>	22			100	100		63	82			100			
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	50	90			100	100	55	76	98			100		

Aislamientos pacientes adultos bacilos Gram negativos



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias
DEPARTAMENTO DE SALUD

Informe de Sensibilidades en porcentajes

Aislamientos de Pacientes adultos

Año 2024



SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

Bacilos Gram negativos Enterobacterias

AMC: amoxicilina/clavulanico
AMK: amikacina
AMP: ampicilina
AMS: ampicilina/sulbactam
AZM: aztreonam
AZT: aztreonam
BLEE: b-lactamasa espectro ampliado
CAZ: ceftazidima
CC: clindamicina
CBP: cefepime
CFD: cefiderocol
CFX: cefuroxima
CFZ: ceftazidima
CIP: ciprofloxacina
CLA: clindamicina
CM: cloranfenicol
COL: colistina
CTX: cefotaxima
CTR: ceftriaxona
CX: cloxacilina
CXM: cefixima
CXA: ceftazidima/avibactam
C/T: ceftiozono/tazobactam
DAP: daploxacina
ERM: eritromicina
FEP: cefepime
FOS: fosfomicina
FOX: cefoxitina
GM: gentamicina
G600: gentamicina 600
IMP: imipenem
LEV: levofloxacina
LNZ: linezolid
MOX: moxifloxacina
MER: meropenem
MTZ: metronidazol
NF: nitrofurantoina
NOR: norfloxacina
OFL: ofloxacina
PEN: penicilina
PIT: piperacilina/tazobactam
RIF: rifampicina
S1000: estreptomicina 1000
SXT: cotrimoxazol
TEI: telicoplanina
TET: tetraciclina
TIG: tigeciclina
TOB: tobramicina
VAN: vancomicina

Microorganismos	Probados	AMP	AMC	PIT	CTX	CAZ	C/A	C/T	FEP	BLEE	IMP	MER	AZM	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	TIG	SXT
<i>Citrobacter</i>	65	72	98		94	98			100	0	100	100	94	98	100	98	98	100		94
<i>Citrobacter freundii</i>	76	4	79		64	68			91	1	94	99	74	81	79	95	88	93		82
<i>Citrobacter koseri</i>	31	93	97		96	97			96	4	100	100	95	100	100	100	100	100		94
<i>E. coli</i>	4381	42	63	95	87	88			88	12	100	100	87	71	70	87	82	97		71
<i>E. coli BLEE</i>	522	1	38	90	1	17			6	100	100	100	5	19	12	68	51	90		39
<i>En. cloacae</i>	174	3	73		62	66			80	0	99	99	64	91	90	94	90	98		88
<i>En. hormaechei</i>	128	2	75		62	70	96	76	87	0	96	98	72	88	88	95	93	96	100	88
<i>Enterobacter</i>	41	23	83		76	73	92	87	90	0	90	92	76	88	88	100	92	98	100	93
<i>K. aerogenes</i>	115	2	77		64	66			93	1	98	100	72	94	96	97	98	99		99
<i>K. oxytoca</i>	175	88	93		94	96			95	7	99	100	89	90	89	95	92	97		89
<i>K. pneumoniae</i>	1234	68	83		82	82			82	15	98	98	81	78	78	88	84	98		78
<i>K. pneumoniae BLEE</i>	177	26	61	3	7				7	100	96	98	6	29	14	52	37	97		17
<i>Klebsiella</i>	10	90	90		100	90			100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	90	100
<i>Moreanella</i>	108	3	97		75	83			98	0	99	100	78	61	64	85	82	100		66
<i>Proteus</i>	26	78	100		96	100			100	0	95	100	100	91	77	92	95	100		81
<i>Proteus mirabilis</i>	434	58	82	99	95	98			97	3		100	96	79	65	72	70	88		66
<i>Providencia</i>	23	5	100		68	87			100	0	95	100	100	24	22		14	83		96
<i>Salmonella</i>	76	53	76	99	99	99			99	0	100	100	99	68					100	72
<i>Serratia</i>	11	64	100		100	100			100	0	100	100	91	100	100	100	73	73		100
<i>Serratia marcescens</i>	125	6	93		76	82			97	0	100	100	81	87	87	95	3	4		95

Entre 85-100% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 75-84% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 0-74% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Bacilos Gram Negativos NO Enterobacterias

Microorganismos	Probados	AMS	PIT	CAZ	FEP	C/A	C/T	CFD	IMP	MER	AZM	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	COL	SXT
<i>Achromobacter</i>	26	96							96									72
<i>Acinetobacter</i>	22								100	100		95	93	94	100	95	94	73
<i>Aeromonas</i>	57			88	91				90		89	87	79					91
<i>Pseudomonas</i>	29		93	86	89				93	96	64	89	90		96	97	96	0
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	783		87	87	87	94	96		81	91	90	78	79		91	93	95	0
<i>Stenotrophomonas</i>	104							100				87						96

Se han seleccionado los primeros aislados de cada tipo de muestra de un paciente

Se presentan datos de especies, generos o grupos con al menos 10 aislados

Se han descartado los aislamientos repetidos de un mismo paciente y tipo de muestra un periodo de 30 días

Se presentan datos de antibióticos si fueron probados en al menos el 50% de los aislados

Cuando el número de cepas es <30 el porcentaje obtenido tiene escaso valor estadístico

Han sido agrupados microorganismos sensibles y sensibles, cuando incrementa la exposición, según recomendaciones de EUCAST

Aislamientos pacientes adultos bacterias Gram positivas



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias
SERVICIO DE ANÁLISIS DE SALUD

Informe de Sensibilidades en porcentajes

Aislamientos de Pacientes adultos

Año 2024

SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA



AMC: amoxicilina/clavulánico
AMK: amikacina
AMP: ampicilina
AMS: ampicilina/sulbactam
AZM: aztreonam
AZT: azitromicina
BLEE: beta-lactamasa espectro ampliado
CAZ: ceftazidima
CC: clindamicina
CBP: ceftiofurolo
CFD: cefiderocol
CFX: cefuroxima
CFZ: cefazolina
CIP: ciprofloxacina
CLA: clantromicina
CMC: cloranfenicol
COL: colistina
CTX: cefotaxima
CTR: ceftazidima
CXI: cefixima
CXM: cefixima
CXA: ceftazidima/avibactam
CXT: ceftiofurolo/tazobactam
DAP: daplofina
ERM: eritromicina
FEP: cefepima
FOS: fosfomicina
FOX: cefoxitina
GM: gentamicina
G60: gentamicina 600
IMP: imipenem
LEV: levofloxacina
LNZ: linezolid
MOX: moxifloxacina
MER: meropenem
MTZ: metronidazol
NF: nitrofurantoina
NOR: norfloxacina
OFL: ofloxacina
PEN: penicilina
PIT: piperacilina/tazobactam
RIP: rifampicina
S1000: estreptomicina 1000
SXT: cotrimoxazol
TEI: telapocina
TET: tetraciclina
TIG: tigeciclina
TOB: tobramicina
VAN: vancomicina

Bacterias Gram positivas

Microorganismos	Probados	PEN	CX	AMP	AMC	CTX	CBP	CTR	IMP	GM	S1000	ERM	CC	LNZ	LEV	CIP	TET	VAN	TEI	DAP	FOS	SXT	NF
<i>Aerococcus</i>	40			95											82								85
<i>Cornebacterium</i>	16	62								79		19						100					90
<i>E. faecalis</i>	1045			100				99		69			98	72	97			100	100	100			84
<i>E. faecium</i>	337			10						30			86	13				99	100	98			91
<i>Enterococcus</i>	21			90				84		95			95		100			48	100	100			
<i>S. aureus</i>	947	24	88	24	88	88	100	88	93			60	66	100	88	88	94	100	100	100	98	100	
<i>S. aureus Metilicina Resistente</i>	112	0	0	0	0	0		99	0	83		40	63	100	35	34	81	99	98	99	95	99	
<i>S. aureus Metilicina Sensible</i>	835	28	100	28	100	100	100	100	94			63	66	100	95	95	95	100	100	100	99	100	
<i>S. epidermidis</i>	252	0	23	7	23	23	100	23	41			22	47	81	38	41	81	100		100	88	65	
<i>S. haemolyticus</i>	23	0	9	4	9	9		36	9	17		4	30	100	13	13	100	100		100	64	22	
<i>S. hominis</i>	80	2	41	10	40	40		98	40	56		22	46	92	49	51	90	100		100	49	91	
<i>S. luedemannii</i>	40	47	89	47	89	89	100	89	89			77	82	98	90	92	95	100		100		100	
<i>S. saprophyticus</i>	117	1	96	84	95	95		95	98			50	88	99	99	98	87	99	99	99	1	97	100
<i>Staphylococcus</i>	40	5	64	25	61	62		64	86			66	82	100	69	72	97	100	95	95	23	100	
<i>Streptococcus</i>	28	100										50	79		94		75						
<i>Streptococcus agalactiae</i>	196	100		100								58		99	97		15	100					
<i>Streptococcus er amninosus</i>	145	100		98		100						59	64		99		73						
<i>Streptococcus er bovis</i>	47	100		100											85								
<i>Streptococcus er mitis</i>	20	90				100							85		82								
<i>Streptococcus er sanguinis</i>	16	87		73		94							86		100								
<i>Streptococcus pyogenes</i>	91	100										74	77	97	94		55						

Entre 85-100% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 75-84% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 0-74% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Se presentan datos de antibióticos si fueron probados en al menos el 50% de los aislados

Cuando el número de cepas es inferior a 30 el porcentaje obtenido tiene escaso valor estadístico

Han sido agrupados microorganismos sensibles y sensibles, cuando se incrementa la exposición, según recomendaciones de EUCAST

Se han seleccionado los primeros aislados de cada tipo de muestra de un paciente

Se han descartado los aislamientos repetidos de un mismo paciente y tipo de muestra en un periodo de 30 días

Se presentan datos de especies, generos o grupos con al menos 10 aislados

Aislamientos pacientes adultos bacterias de crecimiento dificultoso y anaerobias

AMC: amoxicilina/clavulanico
AMK: amikacina
AMP: ampicilina
AZM: aztreonam
AZT: azitromicina
BLEE: beta-lactamasa espectro ampliado
CAZ: ceftazidima
CC: clindamicina
CFX: cefuroxima
CFZ: ceftazolin
CIP: ciprofloxacina
CLA: clartromicina
CM: cloranfenicol
COL: colistina
CTX: cefotaxima
CX: cloxacilina
CXM: cefixima
DAP: daptoicina
ERM: eritromicina
FEP: cefepima
FOS: fosomicina
FOX: cefoxitina
GM: gentamicina
G500: gentamicina 500
IMP: imipenem
LEV: levofloxacina
LNZ: linezolid
MOX: moxifloxacina
MER: meropenem
MTZ: metronidazol
NF: nitrofurantoina
NOR: norfloxacina
OFL: ofloxacina
PEN: penicilina
PIT: piperacilina/tazobactam
RIF: rifampicina
S1000: estreptomicina 1000
SXT: cotrimoxazol
TEI: telcoplanina
TET: tetraciclina
TIG: tigeciclina
TOB: tobramicina
VAN: vancomicina

Bacterias de crecimiento dificultoso

Microorganismos	Probados	PEN	AMP	AMC	CTX	MER	ERM	AZI	CC	LNZ	LEV	CIP	MOX	VAN
<i>Haemophilus influenzae</i>	244	83			100	100		32				92		
<i>Moraxella catarrhalis</i>	57			100	100			76	71		98			
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	67	96			100									
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	79	97			100	100		71	79	99			99	

Bacterias anaerobias

Microorganism	Probados	PEN	PZT	MER	CC	MTZ	VAN
<i>Bacteroides fragilis</i> gr	36	10	69	89	69	94	
<i>BGN Anaerobio</i>	20	41	79	75	45	85	
<i>BGP anaerobio</i>	16	94	100	100	53	60	90
<i>CGP anaerobio</i>	14	100	92	100	79	83	100
<i>Cutibacterium acnes</i>	46	93	100	100	89	7	100

Entre 85-100% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 75-84% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 0-74% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Se presentan datos de antibióticos si fueron probados en al menos el 50% de los aislados

Cuando el número de cepas es inferior a 30 el porcentaje obtenido tiene escaso valor estadístico

Han sido agrupados microorganismos sensibles y sensibles, cuando se incrementa la exposición, según recomendaciones de EUCAST

Se han seleccionado los primeros aislados de cada tipo de muestra de un paciente

Se han descartado los aislamientos repetidos de un mismo paciente y tipo de muestra en un periodo de 30 días

Se presentan datos de especies, generos o grupos con al menos 10 aislados

Aislamientos extrahospitalarios bacilos Gram negativos



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias
SERVICIO DE ANÁLISIS DE SALUD

Informe de Sensibilidades en porcentajes

Aislamientos de Extrahospitalario

Año 2024



SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

Bacilos Gram negativos Enterobacterias

AMC: amoxicilina/clavulanico
AMK: amikacina
AMP: ampicilina
AMS: ampicilina/sulbactam
AZM: aztreonam
AZT: aztreonam
BLEE: b-lactamasa espectro ampliado
CAZ: ceftazidima
CC: ceftriaxona
CBP: ceftiofuro
CFD: ceftiofuro
CFX: cefixima
CFZ: ceftazidima
CIP: ciprofloxacina
CLA: clindamicina
CM: cloranfenicol
COL: colistina
CTX: cefotaxima
CTR: ceftarolina
CX: cloxacilina
CXM: cefixima
CIA: ceftazidima/avibactam
C/T: ceftiofuro/tazobactam
DAP: daplofina
ERM: eritromicina
FEP: cefepima
FOS: fosfomicina
FOX: cefoxitina
GM: gentamicina
G600: gentamicina 600
IMP: imipenem
LEV: levofloxacina
LNZ: linezolid
MOX: moxifloxacina
MER: meropenem
MTZ: metronidazol
NF: nitrofurantoina
NOR: norfloxacina
OFL: ofloxacina
PEN: penicilina
PIT: piperacilina/tazobactam
RIF: rifampicina
S1000: estreptomicina 1000
SXT: cotrimoxazol
TEI: telaprepina
TET: tetraciclina
TIG: tigeciclina
TOB: tobramicina
VAN: vancomicina

Microorganismos	Probados	AMP	AMC	PIT	CTX	CAZ	C/A	C/T	FEP	BLEE	IMP	MER	AZM	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	TIG	SXT
<i>Citrobacter</i>	38	82	100		97	100			100	0	100	100	97	97	100	100	97	100	100	95
<i>Citrobacter freundii</i>	37	3	80		63	64			97	3	100	100	70	86	82	97	83	94	100	81
<i>Citrobacter koseri</i>	9	100	100		100	100			100	0	100	100		100	100	100	100	100		100
<i>E. coli</i>	2888	44	64	96	88	89	100	100	88	11	100	100	87	73	73	88	84	97	99	72
<i>E. coli BLEE</i>	321	0	38	89	1	15	100	100	4	100	100	100	3	18	11	68	52	89	98	35
<i>En. cloacae</i>	85	3	77		67	70			81	0	99	100	64	96	96	96	94	100	89	91
<i>En. hormaechei</i>	36	3	81		82	78	100	88	91	0	100	100	83	93	94	92	90	92	100	86
<i>K. aerogenes</i>	46	6	86		74	80			94	0	97	100	77	92	96	98	97	100		98
<i>K. oxytoca</i>	92	91	93		98	98	100	100	99	4	100	100	95	91	90	99	99	99	94	91
<i>K. pneumoniae</i>	669	71	86		84	84	95	96	85	14	99	99	84	83	82	91	88	98	96	81
<i>K. pneumoniae BLEE</i>	91	30	66		4	10	100	92	8	100	99	99	8	35	19	63	46	98	100	21
<i>Morganella</i>	47	0	100		68	77	100	100	98	0	100	100	70	68	67	81	84	100		77
<i>Proteus</i>	19	76	100		100	100			100	0	94	100	100	88	74	89	94	100		79
<i>Proteus mirabilis</i>	264	61	83	99	94	98	100	100	96	2	100	100	96	74	61	73	70	86		68
<i>Providencia</i>	16	7	100		80	94			100	0	93	100	100	21	19		14	88		94
<i>Salmonella</i>	63	62	84	98	98	98			98	0	100	100	98	76	40				100	89
<i>Serratia</i>	6	67	100		100	100			100	0	100	100	83	100	100	100	100	100		100
<i>Serratia marcescens</i>	33	3	91		75	85	100	100	97	0	100	100	86	84	85	94	3	6		100
<i>Shigella</i>	5	0	20	100	60	100			100	0	100	100	60	20	20					60
<i>Yersinia</i>	8	0	100		100	100			100	0	100	100	57	100	50	100	100	100	100	100

Entre 85-100% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 75-84% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 0-74% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Bacilos Gram Negativos NO Enterobacterias

Microorganismos	Probados	AMS	PIT	CAZ	FEP	C/A	C/T	CFD	IMP	MER	AZM	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	COL	SXT
<i>Achromobacter</i>	8	100							100									71
<i>Acinetobacter</i>	10			80	100				100	100	0	86	86	88	100	90	100	75
<i>Acinetobacter baumannii</i>	5			60	60				60	100	40	60	60	80	100	80	100	20
<i>Aeromonas</i>	32		83	97	97				97	100	97	93	76	38	22	57		94
<i>Pseudomonas</i>	7		100	86	100				83	100		100	86	83	86		80	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	238		91	93	91	97	99		85	94	94	82	80	92	93	96	92	0
<i>Stenotrophomonas</i>	13							100				89						100

Se han seleccionado los primeros aislados de cada tipo de muestra de un paciente

Se presentan datos de especies, generos o grupos con al menos 10 aislados

Se han descartado los aislamientos repetidos de un mismo paciente y tipo de muestra un periodo de 30 días

Se presentan datos de antibióticos si fueron probados en al menos el 50% de los aislados

Cuando el número de cepas es <30 el porcentaje obtenido tiene escaso valor estadístico

Han sido agrupados microorganismos sensibles y sensibles, cuando incrementa la exposición, según recomendaciones de EUCAST

Aislamientos extrahospitalarios bacterias Gram positivas, crecimiento dificultoso y anaerobias

Informe de Sensibilidades en porcentajes

Aislamientos de Extrahospitalario

Bacterias Gram positivas

Año 2024

SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

AMC: amoxicilina/clavulanico
AMK: amikacina
AMP: ampicilina
AMS: ampicilina/sulbactam
AZM: aztreonam
AZT: azitromicina
BLEE: b-lactamasa espectro ampliado
CAZ: ceftazidima
CC: clindamicina
CBP: cefotaxima
CFD: cefidrol
CFK: cefuroxima
CFZ: ceftazidima
CIP: ciprofloxacina
CLA: claritromicina
CM: cloranfenicol
COL: colistina
CTX: cefotaxima
CTR: ceftriaxona
CX: cefuroxima
CXM: cefixima
CIA: ceftazidima/avibactam
C/T: ceftiozono/tazobactam
DAP: daplofina
ERM: eritromicina
FEP: cefepima
FOS: fosfomicina
FOX: cefoxitina
GM: gentamicina
G600: gentamicina 600
IMP: imipenem
LEV: levofloxacina
LNZ: linezolid
MOX: moxifloxacina
MER: meropenem
MTZ: metronidazol
NF: nitrofurantoina
NOR: norfloxacina
OFL: ofloxacina
PEN: penicilina
PIT: piperacilina/tazobactam
RIF: rifampicina
S1000: estreptomicina 1000
SXT: cotrimoxazol
TEI: telapranina
TET: tetraciclina
TIG: tigeciclina
TOB: tobramicina
VAN: vancomicina

Microorganismos	Probados	PEN	CX	AMP	AMC	CTX	CBP	CTR	IMP	GM	S1000	ERM	CC	LNZ	LEV	CIP	TET	VAN	TEI	DAP	FOS	SXT
<i>Aerococcus</i>	30			97											83							
<i>E. faecalis</i>	508			100				100		69			98	68	96		99	100	100			
<i>E. faecium</i>	77			14				18		39			94	17	71		100	100	98			
<i>Enterococcus</i>	7			100				100		100			100	100			43	100	100			
<i>S. aureus</i>	320	26	89	26	89	89	100	100	89	93		60	65	100	87	88	92	100	100	100	98	100
<i>S. aureus</i> Meticilina Resistente	35	0	0	0	0	0		100	0	86		47	60	100	29	29	82	100	100	100	91	100
<i>S. aureus</i> Meticilina Sensible	285	29	100	29	100	100	100	100	100	94		62	66	100	94	95	94	100	100	100	99	100
<i>S. epidermidis</i>	22	0	18	14	18	18		100	18	45		18	45	91	36	41	77	100	100	100	77	86
<i>S. hominis</i>	35	0	49	6	47	47		100	47	57		14	54	97	49	51	79	100	100	100	46	89
<i>S. lueddemansii</i>	10	50	90	50	90	90		100	90	90		60	70	100	90	90	100	100		100		100
<i>S. saprophyticus</i>	107	1	95	83	95	94		100	94	98		50	88	99	99	98	86	99	98	99	1	97
<i>Staphylococcus</i>	10	0	50	12	40	38			38	90		40	90	100	40	50	100	100	100	100	12	100
<i>Streptococcus</i>	12	100										44	60	100	88		88					100
<i>Streptococcus agalactiae</i>	123	100		100				100				60	60	100	95	100	11	100	100			
<i>Streptococcus</i> gr. anginosus	21	100		92		100		100				62	57		100		64	100				
<i>Streptococcus</i> gr. bovis	35	100		100		100						43	43	94	95		19	100		100		
<i>Streptococcus</i> gr. mitis	6	83				100						67					60					
<i>Streptococcus pyogenes</i>	77	100		100								82	82	96	94		70	100	100	100		

Bacterias de crecimiento dificultoso

Microorganismos	Probados	PEN	AMP	AMC	CTX	MER	ERM	AZI	CC	LNZ	LEV	CIP	MOX	VAN
<i>Haemophilus influenzae</i>	130	85			100	100		36			91	93	95	
<i>Moraxella catarrhalis</i>	33			100	100		80	83			100			
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	46	100	97		100			75						
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	53	96			100	100	70		77	98	75		98	100

Entre 85-100% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición
Entre 75-84% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición
Entre 0-74% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Se han seleccionado los primeros aislados de cada tipo de muestra de un paciente

Se han descartado los aislamientos repetidos de un mismo paciente y tipo de muestra en un periodo de 30 días

Bacterias anaerobias

Microorganismo	Probados	PEN	PZT	MER	CC	MTZ	VAN
<i>Bacteroides fragilis</i> gr.	10		50	100	80	89	
<i>BGP anaerobio</i>	9	100	100	100	50	62	100

Se presentan datos de especies, generos o grupos con al menos 10 aislados

Se presentan datos de antibióticos si fueron probados en al menos el 50% de los aislados

Cuando el numero de cepas es inferior a 30 el porcentaje obtenido tiene escaso valor estadístico

Aislamientos HUVN de hemocultivos bacilos Gram negativos



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias
SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

Informe de Sensibilidades en porcentajes

Aislamientos de Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Año 2024

Bacilos Gram negativos Enterobacterias

Tipo de muestra: Hemocultivo

AMC: amoxicilina/clavulánico
AMP: amikacina
AMP: ampicilina
AMS: ampicilina/sulbactam
AZM: aztreonam
AZT: aztreonam
BLEE: b-lactamasa espectro ampliado
CAZ: ceftazidima
CC: clindamicina
CFX: cefixima
CFZ: ceftazidima
CIP: ciprofloxacina
CLA: clartromicina
CM: cloranfenicol
COL: colistina
CTX: cefotaxima,
CX: cloxacilina
CXM: ceftima
CIA: ceftazidima/avibactam
C/T: ceftiozono/tazobactam
DAP: daptomicina
ERM: eritromicina
FEP: cefepima
FOS: fosomicina
FOX: cefotaxima
GM: gentamicina
G600: gentamicina 600
IMP: imipenem
LEV: levofloxacina
LNZ: linezolid
MOX: moxifloxacina
MER: meropenem
MTZ: metronidazol
NFR: nitrofurantoina
NOR: norfloxacina
OFL: ofloxacina
PEN: penicilina
PIT: piperacilina/tazobactam
RIF: rifampicina
S1000: estreptomicina 1000
SXT: cotrimoxazol
TEI: telapocanina,
TET: tetraciclina
TIG: tigeciclina
TOB: tobramicina
VAN: vancomicina

Microorganismos	Probados	AMP	AMC	PIT	CTX	CAZ	C/A	C/T	FEP	BLEE	IMP	MER	AZM	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	TIG	SXT
<i>E. coli</i>	328	40	68	98	81	84	100	100	84	16	100	100	83	67	65	87	83	97	100	66
<i>E. coli BLEE</i>	53	0	42	96	0	14	100	100	8	100	100	100	6	12	6	74	48	90	100	43
<i>En. hormaechei</i>	19	0	56	37	47	87	53	72	0	84	89	42	74	74	89	79	95	100	68	
<i>K. oxytoca</i>	15	100	93	100	100	100	100	100	0	100	100	100	93	93	93	93	100		87	
<i>K. pneumoniae</i>	97	62	84	69	71	99	90	71	26	97	98	72	73	72	85	83	99		72	
<i>K. pneumoniae BLEE</i>	25	20	65	0	4	100	79	4	100	96	100	4	24	17	50	52	100		16	
<i>Proteus mirabilis</i>	17	50	69	100	94	94	100	100	6		100		75	67	76	88	100		69	
<i>Salmonella</i>	10	40	70	100	100	100		100	0	100	100	100	90						70	
<i>Serratia marcescens</i>	13	0	100	100	92			100	0	100	100	92	100	100	100	0	8		100	

Entre 85-100% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 75-84% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 0-74% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Bacilos Gram Negativos NO Enterobacterias

Microorganismos	Probados	AMS	PIT	CAZ	FEP	C/A	C/T	CFD	IMP	MER	AZM	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	COL	SXT
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	39	85	85	85	93	97			85	90	97	90	84	92	92			

Se han seleccionado los primeros aislados de cada tipo de muestra de un paciente
Se presentan datos de especies, generos o grupos con al menos 10 aislados
Se han descartado los aislamientos repetidos de un mismo paciente y tipo de muestra un periodo de 30 dias
Se presentan datos de antibióticos si fueron probados en al menos el 50% de los aislados
Cuando el numero de cepas es <30 el porcentaje obtenido tiene escaso valor estadístico
Han sido agrupados microorganismos sensibles y sensibles, cuando incrementa la exposición, según recomendaciones de EUCAST

Aislamientos HUVN de hemocultivos bacterias Gram positivas, crecimiento dificultoso y anaerobias



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias
SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

Informe de Sensibilidades en porcentajes

Aislamientos de Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Año 2024



SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

Bacterias Gram positivas

Tipo de muestra: Hemocultivo

AMC: amoxicilina/clavulánico
AMK: amikacina
AMP: ampicilina
AMS: ampicilina/sulbactam
AZM: aztreonam
AZT: azitromicina
BLEE: b-lactamasa espectro ampliado
CAZ: ceftazidima
CC: clindamicina
CBP: cefepímero
CFD: cefiderocol
CFX: cefuroxima
CFZ: ceftazidima
CIP: ciprofloxacina
CLA: cloranfenicol
CM: clonazepam
COL: colistina
CTX: cefotaxima
CTR: ceftriaxona
CX: cloxacilina
CXM: cefixima
CXA: ceftazidima/avibactam
C/T: ceftiozono/tazobactam
DAP: daploxacina
ERM: eritromicina
FEP: cefepímero
FOS: fosfomicina
FOX: cefoxitina
GM: gentamicina
G60: gentamicina 600
IMP: imipenem
LEV: levofloxacina
LNZ: linezolid
MOX: moxifloxacina
MER: meropenem
MTZ: metronidazol
NF: nitrofurantoina
NOR: norfloxacina
OFL: ofloxacina
PEN: penicilina
PIT: piperacilina/tazobactam
RIP: rifampicina
S1000: estreptomicina 1000
SXT: cotrimoxazol
TE: telapocanina
TET: tetraciclina
TIG: tigeciclina
TOB: tobramicina
VAN: vancomicina

Microorganismos	Probados	PEN	CX	AMP	AMC	CTX	CBP	CTR	IMP	GM S1000	ERM	CC	LNZ	LEV	CIP	TET	VAN	TEI	DAP	FOS	SXT	NF
<i>E. faecalis</i>	51		100					93		70			100				100	100	98			
<i>E. faecium</i>	41		7							18			90	8			100	100	91			
<i>S. aureus</i>	85	19	92	19	92	92	99	100	92	92		61	66	100	91	91	95	100	99	100	99	100
<i>S. aureus</i> Meticilina Sensible	78	21	100	21	100	100	100	100	100	92		64	67	100	95	95	95	100	100	100	99	100
<i>S. epidermidis</i>	114	0	18	6	18	18		100	18	35		16	34	78	32	33	77	100		100	86	63
<i>S. haemolyticus</i>	20	0	5	5	5	5		27	5	10		5	30	100	10	10	100	100		100	74	10
<i>S. hominis</i>	67	0	36	5	34	34		98	34	54		13	45	94	45	47	85	100		100	48	91
<i>Staphylococcus</i>	21	0	48	6	43	42			47	80		45	80	100	48	57	95	100	94	95	17	100
<i>Streptococcus gr. anginosus</i>	15	100		83		100							73	90		80						
<i>Streptococcus pyogenes</i>	11	100										64	82	91								

Bacterias de crecimiento dificultoso

Microorganismos	Probados	PEN	AMP	AMC	CTX	MER	ERM	AZI	CC	LNZ	LEV	CIP	MOX	VAN
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	35	94			100	100	65		76	94			97	

Bacterias Anaerobias

Microorganism	Probados	PEN	PZT	MER	CC	MTZ	VAN
<i>Bacteroides fragilis</i> gr	14		57	79	64	100	

Entre 85-100% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 75-84% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 0-74% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Se presentan datos de antibióticos si fueron probados en al menos el 50% de los aislados

Cuando el número de cepas es inferior a 30 el porcentaje obtenido tiene escaso valor estadístico

Han sido agrupados microorganismos sensibles y sensibles, cuando se incrementa la exposición, según recomendaciones de EUCAST

Se han seleccionado los primeros aislados de cada tipo de muestra de un paciente

Se han descartado los aislamientos repetidos de un mismo paciente y tipo de muestra en un periodo de 30 días

Se presentan datos de especies, generos o grupos con al menos 10 aislados

Aislamientos HUVN de exudados bacilos Gram negativos



Junta de Andalucía
Comunidad de Salud y Familia
SERVICIO DE ANÁLISIS DE SPSS

Informe de Sensibilidades en porcentajes

Aislamientos de Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Año 2024

Bacilos Gram negativos Enterobacterias

Tipo de muestra: Exudado

AMC: amoxicilina/clavulanico
AMK: amikacina
AMP: ampicilina
AMS: ampicilina/sulbactam
AZM: aztreonam
AZT: aztreonam
BLEE: b-lactamasa espectro ampliado
CAZ: ceftazidima
CC: cefclindamicina
CFX: cefuroxima
CFZ: ceftazidina
CIP: ciprofloxacina
CLA: clindamicina
CM: cloranfenicol
COL: colistina
CTX: cefotaxima
CX: cloxacilina
CXM: cefixima
C/A: ceftazidima/avibactam
C/T: ceftiozono/tazobactam
DAP: daplofomicina
ERL: eritromicina
FEP: cefepima
FOS: fosfomicina
FOX: cefoxitina
GM: gentamicina
G600: gentamicina 600
IMP: imipenem
LEV: levofloxacina
LNZ: linezolid
MOX: moxifloxacina
MER: meropenem
MTZ: metronidazol
NF: nitrofurantoina
NOR: norfloxacina
OFL: ofloxacina
PEN: penicilina
PIT: piperacilina/tazobactam
RIF: rifampicina
S1000: estreptomicina 1000
SXT: cotrimoxazol
TEI: telapocanina
TET: tetraciclina
TIG: tigeciclina
TOB: tobramicina
VAN: vancomicina

Microorganismos	Probados	AMP	AMC	PIT	CTX	CAZ	C/A	C/T	FEP	BLEE	IMP	MER	AZM	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	TIG	SXT
<i>Citrobacter freundii</i>	22	5	86		82	91			95	0	100	100	91	86	86	95	100	100	100	95
<i>Citrobacter koseri</i>	12	100	100		100	100			100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92
<i>E. coli</i>	282	32	58	94	88	88			90	11	100	100	86	68	65	85	80	96	99	71
<i>E. coli BLEE</i>	30	0	40	90	3	10			10	100	100	100	3	27	19	63	43	77	97	57
<i>En. cloacae</i>	26	0	76		69	73			81	0	100	100	65	88	88	96	88	100	96	85
<i>En. hormaechei</i>	66	2	88		74	83	100	89	92	0	100	100	83	89	89	94	95	94	100	92
<i>Enterobacter</i>	20	5	84		79	84	93	93	100	0	100	100	72	100	100	100	100	100	100	100
<i>K. aerogenes</i>	28	0	78		61	57	100	83	93	0	93	100	75	93	96	96	96	100	96	100
<i>K. oxytoca</i>	38	84	92		87	92			87	13	100	100	79	97	97	92	92	95	100	84
<i>K. pneumoniae</i>	118	60	77		86	84			87	13	97	98	84	80	80	86	85	99	97	84
<i>K. pneumoniae BLEE</i>	15	0	43		7	0	100		7	100	87	93	7	0	0	13	7	100	100	7
<i>Moreanella</i>	33	6	97		82	88			100	0	100	100	79	67	66	91	82	100		61
<i>Proteus mirabilis</i>	56	61	84	100	100	100			100	0		100	96	88	77	77	86	95		68
<i>Serratia marcescens</i>	55	13	98		83	89			96	0	100	100	84	84	83	95	4	4		91

Entre 85-100% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 75-84% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 0-74% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Bacilos Gram Negativos NO Enterobacterias

Microorganismos	Probados	AMS	PIT	CAZ	FEP	C/A	C/T	CFD	IMP	MER	AZM	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	COL	SXT
<i>Pseudomonas</i>	18	100	100	100					94	100		94	100	100	100	100		
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	266	89	87	86	97	97			80	91	88	78	81	92	95	93	0	
<i>Stenotrophomonas</i>	39																100	

Se han seleccionado los primeros aislados de cada tipo de muestra de un paciente
Se presentan datos de especies, generos o grupos con al menos 10 aislados
Se han descartado los aislamientos repetidos de un mismo paciente y tipo de muestra un periodo de 30 dias
Se presentan datos de antibióticos si fueron probados en al menos el 50% de los aislados
Cuando el numero de cepas es <30 el porcentaje obtenido tiene escaso valor estadístico
Han sido agrupados microorganismos sensibles y sensibles, cuando incrementa la exposición, según recomendaciones de EUCAST

Aislamientos HUVN de exudados bacterias Gram positivas, crecimiento dificultoso y anaerobias



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias
SERVICIO ASISTENCIAL DE SALUD

Informe de Sensibilidades en porcentajes

Aislamientos de Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Año 2024



SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

Bacterias Gram positivas

Tipo de muestra: Exudado

AMC: amoxicilina/clavulanico
AMP: ampicilina
AMP: ampicilina
AMS: ampicilina/sulbactam
AZM: aztreonam
AZT: aztreonam
BLEE: b-lactamasa espectro ampliado
CAZ: ceftazidima
CC: clindamicina
CBP: cefepime
CFD: cefiderocol
CFX: cefuroxima
CFZ: ceftazidima
CIP: ciprofloxacina
CLA: clantromicina
CMC: cloranfenicol
COL: colistina
CTX: cefotaxima
CTR: ceftarolina
CX: cefoxitina
CXM: cefixima
CIA: ceftazidima/avibactam
C/T: ceftiozono/tazobactam
DAP: daptomicina
ERM: eritromicina
FEP: cefepima
FOX: fosfomicina
FOX: cefoxitina
GM: gentamicina
G600: gentamicina 600
IMP: imipenem
LEV: levofloxacina
LNZ: linezolid
MOX: moxifloxacina
MER: meropenem
MTZ: metronidazol
NFT: nitrofurantoina
NOR: norfloxacina
OFL: ofloxacina
PEN: penicilina
PIT: piperacilina/tazobactam
RIF: rifampicina
S1000: estreptomicina 1000
SXT: cotrimoxazol
TEI: telcicaplanina
TET: tetraciclina
TIG: tigeciclina
TOB: tobramicina
VAN: vancomicina

Microorganismos	Probados	PEN	CX	AMP	AMC	CTX	CBP	CTR	IMP	GM	S1000	ERM	CC	LNZ	LEV	CIP	TET	VAN	TEI	DAP	FOS	SXT	NF
<i>E. faecalis</i>	166			100				100		73			96	74	100	100	100	100	100				0
<i>E. faecium</i>	110			12						31			80	14						100	100	99	
<i>Enterococcus</i>	10			90				90		90			90					40	100				
<i>S. aureus</i>	687	22	89	22	89	89	100	89	92			65	69	100	90	90	95	100	100	100	99	100	
<i>S. aureus</i> Meticilina Resistente	76	0	0	0	0	0	100	0	80			37	61	100	39	41	80	100	100	100	96	99	
<i>S. aureus</i> Meticilina Sensible	611	25	100	25	100	100	100	100	94			68	70	100	96	96	96	100	100	100	99	100	
<i>S. epidermidis</i>	154	0	27	8	27	27	100	27	46			25	54	86	44	47	83	100		99	89	65	
<i>S. hominis</i>	19		58	26	58	58	100	58	79			53	58	89	79	79	100	100		100	63	95	
<i>S. lugdunensis</i>	38	49	89	49	89	89	100	89	92			78	84	100	95	95	95	100		100		100	
<i>Staphylococcus</i>	22		76	35	75	79	100	79	90			90	85	100	90	90	95	100		95	32	100	
<i>Streptococcus</i>	15	100											82		92		75						
<i>Streptococcus agalactiae</i>	18	100		100								47		100	94		18						
<i>Streptococcus</i> <i>er. amninosus</i>	140	100		100		100						55	62		100		73						
<i>Streptococcus</i> <i>er. mitis</i>	16	94				100							94										
<i>Streptococcus</i> <i>er. sanguinis</i>	13	83		70		100							83										
<i>Streptococcus pyogenes</i>	58	100										86	87	98	98		55						

Bacterias de crecimiento dificultoso

Microorganismos	Probados	PEN	AMP	AMC	CTX	MER	ERM	AZI	CC	LNZ	LEV	CIP	MOX	VAN
<i>Haemophilus influenzae</i>	70		69		100			37			100			
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	37	100			100	100	52		80	100			100	

Bacterias Anaerobias

Microorganism	Probados	PEN	PZT	MER	CC	MTZ	VAN
<i>Bacteroides fragilis</i> <i>er.</i>	24	17	74	96	71	87	
<i>BGN anaerobio</i>	10	50		100	40		
<i>BGP anaerobio</i>	10	90			40		
<i>CGP anaerobio</i>	10		100	100	80		
<i>Cutibacterium acnes</i>	46	93	100	100	89	7	100

Entre 85-100% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición
Entre 75-84% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición
Entre 0-74% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Se han seleccionado los primeros aislados de cada tipo de muestra de un paciente
Se han descartado los aislamientos repetidos de un mismo paciente y tipo de muestra en un periodo de 30 días
Se presentan datos de especies, generos o grupos con al menos 10 aislados

Aislamientos HUVN de muestras respiratorias bacilos Gram negativos, positivas y de crecimiento dificultoso



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias
SERVICIO ASISTENCIAL DE SALUD

Informe de Sensibilidades en porcentajes Aislamientos de Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Bacterias Gram negativas

Año 2024

SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

AMC: amoxicilina/clavulanico
AMK: amikacina
AMP: ampicilina
AMS: ampicilina/sulbactam
AZM: aztreonam
AZT: azitromicina
BLEE: b-lactamasa espectro ampliado
CAZ: ceftazidima
CC: clindamicina
CBP: ceftobiprole
CFD: cefiderocol
CFX: cefuroxima
CFZ: cefazolina
CIP: ciprofloxacina
CLA: clartromicina
CM: cloranfenicol
COL: colistina
CTX: cefotaxima
CTR: ceftarolina
CX: cloxacilina
CXM: cefixima
CIA: ceftazidima/avibactam
C/T: ceftolozano/tazobactam
DAP: daptomicina
ERM: eritromicina
FEP: cefepima
FOS: fosfomicina
FOX: cefoxitina
GM: gentamicina
G600: gentamicina 600
IMP: imipenem
LEV: levofloxacina
LNZ: linezolid
MOX: moxifloxacina
MER: meropenem
MTZ: metronidazol
NF: nitrofurantoina
NOR: norfloxacina
ORL: ofloxacina
PEN: penicilina
PIT: piperacilina/tazobactam
RIF: rifampicina
S1000: estreptomina 1000
SXT: cotrimoxazol
TEI: telicoplanina
TET: tetraciclina
TIG: tigeciclina
TOB: tobramicina
VAN: vancomicina

Microorganismos	Probados	AMP	AMC	PIT	CFX	CTX	CAZ	C/A	C/T	FEP	AZM	BLEE	IMP	MER	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	COL	TIG	SXT
<i>Achromobacter</i>	21			95									95									67
<i>E. coli</i>	72	28	64	99	83	83	86			83	85	15	100	100	58	56	86	83	96		100	65
<i>E. coli BLEE</i>	11	0	45	100	0	0	18			0	9	100	100	100	18	10	73	64	91		100	45
<i>En. cloacae</i>	13	8	77	54	62	69				85	58	0	92	92	85	85	92	92	92		100	77
<i>En. hormaechei</i>	29	0	71	34	52	66	95	74		83	66	0	97	97	93	93	93	90	97	95	100	86
<i>K. aerogenes</i>	10	0	80		80	80				100	80	0	100	100	100	100	100	100	100		100	100
<i>K. oxytoca</i>	23	91	91	83	96	100				96	91	4	100	100	91	91	100	100	100		100	91
<i>K. pneumoniae</i>	59	49	73	64	71	73				75	75	19	93	95	69	68	81	73	98	97	96	75
<i>K. pneumoniae BLEE</i>	11	0	30	0	0	9				9	9	100	91	100	18	10	45	18	100			18
<i>Proteus mirabilis</i>	19	47	74	100	100	100				100	100	0		100	95	95	79	84	95			74
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	294		88		0	89	95	96		87	90	0	84	90	75	76		89	90	97		0
<i>Serratia marcescens</i>	48	0	88	0	67	75				98	79	0	100	100	92	91	94	0	0			98
<i>Stenotrophomonas</i>	72														82							97

Bacterias Gram positivas

Microorganismos	Probados	PEN	CX	AMP	AMC	CTX	CBP	CTR	IMP	GM	S1000	ERM	CC	LNZ	LEV	CIP	TET	VAN	TEI	DAP	FOS	SXT	NF
<i>Corynebacterium</i>	10	90											30					100					
<i>E. faecalis</i>	23		100					100		65				100	53			100	100	100			0
<i>S. aureus</i>	255	26	90	26	90	90		100	90	92		52	57	100	87	86	94	100	100	99	99	100	
<i>S. aureus Meticilina Resistente</i>	26	0	0	0	0	0		96	0	77		62	69	100	27	27	88	96	96	96	100	96	
<i>S. aureus Meticilina Sensible</i>	229	29	100	29	100	100		100	100	94		51	56	100	94	93	95	100	100	100	99	100	
<i>Streptococcus agalactiae</i>	10	100										30		100									
<i>Streptococcus pyogenes</i>	187	100										94	95										
<i>Turicella</i>	24	96								100		54	100					100					

Bacterias de crecimiento dificultoso

Microorganismos	Probados	PEN	AMP	AMC	CTX	MER	ERM	AZI	CC	LNZ	LEV	CIP	MOX	VAN
<i>Haemophilus influenzae</i>	323	85			100	100	33				95			
<i>Moraxella catarrhalis</i>	72		100	100		74	75				99			
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	60	92			100	100	73	77	100			100		

Aislamientos HUVN de orina bacilos Gram negativos y bacterias Gram positivas



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias
REGIÓN ANDALUZA DE SALUD

Informe de Sensibilidades en porcentajes

Aislamientos de Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Año 2024



AMC: amoxicilina/clavulánico
AMK: amikacina
AMP: ampicilina
AMS: ampicilina/sulbactam
AZM: aztreonam
AZT: azitromicina
BLEE: β-lactamasa espectro ampliado
CAZ: ceftazidima
CC: clindamicina
CBP: cefotaxima
CFD: cefiderocol
CFX: cefuroxima
CFZ: cefazolina
CIP: ciprofloxacina
CLA: claritromicina
CM: cloranfenicol
COL: colistina
CTX: cefotaxima
CTR: ceftarolina
CX: cloxacilina
CXM: cefixima
CIA: ceftazidima/avibactam
C/T: ceftiozono/tazobactam
DAP: daptoicina
ERM: eritromicina
FEP: cefepima
FOS: fosfomicina
FOX: cefoxitina
GM: gentamicina
G600: gentamicina 600
IMP: imipenem
LEV: levofloxacina
LNZ: linezolid
MOX: moxifloxacina
MER: meropenem
MTZ: metronidazol
NF: nitrofurantoina
NOR: norfloxacina
OFL: ofloxacina
PEN: penicilina
PIT: piperacilina/tazobactam
RIP: rifampicina
S1000: estreptomicina 1000
SXT: cotrimoxazol
TEI: telcicaplanina
TET: tetraciclina
TIG: tigeciclina
TOB: tobramicina
VAN: vancomicina

Gram negativos

Tipo de muestra: Orina

Microorganismos	Probados	AMP	AMC	PIT	CFX	CTX	CAZ	FEP	AZM	BLEE	IMP	MER	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	COL	SXT	FOS	NF
<i>Citrobacter</i>	59		81	100	85	97	100	100	98	0	100	100	98	100	98	98	100	96	93	98	
<i>Citrobacter freundii</i>	48		5	76	59	60	62	90	70	0	90	98	78	76	96	82	91	95	75	100	
<i>Citrobacter koseri</i>	13			92			92				100		92	92	92		92		92		
<i>E. coli</i>	3995	43	63	95	84	88	89	89	88	11	100	100	73	72	87	83	97	95	72	87	99
<i>E. coli BLEE</i>	443	1	37	89	2	1	18	6	5	100	100	100	20	12	67	51	90	92	37	80	99
<i>En. cloacae</i>	134		3	73	30	60	65	79	64	0	99	99	92	91	93	90	98	84	88	85	
<i>En. hormaechei</i>	24		6	54	33	65	54	81	71	0	93	100	100	96	92	93	96	92	79		
<i>K. aerogenes</i>	73		3	79	56	66	69	92	72	1	100	100	93	94	97	98	99	88	99	89	
<i>K. oxytoca</i>	114		89	94	79	95	96	98	93	5	99	100	88	88	96	92	97	92	90	61	95
<i>K. pneumoniae</i>	1002		72	84	77	83	83	84	83	14	98	98	80	79	89	85	98	85	79	79	
<i>K. pneumoniae BLEE</i>	133		35	64	3	3	8	7	6	100	98	98	34	16	58	41	96	88	21	26	77
<i>Morganella</i>	64		2	98	2	76	83	98	75	0	98	100	61	67	81	86	100	0	70	51	
<i>Proteus</i>	21		72	100	0	95	100	100	100	0	94	100	88	71	90	94	100	0	76	38	
<i>Proteus mirabilis</i>	377	60	84	98	94	94	98	97	95	3	100	100	78	64	72	65	85	0	66	6	
<i>Providencia</i>	17		7	94		81	82	93	92	0	100	100	33	29		7	88	0	94	7	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	268			87		0	89	91	92	0	82	95	80	83		93	95	95	0		
<i>Serratia marcescens</i>	22		0	86	0	50	64	95	62	0	100	100	86	86	95	10	10	5	100	0	

Gram positivos

Microorganismos	Probados	PEN	CX	AMP	AMC	GM	ERM	CC	LNZ	LEV	CIP	TET	VAN	TEI	DAP	FOS	SXT	NF
<i>Aerococcus</i>	37			95						81								92
<i>E. faecalis</i>	852			100					98	75	96		100	100	100			97
<i>E. faecium</i>	185			10					89	14			99	100				91
<i>S. aureus</i>	70	27	83	26	81	96	61	98	100	77	79	90	100	99	100	95	100	
<i>S. aureus Meticilina Resistente</i>	13	0	0	0	0	85	50		100	15	17	83	100	100	100	85	100	
<i>S. aureus Meticilina Sensible</i>	57	33	100	32	100	98	63	100	100	91	94	92	100	98	100	98	100	
<i>S. saprophyticus</i>	119	1	96	83	96	98	50	87	99	99	98	86	99	99	99	1	97	100
<i>Streptococcus agalactiae</i>	159	100		100			57		99	97		16	100					
<i>Streptococcus gr bovis</i>	41	100		100														

Entre 85-100% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición
Entre 75-84% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición
Entre 0-74% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Se han seleccionado los primeros aislados de cada tipo de muestra de un paciente
Se han descartado los aislamientos repetidos de un mismo paciente y tipo de muestra en un periodo de 30 días
Se presentan datos de especies, generos o grupos con al menos 10 aislados

Aislamientos S Hematología bacilos Gram negativos y bacterias Gram positivas

Informe de Sensibilidades en porcentajes

Aislamientos de Hematología

Bacterias Gram negativas

Año 2024

SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

Microorganismos	Probados	AMP	AMC	PIT	CFX	CTX	CAZ	C/A	C/T	FEP	AZM	BLEE	IMP	MER	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	COL	TIG	SXT
<i>Aeromonas</i>	6	0			50		50			83	50	0	83		50	40						50
<i>Campylobacter</i>	6															0						
<i>E. coli</i>	38	24	64	97	88	85	87	100	100	81	88	12	100	100	54	51	89	89	97	100	100	32
<i>K. pneumoniae</i>	21		67	71	57	78	76	67	75	75	76	6	83	85	50	45	81	72	100	69		52
<i>Proteus mirabilis</i>	5	40		80		80	100					20			20	60	80					0
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	11			82		0	73	80	83	73	100	0	50	73	55	60	100	73	100			0
<i>Stenotrophomonas</i>	6																					100

Bacterias Gram positivas

Microorganismos	Probados	PEN	CX	AMP	AMC	CTX	CBP	CTR	IMP	GM	S1000	ERM	CC	LNZ	LEV	CIP	TET	VAN	TEI	DAP	FOS	SXT	NF
<i>E. faecalis</i>	22		100						100		38			100	75	100		100	100	95			89
<i>E. faecium</i>	23		0					0		5				87	0			100	100	82			91
<i>S. aureus</i>	5	40																					
<i>S. epidermidis</i>	6	0	0	0	0	0		0		17		0	33	33	17	17	83	100		100	100	50	

Bacterias de crecimiento dificultoso

Microorganismos	Probados	PEN	AMP	AMC	CTX	MER	ERM	AZI	CC	LNZ	LEV	CIP	MOX	VA
<i>Haemophilus influenzae</i>	6	67			100	100		40				100		

Entre 85-100% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 75-84% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 0-74% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Se presentan datos de antibióticos si fueron probados en al menos el 50% de los aislados

Cuando el número de cepas es inferior a 30 el porcentaje obtenido tiene escaso valor estadístico

Han sido agrupados microorganismos sensibles y sensibles, cuando se incrementa la exposición, según recomendaciones de EUCAST

Se han seleccionado los primeros aislados de cada tipo de muestra de un paciente

Se han descartado los aislamientos repetidos de un mismo paciente y tipo de muestra en un periodo de 30 días

Se presentan datos de especies, generos o grupos con al menos 10 aislados

Mecanismos de resistencia S. Hematología

Especie	BLEE Nº %	OXA Nº %	KPC Nº %	VIM Nº %	IMP Nº %	NDM Nº %	MDR Nº %	XDR Nº %	PDR Nº %	SARM Nº %
<i>Aeromonas hydrophila</i>				1 (50)						
<i>Citrobacter freundii</i>		3 (75)	2 (50)	2 (50)		1 (25)				
<i>Enterobacter cloacae</i>		2 (50)								
<i>Enterobacter hormaechei</i>		1 (33,33)								
<i>Enterobacter kobei</i>			1 (50)							
<i>Escherichia coli</i>	4 (10,52)									
<i>Klebsiella oxytoca</i>	1 (33,33)									
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	2 (9,52)	2 (9,52)				2 (9,52)				
<i>Proteus mirabilis producto</i>	1 (100)									
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>				2 (18,18)			3 (30)	2 (20)	0 (0)	
<i>Staphylococcus aureus</i>										3 (60)

Aislamientos S. Medicina Interna bacilos Gram negativos y bacterias Gram positivas

Informe de Sensibilidades en porcentajes Aislamientos de Medicina Interna Bacterias Gram negativas

Año 2024

SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

AMC: amoxicilina/clavulánico
AMK: amikacina
AMP: ampicilina
AMS: ampicilina/sulbactam
AZM: aztreonam
AZT: azitromicina
BLEE: b-lactamasa espectro ampliado
CAZ: ceftazidima
CC: clindamicina
CBP: ceftobiprole
CFD: cefiderocol
CFK: cefuroxima
CFZ: ceftazidina
CIP: ciprofloxacina
CLA: clartromicina
CM: cloranfenicol
COL: colistina
CTX: cefotaxima
CTR: ceftazidina
CX: cloxacilina
CXM: cefixima
CIA: ceftazidima/avibactam
C/T: ceftiozono/tazobactam
DAP: daptomicina
ERM: eritromicina
FEP: cefepima
FOS: fosfomicina
FOX: cefoxitina
GM: gentamicina
G600: gentamicina 600
IMP: imipenem
LEV: levofloxacina
LNZ: linezolid
MOX: moxifloxacina
MER: meropenem
MTZ: metronidazol
NF: nitrofurantoina
NOR: norfloxacina
OFL: ofloxacina
PEN: penicilina
PIT: piperacilina/tazobactam
RIF: rifampicina
S1000: estreptomicina 1000
SXT: cotrimoxazol
TEI: telicoplanina
TET: tetraciclina
TIG: tigeciclina
TOB: tobramicina
VAN: vancomicina

Microorganismos	Probados	AMP	AMC	PIT	CFX	CTX	CAZ	C/A	C/T	FEP	AZM	BLEE	IMP	MER	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	COL	TIG	SXT
<i>Campylobacter</i>	6															0						
<i>E. coli</i>	124	31	54	94	70	73	75	73	100	75	73	23	97	97	58	55	74	72	94	98	100	65
<i>E. coli BLEE</i>	28	0	20	96	0	0	11			4	0	100	100	100	20	8	54	40	89	100	100	39
<i>En. cloacae</i>	15		0	43	27	31	29			64	44	0	100	100	64	60	87	73	93	80		80
<i>En. hormaechei</i>	6		0	50	0	50	67	80	60	60	60	0	80	100	80	83	100	80	100	60		83
<i>K. aerogenes</i>	6		0	80	40	33	40			80	60	0	100	100	80	83	100	100	100			100
<i>K. oxytoca</i>	11		73	82	27	82	80			82	75	9	91	100	82	82	91	82	91	62	100	100
<i>K. pneumoniae</i>	73		43	57	47	53	54	86	55	56	49	26	86	88	61	57	67	60	97	77	92	59
<i>K. pneumoniae BLEE</i>	18		31	47	6	6	6	100	40	12	8	100	87	94	47	15	39	33	94	60		17
<i>Morganella</i>	6		0	83	0	83	83			83		0	100		60	67	100	100	100	0		67
<i>Proteus mirabilis</i>	25	72	84	100	100	100	100			100	88	0		100	88	76	72	67	92	0		80
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	85			84		0	80	94	94	83	88	0	73	89	77	80	67	92	94	91		0
<i>Stenotrophomonas</i>	15														80						88	100

Bacterias Gram positivas

Microorganismos	Probados	PEN	CX	AMP	AMC	CTX	CBP	CTR	IMP	GM S1000	ERM	CC	LNZ	LEV	CIP	TET	VAN	TEI	DAP	FOS	SXT	NF
<i>E. faecalis</i>	64			100					95	61			100	69	93		100	100	100			76
<i>E. faecium</i>	51			8					18	33			86	8	42		100	100	97			89
<i>S. aureus</i>	35	24	71	24	69	69	80	100	69	80		83	86	100	63	62	90	100	97	100	97	100
<i>S. aureus Meticilina Resistente</i>	10	0	0	0	0	0		100	0	56		78	78	100	0	0	89	100	89	100	100	100
<i>S. aureus Meticilina Sensible</i>	25	35	100	35	100	100		100	100	90		85	90	100	90	90	90	100	100	100	95	100
<i>S. epidermidis</i>	24	0	4	4	4	4		100	4	42		12	38	71	38	42	62	100	92	100	92	62
<i>S. hominis</i>	7	0	0	0	0	0			0	43		0	29	100	14	17	100	100		100	17	71

Bacterias de crecimiento dificultoso

Microorganismos	Probados	PEN	AMP	AMC	CTX	MER	ERM	AZI	CC	LNZ	LEV	CIP	MOX	VAN
<i>Haemophilus influenzae</i>	9		100		100	100		33				56		

Mecanismos de resistencia S. Medicina Interna

Especie	BLEE Nº %	OXA Nº %	KPC Nº %	VIM Nº %	IMP Nº %	NDM Nº %	MDR Nº %	XDR Nº %	PDR Nº %	SARM Nº %
<i>Aeromonas caviae</i>				1 (100)						
<i>Enterobacter asburiae</i>				1 (100)						
<i>Enterobacter hormaechei</i>		1 (16,66)	1 (16,66)							
<i>Escherichia coli</i>	28 (22,58)					2 (1,61)				
<i>Klebsiella oxytoca</i>	1 (9,09)									
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	18 (24,65)	17 (23,28)				3 (4,1)				
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>							10 (12,34)	4 (4,93)	0 (0)	
<i>Staphylococcus aureus</i>										10 (28,57)

Aislamientos S. Neumología bacilos Gram negativos, bacterias Gram positivas y crecimiento dificultoso



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

Informe de Sensibilidades en porcentajes

Aislamientos de Neumología

Bacterias Gram negativas

Año 2024

SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

Microorganismos	Probados	AMP	AMC	PIT	CFX	CTX	CAZ	C/A	C/T	FEP	AZM	BLEE	IMP	MER	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	COL	TIG	SXT
<i>Achromobacter</i>	8			88										100								75
<i>E. coli</i>	15	53	73	93	87	86	87			86	92	14	100	100	43	38	73	64	87	71	100	67
<i>K. pneumoniae</i>	8		83	86	83	88	88			100	100	0	100	88	100	86	100	100	100		100	75
<i>Proteus mirabilis</i>	10	70	89	100	78	90	100			100	89	10		100	100	80	60	56	90	0		80
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	53			92		0	92	98	100	86	92	0	91	96	74	75		88	85	98		0
<i>Serratia marcescens</i>	5		0	100	0	80	80			100	100	0	100	100	100	100	100	0	0			100
<i>Stenotrophomonas</i>	14														80					100		93

Bacterias Gram positivas

Microorganismos	Probados	PEN	CX	AMP	AMC	CTX	CBP	CTR	IMP	GM	S1000	ERM	CC	LNZ	LEV	CIP	TET	VAN	TEI	DAP	FOS	SXT	NF
<i>E. faecalis</i>	5			100						80				100	60			100	100	100			40
<i>E. faecium</i>	6			0						0				100				83	100				
<i>S. aureus</i>	45	32	91	32	91	91		100	91	93		51	49	100	93	91	98	100	100	100	100	100	100
<i>S. aureus Meticilina Sensible</i>	41	35	100	35	100	100		100	100	98		51	54	100	95	92	100	100	100	100	100	100	100
<i>Streptococcus agalactiae</i>	5													100				100					

Bacterias de crecimiento dificultoso

Microorganismos	Probados	PEN	AMP	AMC	CTX	MER	ERM	AZI	CC	LNZ	LEV	CIP	MOX	VAN
<i>Haemophilus influenzae</i>	40		72		100	100		19			90		75	
<i>Moraxella catarrhalis</i>	8			100	100		62	50			100			
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	9	100			100	100	56	67	100			100	100	

Entre 85-100% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 75-84% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 0-74% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Se presentan datos de antibióticos si fueron probados en al menos el 50% de los aislados

Quando el número de cepas es inferior a 30 el porcentaje obtenido tiene escaso valor estadístico

Han sido agrupados microorganismos sensibles y sensibles, cuando se incrementa la exposición, según recomendaciones de EUCAST

Se han seleccionado los primeros aislados de cada tipo de muestra de un paciente

Se han descartado los aislamientos repetidos de un mismo paciente y tipo de muestra en un periodo de 30 días

Se presentan datos de especies, generos o grupos con al menos 10 aislados

Mecanismos de resistencia S. Neumología

Especie	BLEE Nº %	OXA Nº %	KPC Nº %	VIM Nº %	IMP Nº %	NDM Nº %	MDR Nº %	XDR Nº %	PDR Nº %	SARM Nº %
<i>Enterobacter hormaechei</i>				1 (25)						
<i>Enterobacter sp.</i>				1 (100)						
<i>Escherichia coli</i>	2 (13,33)									
<i>Klebsiella pneumoniae</i>			1 (12,5)							
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>							2 (4,08)	1 (2,04)	0 (0)	
<i>Staphylococcus aureus</i>										4 (8,88)

Aislamientos S. Neurología



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias
SERVICIO ASISTENCIAL DE SALUD

Informe de Sensibilidades en porcentajes

Aislamientos de Neurología

Bacterias Gram negativas

Año 2024

SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

AMC: amoxicilina/clavulanico
AMK: amikacina
AMP: ampicilina
AMS: ampicilina/sulbactam
AZM: aztreonam
AZT: aztreonam
BLEE: b-lactamasa espectro ampliado
CAZ: ceftazidima
CC: clindamicina
CBP: ceftiofurolo
CFD: cefiderocol
CFX: cefuroxima
CFZ: ceftazidima
CIP: ciprofloxacina
CLA: clarithromicina
CM: cloranfenicol
COL: colistina
CTX: cefotaxima
CTR: ceftriaxona
CX: cloxacilina
CXM: cefixima
CIA: ceftazidima/avibactam
C/T: ceftiofurolo/tazobactam
DAP: daptoicina
ERM: eritromicina
FEP: cefepima
FOS: fosfomicina
FOX: cefoxitina
GM: gentamicina
G600: gentamicina 600
IMP: imipenem
LEV: levofloxacina
LNZ: linezolid
MOX: moxifloxacina
MER: meropenem
MTZ: metronidazol
NF: nitrofurantoina
NOR: norfloxacina
OFL: ofloxacina
PEN: penicilina
PIT: piperacilina/tazobactam
RIF: rifampicina
S1000: estreptomicina 1000
SXT: cotrimoxazol
TEI: telicoplanina
TET: tetraciclina
TIG: tigeciclina
TOB: tobramicina
VAN: vancomicina

Microorganismos	Probados	AMP	AMC	PIT	CFX	CTX	CAZ	C/A	C/T	FEP	AZM	BLEE	IMP	MER	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	COL	TIG	SXT
<i>E. coli</i>	37	35	55	97	77	82	86			87	86	14	100	100	79	71	89	86	100	92		78
<i>E. coli BLEE</i>	6	0		100			17					100		100		0	100		100			67
<i>K. pneumoniae</i>	12		91	92	91	91	83			91	90	8	100	100	91	83	92	91	100	50		83
<i>Proteus mirabilis</i>	8	50	71	88	86	100	100			100	100	0		100	100	75	75	43	75			50
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	15			73		0	80	80	83	86	79	0	93	93	93	100		93	93	92		0

Bacterias Gram positivas

Microorganismos	Probados	PEN	CX	AMP	AMC	CTX	CBP	CTR	IMP	GM	S1000	ERM	CC	LNZ	LEV	CIP	TET	VAN	TEI	DAP	FOS	SXT	NF
<i>E. faecalis</i>	13			100					100		69			100	100	100		100	100	100		100	
<i>S. aureus</i>	6	17	100	17	100	100		100	100	83		50	67	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<i>S. aureus Meticilina Sensible</i>	6	17	100	17	100	100		100	100	83		50	67	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Entre 85-100% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 75-84% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 0-74% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Se presentan datos de antibióticos si fueron probados en al menos el 50% de los aislados

Cuando el número de cepas es inferior a 30 el porcentaje obtenido tiene escaso valor estadístico

Han sido agrupados microorganismos sensibles y sensibles, cuando se incrementa la exposición, según recomendaciones de EUCAST

Se han seleccionado los primeros aislados de cada tipo de muestra de un paciente

Se han descartado los aislamientos repetidos de un mismo paciente y tipo de muestra en un periodo de 30 días

Se presentan datos de especies, generos o grupos con al menos 10 aislados

Mecanismos de resistencia S. Neurología

Especie	BLEE Nº %	OXA Nº %	KPC Nº %	VIM Nº %	IMP Nº %	NDM Nº %	MDR Nº %	XDR Nº %	PDR Nº %	SARM Nº %
<i>Enterobacter asburiae</i>				2 (100)						
<i>Escherichia coli</i>	6 (16,21)									
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	1 (8,33)	1 (8,33)								
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>					1 (6,66)		2 (16,66)	0 (0)	0 (0)	

Aislamientos S. Oncología



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias
SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

Informe de Sensibilidades en porcentajes

Aislamientos de Oncología

Bacterias Gram negativas

Año 2024

SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

AMC: amoxicilina/clavulanico
AMK: amikacina
AMP: ampicilina
AMS: ampicilina/sulbactam
AZM: aztreonam
AZT: azitromicina
BLEE: b-lactamasa espectro ampliado
CAZ: ceftazidima
CC: clindamicina
CBP: ceftolozan/prole
CFD: cefiderocol
CFX: cefturoxima
CFZ: ceftazolin
CIP: ciprofloxacina
CLA: clartromicina
CM: clarafenicol
COL: colistina
CTX: cefotaxima
CTR: ceftriaxona
CX: cloxacilina
CXM: cefixima
CIA: ceftazidima/avibactam
C/T: ceftolozano/tazobactam
DAP: daptomicina
ERM: eritromicina
FEP: cefepima
FOS: fosfomicina
FOX: ceftoxima
GM: gentamicina
G600: gentamicina 600
IMP: imipenem
LEV: levofloxacina
LNZ: linezolid
MOX: moxifloxacina
MER: meropenem
MTZ: metronidazol
NIP: nitrofurantoina
NOR: norfloxacina
OFL: ofloxacina
PEN: penicilina
PIT: piperacilina/tazobactam
RIF: rifampicina
S1000: estreptomicina 1000
SXT: cotrimoxazol
TEI: telicoplanina
TET: tetraciclina
TIG: tigeciclina
TOB: tobramicina
VAN: vancomicina

Microorganismos	Probados	AMP	AMC	PIT	CFX	CTX	CAZ	C/A	C/T	FEP	AZM	BLEE	IMP	MER	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	COL	TIG	SXT
<i>Citrobacter freundii</i>	5	20	60	20	40	40				60	60	0	80	100	80	100	100	80				80
<i>E. coli</i>	61	33	56	93	75	88	92	100	100	91	89	12	100	100	72	72	82	77	98	100	96	69
<i>E. coli BLEE</i>	8	0	25	88	0	0	38			33	29	100	100	100	25	14	75	38	88	100		38
<i>K. pneumoniae</i>	22		76	81	80	81	82			81	79	14	100	100	86	86	86	85	90	94	100	81
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	18			83		0	83	91	92	83	94	0	67	89	89	94		89	100	94		0

Bacterias Gram positivas

Microorganismos	Probados	PEN	CX	AMP	AMC	CTX	CBP	CTR	IMP	GM S1000	ERM	CC	LNZ	LEV	CIP	TET	VAN	TEI	DAP	FOS	SXT	NF
<i>E. faecalis</i>	16			100					100	73			100	33	100		100	100	100			71
<i>E. faecium</i>	17			6						31			76	40			94	100	100			86
<i>S. aureus</i>	23	14	96	14	95	95		100	95	100		64	68	100	86	86	100	100	95	100	100	100
<i>S. aureus Meticilina Sensible</i>	22	14	100	14	100	100		100	100	100		62	67	100	90	90	100	100	95	100	100	100

Entre 85-100% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 75-84% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 0-74% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Se presentan datos de antibióticos si fueron probados en al menos el 50% de los aislados

Cuando el número de cepas es inferior a 30 el porcentaje obtenido tiene escaso valor estadístico

Han sido agrupados microorganismos sensibles y sensibles, cuando se incrementa la exposición, según recomendaciones de EUCAST

Se han seleccionado los primeros aislados de cada tipo de muestra de un paciente

Se han descartado los aislamientos repetidos de un mismo paciente y tipo de muestra en un periodo de 30 días

Se presentan datos de especies, generos o grupos con al menos 10 aislados

Mecanismos de resistencia S. Oncología

Mecanismos de resistencia

Año 2024

Aislamientos de Oncología

SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

Especie	BLEE Nº %	OXA Nº %	KPC Nº %	VIM Nº %	IMP Nº %	NDM Nº %	MDR Nº %	XDR Nº %	PDR Nº %	SARM Nº %
<i>Citrobacter freundii</i>		1 (20)	1 (20)	1 (20)						
<i>Enterobacter hormaechei</i>		1 (33,33)								
<i>Escherichia coli</i>	8 (13,11)									
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	3 (13,63)									
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>					1 (5,55)		2 (12,5)	1 (6,25)	0 (0)	
<i>Staphylococcus aureus</i>										1 (4,34)

Aislamientos S. Cuidados Críticos hospital general

Informe de Sensibilidades en porcentajes

Aislamientos de Cuidados Críticos HG

Bacterias Gram negativas

Año 2024

SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

AMC: amoxicilina/clavulanico
AMK: amikacina
AMP: ampicilina
AMS: ampicilina/sulbactam
AZM: aztreonam
AZT: aztreonam
BLEE: b-lactamasa espectro ampliado
CAZ: ceftazidima
CC: cindamicina
CBP: cefepime
CFD: cefiderocol
CFX: cefuroxima
CFZ: ceftazidima
CIP: ciprofloxacina
CLA: clartromicina
CM: cloranfenicol
COL: colistina
CTX: cefotaxima
CTR: ceftazidima
CX: cloxacilina
CXM: cefixima
CIA: ceftazidima/avibactam
C/T: ceftiozono/tazobactam
DAP: daplofina
ERM: eritromicina
FEP: cefepime
FOS: fosomicina
FOX: cefoxitina
GM: gentamicina
G600: gentamicina 600
IMP: imipenem
LEV: levofloxacina
LNZ: linezolid
MOX: moxifloxacina
MER: meropenem
MTZ: metronidazol
NFR: nitrofurantoina
NOR: norfloxacina
OFL: ofloxacina
PEN: penicilina
PIT: piperacilina/tazobactam
RIF: rifampicina
S1000: estreptomicina 1000
SXT: cotrimoxazol
TEI: telicoplanina
TET: tetraciclina
TIG: tigeciclina
TOB: tobramicina
VAN: vancomicina

Microorganismos	Probados	AMP	AMC	PIT	CFX	CTX	CAZ	C/A	C/T	FEP	AZM	BLEE	IMP	MER	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	COL	TIG	SXT
<i>E. coli</i>	48	33	71	98	89	84	88	100	100	85	86	18	100	100	63	62	85	83	94	97	100	65
<i>E. coli BLEE</i>	8	0	80	100	0	38				17	17	100	100	100	0	0	88	67	75			50
<i>En. hormaechei</i>	7	0	17	0	14	14	100	43		71	14	0	100	100	71	71	100	100	100	100	100	71
<i>K. pneumoniae</i>	32	53	74	67	68	75	83	90		72	68	26	90	93	68	69	78	68	100	83	100	72
<i>K. pneumoniae BLEE</i>	8	12	71	0	0	25				12	12	100	88	100	12	12	50	12	100	80	100	12
<i>Proteus mirabilis</i>	9	33	75	100	86	100	100	100		100	100	0	100	100	100	100	56	88	100	0		89
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	36		86	0	83	100	100	86	91	0	86	94	92	89			83	97	100			0
<i>Serratia marcescens</i>	8	0	100	0	88	88				100	88	0	100	100	100	100	100	0	0			100
<i>Stenotrophomonas</i>	10														100							90

Bacterias Gram positivas

Microorganismos	Probados	PEN	CX	AMP	AMC	CTX	CBP	CTR	IMP	GM S1000	ERM	CC	LNZ	LEV	CIP	TET	VAN	TEI	DAP	FOS	SXT	NF
<i>E. faecalis</i>	21			100					93				100	83	100		100	100	100			76
<i>E. faecium</i>	11			0						0			91	14			100	100	88			
<i>S. aureus</i>	31	29	77	29	77	77	100	97	77	97		52	61	100	81	81	87	97	97	94	100	97
<i>S. aureus Meticilina Resistente</i>	7	0	0	0	0	0		86	0	100		14	71	100	29	29	86	86	86	86	100	100
<i>S. aureus Meticilina Sensible</i>	24	38	100	38	100	100	100	100	100	96		62	58	100	96	96	88	100	100	96	100	96
<i>S. epidermidis</i>	22	0	10	0	10	10		100	10	14		0	23	55	14	14	82	100	100	100	86	36

Bacterias de crecimiento dificultoso

Microorganismos	Probados	PEN	AMP	AMC	CTX	MER	ERM	AZI	CC	LNZ	LEV	CIP	MOX	VAN
<i>Haemophilus influenzae</i>	15		80		100	100		20			100	100		

Entre 85-100% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 75-84% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 0-74% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Se presentan datos de antibióticos si fueron probados en al menos el 50% de los aislados

Cuando el número de cepas es inferior a 30 el porcentaje obtenido tiene escaso valor estadístico

Han sido agrupados microorganismos sensibles y sensibles, cuando se incrementa la exposición, según recomendaciones de EUCAST

Se han seleccionado los primeros aislados de cada tipo de muestra de un paciente

Se han descartado los aislamientos repetidos de un mismo paciente y tipo de muestra en un periodo de 30 días

Se presentan datos de especies, generos o grupos con al menos 10 aislados

Mecanismos de resistencia S. Cuidados Críticos hospital general

Mecanismos de resistencia

Año 2024

Aislamientos de Cuidados Críticos HG

SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

Especie	BLEE Nº %	OXA Nº %	KPC Nº %	VIM Nº %	IMP Nº %	NDM Nº %	MDR Nº %	XDR Nº %	PDR Nº %	SARM Nº %
<i>Escherichia coli</i>	8 (16,66)									
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	8 (23,52)	4 (11,76)				3 (8,82)				
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>							3 (8,57)	1 (2,85)	0 (0)	
<i>Staphylococcus aureus</i>										7 (22,58)

Aislamientos S. Cuidados Críticos Neurotraumatología



Informe de Sensibilidades en porcentajes Aislamientos de Cuidados Críticos Neurotraumatología



Bacterias Gram negativas

Año 2024

SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

Microorganismos	Probados	AMP	AMC	PIT	CFX	CTX	CAZ	C/A	C/T	FEP	AZM	BLEE	IMP	MER	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	COL	TIG	SXT
<i>E. coli</i>	15	20	62	93	100	86	87		100	100	100	14	100	100	77	62	80	85	100	100	100	80
<i>En. hormaechei</i>	7	0	100		57	71	100			100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<i>K. aerogenes</i>	8	0	57		50	50	100	60	100	50	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<i>K. pneumoniae</i>	9	78	89		75	78	78			78	75	22	100	100	56	56	78	78	100	100		78
<i>Proteus mirabilis</i>	5	0	60	80	100	100	100			100	100	0	100	100	100	100	60	60	100			20
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	18		56		0	50	78	82	50	50	0	61	72	78	72		72	83	100			0
<i>Serratia marcescens</i>	6	0	83	0	67	83			100	83	0	100	100	83	80	83	0	0				100

Bacterias Gram positivas

Microorganismos	Probados	PEN	CX	AMP	AMC	CTX	CBP	CTR	IMP	GM	S1000	ERM	CC	LNZ	LEV	CIP	TET	VAN	TEI	DAP	FOS	SXT	NF
<i>E. faecalis</i>	11		100						100	100				100	83	100		100	100	100			89
<i>S. aureus</i>	27	30	81	30	81	81	100	81	85		67	74	100	85	85	96	100	100	100	100	100	100	
<i>S. aureus</i> Meticilina Resistente	5	0	0	0	0	0	100	0	80		60	80	100	40	40	100	100	100	100	100	100	100	
<i>S. aureus</i> Meticilina Sensible	22	36	100	36	100	100	100	100	86		68	73	100	95	95	95	100	100	100	100	100	100	
<i>S. epidermidis</i>	13	0	15	0	15	15	100	15	23		15	15	100	15	15	92	100		100		77	31	

Bacterias de crecimiento dificultoso

Microorganismos	Probados	PEN	AMP	AMC	CTX	MER	ERM	AZI	CC	LNZ	LEV	CIP	MOX	VA
<i>Haemophilus influenzae</i>	7	57			100	100		33				86		

Entre 85-100% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 75-84% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 0-74% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Se presentan datos de antibióticos si fueron probados en al menos el 50% de los aislados

Cuando el número de cepas es inferior a 30 el porcentaje obtenido tiene escaso valor estadístico

Han sido agrupados microorganismos sensibles y sensibles, cuando se incrementa la exposición, según recomendaciones de EUCAST

Se han seleccionado los primeros aislados de cada tipo de muestra de un paciente

Se han descartado los aislamientos repetidos de un mismo paciente y tipo de muestra en un periodo de 30 días

Se presentan datos de especies, generos o grupos con al menos 10 aislados

Mecanismos de resistencia S. Cuidados Críticos Neurotraumatología



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Mecanismos de resistencia

Año 2024



HOSPITAL UNIVERSITARIO
VIRGEN DE LAS ARAS

Aislamientos de Cuidados Críticos Neurotraumatología

SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

Especie	BLEE Nº %	OXA Nº %	KPC Nº %	VIM Nº %	IMP Nº %	NDM Nº %	MDR Nº %	XDR Nº %	PDR Nº %	SARM Nº %
<i>Escherichia coli</i>	2 (13,33)									
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	2 (22,22)									
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>					2 (11,11)		8 (44,44)	5 (27,77)	0 (0)	
<i>Staphylococcus aureus</i>										5 (18,51)

Aislamientos bacilos Gram negativos servicio Traumatología

Informe de Sensibilidades en porcentajes

Aislamientos de Traumatología

Año 2024

SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

Bacterias Gram negativas

Microorganismos	Probados	AMP	AMC	PIT	CFX	CTX	CAZ	C/A	C/T	FEP	AZM	BLEE	IMP	MER	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	COL	TIG	SXT
<i>E. coli</i>	167	38	56	93	83	88	89	100	100	88	89	12	100	100	67	68	86	82	97	95	100	74
<i>E. coli BLEE</i>	20	0	25	85	6	0	16			0	0	100	100	100	7	5	65	33	85	80	100	55
<i>En. cloacae</i>	5			80		60	60								100		80		100			100
<i>En. hormaechei</i>	18	0	83	50	72	83	100	78	83	83	0	94	100	100	100	100	94	100	100	92	100	94
<i>K. aerogenes</i>	5	0	80		60	80				100	100	0	100	100	100	100	80	100	100	80		100
<i>K. oxytoca</i>	7	100	100	86	100	100				100	100	0	100	100	100	100	100	100	100			86
<i>K. pneumoniae</i>	58	76	84	70	88	88	100	82	88	88	12	96	96	82	84	88	87	100		90	100	84
<i>K. pneumoniae BLEE</i>	6	0	50	0	0	0				0	0	100	67	80	0	0	0	0	100			0
<i>Morganella</i>	8	0	100	12	88	100				100	100	0	100	100	25	38	62	75	100	0		38
<i>Proteus mirabilis</i>	19	74	94	100	100	100	100	100	100	100	100	0		100	94	79	74	67	89	0		79
<i>Pseudomonas</i>	5		100			100				100		0	100	100	100	100		100	100	100		
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	48		83		0	90	97	100	85	94	0	79	96	77	81		91	94	98			0
<i>Serratia marcescens</i>	6	17	100	0	50	67				83	83	0	100	100	83	83	100	0	0			100
<i>Stenotrophomonas</i>	5														100							100

Bacterias Gram positivas

Microorganismos	Probados	PEN	CX	AMP	AMC	CTX	CBP	CTR	IMP	GM	S1000	ERM	CC	LNZ	LEV	CIP	TET	VAN	TEI	DAP	FOS	SXT	NF
<i>E. faecalis</i>	38		100					100		81				95	81	96		100	97	100			66
<i>E. faecium</i>	9		44							44				89				100	100	100			
<i>S. aureus</i>	97	27	92	27	92	92	100	100	92	91		67	72	100	93	92	97	100	100	100	98	100	
<i>S. aureus Meticilina Resistente</i>	8	0	0	0	0	0		100	0	88		50	62	100	50	38	88	100	100	100	88	100	
<i>S. aureus Meticilina Sensible</i>	89	30	100	30	100	100	100	100	100	91		69	73	100	97	97	98	100	100	100	99	100	
<i>S. epidermidis</i>	61	0	33	16	33	31		100	31	60		25	73	93	56	62	91	100	100	98	85	80	
<i>S. hominis</i>	14		79	36	79	79		91	79	93		50	71	100	93	93	93	100		100	50	100	
<i>S. lueddemansii</i>	10	67	89	67	89	89		100	89	89		89	89	100	100	100	100	100		100		100	
<i>Staphylococcus</i>	14	0	77	38	77	77		100	77	85		85	85	100	86	86	100	100	100	92	23	100	
<i>Streptococcus er aneinosus</i>	11	100		88		100						64		100		71							
<i>Streptococcus pyogenes</i>	8	100		100								100	100	100	100		33						

Servicio Traumatología mecanismos de resistencia

Mecanismos de resistencia

Año 2024

Aislamientos de Servicio de Traumatología

SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

Especie	BLEE Nº %	OXA Nº %	KPC Nº %	VIM Nº %	IMP Nº %	NDM Nº %	MDR Nº %	XDR Nº %	PDR Nº %	SARM Nº %
<i>Escherichia coli</i>	20 (11,97)									
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	6 (10,34)	4 (6,89)								
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>							4 (8,69)	1 (2,17)	0 (0)	
<i>Staphylococcus aureus</i>										8 (8,24)

Aislamientos S. Urología



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias
DEPARTAMENTO DE SALUD

Informe de Sensibilidades en porcentajes

Aislamientos de Urología

Bacterias Gram negativas

Año 2024

SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

AMC: amoxicilina/clavulánico
AMK: amikacina
AMP: ampicilina
AMS: ampicilina/sulbactam
AZM: aztreonam
AZT: aztreonam
BLEE: b-lactamasa espectro ampliado
CAZ: ceftazidima
CC: clindamicina
CBP: cefotaxima
CFD: cefiderocol
CFX: cefuroxima
CFZ: ceftazidima
CIP: ciprofloxacina
CLA: clartromicina
CM: cloranfenicol
COL: colistina
CTX: cefotaxima
CTR: ceftriaxona
CX: cloxacilina
CXM: cefixima
CIA: ceftazidima/avibactam
C/T: ceftiozono/tazobactam
DAP: daplofina
ERM: eritromicina
FEP: cefepima
FOS: fosfomicina
FOX: cefoxitina
GM: gentamicina
G600: gentamicina 600
IMP: imipenem
LEV: levofloxacina
LNZ: linezolid
MOX: moxifloxacina
MER: meropenem
MTZ: metronidazol
NF: nitrofurantoina
NOR: norfloxacina
OFL: ofloxacina
PEN: penicilina
PIT: piperacilina/tazobactam
RIF: rifampicina
S1000: estreptomicina 1000
SXT: cotrimoxazol
TEI: telicoplanina
TET: tetraciclina
TIG: tigeciclina
TOB: tobramicina
VAN: vancomicina

Microorganismos	Probados	AMP	AMC	PIT	CFX	CTX	CAZ	C/A	C/T	FEP	AZM	BLEE	IMP	MER	LEV	CIP	GM	TOB	AMK	COL	TIG	SXT
<i>Citrobacter freundii</i>	5	0	100	80	80	80				100	80	0	100	100	80	100	100	100				100
<i>E. coli</i>	99	42	59	98	76	81	89	100	100	80	76	18	100	100	57	56	89	75	97	94	100	71
<i>E. coli BLEE</i>	17	0	25	94	0	0	41			0	19	100	100	100	19	7	71	56	94	85		41
<i>En. cloacae</i>	6	0	50	0	17	50				80	33	0	100	100	83	83	83	83	100	100		83
<i>En. hormaechei</i>	5		0		0	0								80		80	80		100			60
<i>K. pneumoniae</i>	33	63	94	79	80	82				79	81	20	100	100	59	66	76	63	100	81	100	73
<i>K. pneumoniae BLEE</i>	6	17	100	0	0	0				0		100	100		17	0	0	0	100			0
<i>Morganella</i>	5	0	100	0	40	80				100		0	100		40	40	80	80	100	0		40
<i>Proteus mirabilis</i>	16	56	80	100	87	88	100			87	100	6		100	80	50	81	80	88	0		62
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	14		86		0	93	100			86	93	0	77	86	92	92		92	100	100		0

Bacterias Gram positivas

Microorganismos	Probados	PEN	CX	AMP	AMC	CTX	CBP	CTR	IMP	GM	S1000	ERM	CC	LNZ	LEV	CIP	TET	VAN	TEI	DAP	FOS	SXT	NF
<i>E. faecalis</i>	46		100					100		72				93	79	97		100	100	100			80
<i>E. faecium</i>	12		0							25				75	0			100	100	100			100
<i>S. aureus</i>	6	17	100	17	100	100		100	100			67		100	100	100	83	100	100	100	100	100	100
<i>S. aureus Meticilina Sensible</i>	6	17	100	17	100	100		100	100			67		100	100	100	83	100	100	100	100	100	100
<i>Streptococcus agalactiae</i>	5	100	100									40		100									
<i>Streptococcus gr anginosus</i>	5			100								100											

Entre 85-100% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 75-84% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Entre 0-74% aislamientos sensibles o sensibles cuando se incrementa la exposición

Se presentan datos de antibióticos si fueron probados en al menos el 50% de los aislados

Cuando el número de cepas es inferior a 30 el porcentaje obtenido tiene escaso valor estadístico

Han sido agrupados microorganismos sensibles y sensibles, cuando se incrementa la exposición, según recomendaciones de EUCAST

Se han seleccionado los primeros aislados de cada tipo de muestra de un paciente

Se han descartado los aislamientos repetidos de un mismo paciente y tipo de muestra en un periodo de 30 días

Se presentan datos de especies, generos o grupos con al menos 10 aislados

Mecanismos de resistencia S. Urología

Mecanismos de resistencia

Año 2024

Aislamientos de Servicio de Urología

SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

Especie	BLEE Nº %	OXA Nº %	KPC Nº %	VIM Nº %	IMP Nº %	NDM Nº %	MDR Nº %	XDR Nº %	PDR Nº %	SARM Nº %
<i>Enterobacter cloacae</i>					1 (20)					
<i>Enterobacter hormaechei</i>				1 (20)						
<i>Escherichia coli</i>	17 (17,17)									
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	6 (18,18)									
<i>Proteus mirabilis producto</i>	1 (100)									

Gráfico 1. Evolución de la sensibilidad a los antibióticos de *Escherichia coli*





Gráfico 2. Evolución de la sensibilidad a los antibióticos de *Klebsiella pneumoniae*

K. pneumoniae



K. pneumoniae BLEE





Gráfico 3. Evolución de la sensibilidad a los antibióticos de *K. oxytoca* y *K. aerogenes*

K. oxytoca



K. aerogenes




Gráfico 4. Evolución de la sensibilidad a los antibióticos de *Enterobacter cloacae*




Gráfico 5. Evolución de la sensibilidad a los antibióticos de *P. mirabilis* y *M. morganii*





Gráfico 6. Evolución de la sensibilidad a los antibióticos *P. aeruginosa*




Gráfico 7. Evolución de la sensibilidad a los antibióticos *Stenotrophomonas maltophilia*




Gráfico 8. Evolución sensibilidad a los antibióticos *Staphylococcus aureus* y *S. aureus* meticilin resistentes





Gráfico 9. Evolución de la sensibilidad a los antibióticos *Staphylococcus epidermidis* y *S. hominis*





Gráfico 10. Evolución de la sensibilidad a los antibióticos *Enterococcus faecalis* y *E. faecium*

