

ANTIBIOTICO	FORMA DE ADMINISTRACIÓN PARA ENFERMERÍA			ESTABILIDAD
	Catéter	Osmolaridad (mOsm/L); pH	Preparación	
AMIKACINA	CVPC >7d: LM	293-322 4.42-4.87	El vial viene reconstituido: 500 mg/2mL(1000mg/ml) Diluir en 100 mL de SSF.	24h a 25ºC Para SSF y SG a 25ºC 48h
AMPICILINA	CVPC >7d: LM	238-372 8-10	Reconstituir vial con 3ml API que viene con la ampolla Diluir en 50-100 de SF o SG5%	8h a 25ºC
ANFOTERICINA B LIPOSOMAL	CVPC >7d: LM	305-309 5.60-5.64	Reconstituir vial con 12 mL de API; agitar vigorosamente; extraer dosis e introducirla (utilizando filtro de 5 µm) en 250-500 mL de SG5%. (NO USAR SSF).	72h a 25ºC 7 días 2-8ºC
ANIDULAFUNGINA	CVPC >7d: LM	267-269 4.49-4.57	Reconstituir con 30 mL de API. Diluir en 100 mL de SSF.	Estable 48 h a 25º
AZTREONAM	CVPC >7d: LM	369-395 5.05-5.18	Reconstituir vial con 4 mL de API. Diluir en 100 mL de SSF.	Estable 48h a 25ºC 7d a 2-8ºC→ (proteger de la luz)
CASPOFUNGINA	CVPC >7d: LM	256-266 6.19-6.36	Reconstituir con 10,5 mL de API o SSF. Diluir en 100-250 ml de SSF. NO USAR SG5% ni SG.	Estable 24h a máximo 25ºC 48h a 2-8ºC →(proteger de la luz)
CEFAZOLINA	CVPC >7d: LM	315-326 4.94-5.04	Reconstituir vial con 10 ml de API Diluir en 50-100 ml de SF o SG5%	24h a 25ºC
CEFEPIMA	CVPC >7d: LM	396-581 4.1-4.3	Reconstituir vial con 10 mL de API o SSF. Diluir en 100 mL de SSF o SG.	Estable 48h a 25ºC
CEFIDEROCOL	CVPC >7d: LM	No datos 5.2-5.8	Para reconstituir un vial de 1 g extraer 10 mL(si es de 2g, 20 ml) de SF o SG5% de la bolsa de 100ml. Diluir en 100 mL de SSF o SG5%.	Vial reconstituido estable 1h a 25ºC. Dilución (20mg/ml) estable 6h a 25ºC, protegida de la luz. Estable 24h a 2-8ºC
CEFOTAXIMA	CVPC >7d: LM	339-411 5.26-5.41	Reconstituir el vial con el mismo diluyente. Diluir en 50-100 ml SF o SG5%	24h a 25ºC
CEFTAROLINA	CVPC >7d: LM	265 4.8-6.5	Reconstituir vial con 20 mL de API. Diluir en 250 mL de SSF, SGS o SG5%	Estable 6h a 25ºC 24h entre 2-8ºC
CEFTAZIDIMA	CVPC >7d: LM	311-341 6.61-6.95	Reconstituir vial con 10 mL de SSF. Diluir en 100 mL de SSF	Estable 24h a 25ºC
CEFTAZIDIMA/ AVIBACTAM	CVPC >7d: LM	362-386 6.66-6.73	Reconstruir vial con 10 mL de API. Diluir en 100 mL de SSF	Dilución estable 12h a25ºC, 24h a 2-8ªC.Vial reconstituido debe utilizarse inmediatamente
CEFTOBIPROLE	CVPC >7d: LM	No datos	Reconstituir con 10 mL de API. Diluir en 250 mL de SSF (2mg/ml)	Vial reconstituido estable 1h a 25ºC y 24h a 2-8ºC.Dilución estable 24h a 25ºC en SF, y 12h en SG5%. Estable 8h sin protección de la luz en SF y SG5%. Estable 96h a 2-8ºC protegido de la luz
CEFTOLOZANO/ TAZOBACTAM	CVPC >7d: LM	380-520 5.93-6.06	Reconstituir vial con 10 mL de API o SSF. Diluir en 100 mL de SSF	Estable 24h a 25ªC, 7 días refrigerada a 2-8ºC
CEFTRIAXONA	CVPC >7d: LM	310-494 6.66-6.72	Se reconstituye el vial con el mismo diluyente. Diluir en 50ml SF.Evitar diluyente que contengan Ca2+ NO USAR solución de Ringer lactato	Vial reconstituido 6h a 25ºC Dilución 48h a 25ºC
CEFUROXIMA	CVPC >7d: LM	322-365 6.04-6.81	Reconstituir vial de 750mg con 6ml de API Diluir en 50-100ml de SF o SG5%	Vial reconstituido estable 5h a 25ºC o 48h a 2-8ºC
CIPROFLOXACINO	CVPC >7d: LM	285-303 3.3-4.60	Viene diluido en 200 ml	14 días a 25ºC protegida de la luz
CLINDAMICINA	CVPC >7d: LM	308-350 6.27-6.81	Diluir la dosis en 100-250 ml de SF o SG5%. Máximo 1200mg en una sola dilución	24h a 25ºC
CLOXACILINA	CVPC >7d: LM	261-271 4.90	Reconstituir vial de 1 g con 20 mL de API. Diluir en 50-100 mL de SSF.	Estable 24h a 25ºC 72h si refrigera.
COLISTINA	CVPC >7d: LM	294-310 8.26-8.29	Reconstituir vial de 1MU con 2 mL de API Diluir en 100 mL de SSF	Una vez reconstituido y diluido en la bolsa debe utilizarse inmediatamente A 2-8ºC protegida de la luz estable 48h
DALBAVANCINA	CVPC	246 4.5	Reconstituir cada vial con 25 ml de API. Diluir en 100-250 ml de SG5% (NO USAR SSF)	Estable 48h a 2-8ºC y a 25ºC
DAPTOMICINA	CVPC >7d: LM	292-297 4.50-4.53	Reconstituir con SSF (350 mg/ 7 mL; 500mg/ 10 mL). Diluir en 100 ml de SSF. NO USAR SG5%.	Estable 12h a 25ºC y 2-8ºC
DELAFLOXACINO	CVPC >7d: LM	No datos	Reconstituir el vial con 10,5 ml de SF o SG5%. Diluir en 250ml de SF o SG5%	Estable 24h a 25ºC y 2-8ºC

ANTIBIOTICO	FORMA DE ADMINISTRACIÓN PARA ENFERMERÍA			ESTABILIDAD
	Tipo de catéter	Osmolaridad (mOsm/L); pH	Preparación	
ERTAPENEM	CVPC >7d: LM	314-395 7.76	Vía IV: Reconstituir vial con 10 mL de API o SSF. Diluir en 100 mL de SSF Vía IM: Reconstituir vial con 3ml de Lidocaína al 2%.	Estable 6h a 25°C y 24h a 4°C
FOSFOMICINA	LM	465-579 7.64-7.79	Reconstituir vial de 4g con 20 mL de API. Diluir en 250 ml de SG5%. (NO USAR SSF)	Estable 24h a 25°C y a 2-8 °C
GENTAMICINA	CVPC >7d: LM	307 4.62	El vial viene reconstituido. Diluir en 50-200ml de SF o SG5% y	Estable 48h a 25°C
IMIPENEM	CVPC >7d: LM	364-396 7.43-7.56	Reconstituir vial con 10 mL de SSF. Diluir dosis de 500 mg en 100 ml de SSF y 1g en 250 ml de SSF	Estable < de 4h a 25°C. 8h a 2-8°C
ISAVUCONAZOL	PICC	No datos 1.9-2.6	Reconstituir vial de 200 mg con 5 mL de API. Diluir en 250 mL de SSF o SG5%. Utilizar equipo de perfusión con filtro en línea (0,22 a 1,2 µm)	Estable 6h a 25°C, 24h a 2-8°C
LEVOFLOXACINO	CVPC >7d: LM	250-323 3.8-5.8	Viene diluido en 100ml	72h a 25°C protegido de la luz
LINEZOLID	CVPC >7d: LM	309 4.83	Viene diluido en 300 ml	Estable 4h a 25°C
MEROPENEM	CVPC >7d: LM	415-451 7.87-7.91	Reconstituir el vial 500 mg con 10 ml de API y 1g con 20 mL de API. Diluir en 100 ml de SSF o SG5%	Estable 4h a 25°C; 24h entre 2-8°C. 10mg/ml 12h a 24º en SSF 20mg/ml 10h a 25°C
MEROPENEM/ VABORBACTAM	CVPC >7d: LM	No datos	Reconstituir cada vial con 20 mL extraídos de una bolsa de 250ml de SSF y diluir (concentración final de 4mg/mL).	4h a 25°C 22h a 2–8°C
MICAFUNGINA	CVPC >7d: LM	281-307 4.35-5.90	Reconstituir con 5ml de SSF lentamente y no AGITAR . Diluir en 100 mL de SSF.	Estable 96h a 25°C con protección de la luz y 24h a 2-8°C
MOXIFLOXACINO	CVPC >7d: LM	270-320 4.1-4.6	Viene diluido en 250ml	
ORITAVANCINA	CVPC	300 3.6-3.8	Reconstituir cada vial de 400 mg con 40 mL de API y diluir en 1000mL de SG5% . Previamente sacar 120mL de una bola de 1000mL y coger 40mL de cada vial reconstituido (3 en total) hasta obtener una concentración de 1,2 mg/mL. NO USAR SSF.	12h a 25°C y 24h a 2-8°C
PIPERACILINA/ TAZOBACTAM	CVPC >7d: LM	390-501 5.31-5.78	Reconstituir vial de 2g con 10 mL de API/SSF y 4g con 20mL de API/SSF. Diluir en 100 mL de SSF.	Estable 24h a 25°C
POSACONAZOL	PICC	281-292 2.6	El vial viene reconstituido. Diluir contenido del vial (16,7 ml) en 250 ml de SSF.	Estable 24h a 2-8°C
RIFAMPICINA	CVPC >7d: LM	264-288 8.28-8.31	Reconstituir con 10 mL de API. Diluir en 500 mL de SG5%	Estable 4h a 25°C, 24h 2-8°C, 8h a 25°C y 72h a 4°C
TEDIZOLID	CVPC >7d: LM	298 7.4-8.1	Reconstituir vial de 200 mg con 4 mL de API. Diluir en 250mL de SSF	Estable 24h a 25°C y a 2-8°C
TEICOPLANINA	CVPC >7d: LM	282-304 7.48-7.73	Reconstituir el vial de 400 mg con 3 mL de API. Diluir en 100 mL de SSF	Estable 24h a 25°C y 24h a 2-8°C protegido de la luz.
TIGECICLINA	CVPC >7d: LM	259-289 4.96-5.40	Reconstituir vial con 5,3 mL de SSF y agitar suavemente hasta conseguir disolución. Tomar 5 mL de cada vial (el vial contiene un exceso de dosis del 6%). Diluir en 100 ml de SSF	Vial reconstituido debe utilizarse inmediatamente. Dilución estable 24h a 25°C y 48h a 2-8°C
TOBRAMICINA	CVPC >7d: LM	316 5.12	El vial viene reconstituido. Diluir en 100 ml de SSF	48h a 25°C o a 4°C.
VANCOMICINA	PICC	235-285 3.61-3.74	Reconstituir vial con 20 mL de API. Diluir en 250 mL de SSF o G5%.	Estable 24h a 25°C, 48h a 25°C con protección de la luz
VORICONAZOL	CVPC >7d: LM	326-389 4.20-5.44	Reconstituir vial con 19 mL de API. Diluir en 250 mL de SSF	Una vez reconstituido y diluido en la bolsa debe utilizarse inmediatamente. Estable 24h a 2-8°C

CVPC: catéter vascular periférico corto

PICC: catéter venoso central

LM: Línea media

Leyenda de colores:

Violeta: no compatible con RL	Verde: compatible con todo
Gris: ya viene diluido	Rosa: compatible solo SG5%
Amarillo: solo SF	

Acceso on-line:

https://www.huvn.es/profesionales/de_interes_sanitario/proa_programa_de_optimizacion_de_la_antibioterapia/guia_de_antibioterapia_empirica_2021_2022/forma_de_administracion_de_antibioticos