

PRECAUCIONES BASADAS EN LA VÍA DE TRANSMISIÓN

Amalia Ramos Cuadra, Francisca Enríquez Maroto, Francisco José Martín Pérez

Las **Precauciones** de prevención de infecciones basadas en la vía de **Transmisión**, se AÑADEN a las Precauciones Estándar, las cuales aplican a todos los pacientes durante la asistencia sanitaria y no solo en aquéllos con infección/colonización.

ENFERMEDADES, SÍNDROMES O MICROORGANISMOS QUE REQUIEREN PRECAUCIONES POR CONTACTO

Infecciones entéricas

- *Clostridioides difficile*
- Brotes de gastroenteritis en el hospital
- En pacientes con pañal o incontinentes:
E. coli =157:H/7 enterohemorrágica, Shigella, enterocolitis estafilocócica, hepatitis A y cólera
- Poliomieltitis
- Enterovirus (sólo en niños)

Infecciones de la piel

- Difteria cutánea
- Virus herpes simple (neonatal o mucocutáneo diseminado o severo)
- Varicela
- Herpes zóster (incluye zóster diseminado, o localizado en inmunodeprimidos)
- Carbunco cutáneo (ántrax)
- Rubéola congénita
- Lesión exudativa tuberculosa
- Infección estafilocócica o estreptocócica
- Eczema o reacción cutánea postvacunal
- Absceso grande (no cubierto con apósito)
- Herida o úlcera de decúbito extensa infectada (abundante exudado)
- Viruela del mono

Parasitosis

- Escabiosis
- Pediculosis

Microorganismos multirresistentes

- Colonización o infección de piel, herida quirúrgica, gastrointestinal o respiratoria

Conjuntivitis viral/hemorrágica

Meningitis aséptica viral (sólo en niños y jóvenes)

SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo)

Fiebre hemorrágica vírica

- Ébola
- Lassa
- Marburg
- Crimea-Congo, etc.

Otras infecciones por virus

- Coronavirus SARS-CoV-2
- Adenovirus
- Metapneumovirus
- Norovirus
- Rotavirus
- Virus respiratorio sincitial (sólo en niños o inmunodeprimidos)

P
PRECAUCIONES

C
DE CONTACTO

Solución Hidroalcohólica

VALORAR

EN CASO DE DUDA, CONSULTE
CON EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA PLANTA

A Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Bienestar
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

SERVICIO DE MEDICINA
PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA

sampspgs

ENFERMEDADES, SÍNDROMES O MICROORGANISMOS QUE REQUIEREN PRECAUCIONES POR GOTAS

Infecciones bacterianas

- Infección por *Haemophilus influenzae*
- Infección por *Neisseria meningitidis*
- Difteria faríngea
- Neumonía por *Mycoplasma pneumoniae*
- Estreptococo del grupo A: enfermedad respiratoria (incluye faringitis en niños); escarlatina; infección extensa en piel, herida o quemadura
- Tos ferina (*Bordetella pertussis*)
- Peste neumónica (*Yersinia pestis*)
- *Burkholderia cepacia* en fibrosis quística

Infecciones víricas

- Gripe (*Influenza*) por cualquier serotipo
- Parotiditis
- Rubéola
- Rinovirus
- Adenovirus: cualquier infección en niños; neumonía en adultos
- Parvovirus B19: infección en piel
- Coronavirus SARS-CoV-2
- Fiebres hemorrágicas (Ébola, Lassa, Crimea-Congo, Marburg, etc.)

SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo)

P
PRECAUCIONES

G
POR GOTAS

Mascarilla quirúrgica

Solución Hidroalcohólica

EN CASO DE DUDA, CONSULTE
CON EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA PLANTA

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

SERVICIO DE MEDICINA
PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA

samppsgs

ENFERMEDADES, SÍNDROMES O MICROORGANISMOS QUE REQUIEREN PRECAUCIONES AÉREA/AEROSOLES

- **Tuberculosis** (en caso de tuberculosis en piel con lesiones exudativas, se añadirán las Precauciones de Contacto)
- **Sarampión**
- **Varicela**, incluye:
 - zóster diseminado
 - zóster localizado en inmunodeprimidos
- **Coronavirus SARS-CoV-2**

P
PRECAUCIONES

A
AÉREAS/AEROSOLES

FFP2

Solución Hidroalcohólica

OBLIGATORIO MANTENER
LA PUERTA CERRADA

EN CASO DE DUDA, CONSULTE
CON EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA PLANTA

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

SERVICIO DE MEDICINA
PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA

samppsgs

RESUMEN DE MEDIDAS DE LAS PRECAUCIONES BASADAS EN LA TRANSMISIÓN

Precauciones	Habitación individual	Higiene manos	Bata Adicional	Guantes	Mascarilla	Traslado (medidas a utilizar por el paciente)
Contacto	No ¹	Antes y después	Valorar ²	Sí	No	No
Gotas	No ³	Antes y después	No	No	Quirúrgica	Mascarilla quirúrgica
Aérea/Aerosoles	Sí	Antes y después	No	No	Sí FFP2/FFP3	Mascarilla quirúrgica

¹ Se utilizará habitación individual para infección/colonización por enterobacterias productoras de carbapenemasas (EPC), microorganismos panresistentes, fiebres hemorrágicas virales (Ébola, Lassa, Marburg, Crimea-Congo,...), coronavirus SARS-CoV-2 (en caso de SARS-CoV-2, también puede indicarse aislamiento de cohortes), *Enterococcus* resistente a vancomicina, *Cl. Difficile* y otros microorganismos productores de carbapenemasas (*Pseudomonas*, *Acinetobacter*, etc.).

² Sólo si se prevee contacto directo entre la ropa del trabajador sanitario y el paciente o su ropa de cama, utilizar bata adicional.

³ Se utilizará habitación individual para coronavirus SARS-CoV-2 (también puede indicarse aislamiento de cohortes).

ENFERMEDADES O CIRCUNSTANCIAS QUE REQUIEREN AMBIENTE PROTECTOR

- Paciente receptor de trasplante alogénico de médula ósea (durante los 100 primeros días desde el trasplante)
- Paciente receptor de trasplante de órgano sólido, durante el periodo inmediatamente postquirúrgico de máxima inmunodepresión (durante las 3 primeras semanas tras el trasplante)
- Paciente con neutropenia severa (neutropenia $<500/\text{mm}^3$ durante un periodo ≥ 2 semanas, o neutropenia $<100/\text{mm}^3$ cualquiera que sea su duración). En este caso, las precauciones finalizarán cuando la cifra de neutrófilos sea >1.000 células/ mm^3 .

A

AMBIENTE

P

PROTECTOR



Solución Hidroalcohólica



Mascarilla quirúrgica







OBLIGATORIO MANTENER LA PUERTA CERRADA

EN CASO DE DUDA, CONSULTE
CON EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA PLANTA



Junta de Andalucía
Comunidad de Salud y Prevención
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

SERVICIO DE MEDICINA
PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA

