Guía de estudio Métodos de Investigación ODON249

 $Sergio\ Uribe,\ PhD.\ Profesor\ Asociado\ UACh.\ sergiouribe@uach.cl$

Contents

Introducción a los métodos de investigación Ética	1 1			
Búsqueda de información	1			
Diseño de estudios Muestreo	2 3 4			
Estudios observacionales de prevalencia	4			
Estudios observacionales analíticos	4			
Estudios clínicos controlados				
Revisiones sistemáticas				
 Es considerado el padre del método científico. Esta frase se refiere a				
Ética				
• Explique los cuatro principios éticos básicos				
 El procedimiento formal para asegurar el cumplimiento del principio de autonomía es	lor,			

Búsqueda de información


• Cuál de las siguientes búsquedas genera más ítems o resultados?

e. Cuál debe ser el precio de un nuevo medicamento?


- a) Periodontal AND caries AND systemic diseases
- b) (Periodontal OR caries) AND systemic diseases

c. Existe menor prevalencia de periodontitis en personas orientales que occidentales? d. Cuáles son las diferencias éticas entre realizar una investigación en Egipto y en Irak?

- c) (Periodontal NOT caries) AND systemic diseases
- d) (Periodontal OR caries OR systemic diseases)
- e) (Periodontal OR caries NOT systemic diseases)
- Identifique las partes cada parte numeradas de la siguiente referencia y describa que significa el 5 y 6



¹Australian Research Centre for Population Oral Health, School of Dentistry, The University of Adelaide, Australia; ²Faculty of Dentistry, The University of Hong Kong, 3/F, Prince Philip Dental Hospital, 34 Hospital Road, Hong Kong SAR, China; and ³Cancer Clinical Trials Office, Stanford University, Palo Alto, CA, USA; *corresponding author, edward-lo@hku.hk



• Dentro de un artículo científico, la sección donde Ud. puede encontrar **ideas** para realizar una investigación, es _____

• Las secciones esenciales de un manuscrito científico son _______, ______

• Al ingresar el siguiente texto en PubMed:

 $Agressive\ Periodontitis/drug\ therapy[Mesh]\ AND\ (amoxicilin\ AND\ metronidazole)\ AND\ (blind*\ AND\ random*)$ encontrará estudios principalmente de tipo:

- a. descriptivos
- b. cohortes
- c. casos v controles
- d. cuasiexperimentales
- e. clínicos aleatorios

Diseño de estudios

- El tipo de investigación más cercano a establecer causalidad en humanos es _____
- Acerca de las enfermedades, el Principio Epidemiológico señala que:
 - a) Las enfermedades se distribuyen al azar.
 - b) Las enfermedades no se distribuyen aleatoriamente.
 - c) Siempre es necesario realizar un estudio epidemiológico.
 - d) La población enferma siempre buscará un tratamiento.
 - e) Las causas de las enfermedades son géneticas
- Ud desea validar el Cariograma, un test que indica el riesgo de caries y estima la probabilidad del desarrollo de caries. El diseño apropiado para validarlo es:
- De acuerdo al siguiente material y método: Methods: MEDLINE, EMBASE and the Cochrane Library were searched through December 2009 to identify relevant randomised trials with blind outcome assess-

ment and a minimum duration of 1 year. The search was later updated in MEDLINE and the Cochrane Library to March 19th, 2010. Risk of bias of the included trials was assessed. The primary outcome was the caries increment. La pauta apropiada para analizar este estudio es

- Identifique a qué tipo de estudio corresponde el siguiente abstract (Pediatr Dent. 2010;32(2):134-40.) PURPOSE: The aim of the present investigation was to compare the prevalence of taurodontism in the permanent mandibular first molars of nonsyndromic children with hypodontia and supernumerary teeth with age- and gender-matched controls. METHODS: The crown-body root ratios of the permanent first molars were determined from orthopantomograms of 83 children with hypodontia (> or =1 missing teeth) and 37 children with supernumerary teeth (> or =1 extra teeth) compared with normal case controls.
- Identifique a qué tipo de estudio corresponde el siguiente fragmento: "The objective of this study was to assess whether there is a bi-directional relationship between periodontal status and diabetes. This study included 5,856 people without periodontal pockets of 4 mm at baseline. Relative risk was estimated for the 5-year incidence of periodontal pockets of 4 mm (CPI scores 3 and 4, with the CPI probe), in individuals with glycated hemoglobin (HbA1c) levels of 6.5% at baseline"

Muestreo

- Usted realiza un estudio sobre prevalencia de caries en primeros molares en niños de 12 años, para ello pretende visitar todos los colegios de su comuna escogiendo a los alumnos número 5, 10 y 15 de la lista de curso de cada 7mo básico de los establecimientos visitados. Indique el el método de aleatorización.
- Identifique el método de selección de la muestra utilizado en el siguiente estudio: AIM: The objective of this study was to estimate the caries impact of providing training in infant feeding guidelines to workers at Brazilian public primary care clinics. In a cluster-randomized controlled trial (n = 20 clinics), health care workers either were trained in guidelines for infant nutrition, stressing healthful complementary feeding, or were assigned to a 'usual practices' control, which allowed for maternal counseling at practitioner discretion. Training occurred once; the amount of counseling provided to mothers was not assessed. Eligible pregnant women were enrolled to follow health outcomes in their children. Early childhood caries (ECC) was measured at age three years (n = 458 children).
- $\bullet\,$ En un estudio aparece la siguiente frase: "el tamaño muestral es de 354 con una potencia estadística del 80%". Explíque a que se refiere
- En un estudio (J Dent Res. 2010 Oct;89(10):1086-90.) se comparó la efectividad de 3 métodos de prevención de caries en pacientes adultos mayores institucionalizados y se obtuvieron los resultdos de la siguTable 2. Mean Number of Root Surfaces with New Active Caries or Fillings over 3 Years (standard error in parentheses)

Study Group	1 Yr (N = 247)	2 Yrs (N = 227)	3 Yrs (N = 203)	3 Yrs PF (%)	
OHI (Control)	1.5 (0.2)	2.0 (0.3)	2.5 (0.5)	_	
OHI + chlorhexidine	1.0 (0.2)	1.0 (0.3)	1.1 (0.2)	57	
OHI + sodium fluoride	0.8 (0.2)	0.9 (0.2)	0.9 (0.3)	64	
OHI + SDF	0.4 (0.1)	0.7 (0.2)	0.7 (0.2)	71	
All groups	0.9 (0.1)	1.2 (0.1)	1.3 (0.2)		
Significance	p < 0.001	p < 0.001	p < 0.001		
Scheffé comparison	Gp1>Gp2,Gp4	Gp1>Gp2,Gp3,Gp4	Gp1>Gp2,Gp3,Gp4		

OHI = oral hygiene instruction.

SDF = silver diamine fluoride.

iente imagen. PF = prevented fraction: [(control mean—intervention mean] / control mean] x 100%.

Al respecto indique

- Qué test estadístico sería el más apropiado de utilizar para analizar estos datos?
- Con los datos de la tabla, ¿cuál o cuáles son los métodos más efectivos para la reducción de caries o nuevas restauraciones al año 3?

Análisis

- Se realiza un estudio que mide la prevalencia de caries en COP(D)en adultos de tres estratos socioeconómicos (ABC1, C2 y D), con 300 mediciones para A y B y 450 para C. La prueba estadística más indicada para el análisis de los datos sería _____
- Cuál es la diferencia entre significancia clínica y significacia estadística?

Estudios observacionales de prevalencia

• Usted desea realizar un estudio de prevalencia de estomatitis aftosa recidivante en niños de 6 años en Valdivia, realizando un examen bucal. El mejor lugar para la obtención de la muestra es

Estudios observacionales analíticos

• Indique y explique los criterios de causalidad de Hill

Estudios clínicos controlados

• El propósito del doble cegamiento o enmascaramiento en un estudio clínico tiene como propósito

Revisiones sistemáticas

• Interprete los resultados del siguiente gráfico

\begin{center} \includegraphicswidth=4cm \end{center}

• Interprete los resultados del siguiente gráfico

\begin{center} \includegraphicswidth=4cm \end{center}

• Indique a qué corresponden los números de la siguiente figura

\begin{center} \includegraphicswidth=4cm \end{center}




Figure 1: Meta-analisis.