



DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Práctica 6

2do cuatrimestre 2021

Álgebra I

Integrante	LU	Correo electrónico
Yago Pajariño	546/21	ypajarino@dc.uba.ar



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (++54 +11) 4576-3300

<http://www.exactas.uba.ar>

Índice

6. Práctica 6	2
6.1. Ejercicio 1	2
6.2. Ejercicio 2	3
6.3. Ejercicio 3	4
6.4. Ejercicio 4	6
6.5. Ejercicio 5	7
6.6. Ejercicio 6	9
6.7. Ejercicio 7	9
6.8. Ejercicio 8	12
6.9. Ejercicio 9	13
6.10. Ejercicio 10	13
6.11. Ejercicio 11	15
6.12. Ejercicio 12	16
6.13. Ejercicio 13	16
6.14. Ejercicio 14	17
6.15. Ejercicio 15	17

6. Práctica 6

6.1. Ejercicio 1

6.1.A. Pregunta i

Paso a polares:

- $5i = 5(\cos(\frac{\pi}{2}) + i \sin(\frac{\pi}{2}))$
- $(1+i)^4 = (\sqrt{2})^4 \cdot (\cos(\pi) + i \sin(\pi))$

Luego,

$$\begin{aligned} z &= 4.5(\cos(\pi + \frac{\pi}{2}) + i \sin(\pi + \frac{\pi}{2})) \\ &= 20(\cos(\frac{3\pi}{2}) + i \sin(\frac{3\pi}{2})) \end{aligned}$$

Así,

- $Re(z) = 20 \cdot \cos(\frac{3\pi}{2}) = 0$
- $Im(z) = 20 \cdot \sin(\frac{3\pi}{2}) = -20$
- $|z| = 20$
- $Re(z^{-1}) = 0$
- $iz = 20(\cos(2\pi) + i \sin(2\pi)) \implies Im(iz) = 0$

6.1.B. Pregunta ii

$$\begin{aligned} z &= (\sqrt{2} + \sqrt{3}i)^2 \cdot (\overline{1 - 3i}) \\ &= (2 + 2 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{3}i - 3) \cdot (1 + 3i) \\ &= (-1 + 2 \cdot \sqrt{6}i) \cdot (1 + 3i) \\ &= -1 - 3i + 2 \cdot \sqrt{6}i - 6 \cdot \sqrt{6} \\ &= -1 - 6 \cdot \sqrt{6} + (2 \cdot \sqrt{6} - 3)i \end{aligned}$$

- $Re(z) = -1 - 6 \cdot \sqrt{6}$
- $Im(z) = 2 \cdot \sqrt{6} - 3$
- $|z| = \sqrt{(-1 - 6 \cdot \sqrt{6})^2 + (2 \cdot \sqrt{6} - 3)^2} = \sqrt{250} = 5 \cdot \sqrt{10}$

6.1.C. Pregunta iii

Paso a polares,

$$i^{17} = \cos(17 \cdot \frac{\pi}{2}) + i \sin(17 \cdot \frac{\pi}{2})$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot (\cos(0) + i \sin(0))$$

$$i = \cos(\frac{\pi}{2}) + i \sin(\frac{\pi}{2})$$

$$(1-i)^3 = (\sqrt{2})^3 (\cos(3 \cdot \frac{7}{4}\pi) + i \sin(3 \cdot \frac{7}{4}\pi))$$

Luego,

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \cdot i \cdot (1+i)^3 &= \frac{1}{2} \cdot (\sqrt{2})^3 \cdot \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{21}{4}\pi\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{21}{4}\pi\right) \right) \\ &= \frac{\sqrt{2}^3}{2} \cdot \left(\cos\left(\frac{23}{4}\pi\right) + i \sin\left(\frac{23}{4}\pi\right) \right)\end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned}z &= \frac{\sqrt{2}^3}{2} \cdot \left(\cos\left(\left(\frac{17}{2} + \frac{23}{4}\right)\pi\right) + i \sin\left(\left(\frac{17}{2} + \frac{23}{4}\right)\pi\right) \right) \\ &= \frac{\sqrt{2}^3}{2} \cdot \left(\cos\left(\frac{57}{4}\pi\right) + i \sin\left(\frac{57}{4}\pi\right) \right)\end{aligned}$$

- $Re(z) = \frac{\sqrt{2}^3}{2} \cdot \cos\left(\frac{57}{4}\pi\right)$
- $Im(z) = \frac{\sqrt{2}^3}{2} \cdot \sin\left(\frac{57}{4}\pi\right)$
- $|z| = \frac{\sqrt{2}^3}{2}$
- $Re(z^{-1}) = \cos\left(\frac{57}{4}\pi\right)$
- $Im(iz) = \frac{\sqrt{2}^3}{2} \cdot \sin\left(\frac{59}{4}\pi\right)$


6.1.D. Pregunta iv

TODO


6.1.E. Pregunta v

TODO


6.2. Ejercicio 2



1. _____



2.



3.

6.3. Ejercicio 3

6.3.A. Pregunta i

$$z^2 = -36$$

Se que $z = a + bi$ con $(a, b) \in \mathbb{R}^2$

Luego busco los z tales que $z^2 = -36$

$$\begin{aligned} z^2 = -36 &\iff z^2 = (a + bi)^2 \\ &= a^2 - b^2 + 2abi \end{aligned}$$

También se que el módulo debe ser igual $|z^2| = |-36|$,

$$\begin{aligned} |z^2| &= |z|^2 = (\sqrt{a^2 + b^2})^2 = a^2 + b^2 \\ |-36| &= 36 \end{aligned}$$

Usando la igualdad de números complejos,

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = -36 \\ 2ab = 0 \\ a^2 + b^2 = 36 \end{cases}$$

$$\text{Sumando (1) y (3)} \quad 2a^2 = 0 \iff a = 0$$

$$\text{Restando (1) a (3)} \quad 2b^2 = 2 \cdot 36 \iff b = \pm 36$$

Luego $z = a + bi$ con los valores de a y b hallados resulta en

$$\text{Rta.: } z_1 = 6i; z_2 = -6i$$

6.3.B. Pregunta ii

$$z^2 = i$$

Se que $z = a + bi$ con $(a, b) \in \mathbb{R}^2$

También se que el módulo debe ser igual $|z^2| = |i|$,

$$|z^2| = |z|^2 = (\sqrt{a^2 + b^2})^2 = a^2 + b^2$$

$$|i| = 1$$

Usando la igualdad de números complejos,

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 0 \\ 2ab = 1 \\ a^2 + b^2 = 1 \end{cases}$$

$$\text{Sumando (1) y (3) } 2a^2 = 1 \iff a = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{Restando (1) a (3) } 2b^2 = 1 \iff b = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{Usando (2) se que } 2ab > 0 \iff (a > 0 \wedge b > 0) \vee (a < 0 \wedge b < 0)$$

$$\text{Rta.: } z_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i; z_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i$$

6.3.C. Pregunta iii

$$z^2 = 7 + 24i$$

Se que $z = a + bi$ con $(a, b) \in \mathbb{R}^2$

También se que el módulo debe ser igual $|z^2| = |7 + 24i|$,

$$|z^2| = |z|^2 = (\sqrt{a^2 + b^2})^2 = a^2 + b^2$$

$$|7 + 24i| = \sqrt{7^2 + 24^2} = \sqrt{49 + 576} = 25$$

Usando la igualdad de números complejos,

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 7 \\ 2ab = 24 \\ a^2 + b^2 = 25 \end{cases}$$

$$\text{Sumando (1) y (3) } 2a^2 = 32 \iff a = \pm 4$$

$$\text{Restando (1) a (3) } 2b^2 = 18 \iff b = \pm 3$$

$$\text{Usando (2) se que } 2ab > 0 \iff (a > 0 \wedge b > 0) \vee (a < 0 \wedge b < 0)$$

$$\text{Rta.: } z_1 = 4 + 3i; z_2 = -4 - 3i$$

6.3.D. Pregunta iv

$$z^2 + 15 - 8i = 0 \iff z^2 = -15 + 8i$$

Se que $z = a + bi$ con $(a, b) \in \mathbb{R}^2$

También se que el módulo debe ser igual $|z^2| = |-15 + 8i|$,

$$|z^2| = |z|^2 = (\sqrt{a^2 + b^2})^2 = a^2 + b^2$$

$$|-15 + 8i| = \sqrt{(-15)^2 + 8^2} = \sqrt{225 + 64} = 17$$

Usando la igualdad de números complejos,

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = -15 \\ 2ab = 8 \\ a^2 + b^2 = 17 \end{cases}$$

$$\text{Sumando (1) y (3) } 2a^2 = 2 \iff a = \pm 1$$

$$\text{Restando (1) a (3) } 2b^2 = 16 \iff b = \pm 4$$

$$\text{Usando (2) se que } 2ab > 0 \iff (a > 0 \wedge b > 0) \vee (a < 0 \wedge b < 0)$$

$$\text{Rta.: } z_1 = 1 + 4i; z_2 = -1 - 4i$$

6.4. Ejercicio 4

6.4.A. Pregunta i

$$z = (2 + 2i)(\sqrt{3} - i)$$

Busco la forma polar de cada factor.

$$\begin{aligned}2 + 2i &= \sqrt{8} \cdot e^{\frac{\pi}{4}i} \\ \sqrt{3} - i &= 2 \cdot e^{\frac{11}{6}\pi i}\end{aligned}$$

Por DeMoivre,

$$\begin{aligned}z &= (2 + 2i)(\sqrt{3} - i) \\ &= \sqrt{8} \cdot 2 \cdot e^{\frac{\pi}{4}i + \frac{11}{6}\pi i} \\ &= 2 \cdot \sqrt{8} e^{\frac{1}{12}\pi i}\end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned}\blacksquare \quad |z| &= 4 \cdot \sqrt{2} \\ \blacksquare \quad \theta &= \frac{1}{12}\pi\end{aligned}$$

6.4.B. Pregunta ii

$$z = (-1 + \sqrt{3}i)^5$$

$$\begin{aligned}-1 + \sqrt{3}i &= 2 \cdot e^{(\pi - \frac{1}{3}\pi)i} \\ &= 2 \cdot e^{\frac{2}{3}\pi i}\end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned}z &= (-1 + \sqrt{3}i)^5 \\ &= (2 \cdot e^{\frac{2}{3}\pi i})^5 \\ &= 2^5 \cdot e^{\frac{10}{3}\pi i}\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\blacksquare \quad |z| &= 2^5 \\ \blacksquare \quad \theta &= \frac{4}{3}\pi\end{aligned}$$

6.4.C. Pregunta iii

$$z = (-1 + \sqrt{3}i)^{-5}$$

$$\begin{aligned}z &= (-1 + \sqrt{3}i)^{-5} \\ &= (2 \cdot e^{\frac{2}{3}\pi i})^{-5} \\ &= 2^{-5} \cdot e^{\frac{-10}{3}\pi i}\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\blacksquare \quad |z| &= \frac{1}{2^5} \\ \blacksquare \quad \theta &= \frac{2}{3}\pi\end{aligned}$$

6.4.D. Pregunta iv

$$z = \frac{1+\sqrt{3}i}{1-i}$$

Busco las expresiones polares.

$$\begin{aligned}1 + \sqrt{3}i &= 2 \cdot e^{\frac{\pi}{3}i} \\ 1 - i &= \sqrt{2} \cdot e^{\frac{7}{4}\pi i}\end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned}z &= \frac{1 + \sqrt{3}i}{1 - i} \\ &= \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot e^{(\frac{1}{3} - \frac{7}{4})\pi i} \\ &= \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot e^{\frac{-17}{12}\pi i}\end{aligned}$$


Por lo tanto,

- $|z| = \frac{2}{\sqrt{2}}$
- $\theta = \frac{7}{12}\pi$

6.5. Ejercicio 5


6.5.A. Pregunta i

$$\operatorname{Re}(z) = x \wedge \operatorname{Im}(z) = y \implies x + 5y \leq 8 \iff y \leq -\frac{1}{5}x + \frac{8}{5}$$




6.5.B. Pregunta ii


- $|z| = 2$ define una circunferencia de radio 2.
- $\frac{\pi}{4} \leq \arg(z) \leq \frac{2\pi}{3}$ define un arco de angulo barrido.



6.5.C. Pregunta iii



6.5.D. Pregunta iv



6.6. Ejercicio 6

6.6.A. Pregunta i

$$z = \left(\frac{1+\sqrt{3}i}{1-i}\right)^{17}$$

$$\text{Sea } w = \frac{1+\sqrt{3}i}{1-i}$$

Busco las expresiones polares.

$$\begin{aligned}1 + \sqrt{3}i &= 2 \cdot e^{\frac{\pi}{3}i} \\ 1 - i &= \sqrt{2} \cdot e^{\frac{7}{4}\pi i}\end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned}w &= \frac{1 + \sqrt{3}i}{1 - i} \\ &= \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot e^{(\frac{1}{3} - \frac{7}{4})\pi i} \\ &= \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot e^{\frac{7}{12}\pi i}\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}z &= w^{17} \\ &= \left(\frac{2}{\sqrt{2}} \cdot e^{\frac{7}{12}\pi i}\right)^{17} \\ &= \left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right)^{17} \cdot e^{\frac{17 \cdot 7}{12}\pi i} \\ &= \left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right)^{17} \cdot e^{\frac{23}{12}\pi i}\end{aligned}$$

$$\text{Por lo tanto, } z = \left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right)^{17} \cdot \cos\left(\frac{23}{12}\pi i\right) + \left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right)^{17} \cdot \sin\left(\frac{23}{12}\pi i\right)$$

6.6.B. Pregunta ii

$$z = (-1 + \sqrt{3}i)^n$$

$$-1 + \sqrt{3}i = 2 \cdot e^{\frac{2}{3}\pi i}$$

$$(-1 + \sqrt{3}i)^n = 2^n \cdot e^{\frac{2n}{3}\pi i}$$

$$\text{Luego } 0 \leq \frac{2n}{3}\pi i < 2\pi \iff 0 \leq n < 3$$

Por lo tanto,

- $n = 0 \implies z = 1$
- $n = 1 \implies z = 2 \cdot e^{\frac{2}{3}\pi i} = -1 + \sqrt{3}i$
- $n = 2 \implies z = 4 \cdot e^{\frac{4}{3}\pi i} = -2 + 2 \cdot \sqrt{3}i$

6.7. Ejercicio 7

6.7.A. Pregunta i

$$\text{Busco los } n \in \mathbb{N} \text{ tales que } (\sqrt{3} - i)^n = 2^{n-1} \cdot (-1 + \sqrt{3}i)$$

Luego,

$$\begin{aligned}(\sqrt{3} - i)^n = 2^{n-1} \cdot (-1 + \sqrt{3}i) &\iff 2(\sqrt{3} - i)^n = 2^n \cdot (-1 + \sqrt{3}i) \\ &\iff \left(\frac{\sqrt{3} - i}{2}\right)^n = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}\end{aligned}$$

Busco expresiones polares,

- $-1 + \sqrt{3}i = 2 \cdot e^{\frac{2}{3}\pi i}$
- $2 = 2 \cdot e^0$
- $\sqrt{3} - i = 2 \cdot e^{\frac{11}{6}\pi i}$

Así,

$$\begin{aligned}\frac{-1 + \sqrt{3}i}{2} &= 1 \cdot e^{\frac{2}{3}\pi i} \\ &= e^{\frac{2}{3}\pi i}\end{aligned}$$

Y,

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{3} - i}{2} &= 1 \cdot e^{\frac{11}{6}\pi i} \\ &= e^{\frac{11}{6}\pi i} \\ \implies \left(\frac{\sqrt{3} - i}{2}\right)^n &= e^{\frac{11}{6}n\pi i}\end{aligned}$$

Luego sea $z = e^{\frac{2}{3}\pi i}$ y $w = e^{\frac{11}{6}n\pi i}$ por definición de números complejos, $z = w \iff \begin{cases} |z| = |w| \\ \frac{2}{3}\pi = \frac{11}{6}n\pi + 2k\pi \end{cases}$

Luego,

$$\begin{aligned}\frac{2}{3}\pi &= \frac{11}{6}n\pi + 2k\pi \\ \frac{2}{3} &= \frac{11}{6}n + 2k \\ 4 &= 11n + 12k \\ 11n &= -12k + 4 \\ \iff 11n &\equiv 4(12) \\ -n &\equiv 4(12) \\ n &\equiv 8(12)\end{aligned}$$

Rta.: $w = z \iff n \equiv 8(12)$

6.7.B. Pregunta ii

Busco los $n \in \mathbb{N}$ tales que $(-\sqrt{3} + i)^n \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ es un real negativo

Busco expresiones polares.

- $-\sqrt{3} + i = 2 \cdot e^{\frac{5}{6}\pi i}$
- $\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot e^0$

$$\text{Luego, } z = 2^n \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) \cdot e^{\frac{5}{6}\pi ni}$$

Por definición de la forma polar, $z \in \mathbb{R}_{<0} \iff \arg(z) = \pi$

Así,

$$\begin{aligned}\frac{5}{6}\pi n &= \pi + 2k\pi \\ \frac{5}{6}n &= 1 + 2k \\ 5n &= 6 + 12k \\ \iff 5.5n &\equiv 5.6(12) \\ \iff n &\equiv 6(12)\end{aligned}$$

Rta.: z es real negativo $\forall n \in \mathbb{N} : n \equiv 6(12)$

6.7.C. Pregunta iii

Busco los $n \in \mathbb{N}$ tales que $\arg((-1+i)^{2n}) = \frac{\pi}{2}$ y $\arg((1-\sqrt{3}i)^{n-1}) = \frac{2}{3}\pi$

Busco expresiones polares.

$$\begin{aligned}\blacksquare (1-i) &= \sqrt{2} \cdot e^{\frac{3}{4}\pi i} \\ \blacksquare (1-i)^{2n} &= (\sqrt{2})^{2n} \cdot e^{2n \frac{3}{4}\pi i} = 2^n \cdot e^{\frac{3}{2}\pi ni} \\ \blacksquare (1-\sqrt{3}i) &= 2 \cdot e^{\frac{5}{3}\pi i} \\ \blacksquare (1-\sqrt{3}i)^{n-1} &= 2^{n-1} \cdot e^{(n-1)\frac{5}{3}\pi i}\end{aligned}$$

Luego resolviendo la primer igualdad,

$$\begin{aligned}\arg((-1+i)^{2n}) = \frac{\pi}{2} &\iff \frac{3}{2}\pi n = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \\ \frac{3}{2}n &= \frac{1}{2} + 2k \\ 3n &= 1 + 4k \\ 3n &\equiv 1(4) \\ n &\equiv 3(4)\end{aligned}$$

Y la segunda,

$$\begin{aligned}\arg((1-\sqrt{3}i)^{n-1}) = \frac{2}{3}\pi &\iff (n-1)\frac{5}{3}\pi = \frac{2}{3}\pi + 2k\pi \\ (n-1)\frac{5}{3} &= \frac{2}{3} + 2k \\ (n-1)5 &= 2 + 6k \\ 5n - 5 &= 2 + 6k \\ 5n &= 7 + 6k \\ 5n &\equiv 7(6) \\ -n &\equiv 7(6) \\ n &\equiv 5(6)\end{aligned}$$

Juntando ambas soluciones, $\begin{cases} n \equiv 3(4) \implies n \equiv 1(2) \\ n \equiv 5(6) \end{cases}$

La segunda implica la primera, luego los n que cumplen lo pedido son $\{n \in \mathbb{N} : n \equiv 5(6)\}$

6.8. Ejercicio 8

6.8.A. Pregunta i

Busco los $w : w^6 = 8$

$$\text{Se que, } \begin{cases} 8 = 8 \cdot e^0 \\ w^6 = |w|^6 \cdot e^{6\theta i} \end{cases}$$

$$\text{Luego por igualdad de números complejos, } w^6 = 8 \iff \begin{cases} |w|^6 = 8 \\ \theta = \frac{0+2k\pi}{6} \end{cases}$$

$$\text{Con } 0 \leq \theta < 2\pi \iff 0 \leq \frac{k\pi}{3} < 2\pi \iff 0 \leq k < 6 \implies k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

Así, las raíces sextas de 8 son:

- $n = 0 \implies w_0 = \sqrt[6]{8} \cdot e^0$
- $n = 1 \implies w_1 = \sqrt[6]{8} \cdot e^{\frac{2}{6} \cdot \pi i}$
- $n = 2 \implies w_2 = \sqrt[6]{8} \cdot e^{\frac{4}{6} \cdot \pi i}$
- $n = 3 \implies w_3 = \sqrt[6]{8} \cdot e^{\frac{6}{6} \cdot \pi i}$
- $n = 4 \implies w_4 = \sqrt[6]{8} \cdot e^{\frac{8}{6} \cdot \pi i}$
- $n = 5 \implies w_5 = \sqrt[6]{8} \cdot e^{\frac{10}{6} \cdot \pi i}$

6.8.B. Pregunta ii

Busco los $w : w^3 = -4$

$$\text{Se que, } \begin{cases} -4 = 4 \cdot e^{\pi i} \\ w^3 = |w|^3 \cdot e^{3\theta i} \end{cases}$$

$$\text{Luego por igualdad de números complejos, } w^3 = -4 \iff \begin{cases} |w|^3 = 4 \implies |w| = \sqrt[3]{4} \\ \theta = \frac{\pi+2k\pi}{3} \end{cases}$$

$$\text{Con } 0 \leq \theta < 2\pi \iff 0 \leq \frac{\pi+2k\pi}{3} < 2\pi \iff 0 \leq k < 3 \implies k \in \{0, 1, 2\}$$

Así, las raíces cúbicas de -4 son:

- $n = 0 \implies w_0 = \sqrt[3]{4} \cdot e^{\frac{1}{3} \pi i}$
- $n = 1 \implies w_1 = \sqrt[3]{4} \cdot e^{\pi i}$
- $n = 2 \implies w_2 = \sqrt[3]{4} \cdot e^{\frac{5}{3} \pi i}$

6.8.C. Pregunta iii

Busco los $w : w^7 = -1 + i$

$$\text{Se que, } \begin{cases} -1 + i = \sqrt{2} \cdot e^{\frac{3}{4} \pi i} \\ w^7 = |w|^7 \cdot e^{7\theta i} \end{cases}$$

$$\text{Luego por igualdad de números complejos, } w^7 = -1 + i \iff \begin{cases} |w|^7 = \sqrt{2} \implies |w| = \sqrt[7]{\sqrt{2}} \\ \theta = \frac{3/4\pi+2k\pi}{7} \end{cases}$$

$$\text{Con } 0 \leq \theta < 2\pi \iff 0 \leq \frac{3/4\pi+2k\pi}{7} < 2\pi \iff 0 \leq k < 7 \implies k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Así, las raíces séptimas de $-1 + i$ son:

- $n = 0 \implies w_0 = \sqrt[7]{\sqrt{2}} \cdot e^{\frac{3}{28} \pi i}$
- $n = 1 \implies w_1 = \sqrt[7]{\sqrt{2}} \cdot e^{\frac{11}{28} \pi i}$

- $n = 2 \implies w_2 = \sqrt[14]{2} \cdot e^{\frac{19}{28}\pi i}$
- $n = 3 \implies w_3 = \sqrt[14]{2} \cdot e^{\frac{27}{28}\pi i}$
- $n = 4 \implies w_4 = \sqrt[14]{2} \cdot e^{\frac{35}{28}\pi i}$
- $n = 5 \implies w_5 = \sqrt[14]{2} \cdot e^{\frac{43}{28}\pi i}$
- $n = 6 \implies w_6 = \sqrt[14]{2} \cdot e^{\frac{51}{28}\pi i}$

6.9. Ejercicio 9

Busco todos los $z \in \mathbb{C}$ tales que $3z^5 + 2|z|^5 + 32 = 0$

Pero, $3z^5 + 2|z|^5 + 32 = 0 \iff 3z^5 = -2|z|^5 - 32$

Luego por igualdad de números complejos, $\arg(3z^5) = \arg(-2|z|^5 - 32)$

$$\begin{aligned}\arg(3z^5) &= \arg(-2|z|^5 - 32) \\ \arg(3z^5) &= \arg(-2(|z|^5 - 16)) \\ \arg(3) + \arg(z^5) &= \arg(-2) + \arg(|z|^5 - 16) + 2k\pi \\ 0 + 5\theta &= \pi + 0 + 2k\pi \\ \theta &= \frac{\pi}{5} + \frac{2k\pi}{5}\end{aligned}$$

Con $0 \leq \frac{\pi}{5} + \frac{2k\pi}{5} < 2\pi \iff 0 \leq 1 + 2k < 10 \iff \frac{-1}{2} \leq k \leq \frac{9}{2} \implies k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$

Ahora busco $|z|$

$$\begin{aligned}3||z|^5| &= |-2||z|^5 - 16| \\ 3|z|^5 &= 2|z|^5 + 32 \\ |z|^5 &= 32 \\ |z| &= \sqrt[5]{32} \\ |z| &= 2\end{aligned}$$

Luego $z = 2 \cdot e^{\theta i} = 2 \cdot e^{\frac{\pi}{5} + \frac{2k\pi}{5}}$ con $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$

Los z que cumplen lo pedido son:

- $k = 0 \implies z_0 = 2 \cdot e^{\frac{1}{5}\pi i}$
- $k = 1 \implies z_1 = 2 \cdot e^{\frac{3}{5}\pi i}$
- $k = 2 \implies z_2 = 2 \cdot e^{\pi i}$
- $k = 3 \implies z_3 = 2 \cdot e^{\frac{7}{5}\pi i}$
- $k = 4 \implies z_4 = 2 \cdot e^{\frac{9}{5}\pi i}$

6.10. Ejercicio 10

$$z^n + i\bar{z}^2 = 0 \iff z^n = -i\bar{z}^2$$

Voy a usar la igualdad de complejos en forma polar, no cubre el caso $z = 0$ así que lo pruebo primero como caso aparte.

$z = 0 \implies 0^n + i0^2 = 0$ luego tengo la primer solución en $z = 0$.

Se que z es de la forma: $z = |z| \cdot e^{\theta i}$ con $0 \leq \theta < 2\pi$

Luego,

$$\begin{aligned}\bar{z} &= |z| \cdot e^{-\theta i} \\ \bar{z}^2 &= |z|^2 \cdot e^{-2\theta i} \\ -i\bar{z}^2 &= |z|^2 \cdot e^{(-2\theta + \frac{3}{2}\pi)i}\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}z^n &= |z|^2 \cdot e^{(-2\theta + \frac{3}{2}\pi)i} \\ |z|^n \cdot e^{n\theta i} &= |z|^2 \cdot e^{(-2\theta + \frac{3}{2}\pi)i}\end{aligned}$$

Por igualdad de números complejos,

$$|z|^n \cdot e^{n\theta i} = |z|^2 \cdot e^{(-2\theta + \frac{3}{2}\pi)i} \iff \begin{cases} |z|^n = |z|^2 \\ n\theta = -2\theta + \frac{3}{2}\pi + 2k\pi \end{cases}$$

Entonces, mirando la igualdad de los módulos, si $n = 2$ existen infinitas soluciones, no sirve pues solo quiero seis. Pero si $n \neq 2 \implies |z| = 1$ es la única solución posible, es el único número que elevado a dos potencias distintas cualquiera, sigue siendo el mismo.

Ahora busco θ ,

$$\begin{aligned}n\theta &= -2\theta + \frac{3}{2}\pi + 2k\pi \\ n\theta + 2\theta &= \frac{3}{2}\pi + 2k\pi \\ (n+2)\theta &= \frac{3}{2}\pi + 2k\pi \\ \theta &= \frac{3}{2(n+2)}\pi + \frac{2k}{(n+2)}\pi\end{aligned}$$

Con $0 \leq \theta < 2\pi$,

$$\begin{aligned}0 &\leq \frac{3}{2(n+2)}\pi + \frac{2k}{(n+2)}\pi < 2\pi \\ 0 &\leq \frac{3}{2(n+2)} + \frac{2k}{(n+2)} < 2 \\ 0 &\leq 3 + 4k < 4(n+2) \\ 0 &\leq 3 + 4k < 4n + 8 \\ -\frac{3}{4} &\leq k < n + \frac{5}{4} \iff k \in \{0, 1, \dots, n+1\}\end{aligned}$$

Busco cinco soluciones, por lo tanto $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$

Así las seis soluciones son:

- $k = 0 \implies z_0 = e^{\frac{3}{10}\pi i}$
- $k = 1 \implies z_1 = e^{\frac{7}{10}\pi i}$
- $k = 2 \implies z_2 = e^{\frac{11}{10}\pi i}$
- $k = 3 \implies z_3 = e^{\frac{15}{10}\pi i}$
- $k = 4 \implies z_4 = e^{\frac{19}{10}\pi i}$
- $z_5 = 0$

6.11. Ejercicio 11

6.11.A. Pregunta i

Se que $w \in G_7$

$$\begin{aligned} & w + \bar{w} + (w + w^2)^2 - w^{38}(1 - w^2) \\ &= w + \bar{w} + w^2 + 2ww^2 + w^4 - w^{38} - w^{40} \\ &= w + \bar{w} + w^2 + 2w^3 + w^4 - w^3 + w^5 \\ &= 1 + w + w^6 + w^2 + w^3 + w^4 + w^5 - 1 = \begin{cases} -1 & w \neq 1 \\ 6 & w = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

6.11.B. Pregunta ii

Se que $w \in G_3$

$$\begin{aligned} & w^{73} + \bar{w}w^9 + 8 \\ &= w + w^2w^0 + 8 \\ &= w + w^2 + 8 \\ &= 1 + w + w^2 + 7 = \begin{cases} 10 & w = 1 \\ 7 & w \neq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

6.11.C. Pregunta iii

Se que $w \in G_10$

$$\begin{aligned} S &= 1 + w^2 + w^{-2} + w^4 + w^{-4} \\ S &= 1 + w^2 + w^8 + w^4 + w^6 \end{aligned}$$

Si llamo $z = w^2 \implies z \in G_5$

Luego,

$$S = 1 + z + z^4 + z^2 + z^3 = \begin{cases} 5 & z = 1 \\ 0 & z \neq 1 \end{cases}$$

$$\text{Pero } z = w^2 \implies z = 1 \iff w = \pm 1 \implies S = \begin{cases} 5 & w = \pm 1 \\ 0 & w \neq \pm 1 \end{cases}$$

6.11.D. Pregunta iv

Se que $w \in G_5$

$$\begin{aligned} & w^{14} + w^{-8} + \bar{w}^4 + \overline{w^{-3}} \\ &= w^4 + w^2 + w + w^3 \\ &= 1 + w^4 + w^2 + w + w^3 - 1 = \begin{cases} 4 & w = 1 \\ -1 & w \neq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

6.12. Ejercicio 12

6.12.A. Pregunta i

Se que $w \in G_{36} \implies w^{36} = 1$

Si defino $z = w^4$ entonces,

$$\begin{aligned}\sum_{k=7}^{60} w^{4k} &= \sum_{k=0}^{60} z^k - \sum_{k=0}^6 z^k \\&= \frac{z^{61} - 1}{z - 1} - \frac{z^7 - 1}{z - 1} \\&= \frac{z^{61} - z^7}{z - 1} \\&= \frac{z^7(z^{54} - 1)}{z - 1} \\&= \frac{(w^4)^7((w^4)^{54} - 1)}{w^4 - 1} \\&= \frac{w^{28}((w^{36})^6 - 1)}{w^4 - 1} \\&= \frac{w^{28}(1 - 1)}{w^4 - 1} \\&= 0\end{aligned}$$

6.12.B. Pregunta ii

Por propiedades de los números complejos se que $Re(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$

Luego,

$$\begin{aligned}Re\left(\sum_{k=0}^{60} w^k\right) &= \frac{\sum_{k=0}^{60} w^k + \sum_{k=0}^{60} \bar{w}^k}{2} \\&= \frac{\frac{w^{61} - 1}{w - 1} + \frac{\bar{w}^{61} - 1}{\bar{w} - 1}}{2} \\&= \frac{\frac{w^6 - 1}{w - 1} + \frac{\bar{w}^5 - 1}{\bar{w} - 1}}{2} \\&= \frac{(w^6 - 1)(\bar{w} - 1) + (\bar{w}^5 - 1)(w - 1)}{2(w - 1)(\bar{w} - 1)} \\&= \frac{(w^6 - 1)(w^{10} - 1) + (w^5 - 1)(w - 1)}{2(w - 1)(w^{10} - 1)} \\&= \frac{w^{16} - w^6 - w^{10} + 1 + w^6 - w^5 - w + 1}{2(w^{11} - w^{10} - w + 1)} \\&= \frac{-w^{10} - w + 2}{2(-w^{10} - w + 2)} \\&= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

6.13. Ejercicio 13

TODO

6.14. Ejercicio 14

TODO

6.15. Ejercicio 15

TODO