征解·1 问题

征解

Seris Lee 每周二, 五

截止 2025 年 3 月 17 日

目录 1-3, 8, 10: 数论 4-7: 三角 9: 超越方程

1 问题

- 1. 求证: $n \equiv 0$ 或 3 mod 4 是 $1, 1, 2, 3, \dots, n, n$ 排成一行, 存在任 2 个 i 之间有 i 个数的排列的 必要条件.
 (赵子铭 供)
- 2. 25 元集, 有 n 个 5 元子集, 满足 $\forall i, j \in [1, n]$ $(i, j \in \mathbb{Z}), |A_i \cap A_j| \le 1$, 求 n 的最大值. (赵子铭 供)
- 3. $\forall a_1, a_2, \cdots, a_n \in \mathbb{N}^+$, 证明:

$$\prod_{1 \le i < j \le n} (j-i) \mid \prod_{1 \le i < j \le n} (a_j - a_i).$$

(张博涵 供)

4. 证明:

$$\prod_{k=1}^{n} \cos \frac{k\pi}{2n+1} = \frac{1}{2^n} \,.$$

(张博涵 供)

5. 证明:

$$\prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}} \,.$$

(曹铭杰 供)

6. 证明:

$$\sum_{k=1}^{n} \cos \frac{2k-1}{2n+1} \pi = \frac{1}{2} \,.$$

(陈宇航 供)

7. 证明方程 $\sin \sin \sin x = \cos \cos \cos x$ 无实数解. (张

(张博涵 供)

征解·2 已知解答 2

(陈宇航 张博涵 供)

9. 求方程 $x^2 = 2^x$ 的负数解. (闫家宁 供)

10. 设正整数 a < b, 求 $\overline{ab} \mid \overline{a(a+1)(a+2)\cdots b}$ 的充分必要条件. (张博涵 供)

2 已知解答

2.1 第 4 题 (陈宇航解答)

配对法. 由二倍角公式知

$$\prod_{k=1}^{n} \cos \frac{k\pi}{2n+1} = \frac{\cos \frac{\pi}{2n+1} \cdots \cos \frac{n\pi}{2n+1} \cdot \sin \frac{\pi}{2n+1} \cdots \sin \frac{n\pi}{2n+1}}{\sin \frac{\pi}{2n+1} \cdots \sin \frac{n\pi}{2n+1}}$$

$$= \frac{1}{2^{n}} \cdot \frac{\sin \frac{2\pi}{2n+1} \sin \frac{4\pi}{2n+1} \cdots \sin \frac{2n\pi}{2n+1}}{\sin \frac{\pi}{2n+1} \cdots \sin \frac{n\pi}{2n+1}}$$

$$= \frac{1}{2^{n}}.$$

2.2 第8题(张博涵解答,或伪证)

回想数列周期性的证明. a_n 模 m 的余数有 m 种,由抽屉原理知,其中必有两项的余数相等,不妨设为 a_r 和 a_t ,则由递推公式知 a_{r+1} 和 a_{t+1} 模 m 的余数相等,以此类推, a_n mod m 是周期数列 (不一定是纯周期),且周期 $T \le m$. 于是考虑最大情况 T = m,此时最晚应于第 m 项进入周期,因为 若在第 m+1 项才进入周期,前面还剩 m 项,则由递推公式,周期从第 1 项开始,矛盾! 所以不存在 $\{a_n\}$,使其从第 i 项 (i>m) 才开始进入周期.