

<カタカナに関するヒント>

1. 「オ（オ段）」は安易に使わない。オ段が登場するのは：

- "-oi-"または"-oy-"のとき→「オイ」
- 接頭辞（"co-"、"cerebro-"、"hypo-" など）のときと、"-ro-"のとき→「オウ」
- "-or-"のときで、単語末（"mirror" など）でないとき→「オー」

くらい。（要するにレア。）

※これ以外に「/ə/」は「オ」と書いても正解だが、「/ɑ/」だった場合は「オ」と書くと失点するので、「ア（ア段）」を使うのが吉。

2. 英語の発音に「ッ（促音）」は無い。以下資料には便宜上「ッ」を入れたが、試験では書かない方が、"ちゃんと勉強した感" が増す。

<音読課題1>

Asthma attacks are not all the same — some are worse than others in a **severe** asthma attack, the **airways** can close so much that not enough **oxygen** gets to vital **organs**. This condition is a medical emergency. People can **die** from severe asthma attacks.

<日本語訳>

喘息発作はすべて同じではありません。重症の喘息発作では、気道が非常に狭くなり、重要な臓器に十分な酸素が行き届かなくなります。この状態は医療緊急事態である。重症の喘息発作で死亡することもあります。

<単語帳>

英語	発音記号	カタカナ	日本語
asthma	æzmə	ア'ズマ	ぜんそく 喘息
attacks	ətæks	アタ'ックス	ほっき 発作
severe	sə'vɪə	スイ'ヴィ'アー	重症の
airways	éə'weɪz	エ'アウェイズ	気道
oxygen	áksɪdʒən	ア'クシヂェン	酸素
organs	óə'gənz	オ'ーガンズ	臓器

英語	発音記号	カタカナ	日本語
die	dáɪ	ダイ	死ぬ

<音読課題2>

Panic attacks can occur at any time, even during sleep. An attack usually **peaks** within 10 minutes, but some **symptoms** may last much longer. **Panic disorder** affects about 6 million American adults and is twice as common in women as men. Panic attacks often begin in late **adolescence** or early **adulthood**, but not everyone who experiences panic attacks will develop panic disorder. Many people have just one attack and never have another. The tendency to develop panic attacks appears to be **inherited**.

<日本語訳>

パニック発作は睡眠中でさえ、いつでも起こる可能性がある。発作は通常10分以内にピークに達するが、症状によってはもっと長く続くこともある。パニック障害はアメリカの成人約600万人が罹患し、男性より女性に2倍多い。パニック発作は多くの場合、青年期後期から成人期初期に始まりますが、パニック発作を経験したすべての人がパニック障害を発症するわけではありません。多くの人は1回発作を起こしただけで、その後は発作を起こさない。パニック発作の発症傾向は遺伝するようである。

<単語帳>

英語	発音記号	カタカナ	日本語
panic attacks	pænik ətæks	パ'ニック アタ'ックス	パニック発作
peaks	pí:ks	ピー'クス	頂点に達する
symptoms	sím(p)təmz	スイ'ンプタムズ	症状
panic disorder	pænik dísɔːdə	パ'ニック ディソ'ーダー	パニック障害
adolescence	ædəléns	アダレ'センス	青年期
adulthood	ədʌlthʊd	アダ'ルトフッド	成年期
inherited	ɪnhérɪtɪd	インヘ'リティッド	遺伝する

<音読課題3>

Premenstrual syndrome (PMS) is a collection of **physical**, **psychological**, and/or **behavioral symptoms** that occur during the **luteal phase** and pass within a few days after

the menses begins. The symptoms commonly noted include **abdominal cramps, breast tenderness, headaches, irritability, mood swings, depression, and food cravings**. Up to 90% of women of **childbearing age** experience at least some degree of premenstrual symptoms. About three to eight percent of women suffer from more severe symptoms — **premenstrual dysphoric disorder (PMDD)** — that disrupt everyday life and **interpersonal relationships**. The reason some women get severe PMS while others have none is, as of today, not fully understood.

<日本語訳>

月経前症候群（PMS）とは、黄体期に起こり、月経開始後数日以内に治まる、身体的、心理的、および/または行動的症状の集まりである。一般的に指摘される症状には、腹部のけいれん、乳房の圧痛、頭痛、イライラ、気分の落ち込み、食欲不振などがある。出産適齢期の女性の最大90%が、少なくともある程度の月経前症状を経験しています。約3～8%の女性は、日常生活や対人関係に支障をきたすような、より深刻な症状、月経前不快気分障害（PMDD）に苦しんでいる。PMSがひどい女性もいれば、全くない女性もいる理由は、現在のところ完全には解明されていない。

<単語帳>

英語	発音記号	カタカナ	日本語
premenstrual syndrome (PMS)	pri:ménstruəl síndroum (pí: ém és)	プリーメ'ンストゥルアル スイ'ンドロウム (ピー エ'ム エ'ス)	月経前症候群
physical	fízɪk(ə)l	フィ'ズィカル	肉体的な
psychological	sàɪkələdʒɪk(ə)l	サイカラ'ヂカル	精神的な
behavioral	bɪhævɪjərəl	ビヘ'イヴィアラル	行動の
symptoms	sím(p)təmz	スイ'ンプタムズ	症状
luteal phase	lú:ʃiəl féɪz	ルー'ティアル フェ'イズ	黄体期
menses	ménsi:z	メ'ンスィーズ	月経
abdominal cramps	æbdámən(ə)l kræmps	アブダ'ミナル クラ'ンプ ス	生理痛
breast	brést	ブレ'ストゥ	にゅうぼう 乳房
tenderness	téndənəs	テ'ンダーネス	圧痛
headaches	hédèɪks	ヘ'デイクス	頭痛

英語	発音記号	カタカナ	日本語
irritability	ɪrəˈtəbɪləti	イリタビ'リティ	短気
mood swings	mú:d swíŋz	ム'ード スウィ'ングズ	気分変動
depression	dɪprɛʃən	ディプレ'ッション	鬱
food cravings	fú:d kréivɪŋz	フ'ード クレ'イヴィング	食物 ^{かつぼう} 渴望
childbearing age	tʃáɪldbèərɪŋ éɪdʒ	チャ'イルドベアリング エ'イヂ	出産適齢期
premenstrual dysphoric disorder (PMDD)	pri:ménstruəl disfó:rɪk dɪsɔːdə (pɪ: ém dí: dí:)	プリーメ'ンストゥルアル ディスフォー'リック デ ィソ'ーダー (ピ'ー エ'ム ディ'ー ディ'ー)	月経前不快気分障害
interpersonal relationships	ɪntəpɜ:s(ə)nəl rɪlɛɪʃənʃɪps	インターパー'ソナル リ レ'イシャ'ンシップス	対人関係

<音読課題4>

As the low **birth rate** is a nationwide problem in Japan, we must consider the safety of children, **fetuses** and **pregnant** women. Motor vehicle accidents (MVAs) are the leading cause of unintentional **death** with 13 million deaths worldwide annually, and are also the largest cause of accidental death and disability in **pregnancy**. Therefore, the mechanisms of **maternal injuries** in vehicle collisions should be investigated and maternal as well as **fetal** injuries should be prevented. Seatbelts, which are widely accepted as a safety device, reduce the risk of deaths and severe injuries to the vehicle passengers. Seatbelts worn during pregnancy are also important to improve both maternal and fetal survival after MVAs.

Although wearing seatbelts is mandatory for both drivers and front-seat passengers in many developed countries, in some countries, including Japan, the law exempts pregnant women from wearing seatbelts. In these countries, the importance of wearing seatbelts during pregnancy is not well recognized owing to a lack of knowledge and scientific evidence regarding the correct use of restraints.

<日本語訳>

少子化が全国的な問題となっている日本では、子どもや胎児、妊婦の安全を考えなければならない。自動車事故（MVA）は、全世界で年間1,300万人が死亡している不慮の事故死原因の第1位であり、妊娠中の事故死・障害の最大原因でもある。したがって、自動車衝突事故における母体

傷害のメカニズムを調査し、母体だけでなく胎児の傷害も予防すべきである。安全装置として広く受け入れられているシートベルトは、同乗者の死亡や重傷のリスクを軽減する。妊娠中のシートベルト着用は、自動車事故後の母体および胎児の生存率を向上させるためにも重要である。

多くの先進国では、シートベルトの着用は運転者にも前席の同乗者にも義務付けられているが、日本を含むいくつかの国では、法律により妊婦のシートベルト着用が免除されている。これらの国では、シートベルトの正しい使用法に関する知識や科学的根拠が不足しているため、妊娠中のシートベルト着用の重要性があまり認識されていない。

<単語帳>

英語	発音記号	カタカナ	日本語
birth rate	bɜːθ reɪt	バース レイト	しゅっしょうりつ 出生 率
fetuses	fɪːtəsɪz	フィータスィーズ	胎児
pregnant	prégnənt	プレグナント	妊娠している
death	déə	デス	死
pregnancy	prégnənsi	プレグナンスィ	妊娠
maternal	mætɜːnl	マターナル	母親の
injuries	ɪndʒ(ə)rɪz	インチャリーズ	怪我
fetal	fɪːtəl	フィータル	胎児の

<音読課題5>

Heparin **sodium** is an **anticoagulant** that is commonly administered **intravenously**. It is used in patients undergoing **kidney dialysis**, certain types of **cardiac surgery**, and **treatment** or prevention of other serious medical conditions, including **deep venous thrombosis** and **pulmonary emboli**. In many settings heparin treatment is initiated using high **doses** (5,000-50,000 units) given directly into the **bloodstream** (intravenously) as a **bolus** (over a short period of time, usually a few minutes).

Serious adverse events have recently been reported in patients who received these higher bolus doses. The serious adverse events include **allergic** or hypersensitivity-type reactions, with **symptoms** of oral **swelling**, **nausea**, **vomiting**, **sweating**, **shortness of breath**, and **cases** of **severe hypotension** requiring treatment. Most events developed within minutes of heparin **initiation** although the possibility of a delayed response has not

been excluded. The reports have largely involved the use of multiple-dose **vials**. However there have been several cases in which product from multiple, single-dose vials have been combined to administer a bolus dose.

<日本語訳>

ヘパリンナトリウムは、一般的に静脈内投与される抗凝固剤です。腎透析、ある種の心臓手術、深部静脈血栓症や肺塞栓症などの重篤な疾患の治療や予防に使用される。多くの場合、ヘパリン治療は高用量（5,000～50,000単位）をボラス投与（短時間、通常は数分間）として直接血流（静脈内）に投与することで開始される。

最近、これらの高用量ボラス投与を受けた患者で重篤な有害事象が報告されている。重篤な有害事象にはアレルギー性または過敏症型の反応が含まれ、口腔内の腫脹、悪心、嘔吐、発汗、息切れ、治療を要する重篤な低血圧などの症状がみられた。ほとんどの事象はヘパリン投与開始後数分以内に発現しているが、遅延反応の可能性は排除されていない。報告の大部分は複数回投与バイアルを使用したものである。しかし、複数の単回投与バイアルからの製剤を組み合わせでボラス投与を行った症例もいくつかある。

<単語帳>

英語	発音記号	カタカナ	日本語
sodium	sóʊdiəm	ソ'ウディウム	ナトリウム
anticoagulant	æntikouæggjulənt	アンティコウア'ギュラントゥ	抗凝血剤
intravenously	ɪntrəví:nəsli	イントラヴィ'ーナスリー	じょうちゅう 静注で
kidney dialysis	kídni daɪæləsis	キ'ドニー ダイア'リスィス	腎臓透析
cardiac	káɑ:diæk	カ'ーディアク	心臓の
surgery	sá:dʒ(ə)ri	サ'ージェリー	手術
treatment	trí:tmənt	トゥリ'ートメント	治療
deep venous thrombosis	dí:p ví:nəs ɐrambóʊsis	ディ'ープ ヴィ'ーナス スランボ'ウスィス	深部静脈血栓症
pulmonary emboli	pálmənəri émbəlài	パ'ルマネリー エ'ンバライ	肺血栓
doses	dóʊsɪz	ド'ウスィーズ	用量
bloodstream	bládstri:m	ブラ'ッドストリーム	血流

英語	発音記号	カタカナ	日本語
bolus	bóʊləs	ボ'ウラス	1回分
allergic	ə'lɜːdʒɪk	アラ'ーヂック	アレルギーの
symptoms	sím(p)təmz	スイ'ンプタムズ	症状
swelling	swélɪŋ	スウェ'リング	腫れ
nausea	nóːziə	ノ'ーズィア	吐き気
vomiting	vámɪtɪŋ	ヴァ'ミティング	嘔吐
sweating	swétɪŋ	スウェ'ッティング	はっかん 発汗
shortness of breath	ʃɔːtnəs (ə)v brée	ショ'ートネス アヴ ブ レ'ス	息切れ
cases	kéisɪz	ケ'イスィーズ	症例
severe	səvíə	スイ'ヴィ'アー	重症の
hypotension	háɪpoutɛnʃən	ハ'イポウテンション	低血圧
initiation	ɪnɪʃíɛɪʃən	イニシエ'イション	投与開始
vials	váiəlz	ヴァ'イアルズ	やくびん 薬瓶

<音読課題6>

Air pollution from road traffic is a serious health hazard, and particulates from diesel exhaust have become cause for increasing concern. **Epidemiologic** studies have demonstrated associations between ambient particulate matter and respiratory-associated **morbidity** and **mortality**; these effects may be greater among persons with **preexisting respiratory disease**, including **asthma**.

Diesel engines emit relatively low concentrations of **carbon monoxide** and **carbon dioxide**, but as compared with gasoline engines of similar size, diesel engines can generate more than 100 times the number of particles per distance traveled and are major contributors to atmospheric particulate pollution. In urban environments, almost 90% of traffic-generated particulate matter is from diesel exhaust.

Many urban residents, including those with increased susceptibility to the effects of air pollution, have short-term exposure to diesel traffic during normal activities. Studies of humans in exposure chambers have shown that controlled exposure to diesel exhaust can provoke increased **airway resistance** and **bronchial inflammatory** changes.

We explored the effects of roadside traffic exposure on people with **mild** or **moderate** asthma, of differing **severity**, on a busy city street where traffic is entirely diesel-powered. We tested the hypothesis that short-term, ambient exposures to diesel traffic would lead to a reduction in lung function and a worsening of symptoms, accompanied by increased **inflammation** in the **lungs**.

<日本語訳>

道路交通による大気汚染は深刻な健康被害であり、ディーゼル排気ガスからの微粒子はますます懸念されている。疫学研究では、周囲の粒子状物質と呼吸器に関連した罹患率や死亡率との関連性が実証されている。これらの影響は、喘息を含む呼吸器疾患の既往症がある人ほど大きい可能性がある。

ディーゼルエンジンは比較的低濃度の一酸化炭素と二酸化炭素を排出するが、同程度の大きさのガソリンエンジンと比較すると、ディーゼルエンジンは走行距離あたり100倍以上の微粒子を発生させ、大気中の微粒子汚染の主な原因となっている。都市環境では、交通によって発生する粒子状物質のほぼ90%がディーゼル排気ガスによるものである。

大気汚染の影響を受けやすい人を含む多くの都市住民は、通常の活動中にディーゼル交通に短期間暴露されている。暴露室におけるヒトの研究では、ディーゼル排気ガスへの制御された暴露が、気道抵抗の増加と気管支の炎症性変化を引き起こすことが示されている。

われわれは、交通量がすべてディーゼルエンジンである交通量の多い市街地の路上で、軽症または中等症喘息患者（重症度は異なる）の路上交通暴露の影響を調べた。ディーゼル交通への短期間の周囲暴露は、肺機能の低下と症状の悪化につながり、肺の炎症の増加を伴うという仮説を検証した。

<単語帳>

英語	発音記号	カタカナ	日本語
air pollution	éə pəluːʃən	エ'アー パル'ーション	大気汚染
epidemiologic	èpidiːmiələdʒɪk	エピディーミア'ラヂック	疫学的な
morbidity	mɔəbɪdəti	モービ'ディティ	罹患率
mortality	mɔətæləti	モータ'リティ	死亡率
preexisting	prɪːɪgzɪstɪŋ	ブリーイグズィ'スティン グ	既往の

英語	発音記号	カタカナ	日本語
respiratory disease	rɛsp(ə)rətò:ri dɪzíz	レ'スピラトリー ディズ ィーズ	呼吸器疾患
asthma	æzmə	ア'ズマ	喘息
carbon monoxide	káəb(ə)n manáksaɪd	カ'ーバン マナ'キサイド	一酸化炭素
carbon dioxide	káəb(ə)n dàíáksaɪd	カ'ーバン ダイア'キサイ ド	二酸化炭素
airway	éəweɪ	エ'アーウェイ	気道
resistance	rɪzístəns	リズィ'スタンス	免疫力
bronchial	bránkiəl	ブラ'ンキアル	気管支の
inflammatory	ɪnflæmətò:ri	インフラ'マトリー	炎症性の
mild	máɪld	マ'イルド	軽度の
moderate	máðərət	マ'デレート	中程度の
severity	səvərətɪ	セヴェ'リティ	重症度
inflammation	ɪnfləméɪʃən	インフラメ'イション	炎症
lungs	lɒŋz	ラ'ングズ	肺

<音読課題7>

A 35-year-old right-handed man was **admitted** to the hospital because of persistent **headache** and **deviation of the tongue**.

The **patient** had been in excellent health until about one month earlier, when a left-sided headache developed, with occasional bright spots in the left **visual field**, subjective fever, **chilliness**, and **anorexia**; he lost 5 kg of body weight at this time. The headache became severe and was not affected by **nonsteroidal anti-inflammatory agents**, the patient's position, straining or **coughing**. During this period, his tongue deviated to the left and caused **drooling**, although he had no **dysphasia** or **dysphagia**.

One week before **admission**, the patient was seen at a community health center affiliated with this hospital, where he reported a **transient sore throat**. **Ibuprofen** and **amoxicillin** were **prescribed**, but his condition did not **improve**. A throat **culture** was **negative** for **beta-hemolytic streptococci**. He was admitted to this hospital.

The patient was a native of Morocco and had immigrated to the United States one year before admission. He worked as a cook. He had **smoked** one pack of **cigarettes** daily for 10 years and used **marijuana** occasionally; he did not drink **alcohol**.

<日本語訳>

35歳の右利きの男性が、持続する頭痛と舌の逸脱のため入院した。

この患者は、約1ヵ月前まで非常に健康であったが、左側頭痛が出現し、時折左視野に輝点、自覚的な発熱、寒気、食欲不振がみられ、この時期に体重が5kg減少した。頭痛はひどくなり、非ステロイド性抗炎症剤、患者の体位、力み、咳には影響されなかった。この時期、舌は左に偏位し、嚥下障害はなかったが、流涎がみられた。

入院1週間前、患者は当院付属の地域医療センターを受診し、一過性の咽頭痛を訴えた。イブプロフェンとアモキシシリンが処方されたが、症状は改善しなかった。咽頭培養の結果、 β 溶血性連鎖球菌は陰性であった。当院に入院した。

患者はモロッコ出身で、入院の1年前に米国に移住していた。調理師として働いていた。タバコは10年前から毎日1箱吸っており、マリファナも時々使用していた。

<単語帳>

英語	発音記号	カタカナ	日本語
admitted	əd'mɪtɪd	アドミ'ティッド	入院する
headache	hédə'ek	ヘ'デイク	頭痛
deviation of the tongue	dī:víeɪʃən (ə)v ðə tʌŋ	ディーヴィエ'イション アヴ ザ タ'ン	ぜっへんい 舌偏位
patient	péɪʃənt	ペ'イシャント	患者
visual field	víʒuəl fí:ld	ヴィ'ジュアル フィ'ールド	視野
chilliness	tʃílinəs	チ'リネス	さむけ 寒気
anorexia	ænərə'eksia	アナレ'クシア	拒食症
nonsteroidal anti-inflammatory agents	nɒnstéroid(ə)l ænti inflæmətò:ri éidʒənts	ナンステ'ロイダル アン ティ インフラ'マトーリ エ'イヂャンツ	非ステロイド性抗炎症薬
coughing	kó:fɪŋ	コ'ーフィング	咳をすること
drooling	drú:lɪŋ	ドゥル'ーリング	よだれを垂らすこと

英語	発音記号	カタカナ	日本語
dysphasia	disfɛɪz(i)ə	ディスフェ'イジア	失語症
dysphagia	disfɛɪdʒ(i)ə	ディスフェ'イヂア	嚥下障害
admission	ədmiʃən	アドミ'ッション	入院
transient	trænjənt	トラ'ンシャントゥ	一過性の
sore throat	sóə əróut	ソー スロ'ウトゥ	喉の痛み
ibuprofen	àɪbjʊ:próʊfən	アイビュープロ'ウフェン	イブプロフェン
amoxicillin	əmàksəsíln	アマクサスイ'リン	経口ペニシリン
prescribed	prískráɪbd	プリスクライ'ブド	処方された
improve	ɪmprú:v	インプル'ーヴ	回復する
culture	káltʃə	カルチャー	培養
negative	négəʈɪv	ネ'ガティヴ	陰性
beta-hemolytic streptococci	béɪtə hì:məlítɪk streptoukákai	ベ'イタ ヒーマリ'ティック ストレプトウカ'ーカイ	β 溶血性連鎖球菌
smoked	smóukt	スモ'ウクト	喫煙した
cigarettes	sìgəréts	スイガレ'ッツ	たばこ
marijuana	mæərə(h)wá:nə	マリワ'ーナ	マリファナ
alcohol	ælkəhò:l	アルカホール	アルコール

<音読課題8>

Epilepsy is a **chronic neurological** condition characterized by **recurrent seizures**. A seizure happens when abnormal electrical activity in the **brain** causes an involuntary change in body **movement** or function, **sensation**, awareness, or **behavior**. Seizures can vary from a momentary disruption of senses to short periods of **unconsciousness**, or from staring spells to **convulsions**. Some people have only one type of seizure while others show more than one type. The term epilepsy can be used interchangeably with seizure disorder. Epilepsy is a chronic condition and it cannot be **transmitted** from person to person.

<日本語訳>

てんかんは、再発性の発作を特徴とする慢性の神経疾患である。発作は、脳内の異常な電氣的活動により、身体の動きや機能、感覚、意識、行動に不随意的な変化が起こることによって起こります。

発作は、一瞬の感覚の障害から短時間の意識障害、あるいは凝視発作からけいれん発作までさまざまです。発作が1種類しかない人もいれば、2種類以上の発作を示す人もいます。てんかんという言葉は、発作性疾患と同じ意味で使われることもあります。てんかんは慢性疾患であり、人から人へ感染することはありません。

<単語帳>

英語	発音記号	カタカナ	日本語
epilepsy	épəlèpsi	エ'ピレプスイ	てんかん
chronic	kráník	クラ'ニック	慢性の
neurological	n(j)ù(ə)rəládʒík(ə)l	ニューララ'ヂカル	神経病学の
recurrent	ríká:rənt	リカ'ーレント	再発する
seizures	sí:ʒəz	スイ'ージャーズ	(てんかんによる) ^{けいれん} 痙攣
brain	bréin	ブレ'イン	脳
movement	mú:vmənt	ム'ーヴメント	運動
sensation	senséɪʃən	センセ'イション	感覚
behavior	bɪhéɪvjə	ビヘ'イヴィアー	行動
unconsciousness	ʌnkánʃəsnes	アンカ'ンシャスネス	意識不明
convulsions	kənválʃənz	カンヴァ'ルシャンズ	ひきつけ
transmitted	trænsmítɪd	トランスミ'ティッド	伝染する

<音読課題9>

Several studies have linked **aspirin** use to the development of **Reye's syndrome** in children **recovering** from **flu** or **chickenpox**. **Reye's syndrome** is a rare but serious illness that usually occurs in children between the ages of 3 and 12 years. It can affect all organs of the body but most often the **brain** and **liver**. While most children who survive an **episode** of **Reye's syndrome** do not suffer any lasting consequences, the **illness** can lead to permanent brain damage or **death**. The American Academy of **Pediatrics** recommends children and **teenagers** not be given aspirin or medicine containing aspirin when they have any viral illness such as the **common cold**.

<日本語訳>

インフルエンザや水疱瘡から回復した小児において、アスピリンの使用とライ症候群の発症を関連づけた研究がいくつかある。ライ症候群は、まれではあるが、通常3歳から12歳の小児に発症する重篤な病気である。全身の臓器が侵される可能性があるが、脳と肝臓が侵されることが多い。ライ症候群を発症しても、ほとんどの子どもは後遺症を残さないが、この病気は脳の永久的な損傷や死につながる可能性がある。米國小児科学会は、小児やティーンエイジャーが風邪などのウイルス性疾患に罹患した場合、アスピリンやアスピリンを含む薬を与えないよう推奨している。

<単語帳>

英語	発音記号	カタカナ	日本語
aspirin	æsp(ə)rɪn	ア'スピリン	アスピリン
Reye's syndrome	ráɪz sɪndrəʊm	ライズ スィ'ンドロウム	ライ症候群
recovering	rɪkʌv(ə)rɪŋ	リカ'ヴァリング	回復している
flu	flú:	フルー	インフルエンザ
chickenpox	tʃɪk(ə)npəks	チ'キンパクス	みずぼうそう 水疱瘡
brain	bréɪn	ブレ'イン	脳
liver	lívə	リ'ヴァー	肝臓
episode	épəsəʊd	エ'ピソウド	発病
illness	ílness	イルネス	病気
death	dée	デ'ス	死
pediatrics	pɪ:diætɪks	ピーディア'トリックス	小児科学
teenagers	tí:nèɪdʒəz	ティ'ーネイチャーズ	13歳から19歳の若者
common cold	kámən kóʊld	カ'マン コ'ウルド	風邪

<音読課題10>

According to the Centers for Disease Control and Prevention, about 10% of women (6.1 million) in the United States aged 15 - 44 have difficulty getting **pregnant** or staying pregnant.

Though nearly one-third of **infertility** cases are found in women, infertility is not always a woman's problem. Indeed, another third of **fertility** problems occurs in men, indicating that infertility is a shared burden of both women and men. It sometimes happens that in a married couple the **sterility** is attributed to both partners, or the cause may be unknown. Infertility can be treated with medicine, surgery, or **artificial insemination**. Many times, specialists use a combined **therapy** approach.

<日本語訳>

米国疾病予防管理センターによると、米国では15～44歳の女性の約10%（610万人）が妊娠しにくい、あるいは妊娠を継続することが困難であるという。

不妊症の3分の1近くは女性に見られるが、不妊症は必ずしも女性の問題ではない。実際、不妊症の別の3分の1は男性に起こっており、不妊症は女性にも男性にも共通の負担であることを示している。結婚しているカップルの場合、不妊の原因が両方のパートナーにあったり、原因が不明であったりすることもある。不妊症は薬、手術、人工授精などで治療することができます。多くの場合、専門医は複合的な治療法を用います。

<単語帳>

英語	発音記号	カタカナ	日本語
pregnant	prégnənt	プレ'グナント	妊娠している
infertility sterility	ɪnfə(:)tɪləʒi stə'ɪləʒi	インファ-ティ'リティ スタリ'リティ	不妊
fertility	fə:tɪləʒi	ファ-ティ'リティ	にんよう 妊孕性
artificial insemination	àɹtəfɪʃəl ɪnsəmənɛɪʃən	アーティフィ'シャル イ ンセミネ'イション	人工授精
therapy	eéɹəpi	セ'ラピー	療法