

a
Focus H2-Q7:
colour = its row of spearman_fold_change
H2-Q7
H2-Q6 0.82
Fxyd5 0.65
H2-D1 0.66
DE, FDR 5%
Tapbpl 0.73
Sec62 0.63
Mahalanobis distance (Kompot)
Mean log2 fold change, Old vs Young (Kompot)
b
Focus H2-Aa:
same plot, new row
Cd74 0.81
H2-Aa
H2-Ab1 0.88
H2-Eb1 0.93
Ciita 0.84
DE, FDR 5%
H2-DMb1 0.74
Mean log2 fold change, Old vs Young (Kompot)
Spearman ρ with focused gene
(fold-change layer, across cells)
c
module 1 (87)
module 2 (68)
module 3 (35)
H2-Q6 0.82
Cd74 0.24
H2-Aa 0.20
module 2
ρ with H2-Q7
H2-Q7, module 1: median ρ = 0.16;
52 of 86 members ρ < 0.2, 0 others ρ > 0.5
S100a8 0.95
Camp 0.72
Ngp 0.61
ρ with S100a9
S100a9, module 3: median ρ = 0.24;
13 of 34 members ρ < 0.2, 2 others ρ > 0.5
DE genes ranked by ρ with the focused gene (n = 189)
d
shares its
age response
H2-D1
H2-Q6
Fxyd5
Tapbpl
B2m
Sec62
Zc3h6
H2-K1
shares its
cell-state
pattern only
smoothed ρ > 0.7, fold-change ρ < 0.5 (n = 192)
fold-change ρ > 0.5 (n = 35)
ρ with H2-Q7, fold change
(spearman_fold_change)
ρ with H2-Q7, smoothed expression
(spearman_smoothed)