

1 금성 복통

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)	예	아니오
복통이 시작된 시점 을 확인하였다.		
복통의 위치와 이동 양상, 방사통 빈도 를 확인하였다.		
복통의 지속 시간 에 대해서 물어보았다.		
통증의 양상(찌르는, 조이는, 쥐어짜는, 지속적 or 간헐적)에 대해서 구체적으로 질문하였다.		
복통의 강도 를 확인하였다.		
발열 혹은 오한 에 대해서 물어보았다.		
복통의 악화 및 완화 인자(식사, 자세, 배뇨, 배변) 를 확인하였다.		
소화기 증상 에 대해서 질문하였고(식욕부진, 구역질, 구토, 변비, 설사, 혈변, 황달 등), 평소에 속쓰림 혹은 신트림 이 있는지 물어보았다.		
소변 볼 때 통증 혹은 혈뇨 에 대해서 물어보았다.		
[여성] 환자의 산부인과적 병력(월경력, 성관계, 질출혈) 을 확인하였다.		
순환기(가슴 통증, 호흡곤란) 증상에 대해서 물어보았다.		
병력 청취(기본)	예	아니오
현재 복용 중인 약물 에 대해서 확인하였다(소염진통제, 소화제).		
음주 횟수와 양 에 대해서 모두 물어보았다.		
소화기 질환의 가족력 에 대해서 물어보았다.		
복부 외상력 및 수술력 에 대해서 질문하였다.		
환자의 과거 소화기 질환 여부를 확인하였다.		
환자의 식습관 및 운동 여부 에 대해서 물어보았다.		
과거에 위내시경 해 본 적이 있는지 물어보았다.		

신체 진찰	잘함	보통	미흡
환자의 생체 징후 를 확인하였다.			
눈 진찰을 통해 황달 , 빈혈 유무 를 확인하였다.			
복부 진찰을 위해 환자를 바로 눕히고 양쪽 무릎을 세웠다 .			
배를 만지기 전에 청진을 복부 5군데에서 3초 이상 실시하였다.			
복부 시진 - 청진 - 타진 - 촉진 의 순서대로 진찰을 시행하였다.			
통증이 심한 부위를 마지막으로 촉진 하며, 반발통 여부를 확인하였다.			
[급성 담낭염 의심 시] 상복부를 누르면서 숨을 내쉬고 들이 쉴 때 복부 통증 이 심해지는지 확인하였다.			
[급성 충수돌기염 의심 시] 오른쪽 허벅지를 신전 하거나, 오른쪽 허벅지를 내회전 시켰을 때 통증 이 있는지 확인하였다.			
진찰 시 늑골 척추각 압통(CVAT) 여부를 확인하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
가능한 진단을 설명하고 필요한 검사 계획에 대해서 설명하였다.			
수술적 치료 가 필요한 경우 이에 대해서 설명하였다.			
내시경 등의 검사가 필요한 경우 금식을 하도록 지도하였다.			

환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			



Memo

