

10 두근거림

채점표 예시


병력 청취(주제 관련)	예	아니오
두근거림이 나타난 시점, 상황, 빈도, 지속 시간 에 대해서 확인하였다.		
두근거림의 양상(직접 측정해 봤는지, 갑자기 시작 혹은 끝나는지, 불규칙한 지) 에 대해서 파악하였다.		
두근거림과 동반되는 순환기계 증상(흉통, 숨참, 실신), 저혈당 증상, 내분비계 증상(더위불내성, 두통과 식은땀) 에 대해서 물어보았다.		
정신과적 병력 여부를 확인하였다.		
폐경 여부를 확인하였다.		
과거에도 비슷한 경험이 있는지 물어보았다.		
병력 청취(기본)	예	아니오
사용 중인 약물 및 커피, 음주, 흡연 에 대해서 확인하였다.		
환자의 심혈관계 위험 인자 를 확인하였다(흡연, 고혈압, 당뇨 등).		
심혈관 질환의 가족력 에 대해서 물어보았다.		
심장 수술력 에 대해서 질문하였다.		
환자의 과거 심혈관 질환 에 대해서 확인하였다.		

신체 진찰	잘함	보통	미흡
환자의 생체 징후 를 확인하였고(노동맥 촉진하여 맥박 확인), 양쪽 손목에서 맥박을 측정하였다.			
결막을 시진 하여 창백한지 확인하였다.			
갑상샘 시진 및 촉진 을 시행하였다.			
환자의 고개를 돌린 상태에서 경동맥과 경정맥 을 진찰하였다.			
폐음을 12번 이상 청진 하였다.			
심음을 5군데 이상 올바른 위치에서 2초 이상 청진하였다.			
손 떨림 이 있는지 확인하였다.			

신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			

환자 교육	잘함	보통	미흡
원인 감별을 위한 검사 계획에 대해서 설명하였다.			
진단을 위한 검사 계획을 설명하였다.			
필요한 약물 치료 및 대증적 요법에 대하여 설명하였다.			
증상이 재발할 경우 취해야 할 조치에 대하여 설명하였다.			
커피, 스트레스, 술, 담배 등 두근거림의 요인을 줄이도록 교육하였다.			
응급 치료가 필요한 환자를 감별하고 치료 계획을 수립하였으며, 응급 조치에 대해 교육하였다.			

환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			



Memo