

11 고혈압

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)	예	아니오
언제 혈압이 높다고 들었는지 물어보았다.		
혈압이 올바르게 측정되었는지 확인하였다(다른 곳에서 2회 이상, 5분 이상 안정, 커피/담배/운동 여부).		
표적기관 손상 여부(어지러움, 두통, 시야장애, 가슴 통증, 거품뇨, 붓는 증상)에 대해서 두 가지 이상 질문하였다.		
2차성 고혈압에서 나타날 수 있는 증상(체중의 변화, 부종, 소변양 변화, 호흡곤란, 두근거림 등)을 확인하였다.		
고혈압의 위험 인자를 확인하였다(비만, 당뇨, 고지혈증).		
고혈압의 합병증에 대해서 물어보았다(눈, 심장, 신장).		

병력 청취(기본)	예	아니오
복용 중인 약물에 대해서 확인하고, 고혈압약을 복용 중이라면 혈압이 잘 조절되는지 확인하였다.		
과거 고혈압 진단 여부를 확인하였다.		
심혈관 질환 및 뇌졸중의 가족력에 대해서 물어보았다.		
환자의 과거 심혈관 질환에 대해서 확인하였다.		
심혈관 질환의 위험도를 평가하였다(식사 습관, 운동, 음주, 흡연).		

신체 진찰	잘함	보통	미흡
환자의 생체 징후를 확인하였고, 양쪽 손목에서 맥박을 측정하였다.			
키, 몸무게, 허리둘레를 측정하였다.			
양쪽 목동맥을 환자에게 숨을 참으라고 지시한 후 청진하였다.			
갑상샘 시진 및 촉진을 실시하였다.			

심음을 5군데 이상 올바른 위치에서 2초 이상 청진하였다.			
복부를 시진하고 양쪽 콩팥동맥 부위를 청진 하여 잡음을 확인하였다.			
오목 부종 을 확인하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
임상 술기(필요 시)	잘함	보통	미흡
혈압 측정 에 대해서 설명하고 시행하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
고혈압의 위험성과 합병증에 대해서 교육하였다.			
현재 혈압과 목표 혈압을 고지하였다.			
원인 감별을 위한 검사 계획에 대해서 설명하였다.			
필요한 약물 치료 및 대중적 요법에 대하여 설명하였다.			
자가 혈압 측정과 규칙적인 투약의 중요성을 설명하였다.			
환자의 심혈관 질환 위험도 를 알려주고 예방하기 위한 생활 습관을 교육 하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			

말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

증례별 알고리즘

