

17-2 소변량 변화(핍뇨)

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)	예	아니오
증상이 나타난 시점 에 대해서 확인하였다.		
핍뇨 혹은 무뇨 에 해당하는지 파악하였다(<500ml/d, <50~100ml/d).		
소변색의 변화 가 있는지 물어보았다.		
전신 증상 에 대해서 질문하였다(발열, 오한, 체중 감소).		
요독 증상 (구역, 구토, 가려움증)에 대해서 물어보았다.		
신전성 증상에 대해서 질문하였다(탈수, 설사, 출혈 등)		
신성 증상에 대해서 질문하였다(혈뇨, 거품뇨, 옆구리 통증, 하복부 통증).		
신후성 증상에 대해서 질문하였다(FUND, HIS).		
병력 청취(기본)	예	아니오
사용 중인 신독성 약물 에 대해서 확인하였다(소염제, 고혈압약, 항생제).		
최근 음식 이나 수분 섭취 가 줄었는지 물어보았다.		
최근 감기 및 심한 운동 여부에 대해서 질문하였다.		
신장 및 비뇨기계 질환 의 가족력에 대해서 물어보았다.		
복부 및 비뇨기계 외상력 및 수술력 에 대해서 질문하였다.		
조영제를 사용한 검사나 요도 카테터를 삽입한 적이 있는지 물어보았다.		
환자의 과거 신장 질환 과 만성 질환에 대해서 물어보았다.		

신체 진찰	잘함	보통	미흡
환자의 생체 징후 를 확인하였다.			
환자의 피부 긴장도 및 구강 점막 을 확인하여 탈수 여부를 확인하였다.			
팔다리를 충분히 노출시킨 후 사지 부종 을 확인하였다.			

홍부 진찰을 실시하였다.			
복부 진찰을 위해 환자를 바로 눕히고 양쪽 무릎을 세웠다.			
복부 진찰은 하복부를 포함하여 5군데에서 실시하였다.			
늑골 척추각 압통을 설명하고 시행하였다.			
Suprapubic 부위 진찰을 통해 방광이 팽창한 상태인지 확인하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
임상 술기(필요 시)	잘함	보통	미흡
[남성] 직장수지검사를 실시하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
원인 감별을 위한 검사 계획에 대해서 설명하였다.			
필요한 약물 치료 및 대증적 요법에 대하여 설명하였다.			
추적 소변검사의 필요성에 대해서 설명하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			

눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰 할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

증례별 알고리즘

