

17-1 소변량 변화(다뇨증)

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)		예	아니오	
소변량이 많아지기 시작한 시기 를 확인하였다.				
배뇨의 양 과 횟수 를 확인하였다.				
다뇨 와 빈뇨 를 감별하였다(≥50ml/kg, 3L/d).				
배뇨의 양상(색/냄새/거품) 에 대해서 질문하였다.				
탈수 증상 과 다음 여부 를 확인하였다.				
다갈 이 있는지 물어보았다.				
전신 증상 에 대해서 질문하였다(발열, 오한, 체중 감소).				
비뇨기 증상 에 대해서 질문하였다(FUND, HIS).				
신경계 증상(두통, 시야 변화, 성욕 감퇴나 발기 부전) 에 대해서 질문하였다.				
병력 청취(기본)		예	아니오	
현재 복용 중인 약물 에 대해서 확인하였다(이노제, 리튬).				
최근의 스트레스 에 대해서 질문하였다.				
신장 질환 및 당뇨병 의 가족력에 대해서 물어보았다.				
두부 외상력 및 수술력에 대해서 질문하였다.				
환자의 과거 신장 질환 및 만성 질환 여부를 확인하였다.				
[여성] 월경을 규칙적 으로 하고 있는지, 분만 경험이 있을 경우 분만 시 출혈이 심했는지 물어보았다.				
신체 진찰		잘함	보통	미흡
체중 감소 여부를 확인하였다.				
환자의 생체 징후 를 확인하였다.				

환자의 피부 긴장도 및 구강 점막 을 확인하여 탈수 여부를 확인하였다.			
팔다리를 충분히 노출시킨 후 사지 부종 을 확인하였다.			
복부 진찰을 위해 환자를 바로 눕히고 양쪽 무릎을 세웠다.			
복부 진찰은 하복부를 포함하여 5군데에서 실시하였다.			
늑골 척추각 압통 을 설명하고 시행하였다.			
복부 진찰 시 신동맥을 청진 하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
원인 감별을 위한 검사 계획에 대해서 설명하였다.			
탈수 및 전해질 이상 교정 의 필요성에 대해서 설명하였다.			
필요한 약물 치료 및 대증적 요법에 대하여 설명하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 살 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			

용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

증례별 알고리즘

