

21 쉽게 멍이 들

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)		예	아니오	
멍이 잘 생기기 시작한 시기 에 대해서 질문하였다.				
멍이 생긴 위치 와 크기 에 대해서 질문하였다.				
멍의 양상 (색, 모양, 크기, 개수, 대칭성, 통증, 가려움, 감각이상, 열감, 누르면 소실되는지)에 대해서 자세히 확인하였다.				
혈소판, 혈관 이상, 응고 이상 을 감별하였다(살짝 베었을 때 심한 출혈, 과거 수술 혹은 출산 시 심한 출혈, 잦은 코피나 잇몸 출혈, 월경량 과다, 혈관절).				
동반 증상 에 대해서 질문하였다(발열, 체중 변화, 어지럼, 복통, 관절통).				
외상 에 의해 든 멍은 아닌지, 직업 은 무엇인지 질문하였다.				
탈수 증상 이 있는지 질문하였다.				
출혈 위험도 를 평가하였다(부딪치지 않더라도 그냥 멍이 드는지, 멍이 계속 커지는지, 칫솔질 후 구강에서 피가 새어나오는지 등).				
병력 청취(기본)		예	아니오	
복용 중인 약물이나 건강식품 에 대해서 질문하였다.				
과거에 감기 들면 멍이 생기고, 감기가 나으면 멍이 사라진 적이 있는지 물어 보았다.				
다른 병 을 진단 받은 적이 있는지 물어보았다(간질환, 신장 질환, 악성 종양, 자가면역 질환, 혈액 질환 등).				
음주 여부 와 양 에 대해서 질문하였다.				
여행력 이 있는지 물어보았다.				
가족들 중 멍이 잘 드는 사람이 있는지 물어보았다.				
[여성] 여성 환자의 경우 임신 가능성 이 있는지 물어보았다.				
신체 진찰		잘함	보통	미흡
환자의 생체 징후 를 확인하였다.				

피부의 멍을 시진 및 촉진하였고, 발진 및 부종 유무를 확인하였다.			
팔다리관절을 시진하고 촉진하며 운동을 확인하였다.			
눈결막과 공막을 관찰하였다.			
구강과 잇몸을 시진하였다.			
경부 림프절을 촉진하였다.			
흉부 청진하여 호흡음 이상을 확인하였다.			
복부를 시진하고 지라와 간의 크기를 확인하기 위하여 타진과 촉진 을 실시하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
임상 술기(필요 시)	잘함	보통	미흡
안전 수혈 술기에 대해서 설명하고 시행하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
멍이 발생하는 기전과 예상되는 원인에 대하여 설명하였다.			
향후 필요한 검사에 대하여 설명하고 동의를 구하였다.			
향후 치료 계획에 대하여 설명하였다.			
출혈 위험에 대한 관리 원칙을 설명하였다.			
응급 상황을 의미하는 증상과 처치를 교육하였다.			
아스피린, 진통소염제 등의 복용은 주의할 필요가 있음을 설명하였다.			
수술이나 발치 예정 시 의사와 상의해야 함을 설명하였다.			

