

28 기분 변화

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)		예	아니오
기분 변화가 언제부터 시작했는지 질문하였다.			
이전에도 이런 증상 이 있는지 물어보았다.			
본인이 원해서 병원에 방문했는지 질문하였다.			
기분에 관련해서 물어보았다(기분이 어떤지, 기분에 대해서 어떻게 반응하는지).			
주요 우울장애의 진단 기준 에 대해서 질문하였다(우울함이 하루 종일 지속되는지, 의욕이나 흥미가 떨어지는지, 수면 감소, 죄책감, 에너지 감소, 집중력 감소, 식욕 감소 및 체중 감소, 정신운동지체, 자살 사고/계획/시도).			
기분 변화의 유발 요인 이나 악화 요인 을 확인할 수 있다(예 계절, 월경, 스트레스 등).			
기분 변화의 원인이 될 만한 스트레스 에 대해서 질문하였다.			
대인 관계 에 문제가 있는지 물어보았다.			
기분 변화가 나타나는 특정 시기 가 있는지 물어보았다(계절, 출산 후).			
기분 변화가 동반되는 정신과적 증상, 인지 기능장애 에 대해서 질문하였다(조증, 조현병, 불안장애 포함).	조증 : 이전에 기분이 들뜬 시기가 있었는지		
	조현병 : 환각, 망상		
	불안장애 : 불안		
	인지기능장애 : 기억력 저하, 집중력 감퇴		
신체 증상 에 대해서 질문하였다(추위불내성, 피로 등).			
현재 또는 과거 자살 사고, 계획, 시도 여부를 확인하였다.			
병력 청취(기본)		예	아니오
복용 중인 약물 에 대해서 질문하였다(스테로이드, 경구피임약, 다이어트 약 등).			
환자가 앓고 있는 신체 질환 에 대해서 질문하였다.			
이전에 정신건강의학과 진료 를 받은 적 있는지 질문하였다.			
음주력 에 대해서 질문하였다.			

가족들 중 우울증이 있거나 정신건강의학과 진료를 받은 사람이 있는지 질문하였다.		
최근 스트레스를 많이 받는 환경인지 물어보았다.		

신체 진찰	잘함	보통	미흡
환자의 갑상샘 을 시진 하고 촉진 하였다.			
호흡음 및 심음 을 청진 하였다.			
양 정강이 의 오목 부종 을 확인하였다.			
양측 상하지 의 근력 을 비교하며 측정하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			

환자 교육	잘함	보통	미흡
환자가 느끼는 기분 변화에 대해서 안심시키고 공감하였다.			
의심되는 질환의 원인에 대해서 설명하였다.			
의심되는 질환들을 감별하기 위한 검사의 필요성에 대해서 설명하였다.			
기분 변화를 확인할 수 있는 평가 척도(심리검사)를 의뢰할 수 있다 (예) 백 우울척도 검사, 양극성 우울성 평가 척도 등).			
앞으로의 치료 계획에 대해서 설명하였다(우울증 , 조증 을 포함해 치료 개요를 쉽게 설명할 수 있다).			
자살 사고나 응급 상황에서 입원 치료를 권유하였다.			
급성기의 증상 완화를 위한 약물 치료 와 정신 치료 계획 을 수립할 수 있다.			
항우울제 치료가 필요한 경우 2~3주가 지나야 효과가 있음을 설명하였고, 그 부작용에 대해서도 충분히 설명하였다			

환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

증례별 알고리즘

