

29 불안

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)		예	아니오	
불안감이 언제부터 시작했는지 질문하였다.				
불안의 양상에 대해서 질문하였다(불안의 강도, 일상 생활 지장 여부, 불안 지속 시간).				
불안의 추정되는 원인에 대해서 질문하였다(특정 장소나 상황, 특정 대상, 스트레스를 받을 만한 사건 등).				
평상 시 성격은 어떤 지, 대인 관계는 어떤 지 물어보았다.				
불안감과 동반되는 정신과적 증상에 대해서 질문하였다(우울, 원치 않는 생각이나 행동이 반복, 망상, 환각, 자살 사고/계획/시도).				
불안감과 동반되는 신체 증상에 대해서 질문하였다(두근거림, 체중 변화, 더위불내성 등).				
병력 청취(기본)		예	아니오	
머리를 다친 적이 있는지 물어보았다.				
복용 중인 약물, 복용하다 중단한 약물에 대해서 질문하였다.				
환자가 앓고 있는 신체 질환에 대해서 질문하였다.				
이전에 정신건강의학과 진료를 받은 적 있는지 질문하였다.				
음주력에 대해서 질문하였다.				
가족들 중 우울증이 있거나 정신건강의학과 진료를 받은 사람이 있는지 질문하였다.				
커피, 녹차 등 카페인 관련 음료를 얼마나 섭취하는지 확인하였다.				
최근 스트레스를 많이 받는 환경인지에 대해서 확인하였다.				
신체 진찰		잘함	보통	미흡
환자의 맥박을 촉진하였다.				
환자의 갑상샘을 시진하고 촉진하였다.				

호흡음 및 심음을 청진하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
환자가 느끼는 불안감에 대해서 안심시키고 공감하였다.			
의심되는 질환의 원인에 대해서 설명하였다.			
의심되는 질환들을 감별하기 위한 검사의 필요성에 대해서 설명하였다.			
앞으로의 치료 계획에 대해서 설명하였다.			
환자의 예후에 대해서 설명하였다.			
환자에게 생활 습관의 교정의 필요성에 대해서 설명하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			

적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.

증례별 알고리즘

