

3 토혈

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)		예	아니오	
토혈을 한 시간, 횟수, 양, 색 에 대해서 물어보았다.				
객혈을 감별하기 위해 질문하였다(거품, 기침, 구토, 음식물 동반).				
전신 증상(피로, 체중 감소)에 대하여 물어보았다.				
대량 출혈 여부를 파악하였다(어지럼증, 소변량 감소, 호흡곤란).				
출혈 경향 (피가 나면 잘 멎지 않거나, 코피가 자주 나거나, 멍이 잘 드는 등)에 대해서 질문하였다.				
소화기 증상 (속쓰림, 혈변, 흑색변)에 대해서 질문하였다.				
토혈 전 심한 구토 여부에 대해서 확인하였다.				
최근 과음 여부를 확인하였다.				
병력 청취(기본)		예	아니오	
현재 복용 중인 약물 에 대해서 확인하였다(NSAIDs, 항응고제).				
소화기 질환 및 간질환의 가족력에 대해서 물어보았다.				
환자의 소화기 질환 및 간질환, 간염, 간경변 과거력을 확인하였다.				
환자의 음주력 을 확인하였다.				
흡연력 에 대해서 물어보았다.				
신체 진찰		잘함	보통	미흡
환자의 생체 징후 를 확인하였다.				
환자의 피부 긴장도 및 구강 점막 을 확인하여 탈수 여부를 확인하였다.				
목 안 을 설압자와 펜라이트로 확인하였다.				
눈 진찰을 통해 황달, 빈혈 유무 를 확인하였다.				
복부 진찰을 위해 환자를 바로 눕히고 양쪽 무릎을 세웠다 .				

배를 만지기 전에 청진을 복부 5군데에서 3초 이상 실시하였다.			
복부 시진 - 청진 - 타진 - 촉진 의 순서대로 진찰을 시행하였다.			
복부를 촉진하여 압통, 종괴, 간비대 등을 확인하였다.			
복부 타진 및 촉진으로 간과 지라의 크기 및 복수 여부를 확인하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
임상 술기(필요 시)	잘함	보통	미흡
혈압 측정 에 대해서 설명하고 시행하였다.			
정맥주사 에 대해서 설명하고 시행하였다.			
안전 수혈 술기 에 대해서 설명하고 시행하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
환자의 불안감을 배려하며 안심 을 시켜 주었다.			
수액 공급 및 수혈 의 필요성에 대해서 설명하였다.			
진단과 지혈 치료를 위한 내시경의 필요성 에 대해서 설명하였다.			
다시 토혈하였을 때의 주의사항 (어지럼 / 호흡곤란 동반 시 내원이 필요함)을 교육하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			

말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

증례별 알고리즘

