

병력 청취(주제 관련)	예	아니오
잠을 못 자는 증상이 시작된 시점 에 대해서 물어보았다.		
불면의 심한 정도 (횟수)에 대해서 질문하였다.		
수면 시간(몇 시에 잠들어서 몇 시에 깨어나는지, 중간에 몇 번 깨고 나서 다시 잠을 못 자는지, 낮잠 시간)에 대해서 질문하였다.		
일상 생활에 얼마나 지장 이 되는지 질문하였다.		
수면 위생에 대해서 확인하였다(저녁에 무엇을 하는지, 잠자리 환경, 커피, 녹차, 담배, 잠이 안오면 어떻게 하는지).		
동반되는 정신과적 증상 에 대해서 질문하였다(우울, 불안, 스트레스).		
동반되는 신체 증상 에 대해서 질문하였다(야뇨, 폐경, 통증, 다리 불편감, 코골이 등).		
최근 잠을 못 자게 된 계기 혹은 스트레스 사건 혹은 걱정거리에 대해서 물어보았다.		
병력 청취(기본)	예	아니오
복용 중인 약물 및 수면제 복용 경험에 대해서 질문하였다.		
환자가 앓고 있는 신체 질환 에 대해서 질문하였다.		
이전에 정신건강의학과 진료 를 받은 적 있는지 질문하였다.		
음주력 에 대해서 질문하였다.		
가족들 중 정신건강의학과 진료를 받은 사람이 있는지 질문하였다.		
최근 우울 하거나 식욕이 저하 되지는 않았는지 확인하였다.		

신체 진찰	잘함	보통	미흡
키, 체중 을 통해 비만 여부를 확인하였다.			
환자의 호흡음 및 심음 을 청진하였다.			
기타 환자가 호소하는 증상과 관련하여 적절한 신체 진찰 을 시행하였다.			
정신 질환이 의심될 경우 Mental status examination 을 평가할 수 있다(특히 우울증에서 Mood, Affect, Suicidal ideation에 대해).			

구강검사를 시행하였다.			
감상샘기능검사를 시행하였다.			
신체 진찰(공동)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
환자를 안심시키고 긴장을 완화시켰다(수면장애 집착이 수면장애를 악화시킬 수 있다).			
추정 진단에 대해서 설명하였다.			
의심되는 질환의 원인에 대해서 설명하였다.			
원인 감별에 필요한 검사를 설명하였다(심리검사, 수면다원검사, 감상선기능검사, 혈액검사(약물검사 포함) 등).			
향후 치료에 대한 교육을 시행하였다.			
적절한 수면 - 진정제의 사용을 교육하였다(수면 - 진정제 남용을 유의한다).			
수면 위생 교육에 대해서 설명하였다(금주, 카페인 피하기 포함).			
우울증 등 정신 질환이 의심 될 시, 이에 대한 평가의 필요성을 설명하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			

용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

증례별 알고리즘

