

병력 청취(주제 관련)		예	아니오	
어지럼이 시작된 시기 와 발생 상황 에 대해서 질문하였다.				
어지럼의 지속 기간 에 관하여 물어보았다.				
어지럼의 양상 (빙빙도는 느낌, 흔들리고 쓰러질 것 같은 느낌), 지속 시간 에 대해서 질문하였다.				
얼마나 심하게 어지러운지 질문하였다.				
동반되는 신체 증상 에 대해서 질문하였다.	청각 증상 동반 여부 를 질문하였다(난청/이명/이충만감).			
	자율신경 증상 동반 여부 를 질문하였다(오심/구토/안면창백/식은땀/두근거림).			
	뇌신경 증상 에 대해서 질문하였다(두통/시아장애/팔다리 힘 빠짐/구음장애/보행장애).			
	기타 증상 : 두통, 흑색변, 실신 등			
동반되는 정신과적 증상 에 대해서 질문하였다(우울, 불안).				
어지럼의 악화 요인 및 완화 요인 에 대하여 질문하였다(움직임, 고개 돌림, 기립 등).				
병력 청취(기본)		예	아니오	
복용 중인 약물 에 대해서 질문하였다.				
환자가 앓고 있거나 앓았던 질환 (고혈압, 당뇨, 고지혈증 포함)에 대해서 질문하였다.				
외상력, 수술력 에 대해서 질문하였다.				
음주력, 흡연력 에 대해서 질문하였다.				
어지럼의 가족력 에 대해서 질문하였다.				
[여성] 월경 과다 여부를 확인하였다.				
신체 진찰		잘함	보통	미흡
두부 외상 을 시진 을 통해 확인하였다.				
결막 시진 하여 빈혈 을 확인하였다.				

안구 운동 및 눈떨림 유무를 확인하고(자발안진), 주시안진을 검사하기 위해 head-impulse test를 시행하였다.			
두진후안진검사(Head-shaking induced nystagmus test)를 시행하였다.			
청력검사(Rinne's test/Weber test)를 시행하였다.			
뇌신경검사를 시행하였다.			
소뇌신경 기능을 검사하였다(Finger to nose test, Rapid alternating movement).			
팔다리의 근력 및 감각을 검사하였다.			
걸음걸이를 보고 보행장애가 있는지 확인하였다.			
Romberg test를 시행하였다.			
두위변환안진검사(Dix-Hallpike test, Supine roll test)를 시행하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
임상 술기(필요 시)	잘함	보통	미흡
이경검사에 대해서 설명하고 시행하였다.			
안저검사에 대해서 설명하고 시행하였다.			
혈압 측정에 대해서 설명하고 시행하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
추정 진단에 대해서 설명하였다.			
어지럼증이 생기는 원인과 기전에 대해서 설명하였다.			
원인 감별에 필요한 검사를 설명하였다.			
향후 치료에 대한 교육을 시행하였다.			

말초성 어지럼의 비약물 치료를 교육하였다.			
생활 습관 교정에 대해서 설명하였다.			
어지럼이 발생할 경우 낙상을 예방하는 법에 대해서 설명하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰 할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

증례별 알고리즘

