

33 두통

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)		예	아니오	
두통의 발생 시점과 당시 상황(운동, 배변)에 대해서 물어보았다.				
두통의 지속 시간 및 빈도에 대해서 물어보았다.				
이전에도 이런 두통이 있었는지 물어보았다.				
두통의 특성(위치, 통증 양상, 강도)에 대해서 물어보았다.				
두통 전에 눈 앞이 캄캄해지거나 물체가 두 개로 보이지 않는지 물어보았다.				
두통과 함께 구역감, 구토, 경련이 있었는지 물어보았다.				
두근거리거나 식은땀이 나지 않았는지 물어보았다.				
뒷목이 뻣뻣한 느낌이 있었는지 물어보았다.				
두통의 악화 요인 혹은 완화 요인에 대해서 물어보았다.				
생리 주기 혹은 스트레스와 두통 간의 연관성에 대해서 물어보았다.				
병력 청취(기본)		예	아니오	
과거 복용 약물 및 진통제에 대한 반응에 대해서 물어보았다.				
과거 동반 질환, 최근 감기, 두부 외상의 과거력에 대해서 물어보았다.				
두통의 가족력이 있는지 물어보았다.				
흡연력과 음주력에 대해서 물어보았다.				
최근 우울하거나 불안한지에 대해서 확인하였다.				
신체 진찰		잘함	보통	미흡
환자의 생체 징후를 확인하였다.				
두부(두통이 있는 부위 포함)를 시진하고 촉진하여 통증이 유발되는지 확인하였다.				
양쪽 관자동맥을 촉진하였다.				

뇌신경검사(동공반사, 안구운동, 시야검사)를 시행하였다.			
양쪽 사지의 감각 및 근력기능검사를 시행하였다.			
수막 자극 징후(경부강직, kernig & brudzinski sign)를 확인하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
임상 술기(필요 시)	잘함	보통	미흡
안저검사에 대해서 설명하고 시행하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
두통의 원인과 감별을 위한 진단법에 대해서 설명하였다.			
유발 인자 회피 및 규칙적 생활 습관의 중요성에 대해서 설명하였다.			
2차성 두통의 경우 신속한 진단 및 치료가 필요함을 설명하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			

용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

증례별 알고리즘

