

병력 청취(주제 관련)	예	아니오
경련의 발생 시점과 당시 상황(발열, 수면 전후)에 대해서 물어보았다.		
경련의 지속 시간 및 횟수에 대해서 물어보았다.		
이전에도 발작이 있었는지 물어보았다.		
경련 전 전조 증상(시각 증상, 식은땀, 눈앞 캄캄해짐)이 있었는지 물어보았다.		
발작 당시 목격자가 있었는지 물어보았다.		
경련 중 의식 소실 여부, 경련 형태, 행동 변화에 대해서 물어보았다.		
경련 중 허깨짐, 대소변 실금, 안구편위, 자동증 여부를 확인하였다.		
경련 후 증상(두통, 마비, 혼돈, 피곤)에 대해서 물어보았다.		
최근 감기 혹은 최근 두통, 시야 이상 등의 증상이 동반되었는지 물어보았다.		
최근 우울하거나 불안하지 않았는지 물어보았다.		
경련의 유발 인자(수면, 발열, 스트레스, 음주 등)를 확인하였다.		
경련의 양상과 동반 증상을 확인해 진짜 경련과 경련 유사 증상을 구별할 수 있다.		
병력 청취(기본)	예	아니오
복용 중인 약물에 대해서 질문하였다.		
외상 및 뇌 수술력에 대해서 질문하였다.		
과거 열성 경련 혹은 신경계 질환의 과거력을 확인하였다.		
뇌전증 혹은 다른 신경계 질환의 가족력을 확인하였다.		
[소아] 환자의 나이를 묻고 출생력 및 발달력을 확인하였다.		
최근 시야장애나 체중 감소가 있었는지 확인하였다.		

신체 진찰	잘함	보통	미흡
환자의 생체 징후 를 확인하였다.			
설압자를 이용하여 입 안 을 확인하였다.			
환자의 머리에 외상이 있는지 시진 및 촉진 하였다.			
안면/몸통 피부 시진을 통해 피부 병변 유무 를 확인하였다(신경 피부증후군 질환 배제).			
팔다리 운동/감각검사 를 통해 국소 신경학적 징후를 확인하였다.			
뇌신경검사 및 소뇌기능검사 를 실시하였다.			
수막 자극 징후 를 확인하였다(경부강직, Kernig or Brudzinski sign).			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
경련의 원인과 감별을 위한 진단법에 대해서 설명하였다.			
응급 치료가 필요한 경우에 대해 설명하고, 이를 감별하기 위한 검사 계획을 설명하였다.			
유발 인자 회피 및 약물 치료에 대해서 설명하였다.			
[소아] 열성 경련의 경우 양성 경과를 설명하고 보호자를 안심시켰다.			
추후 경련이 발생할 경우 응급 처치 방법 에 대해서 설명하였다.			
위험 직업군(파일럿 등)의 경우 당장 치료가 필요함을 설명하였다.			

환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			



Memo