

병력 청취(주제 관련)		예	아니오	
마비/감각 저하의 발생 시점을 확인하였다(마지막 정상 시간 확인).				
근력/감각 이상이 서서히 혹은 갑자기 진행했는지에 대해서 물어보았다.				
마비/감각 저하의 발생 후 양상 및 진행 경과와 근력/감각 이상이 대칭적인지 비대칭적인지 물어보았다.				
마비/감각 저하의 발생 부위를 파악하였고, 몸 가까운 쪽과 먼 쪽 중 어느 쪽이 더 증상이 심한지 물어보았다.				
마비/감각 저하와 동반되는 증상(허리 통증, 구음장애, 두통, 시야 변화, 체중 감소)에 대해서 물어보았다.				
최근 상기도 감염이 있었는지 물어보았다.				
마비/감각 저하의 악화 인자 혹은 유발 인자에 대해서 물어보았다.				
병력 청취(기본)		예	아니오	
복용 중인 약물에 대해서 질문하였다.				
음주력, 흡연력에 대해서 질문하였다.				
직업력에 대해서 질문하였다.				
환자의 두부/척추/팔다리 외상 여부를 확인하였다.				
환자의 가족력을 확인하였다.				
환자의 과거력(고혈압, 당뇨, 뇌혈관 질환 등)을 확인하였다.				
신체 진찰		잘함	보통	미흡
환자의 생체 징후를 확인하였다.				
[뇌경색 의심 시] 심음 청진을 시행하였다.				
뇌신경검사(시야검사, 안구운동, 얼굴신경검사)를 실시하였다.				
상지의 근력 및 감각검사를 시행하였다.				

호프만 징후와 발목 클로누스를 확인하였다.			
하지의 근력 및 감각검사를 시행하였다.			
심부전 반사 및 바빈스키 징후를 평가하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
응급 치료를 필요로 하는 경우 신속한 검사와 처치가 필요함을 설명하였다.			
위험 인자 회피(금주, 금연 등) 및 생활 습관 개선에 대해서 설명하였다.			
혈압을 조절하는 것이 중요함을 설명하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

