

36 의식장애

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)	예	아니오	
의식장애의 발생 시점과 마지막으로 정상인 시점을 물어보았다.			
의식장애의 경과와 발생 당시 상황에 대해서 물어보았다.			
의식장애의 발생 전에 동반되는 증상에 대해서 물어보았다(선행된 국소 증상이나 징후가 있었는가?).			
평상시 의식 상태와 활동량을 물어보았다.			
최근 식사량의 변화에 대해서 물어보았다.			
최근 열이 나거나 감기 증상이 있었는지 물어보았다.			
병력 청취(기본)	예	아니오	
현재 약물 복용 (당뇨약, 수면제, 항우울제 등)에 대하여 물어보았다.			
약물 중독이나 알코올 중독의 가능성에 대해서 파악하였다.			
최근 두부 외상의 병력이 있었는지 물어보았다.			
환자의 기저 질환(당뇨, 간질환, 뇌혈관 질환)에 대해서 물어보았다.			
신체 진찰	잘함	보통	미흡
환자의 생체 징후를 재확인하였다.			
혈당 확인을 요구하였다.			
의식 정도를 평가하기 위해 부르거나 흔들어 깨워 보았다.			
지남력 평가를 위해 시간, 장소, 사람을 물어보았다.			
환자의 맥박 및 호흡 양상을 확인하였다.			
환자의 의식 수준을 Glasgow coma scale로 평가하였다.			
환자의 동공 크기를 측정하였고, 동공 반사를 확인했으며, 눈동자의 움직임, 안구진탕 여부를 관찰하였다.			
환자의 두부 외상 여부를 자세히 시진하였다.			

양쪽 사지의 감각 및 근력기능검사 를 시행하였다.			
병적 반사 유무 를 확인하였다.			
수막 자극 징후 (경부강직, kernig & brudzinski sign)를 확인하였다.			
환자에게 식은땀 이 나는지 확인하였다.			
흉부를 청진해 의식 저하 를 유발할 만한 사항이 있나 확인하였다 (흡인성 폐렴 등).			
환자의 경동맥 을 청진하였다.			
복수 여부를 확인하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
임상 술기(필요 시)	잘함	보통	미흡
안저검사 에 대해서 설명하고 시행하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
의식장애의 원인과 감별을 위한 진단법에 대해서 설명하였다.			
검사와 치료에 대한 환자가 동의를 구할 수 있는 상태인지 판단하였다.			
의식되는 질환의 위험성과 필요한 응급 조치에 대해서 설명 하였다.			
보호자를 충분히 안심시켰다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			

말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

증례별 알고리즘

