

45 물질 오남용

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)	예	아니오
약물의 복용력 에 대해서 질문하였다.		
약물의 복용량 이나 빈도 에 대해서 질문하였다.		
약물을 사용한 계기 를 질문하였다.		
약물을 감량 혹은 끊으려고 했던 경험 과 실패 이유 에 대해서 질문하였다.		
약물에 대한 의존 및 내성 이 있는지 확인하였다.		
약물의 금단 증상 에 대해서 질문하였다.		
약물 때문에 생활에서 어떤 문제가 있었는지 질문하였다(결근, 가사 소홀, 법적 문제, 대인 관계 문제 등).		
동반된 신체 증상(호흡기, 신경계, 정신)에 대해서 물어보았다.		
추가로 복용하고 있는 약물 이 있는지 질문하였다.		
현재 앓고 있는 질환 에 대하여 질문하였다.		
음주력, 흡연력 에 대해서 질문하였다.		
물질 오남용의 가족력 에 대해서 질문하였다.		

신체 진찰	잘함	보통	미흡
환자의 vital sign을 확인하였다.			
환자의 정신 상태를 확인하였다.			
동공의 확장과 축소 여부를 확인하였다.			
흉부 진찰을 시행하였다.			
복부 진찰을 시행하였다.			
신경학적 검진을 시행하였다.			

신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			

환자 교육	잘함	보통	미흡
추정 진단에 대해서 설명하였다.			
약물 오남용에 대한 부작용과 위험성에 대하여 설명하였다.			
약물 중단 의지가 없는 경우 중단을 설득하였다.			
원인 감별에 필요한 검사를 설명하였다.			
중독 증상과 금단 증상에 대한 치료 방법과 생활 습관 교정에 대한 교육을 시행하였다.			
필요 시 입원 후 용량을 줄이는 방식으로 치료가 가능함을 설명하였다.			

환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			