

병력 청취(주제 관련)	예	아니오
비밀 보장 에 대해서 설명하고 안심시켰다.		
언제 부터 자살을 생각했는지 질문하였다.		
자살 생각을 얼마나 많이 하는지 물어보았다.		
실제로 자살 계획 을 세워본 적이 있는지 질문하였다.		
자살을 실제로 시도 한 적이 있는지 질문하였다.		
과거 자살을 시도한 경험과 당시 상황 에 대해서 질문하였다.		
평소 성격 은 어떤지 물어보았다.		
가족 관계 및 대인 관계 에 대해서 물어보았다.		
우울 증상 (흥미 저하, 피로, 불안, 체중 변화, 수면장애 등)에 대해서 질문하였고, 우울 삽화가 있을 경우 언제부터 있었는지, 과거에도 있었는지, 빈도와 기간은 어떻게 되는지 물어보았다.		
그 외 정신병적 증상 에 대해서 질문하였다(환시/환청, 조증, 충동성).		
최근 극심한 스트레스 를 유발한 상황에 대해서 질문하였다.		
가족이나 동료 등 주위에 도움을 줄 수 있는 사람들 에 대해서 질문하였다.		
진단 받은 정신과 질환 에 대해서 질문하였다.		
가족 중 정신과 질환 및 자살한 사람 이 있는지 질문하였다.		
주변에 폭력을 가하는 사람이 있는지 확인하였다.		
병력 청취(기본)	예	아니오
머리 외상력 을 물어보았다.		
과거 질환 여부 를 확인하였다.		
정신건강의학과 를 방문한 적이 있는지 물어보았다.		
사회력 에 대해서 질문하였다(술, 담배, 직업).		
가족에게 현재 상황 을 공유할 수 있는지 물어보았다.		

신체 진찰	잘함	보통	미흡
갑상샘 시진 및 촉진을 시행하였다.			
자해 및 학대의 흔적을 찾아 보았다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
면담 과정에서 정서적인 지지 를 표현하였다.			
자살 이외의 다른 해결 방법 이 있음을 설명하였다.			
환자에게 필요한 면담 치료 계획 을 설명하였다.			
가족, 친구 등의 보호자가 치료에 함께 참여 하도록 설명하였다.			
경우에 따라 입원 치료 가 필요함을 설명하고 권유하였다.			
도움이 되는 생활 습관 및 치료 방법 을 설명하였다.			
약물 복용법 을 지도하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			

적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지
않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.



Memo



Memo

A series of horizontal dashed lines for writing.

Copyright © 2026 by Yedang books

• 본사의 허락없이 임의로 내용의 일부를 인용하거나 무단전재, 복사하는 행위를 금합니다.