

5 구토

채점표 예시


병력 청취(주제 관련)	예	아니오
구토의 시작 시점 및 횟수에 대해서 질문하였다.		
구토의 특성(식사와의 관계, 구토 후 증상 완화 여부)을 확인하였다.		
구토의 성상(음식물 섞임, 담즙 포함 여부, 혈액성)을 확인하였다.		
탈수 정도(목마름, 어지럼, 소변량 감소)를 확인하였다.		
전신 증상에 대해서 질문하였다(발열, 체중 감소).		
소화기 증상에 대해서 질문하였다(속쓰림, 소화불량, 복통, 설사, 변비).		
신경학적 증상에 대해서 질문하였다(두통, 시야 변화, 현기증, 이명, 팔다리 근력 저하).		
[가임기 여성] 임신 가능성이 있는지 질문하였다.		
과식 후 일부러 토하지 않는지 질문하였다.		
구토 후 동반 증상이 완화되는지 물어보았다.		
병력 청취(기본)	예	아니오
현재 복용 중인 약물에 대해서 확인하였다(NSAIDs, 제산제).		
흡연력과 음주력을 확인하였다.		
소화기 질환의 가족력 및 가족 중 유사한 증상이 있는지 확인하였다.		
환자의 소화기 질환 및 복부 수술 과거력을 확인하였다.		
최근 섭취한 음식이나 여행력을 확인하였다.		

신체 진찰	잘함	보통	미흡
환자의 생체 징후를 확인하였다.			
눈 진찰을 통해 황달, 빈혈 유무를 확인하였다.			
환자의 피부 긴장도 및 구강 점막을 확인하여 탈수 여부를 확인하였다.			
복부 진찰을 위해 환자를 바로 눕히고 양쪽 무릎을 세웠다.			

복부 청진을 5군데에서 3초 이상 실시하여 연동 운동 이상 여부를 확인하였다.			
복부 시진 - 청진 - 타진 - 촉진의 순서대로 진찰을 시행하였다.			
복부를 촉진하여 압통 및 종괴 유무를 확인하였다.			
필요한 경우 신경학적 검사(수막 자극 징후, 동공 빛 반사)를 실시하였다.			
입과 손 진찰을 통해 탈수, 구토에 의한 상처가 있는지 확인하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
임상 술기(필요 시)	잘함	보통	미흡
정맥주사에 대해서 설명하고 시행하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
구토의 일반적 원인과 필요한 검사에 대해서 설명하였다.			
수액 치료를 통한 전해질 불균형 교정의 필요성에 대해서 설명하였다.			
심한 탈수 혹은 신경계 질환 의심 시 입원을 권유하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			

눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰 할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

증례별 알고리즘



기타

약물
알코올, 아편
Reye syndrome

임신

Hyperemesis gravidarum
Acute fatty liver of pregnancy

내분비

갑상샘저하증
Adrenal insufficiency

심장

Acute MI